4.

34

DZIEŁA I ROZPRAWY MATEMATYCZNO-FIZYCZNE.

I.

ARYTMETYKA.

DZIEŁA I ROZPRAWY MATEMATYCZNO-FIZYCZNE,
WYDAWANE
przez A. CZAJEWICZA
Z ZAPOMOGI KASY POMOCY DLA OSÓB PRACUJĄCYCH
NA POLU NAUKOWYM, IMIENIA JÓZEFA MIANOWSKIEGO.

I.

ARYTMETYKA,

WYKŁAD SZCZEGÓŁOWY.

NAPISAŁ
MARYAN A. BARANIECKI.
PROFESOR UNIWERSYTETU KRAKOWSKIEGO.

WYDANIE DRUGIE, ZNACZNIE ZMIENIONE.

WARSZAWA.
W DRUKARNI NOSKOWSKIEGO.
1894.

Wyższa Szkoła Pedagogiczna
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
w Krakowie
103630

Дозволено Цензурою.
Варшава, 27 Мая 1894 года.

Pod zbiorowym tytułem: **Dzieła i rozprawy matematyczno-fizyczne,** mam zamiar wydawać w miarę zebrania odpowiedniego materyału, dzieła z dziedziny matematyki i fizyki, samodzielnie opracowane na podstawie najnowszych źródeł, obejmujących ostatnie wyniki nauki, jak nie mniej rozprawy oryginalne lub też tłomaczenia rozpraw klasycznych. Wydawnictwo niniejsze będzie uzupełnieniem tego, co dawniej wydawanem było w Bibliotece matematyczno-fizycznej pod redakcyą M. A. Baranieckiego i A. Czajewicza a zarazem obejmować będzie te dzieła, które skutkiem ich wyczerpania, wymagają dzisiaj wydania nowych edycyj powiększonych i uzupełnionych.

Obecnie wydana Arytmetyka M. A. Baranieckiego stanowi rzeczywiście drugie wydanie Arytmetyki M. A. Baranieckiego, która w Bibliotece matematyczno-fizycznej wydana była jako Tom I Seryi III, lecz jest znacznie powiększona i stanowi przewodnik dla nauczycieli przy wykładzie Arytmetyki.

Wydawca.

PRZEDMOWA

(autora)

DO WYDANIA DRUGIEGO.

Nabywcy pierwszego w r. 1884 wydania tej książki, które się w ciągu dwu lat rozeszło, sami określili jej założenie. Widocznie takie dzieło jest pożyteczne w naszej literaturze; nie stać nas jeszcze na wszechstronną i wyczerpującą arytmetykę; przynajmniej niech będą rozwinięte kwestye najważniejsze, niech będzie materyał dany, a ścisły, do ich zrozumienia.

To wydanie różni się od poprzedniego tem, że w całem są dodane tytuliki nad oddzielnemi ustępami, co z jednej strony je usprawiedliwia, z innej przejrzystszemi je czyni. Brak tytulików spostrzegłem zaraz po uskutecznieniu wydania pierwszego i postanowiłem w następnem przeprowadzić, jak również wydzielenie reguł szczególnych z reguły trzech, oparszy ich odróżnienie na przekształceniu odpowiedniego zadania na zadanie na regułę trzech.

Co do pierwszych sześciu rozdziałów, to wiele zawdzięczam profesorowi Janowi Ptaszyckiemu w Petersburgu, który wygotować zechciał dla mego użytku komentarz do owych 6-ciu rozdziałów, wytykając to, co mu się niewłaściwem wydało. Co do reguły procentu i wekslu wiele zawdzięczam kilku jędrnym uwagom p. A. Czajewicza w Warszawie, który jako wykładający w szkole handlowej z temi kwestyami ma wiele do czynienia.— Pierwsze wydanie tej książki spotkało wiele krytyk, a nawet nieporozumienie wywołało; starałem się w drugiem każdą kwestyę jaśniej postawić, wykazując moje stanowisko wobec niej

i wyświetlając faktyczną stronę rzeczy, widocznie w pierwszem wydaniu nie dość jasno przezemnie wyłożonej, co wprowadziło w błąd niektórych recenzentów.

Przykrym zaiste w naszym języku jest zbieg zakończeń w wyrazach: wartość, ilość i wielkość, której to niedogodności nie znają obce języki. Tłomaczę to szczegółowo na str. 341 niniejszego wydania. Tego uniknąć nie sposób i nie trzeba, tylko z całą powagą swobodnie tych wyrazów używać należy.

Sądzę że rozróżnienie reguł szczególnych jest wielkiej doniosłości. Ono pozwala wejrzyć jasno, na regułę trzech złożoną, jakoteż dozwala reguły szczególne uzasadnić pozbawiając je charakteru przypadkowości, jak było dawniej w starych książkach z w. XVI. Rzecz w ten sposób sama się wyklarowała.

Mimo, że książka ta od lat 5-ciu przeszło się drukowała, z powodu licznych omyłek druku z wydania kontent nie jestem i sam korekt przeprowadzać nie mogłem i to tę stronę wyjaśnia.

Poprawiając to wydanie starałem się uczynić je pożytecznem i przystępniejszem.

Kraków d. 15 Maja r. 1894.

Baraniecki.

SPIS RZECZY.

Str.

Przedmowa VII
Errata XI
Krótki rys rozwoju arytmetyki i o jej nauczaniu w polsce . XVII—LXIV

ROZDZIAŁ I.

§ 1. Pojęcia wstępne . . . . . str. 1
2. Liczenie słowne 7
3. Liczenie piśmienne 15

ROZDZIAŁ II.

§ 4. Dodawanie . . . . . str. 28
5. Odejmowanie 42

ROZDZIAŁ III.

§ 6. Mnożenie . . . . . str. 57
7. Dzielenie 90

ROZDZIAŁ IV.

§ 8. Miary . . . . . str. 122
9. Wyrażanie liczby wielorakiej jako liczby mianownej prostej i odwrotnie 142
10. Dodawanie i odejmowanie liczb wielorakich 145
11. Mnożenie i dzielenie liczb wielorakich 151

ROZDZIAŁ V.

§ 12. Dzielnik i wielokrotność liczby danéj . . . . . str. 157
13. Cechy podzielności 164
14. Spólny dzielnik kilku liczb, największy spólny dzielnik kilku liczb. 176

ROZDZIAŁ VI.

§ 16. Uzupełnienie nauki o dzieleniu liczb całkowitych czyli, o powstawaniu ułamka . . . . . str. 194
17. O liczbach ułamkowych wogóle 199
18. Dodawanie i odejmowanie liczb ułamkowych 213
19. Mnożenie liczb ułamkowych 222
20. Dzielenie liczb ułamkowych 233

ROZDZIAŁ VII.

§ 21. O liczbach dziesiętnych wogóle . . . . . str. 245
22. Dodawanie i odejmowanie liczb dziesiętnych 258
23. Mnożenie liczb dziesiętnych 262
24. Dzielenie liczb dziesiętnych 266
25. Działania na liczbach przybliżonych 273

ROZDZIAŁ VIII.

§ 26. O liczbie dziesiętnej, przedstawiającej iloraz z podzielenia dwu liczb całkowitych przez siebie. Wyrażanie ułamków zwyczajnych w postaci dziesiętnych . . . . . str. 305
27. Wyrażanie ułamków dziesiętnych w postaci zwyczajnych 315
28. Uwagi ogólne o liczbach dziesiętnych 321

ROZDZIAŁ IX.

§ 29. Stosunki . . . . . str. 325
30. Proporcyje 329
31. O wielkościach proporcyjonalnych 341

ROZDZIAŁ X.

§ 32. Reguła trzech . . . . . str. 347
33. Reguła trzech złożona 353

ROZDZIAŁ. XI.

§ 34. Reguła procentu . . . . . str. 361
35. Reguła dyskonta 380
36. Reguła podziału proporcyjalnego. Reguła spółki 384
37. Reguła mieszaniny 390
38. Reguła łańcuchowa 397
39. Reguła fałszywego założenia 407

ERRATA.

str.	*wiersz*	*zamiast*	*powinno być*
15	1 od góry	gurach	górach
15	15 od dołu (w przyp.)	15	12
15	11 od dołu (w przyp.)	Di	Die
15	6 od dołu (w przyp.)	przedstawianiu	przy przedstawianiu
20	7 od góry	(dziewięć).	9 (dziewięć
29	10 od dołu	dodaniu	dodawaniu
33	1 od góry	$5+3+4+$	$5+3+4$ . .
36	9 od góry	$+4+5$,	$+(4+5)$.
38	7 od góry	kreską	kreskę
38	15 od góry	—każdym	w każdym
39	15 od góry	naoku	na oku
45	11 od góry	w tym §	w §
55	3 od góry	różnicę	różnicy
61	8 od dołu	ilość	ilości
62	1 od dołu (w przyp)	nazywami	nazywamy
65	1 od góry	ma mocy	na mocy
69	2 od dołu (w przyp.)	4800	4×800
71	1 od góry	17	19
71	4 od góry	przeprowadziwszy	poprowadziwszy
71	2 od dołu	$=600\times4+90\times5+$ . . .	$=60\times4+90\times4+7\times4$,
71	1 od dołu	należy	należy
74	13 od dołu	powiedzić	powiedzieć
74	6 od dołu	$=(600\times4+90\times5$ . . .	$=(600\times4+90\times4$ . . .
75	14 od dołu	7257	7256
81	19 od dołu	66-ego	46-ego
83	1 od dołu	podzielamy	podzielimy
84	11 od góry	każdy	każda
84	17 od góry	cali	cale
86	3 od dołu	równy takim	równy 10 takim
89	16 od góry	liczby:	liczby;
89	16 od góry	równą	równa
89	22 od góry	$3=3\times3\times10^4$	3×10^4
89	14 od dołu	na podstawę	za podstawę
90	13 od góry	[29	[49
82	4 od dołu (w przyp.)	mnożenia	mnożeniu
93	3 od góry	jedną	jednę

str.	*wiersz*	*zamiast*	*powinno być*
95	2 od dołu (w przyp.)	= zł.	=6 zł.
96	17 od góry	zdanie	zadanie
100	13 od dołu	zastawiając	zestawiając
103	2 od góry	wraz tym	wraz z tym
103	6 od dołu	iloczynie	ilorazie
103	5 od dołu	(us. 1, 1)	(us. 1, 2)
112	4 od dołu	dzieleniu	dzielenia
117	10 od dołu	(8—3)×	(8—3)+
118	12 od góry	(§	(§ 6
118	14 od góry	6×17×6	6×17+6
118	19 od góry	więc,	więc:
122	13 od dołu	wygodnie	wygodzie
122	8 od dołu	rozwijacące	rozwijające
123	1 od dołu (w przyp.)	dorównywać	porównywać
129	9 od dołu	dośrednich	pośrednich
130	1 od góry	(por. str. 125,	(por. str. 127
131	19 od góry	państwowym	państwowym[4])
132	4 od góry	średnika	średniego
134	4 od dołu	0,549679	0,649679
134	2 od dołu	$7^3/_8$ cala	$7^5/_8$ cali
134	3 od góry (w przyp.)	kturym	których
135	1 od góry	6 ćwierciom	4 ćwierciom
135	6 od góry	= 2,843 . . .	=2,823 , . .
135	14 od góry	20 morgom	30 morgom
136	2 od góry	chełmiński [7])	chełmiński [1])
136	15 od góry	wyrazić [4])	wyrazić [5])
136	18 od góry	= włóce	=1 włóce
136	11 od dołu (w przyp.)	49,9596	948596
137	8 od góry	użycia	użyciu
139	1 od góry	12 uncyjom	16 uncyjom
139	3 od góry	= 8 miligranikom	=8 miligramom
139	11 od góry	łunta	funta
141	10 od góry	pudem	pudom
141	20 od góry	0,3047934	0,3047944
142	13 od góry	MIANOWNEJ	MIANOWANEJ
142	13 od góry	9	§ 9
142	19 od góry	będzie 15	będzie stóp 15
142	23 od góry	× 1 st.	+ 1 st.
142	4 od dołu (w przyp.)	+ c.	+ 8 c.
143	13 od dołu	3 m	3 m^3
144	7od góry	3373.	3378
144	4 od dołu	3 s.	us.
144	1 od dołu	42	342
144	3 od dołu (w przyp.)	W naszej	O naszej
145	7 od góry	27	28
147	20 od góry	20	29
149	10 od góry	681 g	684 mg
149	14 od dołu	29 mg.	29 kg,

str.	*wiersz*	*zamiast*	*powinno być*
150	22 od góry	$\times 6$ d.	$+6$ d·
152	5 od góry	256 ss.	256 st.
153	21 od góry	$\times 16$ m.	$+16$ m.
154	5 od dołu	$\times 6$ ł.	$+6$ ł
157	1 od dołu (w przyp.)	Elemento	Elementa
160	3 od dołu (w przyp.)	samą	sumą
160	2 od dołu (w przyp.)	10^1	10^2
161	2 od góry	37	36
162	4 od dołu (w przyp.)	25^2	15^2
169	7 od dołu	$=9.99+$	$= 8.99 +$
170	4 od góry	wielokrotnością	wielokrotność
170	4 od dołu (w przyp)	weszła	reszta
170	2 od dołu (w przyp.)	$n = p.$	$n=6,$
171	15 od dołu	orpowiednio	odpowiednio
171	2 od dołu	$3. (10^2 + 1)$	$3. (10^3 + 1)$
172	9 od góry	3046 . . .	3056 . .
172	14 od góry	$10^3 + 1)$	$+ (10^3 + 1)$
175	1 od góry	$= 10$	$r^2=10;$
176	4 od dołu	11	12
176	5 od dołu	119	i 119
182	5 od góry	38	39
183	3 od dołu	$c_5 + \ldots\ldots c_5 + \ldots$	$c_6 + \ldots c_3 + \ldots$
188	14 od góry	2.3.3,	2.3.5,
188	1 od dołu	b^m	b^n
190	3 od góry	640	540
192	1 od góry	pwu	dwu
192	3 od dołu (w przyp.)	X	IX
198	4 od góry	otrzymany	otrzymamy
201	2 od góry	mieści 11	mieści się 11
203	14 od góry	14	15
206	2 od dołu	(calkowite	(całkowite)
208	17 od dołu	$\frac{1}{2+\frac{1}{}}$	$\frac{1}{32+\frac{1}{}}$
209	3 od dołu	wiclokrotności	wielokrotność
212	6 od dołu	$13 \times 12 +$	$13 + 12 +$
219	11 od dołu	$\frac{5}{5}$	$\frac{5}{6}$
223	14 od dołu	$= 5$	$= 6$
223	6 od dołu (w przyp.)	podanym	podanymi
231	1 od góry	a tego	a z tego
232	3 od dołu (w przyp.)	liczbami	liczbach
246	8 od dołu	znalazły	znalazłyby
252	6 od dołu	24700.	23700
253	9 od góry	otrzymany	otrzymamy
253	13 od dołu	sm^2	cm^2
259	16 od dołu	05	0,5
267	18 od dołu	oznaczanych	oznaczonych

271	4 od góry	7	6
276	1 od góry	wartości	wartości składników
284	2 od dołu	. . . . , 028	. . . . , 023
285	3 od góry	należy mnożnik przesunąć o jedną cyfrę w lewo.	
288	4 od góry	należy dać kreskę poziomą pod drugą liczbą.	
288	6 od dołu	2[	2+[
294	11 od dołu	798,68	79868
298	13 od dołu	125685	125697
326	8 od dołu (w przyp.)	Traite	Traité
326	7 od dołu (w przyp.)	i c.	l. c.
326	7 od dołu (w przyp.)	może	moje
342	3 od góry	3 ruble	8 rubli
342	6 od dołu	wartość	wartości
342	4 od dołu	wartości	wartość
363	8 od góry	oddanym	oddanych

KRÓTKI RYS

ROZWOJU ARYTMETYKI

I O JÉJ NAUCZANIU W POLSCE.

KRÓTKI RYS ROZWOJU ARYTMETYKI

I O JÉJ NAUCZANIU W POLSCE.

Najdawniejszym [1]) zabytkiem, przedstawiającym sposoby wykonywania rachunków, jest wielce starożytny papyrus egipski, zachowany w British Museum w Londynie, który wydał Rhind, a przetłomaczył Eisenlohr (1877). Dokument ten, napisany pismem hieratycznym, posiada tytuł: *Przepis do osiągnięcia poznania wszelkich rzeczy ciemnych... wszelkich tajemnic, ktore są zawarte w przedmiotach Ułożoną była ta księga w roku 33, Mesori dnia... za króla górnego Egiptu* Ra-a-us *życie dającego, według wzoru starych pism, ktore wygotowane były za czasów króla* [Ra-en-m]at *przez pisarza* Ames'a *ułożone to pismo.* Tu wyraz Ra-a-us jest przydomkiem króla Hiksosów, którego imię jest Apepa. Panowanie zaś jego przypada nie wcześniej niż na 2000 lat, a nie później niż na 1700 lat przed Chr. Do tego więc czasu należy odnieść papyrus Rhind'a, za czym przemawiają także jego cechy paleograficzne [2]). Początkowa część tego zwoju podaje sposoby wykonywania rachunków a końcowa jest poświęcona zadaniom z gieometryi praktycznéj.

Tak w piśmie hieroglificznym, jak i w hieratycznym, ułamki $\frac{1}{2}$ i $\frac{2}{3}$ miały osobne znaki, a w hieratycznym nadto takie oddzielne oznaczenia istniały dla ułamków $\frac{1}{3}$ i $\frac{1}{4}$. Aby zaś przedstawić np. ułamek $\frac{1}{7}$ pisano znak, oznaczający 7, kładąc nad nim osobny znaczek («ro», w piśmie hieratycznym: kropkę), który wskazywał, że to nie jest przedstawienie liczby 7, lecz liczby $\frac{1}{7}$. Mogli więc Egipcyjanie, prócz ułamka $\frac{2}{3}$, przedstawiać tylko ułamki, które, według naszego sposobu ich pisania, mają w liczniku 1. Jakże należało przedstawiać inne ułamki, czyli, według papyrusa, jakże przedstawiać wypadek zadania: «podziel 2 przez 5», 7 i t. d.? Owóż, początek papyrusa zajmuje tablica takich wypadków takich dzieleń liczby 2 przez wszystkie liczby nieparzyste od 3 do 99. Np.

podziel 2 przez 11 $\frac{1}{6}\ \frac{1}{66}$ (t. j. $\frac{2}{11}=\frac{1}{6}+\frac{1}{66}$)

podziel 2 przez 13 $\frac{1}{8}\ \frac{1}{52}\ \frac{1}{104}$ (t. j. $\frac{2}{13}=\frac{1}{8}+\frac{1}{52}+\frac{1}{104}$).

---

[1]) Nie powtarzam w tym «Krótkim rysie» szczegółów o liczeniu słownym i piśmiennym. Są one podane w §§ 2-im i 3-im téj książki. Nie podaję téż mniéj lub więcéj prawdopodobnych domysłów o początkowym wykonywaniu rachunków, opartych na liczeniu społeczesnych ludów pierwotnych.

Materyjał faktyczny do części ogólnéj czerpię z następujących źródeł: Cantor'a *Vorlesungen über Geschichte der Mathematik*, t. I, 1880, t. II, 1892), obejmujące historyją matematyki do r. 1668 po Chr. (autor niekiedy zbyt śmiale robi przypuszczenia); Hankel'a *Zur Geschichte der Mathematik im Alterthum und Mittelalter* (1874); Chasles'a *Aperçu historique sur l'origine et le développement des méthodes en géométrie* (1875; przedruk wydania z r. 1837). Ostrożnie zaś korzystać należy z niekrytycznéj często kompilacyi Hoefer'a *Histoire des mathématiques depuis leurs origines jusqu'au commencement du dix-neuvième siècle* (1874), jako téż z dzieła Maksymiliana Marie *Histoire des sciences mathématiques* (1883—8).

[2]) Nie wyjaśniono dotąd należycie, o jakim dawniejszym królu wspomina ten tytuł

Oczywiście, że przy pomocy tej tablicy wszelki ułamek, którego mianownik jest nie większy od 100, a licznik jakikolwiek, można wyrazić przez ułamki, które Egipcyjanie wymówić i napisać mogli, a te ułamki doprowadzić do tego, iżby pośród podobnych składników, wyrażających ułamek dany, nie było dwu równych. Czy jednak wtedy Egipcyjanie istotnie tak postępowali, wykonywając obliczenia w swoich «domach rachunków», tego z dotąd znanych zabytków wnieść nie można.

Za to w papyrusie Rhind'a są wyraźne ślady, iż pomimo tego, że oznaczali na piśmie tylko mianowniki ułamków, umieli je skracać i sprowadzać do spólnego mianownika, gdy je należało dodać do siebie. Aby zaś przedstawić ułamki o spólnym mianowniku, opuszczano ten ostatni, a natomiast pisano same tylko liczniki (bez kropek, więc jakby liczby całkowite — ale inkaustem odmiennego koloru), i taksamo sumę tych liczników, po której pisano już zwyczajnie wypadek dodawania. — Mnożenie wykonywa się zapomocą kolejnego podwajania, jakby częściowe zastosowanie naszej t. z. praktyki włoskiéj, co w działaniach z ułamkami znakomicie ułatwia powyżéj wzmiankowana tablica. — Odejmowanie zaś i dzielenie traktuje się jako „sekem" (dopełnianie) odjemnika do odjemnéj zapomocą dodawania, a dzielnika do dzielnéj zapomocą mnożenia.

Ostatnią jest grupa zadań «hau» (kupa), które zdają się być rozwiązywane zapomocą fałszywego założenia. Podamy parę wysłowień tych zadań: «Kupa», jéj $\frac{2}{3}$, jéj $\frac{1}{2}$, jéj $\frac{1}{7}$, jéj całość, to stanowi 33»; «$\frac{2}{3}$ do tego, od tego $\frac{1}{3}$, pozostaje 10»[1]); «przepis podziału 700 chlebów między 4 osoby: $\frac{2}{3}$ dla jednéj, $\frac{1}{2}$ dla drugiéj, $\frac{1}{3}$ dla trzeciéj, $\frac{1}{4}$ dla czwartéj». — [W jednym z tych zadań są dodane do siebie liczby: 7, 49, 343, 2401 i 16807 (t. j. potęgi liczby 7), obok których są wyrazy: obraz, kot, mysz, jęczmień i miara (prawdopodobnie objętości). To zadanie przedstawia widoczną analogią z dziwaczną kwestyją, którą się jeszcze spotyka więcej, niż w 3000 lat później, u Leonarda z Pizy (wiek XIII): 7 bab idzie do Rzymu, z których każda ma mułów 7, a na każdym mule sakiew 7, a w każdéj sakwie chlebów 7, a w każdym chlebie nożyków 7, a każdy nożyk ma pochew 7; szukana jest suma wszystkich tych rzeczy.]

Niektórzy ten zabytek uważają za podręcznik do nauki, inni zaś za rodzaj kajetu szkolnego ucznia[2]) Za tym ostatnim przypuszczeniem przemawia wiele względów. Zadania są często niewyraźne, jakby zwięzłe notowania Obok błędnych rachunków są na boku zaznaczone wypadki dobre, jakby przez nauczyciela wskazane. Często złe rachunki następują po dobrym, jakby ten ostatni był wzorem podanym przez nauczyciela. Po złych zaś rozwiązaniach rachunki poprawne są kilkakrotnie powtarzane, jakby dla lepszego nauczenia się ich wykonywania. — Jeżeli papyrus Rhind'a był kajetem ucznia, to mistrz prawdopodobnie umiał więcej. Wskazywałoby to, że nauka rachunków w dawnym Egipcie stała na jeszcze wyższym stopniu, niż o tym bezpośrednio świadczy ów zabytek. — W każdym jednak razie jest on dowodem, iż w tak odległéj starożytności nauczano już systematycznie

---

[1]) T. j. $(x + \frac{2}{3}x) - \frac{1}{3}(x - \frac{2}{3}x) = 10.$

[2]) O pracach, poświęconych (1877—1882) badaniu tego zabytku, p. E. Mejerson ogłosił artykuł sprawozdawczy w *Ateneum* (r. 1883, tom IV), w którym czytelnik może znaleść szczegółowsze przedstawienie wykonywania czterech działań.

rozwiązywania nawet takich zadań, jak powyżéj przytoczone, oraz, że, mimo niedołężnego, a raczéj wielce kłopotliwego wyrażania liczb ułamkowych, przezwyciężano napotykane trudności, a nadto, że działania na liczbach ułamkowych musiały być już bardzo rozpowszechnione, kiedy obmyślono ułatwiającą je tablicę i tak jednostajnie je wykonywano.

Doniosłe w swoim rodzaju posiada znaczenie inny starożytny zabytek, mianowicie dwie gliniane tabliczki [1]), znalezione w r. 1854 przez gieologa Lofuts'a nad Eufratem około Senkereh, a które, według poważnych domnieman (Sayce) pochodzą z okresu między r. 2300 a 1600 przed Chr. Tabliczki te są zapisane po obu stronach pismem klinowym (zob. str. 16), obie do siebie należą, a jedna z nich nie jest całkowita. Na téj, która nie jest uszkodzona, po obu jéj stronach, jest 60 wiérszy. Między liczbami są wyrazy sumeryjskie, z których powtarzający się «ibdi» oznacza : kwadrat (Rawlinson). Z początku jest na téj tablicy:

1 jest kwadrat 1, 4 jest kwadrat 2, i t. d., 49 jest kwadrat 7.

Zamiast jednak tego, by daléj było podobnie: 64 jest kwadrat 8 i t. d., znajdujemy:

1 4 jest kwadrat 8
1 21 jest kwadrat 9
1 40 jest kwadrat 10 (i t. d.)
. . . . . .
58 1 jest kwadrat 59
1 jest kwadrat 1

Owóż, znaczenie liczb początkowych w tych wiérszach jest takie:

$1\times60+4$, $1\times60+21$, $1\times60+40$, i t. d., $58+60+1$, 1×60^2,

a ostatniéj liczby ostatniego wiérsza: 1×60. Ta więc tabliczka jest zestawieniem kwadratów piérwszych 60 liczb, jakby w systemacie sześćdziesiątkowym pisania liczb. Jedna strona drugiéj tabliczki (uszkodzonéj) jest niekompletnym wprawdzie zestawieniem dwu układów miar, z których w jednym podziały są dokładnie sześćdziesiątkowe. Zachowana część téj tabliczki na drugiéj stronie przedstawia sześciany liczb od 1 do 32 (na brakującéj części prawdopodobnie znajdowały się dalsze do liczby 60, jak odpowiednio kwadraty na pierwszéj tabliczce). Są one również napisane według systematu sześćdziesiątkowego; tak np.

obok liczby 4 znajduje się 1 4 t. j. $4^3=1\times60+4$,
„ 16 „ 1 8 16 „ $16^3=1\times60^2+8\times60+16$,
„ 30 „ 7 30 „ $30^3=7\times60^2+30\times60$.

Zestawiając te tabliczki, obejmujące wyrażenia kwadratów i sześcianów liczb w układzie sześćdziesiątkowym, ze śladami układu miar Babilończyków, w którym stanowczo przemagały podziały sześćdziesiątkowe, częściowo dotąd będące w powszechnym użyciu (por. § 2, us. 12), objaśnić sobie łatwo możemy najprawdopodobniejsze ich przeznaczenie, co jeszcze wprost potwierdza jedna strona tabliczki uszkodzonej. Jeżeli prawdziwą jest zaznaczona powyżéj starożytność tych tabliczek, to one wskazywałyby na to, iż działania na liczbach wielorakich w powszechnym musiały być użyciu, jeżeli obmyślono dla

[1]) Fotograficzne ich odtworzenie jest dołączone do rozprawy Lepsius'a w *Abhandlungen* akademii berlińskiéj za rok 1877.

ogólnego użytku (gliniane) podobne ułatwienia Zaznaczyć nadto wypada, że, jak z powyższego widoczna, Babilończycy byli bardzo bliscy utworzenia pozycyjnego systematu sześćdziesiątkowego pisania liczb.

Niemniéj starożytnego pochodzenia jest sposób wykonywania rachunków na przyrządach odpowiednich, który powoli bardzo ustępował pola arytmetyce «cyfrowéj», t. j. takiéj, jaka jest dziś w powszechnym użyciu.

Według źródeł chińskich, o których dotąd, co prawda, tylko przez pośrednictwo chińskich uczonych coś wiedzieć można, jeden z ministrów cesarza Huang-ti, panującego w r. 2637 przed Chr., mianowicie Szeu-ly był wynalazcą «swan-pan'u», przyrządu do wykonywania rachunków, jakotéż autorem «dziewięciu rozdziałów arytmetycznych», które prawie we wszystkich późniéjszych arytmetykach chińskich są uważane jako podstawa nauki rachunków [1]). Swan-pan tworzy rama drewniana z utwierdzonymi w niéj najczęściej 10 równoległymi drutami (tych drutów bywa niekiedy i więcéj), oraz jednym poprzecznym (do tamtych prostopadłym), dzielącym więc każdy z poprzednich drutów na dwie części; na każdym zaś z owych równoległych drutów są gałki, a mianowicie z jednéj strony poprzecznego drutu po 5, a z drugiéj po 2. Każda z owych 5 gałek na którymkolwiek drucie służy do oznaczania 10 razy większéj części liczby niż na poprzednim drucie, a każda z innych 2 oddzielnych gałek na jakimkolwiek drucie jest tyleż, co wszystkie 5 gałek, na innéj części tegoż drutu się znajdujących. Łatwo więc zrozumiemy, jak na tym przyrządzie dogodnie można była unaoczniać liczby. Gdy zaś dawniejsze sposoby piśmiennego przedstawiania liczb tak Chińczyków [2]), jak i innych ludów (por. § 3), nie nadawały się do bezpośredniego wykonywania działań na wypisanych liczbach, przeto uciekać się musiano do mechanicznych sposobów. Oznaczano przeto różne części danéj liczby (jedności, dziesiątki, sta,...) czyto różnymi przedmiotami, czytéż jednakowymi, różnie tylko uszykowanymi; następnie zaś, mając na uwadze owe przedmioty, wykonywano na nich odpowiednie działania, a nakoniec odczytywano i zapisywano otrzymany wypadek. Wskazówką tego, jak dawno takie wykonywanie rachunków było w Chinach uprawiane, a zarazem jak ono było rozpowszechnione, może służyć to, że w żadnéj książce chińskiéj o rachunkach niéma uwag o tym, jak postępować, aby dane liczby dodać lub odjąć od siebie. [3]). Natomiast na mnożenie i dzielenie są podane prawidła; pierwsze uskutecznia się przez częściowe mnożenie (uwielokrotnienie) części większéj z liczb danych, drugie zaś przez powtarzane odejmowanie.

Czy przyrządy do rachowania u różnych ludów powstawały niezależnie, czytéż są modyfikacyją swan-pan'u, stanowczo roztrzygnąć się nie da. Że niektóre z nich przechodziły od jednego narodu do innego, jest dziś rzeczą dowiedzioną. Wiele jednak względów mówi za tym, iż one wszystkie powstać

---

[1]) O rachowaniu na swan-pan'ie traktuje sześciotomowe dzieło chińskie, o którym sprawozdanie ogłosił w r. 1839 E. Biot w *Journal asiatique*.

[2]) Dziś Chińczycy w powszednim życiu używają 9 znaków na różnych miejscach, lecz choć mają i często piszą zero, to jednak, gdy np. piszą 204, pod znakiem 2 piszą 100, a daléj obok zero i cztery.

[3]) Biernatzki. *Die Arithmetik der Chinesen* (w dzienniku matematycznym Crelle'go, tom LII, r. 1856).

mogły ze swan-pan'u, ulegając zmianom pod wpływem wymagań życia praktycznego tego narodu, który takiego przyrządu zaczynał używać. Tak np. dotąd jeszcze w Rosyi używane «szczoty» mają też same ramę, druty i gałki, co swan-pan chiński; pod wpływem jednak dziesiątkowego sposobu pisania liczb znikły gałki oznaczające piątki i drut poprzeczny, a natomiast każdy drut ma 10 gałek.

Rachowanie na podobnych przyrządach wydaćby się nam dziś mogło właściwym chyba przy nauce początkowéj dzieci lub dla osób niewykształconych; wszakże coś podobnego zdarza się niekiedy jeszcze widzieć tylko u «karbowych», czytających rezultaty swych obliczeń i notowań z karbów swoich lasek. Wychowani na arytmetyce cyfrowéj moglibyśmy myśleć, że jeżeli nie zawsze, to przynajmniéj od bardzo dawna ludzie rachują w ten sposób, jak my teraz. Jak jednak zobaczymy, arytmetyka cyfrowa wkraczać zaczyna do świata chrześcijańskiego dopiero w wieku XII. Dawna zaś arytmetyka na przyrządach odpowiednich, niegdyś wyłącznie panująca, podtrzymywana późniéj siłą przyzwyczajeń i odpowiednimi podręcznikami, a tradycyją przekazywana długo następnym pokoleniom, zwolna tylko ustępuje z pola. W Polsce np. są ślady[1]), iż jeszcze w końcu przeszłego stulecia była ona w użyciu.

Aby więc zrozumiéć, jak dawniéj rachowano, aby pojąć powolny postęp arytmetyki cyfrowéj, a tymsamym i jéj doniosłość, winniśmy choć w głównych rysach zaznajomić się z rozprzestrzenieniem i najważniejszymi sposobami wykonywania rachunków na wzmiankowanych przyrządach. Tym właśnie teraz się zajmiemy.

Według świadectwa Herodota, «Egipcyjanie piszą wiérsze swego pisma «i rachują kamykami, posuwając rękę od prawéj ku lewéj, gdy Hellenowie «kierują od lewej ku prawéj». Rachowanie więc kamykami, czyli wykonywanie mechaniczne rachunków, było powszechne w Egipcie, jakkolwiek bezpośredniego śladu tego dotąd nie mamy[2]). Za to zachowały się: rysunek greckiego rachmistrza z przyrządem rachunkowym na wielkiéj wazie Daryjusza w Neapolu, jakotéż znacznych rozmiarów tablica marmurowa, znaleziona w r. 1846 na wyspie Salaminie, będąca albo stołem rachunkowym publicznego wekslarza greckiego, albotéż może stołem do gry, z przygotowanymi rzędami do obliczania wygranéj i przegranéj. Z każdéj strony jest 5 głównych rzędów i 4 pomocnicze. Piérwsze służyły do oznaczania talentów (6000 drachm), tysięcy, set, dziesiątków i pojedyńczych drachm, a były podzielone na dwie części (liczman na jednéj mógł przeto znaczyć tyle, co 5 na drugiéj części), rzędy zaś pomocnicze służyć mogły do oznaczania monet mniejszych od drachmy. Główne rzędy są opatrzone odpowiednimi znaczeniu liczmanów, na nich kładzionych, znakami liczebnymi herodyjańskimi (por. str. 16, odsyłacz 2-gi), co usprawiedliwia podział tych rzędów na wzmiankowane dwie części, gdyż istnieją oddzielne takie znaki dla 5, 50 i t. d. Przyrządy więc rachunkowe u Greków są conajmniéj tak dawne, jak owe znaki herodyjańskie (por. tamże). — Taki przyrząd Grecy nazywali «abaks»[3]), skąd nazwa rzymska «abacus» (nasza

---

[1]) Por. na str. XXVII wzmiankę o książce Marquarta z r. 1772.

[2]) Wprawdzie na papyrusie z czasów króla Meneftah I (panow. 1341—1321 jest jakby rachunek wykonany kamykami (kółka), lecz niektóre tak pionowe jak i poziome rzędy mają po dziesięć kamyków.

[3]) Niektórzy ten wyraz wiążą z pierwiastkiem semickim «bak», piasek.

«abak»), która stała się powszechną. — Jamblichus, głośny autor prac o Pitagorasie i jego szkole, piszący w IV wieku po Chr., opowiada, iż założyciele téj szkoły dowodzenia tak arytmetyczne, jak i gieometryczne przeprowadzali na abaku, a w innym miejscu wyraźnie wypowiada, że abak pitagorejczyków tworzyła tablica [1]) posypana piaskiem, co tłomaczy jéj używanie przy roztrząsaniach gieometrycznych.

U Rzymian, jak liczne wzmianki o tym świadczą, również do ćwiczeń gieometrycznych i arytmetycznych służyła tablica piaskiem pokryta, abacus, na któréj przeciągnąwszy rysy, można było, kładąc kamyki, «calculi», wykonywać rachunki. Nadto zachowały się dotąd cztéry przyrządy rachunkowe z nacięciami, w których przesuwają się gałki na sztyftach. Jeden z tych przyrządów, metalowy, służył do obliczania piéniędzy, assów i uncyj; siedem głównych nacięć, opatrzonych znakami I, X, C i t. d, jest przeznaczonych na assy; każde nacięcie składa się z dwu nierównych części (ściśléj, w jednéj linii są dwa nierówne nacięcia); w większéj można było umieszczać 4 sztyfty z główkami, a w drugiéj tylko jeden, który tyleż oznaczał, co 5 w poprzedniéj części; nadto w jednéj linii są dwa nierówne nacięcia do obliczania uncyj (ass=12 uncyjom), z których więc w jednym można było umieszczać 5 sztyftów, a w drugim 1, równoważny 6-u w tamtéj części.

Ważną reformę w rachowaniu na abaku zaprowadził sławny uczony z początku wieku VI, Anicius Manlius Boethius, autor doszłych do nas prac o arytmetyce, o muzyce, o gieometryi, oraz zaginionéj w XVI wieku pracy o astronomii [2]). Mianowicie, zamiast jednakowych, jak dotąd liczmanów, wprowadził on dziewięć różnych, «apices», na których były umieszczone znaki, oznaczające 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9, tak iż, gdy na abaku była jedna liczba, to na każdéj linii mógł być tylko jeden taki znak. Według badań Cantor'a, najdawniejsze znaki na „apices" Boecyjusza pochodzą od liter, które na oznaczenie liczb początkowych były używane przez Indusów w II stuleciu po Chr. i przez Aleksandryją dostały się do Rzymu. Że zaś z tychże indyjskich liter powstał skutkiem kolejnych zmian kształt dzisiejszych cyfr t. z. arabskich (por. str. 19 i 20), przeto łatwo się tłomaczy przez długi czas niezrozumiałe wzajemne podobieństwo tych znaków liczebnych. — Gdy wystawimy sobie na abaku przy pomocy «apices» wyrażoną jednę lub więcéj liczb, to dostrzeżemy, iż ta tylko będzie różnica od naszego ich przedstawienia, że tam będą niezajęte linije, gdzie my piszemy zera, i można powiedzieć, że około tego zera, téj jedynéj brakującéj cyfry, obracają się usiłowania tylu uczonych przez tyle wieków! — Dzielenie najwięcéj przedstawiało trudności. Boecyjusz uczy metody dopełniającego dzielenia, która prawie przez tysiąc lat była późniéj uprawianą. Tak np. dzielniki 16, 78, 623 od bliskich im liczb okrągłych większych: 20, 80, 700 różnią się o «różnice» 4, 2, 77; dzieli się więc dzielną przez wspomniane liczby okrągłe, a do reszty dodaje się iloczyny ilorazu przez owe «różnice». Gdy zaś trzeba podzielić np. przez 308, to trzeba odłączyć odpowie-

---

[1]) Boecyjusz (por. niżéj) nazywa ją «mensa Pythagorei», co późniéj rozumiano jako oznaczające znaną tabliczkę mnożenia (stąd powszechne przypisywanie jéj Pitagorasowi).

[2]) Onto te cztéry nauki objął powszechną późniéj nazwą «quadrivium». [«Quadrivium» wraz z «trivium» (gramatyka, retoryka i dyjalektyka) obejmowało «siedem sztuk wyzwolonych].

dnią część dzielnéj, pozostałą jéj część podzielić przez 300, a do téj reszty dodać «różnicę» między ową odłączoną uprzednio częścią dzielnéj i iloczynem wyznaczonego ilorazu przez 8.—Od czasów Boecyjusza stale już każda liczba (numerus) od 1 do 9 jest «digitus», palec, każda liczba, jakbyśmy teraz powiedzieli, zakończona na 0, t. j. 10, 20 i t. d. (do nieskończoności), «articulus», staw (zgięcia palca), jedna lub druga ogólnie «incompositus», niezłożona, gdy wszystkie inne liczby (t. j większe od 10, a przez 10 niepodzielne), są «compositi», złożone.

Oto jak się uczono rachunków w wieku IX: «W lecie r. 822 zacząłem «pod kierunkiem Tattos'a naukę arytmetyki. Najprzód objaśnił on nam księgi «konsula Manlijusza Boecyjusza o rozmaitych rodzajach i podziałach, jakotéż «o znaczeniu liczb; później uczyliśmy się rachować na palcach i użycia abaku «według ksiąg, które Beda [1]) i Boecyjusz o tym napisali» [2]). Nie była więc wtedy łatwa nauka rachunków: quantus sudor in mathesi expensus est.

Do ułatwienia jéj i rozpowszechnienia znakomicie się przyczynił sławny Gerbert (ur. w piérwszéj połowie wieku X w Owernii, nauki częściowo pobierał w Marchii hiszpańskiéj, zmarły w r. 1003 jako papież Sylwester II), znakomity na swój czas gieometra i astronom, tak bezpośrednim nauczaniem w Rheims, jakotéż głośnymi swymi pracami o abaku wogóle i osobno o dzieleniu. Te dzieła arytmetyczne są opracowaniami metod Boecyjusza, którego Gerbert był wielkim wielbicielem, choć ani na rysunkach abaku, w tych odpisach, które są starożytniejsze, niéma «apices» Boecyjusza; występują one dopiéro i z czasem upraszczają się w odpisach późniejszych [3]). — Od czasów Gerbert'a i jego uczniów nauka rachunków powoli staje się coraz dostępniejszą i coraz więcéj się rozprzestrzenia, gdyż i ilość szkół jednocześnie się pomnaża.

* * *

Wprawdzie najpiérwsza w Polsce wydana arytmetyka obcego autora jest przeważnie cyfrowa, piérwsze atoli książki arytmetyczne, przez Polaków układane, uczą wykonywać rachunki za pomocą kamyków na linijach abaku — są «arytmetykami linijowymi».

Najdawniejszą [4]) w Polsce drukowaną arytmetyką jest *Algorithmus* Iohannis de Sacro Busto [5]) (Cracovie, Haller, 1509; egzemplarz z biblioteki kórnickiej). Ta książka jest jednak arytmetyką cyfrową, a tylko parę ostatnich stron tak w tym wydaniu [6]), jak i w późniejszym (wnosząc z ech zewnętrznych; nie ma ono miejsca i roku druku; bibl. kór.), jest poświęconych pobieżnemu wykładowi arytmetyki linijowéj (w wydaniu z r. 1509 jeden rysunek abaku). Do téj książki jeszcze wrócimy.

---

[1]) Tu jest mowa o «Beda venerabilis» (672—735), jako autorze dzieła o liczeniu na palcach. (Zob. także koniec str. 8).

[2]) Tak pisze Walafrid Strabo.

[3]) Cantor, str. 746.

[4]) Według d-ra T. Żebrawskiego *Bibljografija z piśmiennictwa polskiego z działu matematyki i fizyki, oraz ich zastosowań* (Kraków. 1873).

[5]) Właściwie Sacro-Bosco, Jan z Holywood, uczony z wieku XIII-go, znany także jako astronom.

[6]) Wszystkich wydań przytoczonych przez Żebr. i w J. Łukaszewicza *Historyi szkół* (Poznań, 1849—51) jest 8 (ostatnie z wymienionym rokiem 1533).

Piérwsza przez Polaka ogłoszona arytmetyka, *Algorismus linealis cum pulchris conditionibus duarum regularum Detri una de integris: altera vero de fractis: regulisque socialibus: et semper exemplis ydoneis adiunctis. In florentissimo studio Cracoviensi editus non minus litteris eruditis quam mercatoribus utilis, et maxime incipientibus.* (Cracovie Haller, 1517; kart 10; bibl. kór.; istnieje wcześniejsze [1]) wyd. z r. 1513), którą ułożył «Ioannes de Lanczut Magister», cała, prócz ustępu «de numeratione» (o wartości cyfry zależnie od miejsca przez nią zajętego), jest poświęcona rachunkowi na abaku. Mistrz Jan z Łańcuta przechodzi tedy kolejno: dodawanie, odejmowanie, podwajanie (duplatio), społowianie (mediatio), mnożenie i dzielenie, przerabiając łatwe zadanie na cztérolinijowym abaku (8 figur), a następnie mówi o postępach obu rodzajów, regule trzech, nieco obszerniéj o regule spółki (uwzględniając różne wkładki na różny przeciąg czasu dane), tak na liczbach całkowitych, jak i na ułamkowych. Znanych (Żebr., Łuk.) 13 wydań téj książki (do r. 1562) wskazuje najlepiéj na jéj upowszechnienie w ówczesnych szkołach [2]).

Piérwszą w języku polskim arytmetyką jest: *Algorithmus: To iesth nauka Liczby; Polską rzeczą wydana: Przez Xiędza* Tomasza Kłosa. *Na trzy sie części dzieli, Pierwsza będzie o osobach Liczby, wtora o Regule detri, Trzecia o rozmaitych rachunkoch y o społkach kupieczkich* [3]) (1538). Każdy z trzech istniejących egzemplarzy [4]) jest zdefektowany, lecz można z nich odtworzyć całość [5]). Obszerna «Przedmowa do wszytkich młodzieńców Polskich, zwłaszcza rodziców Krakowskich» (str. 3 — 8) jest poświęcona wychwalaniu każdéj pokolei liczby od 1 do 10 i rozważaniu «pożytku tej nauki» na temat ze św. Augustyna: «żaden ku uznawaniu ani boskich ani ludzkich rzeczy nie ma przystępować, aż pirwej naukę liczby dobrze pobaczy». Początek samego już wykładu jest taki: «Poczyna się liczba Polska na linijach i na cyfrach. Pierwsza figura telko sama siebie waży. Wtóra dziesięć. Trzecia sto. Czwarta tysiąc. Piąta dziesięć tysiąc. Szósta sto tysiąc. Siódma milon. Osma dziesięć milonów. Dziewiąta sto milonów. Dziesiąta milon milonów. Naucz się tej liczby dobrze wymawiać»; tu jedna z wypisanych liczb jest 10-cyfrowa, utworzona z samych 9-tek. — «Chceszli być prędki w liczbie, naucz się tej wszytkiej figury po pamięci, na każdy dzień jednego rzędu». Tu pod napisami «Wiele czyni» są wypisane szeregi dwu czynników jedno i dwucyfrowych i ich iloczynów.... (str. 20) «Ku lepszemu wyrozumieniu tego figurę z liniami obacz:» i abak ośmiolinijowy oznaczeniem wartości liczmana, kładzionego na różnych linijach i między lini-

---

[1]) Łuk. przytacza (t. I, str. 93) spółczesne piérwszemu wydaniu téj książki: *Linealis calculatio cum pulchris documentis et regulis ad monetam cracoviensem diligenter suputata* Cracovie, 1513), napisał w Krakowie Sebastyjan Pauschner Leutschovianus, przeznaczając je szczególniéj dla kupców. Żebr. nie wspomina o téj książce.

[2]) Książka Jana z Łańcuta jest daleko lepszą od *Algorithmus linealis...* Henricus Stromer Auerbachensis, dzieła nader pobieżnego, którego są znane dwa wydania z r. 1524 (Cracovie, Vietor; bibl. kórn.; 6 kart, 11 rysunków abaku; zakres treści tenże, co u Mistrza Jana) i z r. 1536. (Pierwotne wydanie téj książki wyszło w Wiedniu w r. 1820).

[3]) *Cz* należy tu czytać *c*.


[4]) W bibl. Jagiellońskiéj, w bibl. muzeum ks. Czartoryskich i w bibl. publicznéj w Wilnie.

[5]) Całość tę wraz z rozprawą wstępną, objaśnieniami, podobiznami strony tytułowéj i strony końcowéj w opracowaniu przezemnie wykonanym, ogłosiła w r. 1880 akademia umiejętności w Krakowie jako oddzielny tomik «*Biblioteki pisarzów polskich*» (Przytaczane w tekście strony odnoszą się do tego wydania).


jami (tu zamiast poprzedniego «milona» występuje «Tysiąc tysięcy», a następnie «Pięć kroć tysiąc tysięcy» i «Dziesięć kroć tysiąc tysięcy». — Dalszy ciąg owéj części piérwszéj obejmuje zadania na 4 działania na liczbach całkowitych, oderwanych i mianowanych tak prostych jak i wielorakich; w tym ostatnim razie z uwzględnieniem rozmaitych miar i monet w ówczesnym handlu krakowskim używanych. Przy piérwszych zadaniach na dodawanie, odejmowanie i «mnożenie z dzieleniem» są abaki z odpowiednio nałożonymi liczmanami. Brak wszelkich objaśnień wykonywania działań wskazuje, że autor tylko na linijach je wykonywał (Str. 29). «Poczyna się wtóra część o regule Detri «w całej i w łamanej liczbie. Regula Detri. W której są trzy terminy: pir- «wszy jest wiadomych rzeczy, wtóry jest tych wiadomych rzeczy zapłaty, trze- «ci jest niewiadomych rzeczy. Gdy tedy chcesz dojść niewiadomych rzeczy, «mnóż je przez zapłatę wiadomych rzeczy; a ono, co przydzie z takiego mno- «żenia, dziel przez wiadome rzeczy; a w kociencie (quotiens, iloraz) przydzieć «zapłata niewiadomych rzeczy, jako tu. Kupiłem postawy sukna.

Wiadome		zapłata jich		niewiadome
post.		zł.		postawów
24	za	84.	zacz	9

«Czyni 31½ zł. Zapłata niewiadomych rzeczy na linijach tak: Kładź zawsze «ostatni termin na linijach, jako oto 9; mnóżże ji przez średni.



«Dziel przez pirwszy, jako przez 24; przydzie 31½ zł. Tym obyczajem działaj «wszytki insze takowe». Potym (str. 30—32) 6 przestróg (Kautela), objaśnionych na przykładach np. (2-ga). «Jestli pirwszy i trzeci termin mają różne mianowanie, tedy je ohróć na jedno mianowanie» i t. p. — Następnie (str. 33—36) «Łamana liczba pisze się» i 7 przestróg o ułamkach, głównie o skracaniu w postaci ułamkowéj wypisanych rozwiązań zadań na regułę trzech. Oto jak Kłos postępuje z regułą trzech w przypadku, kiedy liczby dane są ułamkowe (str. 36—7) «Reguła o łąmanej liczbie pospolita. Gdy we wszytkich «trzech terminiech jest łamana liczba przy całej, tedy złam całą liczbę przez «swego mianowacza z przydaniem licznika, produktum na miestcu licznika «kładąc; potym mnóż mianowacza ostatniego (od prawej ręki) w średniego, «a zasię toż produktum mnóż w licznika pirwego, productum tam kładąc; potym «mianowacza pirwego mnóż w licznika średniego albo ostatniego terminu, «produktum tam kładąc, jako tu w tym wnosku ukazuje:



«Wtóra część tej reguły. A jestli nie wszędzie łamana liczba jest, tedy podłóż «1 pod ony terminy, które są bez łamanej liczby, a potym czyń, jakom cię nauczył». Przykład na pierwszą część reguły jest taki: «$16\frac{2}{3}$ korcy żyta za $4\frac{1}{2}$ zł. Zacz $3\frac{3}{4}$ korcy». Stawia się więc dane liczby tak:

$$\frac{50}{3} \quad \frac{9}{2} \quad \frac{15}{4}$$

i przez oba mianowniki dwu ostatnich ułamków mnoży się licznik piérwszego, a przez mianownik piérwszego mnoży się licznik drugiego (lub trzeciego). Otrzymawszy

$$\frac{400}{3} \quad \frac{27}{2} \quad \frac{15}{4},$$

odrzuca się mianowniki, a z liczbami

$$400 \quad 27 \quad 15$$

postępuje się tak, jak w przypadku poprzednio przytoczonym, gdy liczby zadania na regułę trzech są całkowite, t. j. ostatnią (15) mnoży się przez średnią (27), a ten iloczyn dzieli się przez piérwszą (400). Odpowiedź: «facit 1 złoty 0 gr. 6 pien.» (powinno być $6\frac{3}{4}$ pieniążka). Część wreszcie trzecia (str. 38 do 51) obejmuje najróżnorodniejsze zadania: O suknie, O szafranie, O pieprzu O suknie rozmaitej barwy, O zbożu, O wolech na połowicę, i t. d., Reguła Detri w piąci terminiech, i t. d. O frimarku, O towarzystwie reguła [1]), i t. d., O porównaniu wag i myńc, Wywrócona reguła, Regula nalezienia, Łamanie łamania. Właściwie jest to zbiór zadań i odpowiedzi bez objaśnienia sposobu rozwiązywania tych zadań.

Druga w języku polskim arytmetyka znacznie obszerniejsza od poprzedniej jest: *Algorithm to iest nàuka liczby po polsku nà liniach teras nowo z pilnościa przeyrzàny, nà wielu miejscàch popràwiony, y snàdnie k nàuczeniu nisz pierwey podany.* Przez Bernarda Woiewodke. 1553. (Kart 110). Tego wydania Bibl. Kórnicka posiada dwa egzemplarze, jeden całkowity [2]), drugi bez karty tytułowej, trzeci zaś całkowity egzemplarz był w posiadaniu ks. biskupa A. Krasińskiego. (Drugie wydanie ogłoszone w Krakowie w r. 1574, trzecie zaś w Wilnie w r. 1602.) Rysunki abaku są tylko na str. 10, z objaśnieniem, t. j. 13 linij z nazwami części liczby na nich oznaczanych (7-ma: «Tysiąc tysiący», 10-ta. «Tysiąc tys. tysięcy», 13-ta: «Tysiąc tys tys. tysięcy»), i na ostatniej stronie (rycina) abak z liczmanami na stole, za którym siedzi sędziwy rachmistrz. — Choć autor w przedmowie mówi, że «kożdy mało nieco dowcipu mając może sie «już wybornie sam przez się z tego to Algorithmu wiele nauczyć», to [3]) jednak,

---

[1]) Ostatnie z trzech zadań: «Trzej się złożyli: pirwszy włożył 112 zł. i stał 5 «miesięcy, drugi włożył wino i stał 8 miesięcy, trzeci włożył 72 zł. i stał przez niewia«domy czas; i zyskali 104 zł.; a jako często pirwszy z zysku brał 5 zł., tako często wto«ry brał 6 zł., a ile razów wtóry brał 7 zł., tyle razów trzeci brał 9 zł. Jest pytanie, «jako drogo ono wino szacowano, a jako długo trzeci stał w towarzystwie, a wiele każ«demu przyjdzie z zysku.»

[2]) Z tego egzemplarza w r. 1874 Adam Piliński dokonał homograficznego odbicia. Służyło nam ono (z bibl. kórn.) przy tym opisie.

[3]) O zerze «a dziesiąta (figura) jest którą zową cifrą, która sama z siebie nic nie «waży ani znamionuje, ale mając miestce przy drugich dawa innym znamionowanie, a ta «jest 0».

czytając jego dzieło, aby dojść do takiej opinii, trzeba chyba uwzględnić inne dzieła współczesne. Tak np. prowadzi rzecz swą o dzieleniu: «Dzielenie iest «liczby większéj na tylo części rozmierzenie ile jest jedności w mniejszej liczbie, «a przeto dwie liczbie są potrzebne w każdem dzieleniu. Napierwej liczba «którą masz dzielić, a liczba przez którą masz dzielić, z których dwu wychodzi «trzecia liczba którą zową kocientem, który kocient ukazuje wiele raz liczba «przez którą dzielisz może być miana w tej liczbie którą dzielisz, a przeto gdy «jednę liczbę przez drugą chcesz dzielić, tedy tę którą masz dzielić połóż na «linie [4]) podług ich już znamionowania, a drugą liczbę, to jest przez którą masz «dzielić, napisz sobie gdzie dla pamięci albo ją pamiętaj. Potem połóż twój pa«lec na wyższej liniej gdzie leżą liczmany, a ile kroć liczbę przez którą dzielisz, «możesz mieć w onej liczbie w której palec dzierżysz telo liczmanów na tejże «liniej według palca połóż a jeśli liczby przez którą dzielisz cale a zupełnie nie «możesz mieć w onej którą dzielisz która jest na liniach, tedy telko połowicę we«zmij liczby przez którą dzielisz, a za to odjęcie połóż liczman pod linią pod tą «w której palec trzymasz miasto kocienta, a tak tym obyczajem czyń, począwszy «od wierzchniej liniej aż do niższej, aż wszystko dzielenie wypełnisz». Po takim prawidle wypisane są liczby, które należy podzielić, lub liczby mianowane proste, które należy wyrazić jako liczby wielorakie, i odpowiedzi. Wyłożywszy w ten sposób 4 działania na abaku, autor już daléj o nim nie wspomina, a tylko wprost mówi: pomnóż i t. d. — Następuje «Regula Detri» na liczbach całkowitych (str. 40) taksamo pojęta i z takimże prawidłem, jak u autora poprzedniego. — Ułamki nasz autor bardzo szczegółowo traktuje (str. 57—80), drobiazgowo mówiąc o sprowadzaniu ich do spólnego mianownika, o tym «jako masz łamanie łamania przywieść w proste łamanie», przyczym poleca «2. trzeciźnie trzech ćwierci jednej połowice» tak pisać:


$$\frac{2}{3}\ \frac{3}{4}\ \frac{1}{2},$$


pośrednio o skracaniu ułamków, oraz systematycznie o działaniach na «łamaniach» (tu «O podwojeniu łamania», «O rozdwojeniu albo połowiczeniu łamania», którychto działań na liczbach całkowitych nie było. — «Dla pobaczenia lepszego reguły detri w liczbie łamanej będziem baczyć siedm reguł» t. j. rozróżniać 7 przypadków według tego, w których z «terminów» i w ilu z nich jest albo «sama liczba łamana», albo «sama liczba łamana krom całej postawiona» (str. 80 — 108). — Resztę dzieła, a więc całą drugą jego połowę, zajmują «Reguły rozmaite a barzo potrzebne a naprzód reguła towarzystwa rozmaitego i o czasie», «Reguła towarzystwa o czasie»; «Towarzystwo w liczbie łamanej»; «Próba każdego towarzystwa»; późniéj (str. 142) «reguła równości» (za pewną sumę pieniężną kupić różnych różnéj ceny towarów tak, aby każdego towaru kupić tę samę ilość), «Regula ligar To jest Reguła mieszania» (ile zmieszano jednego gatunku danej ceny z danymi ilościami innych gatunków danéj ceny, gdy dana cena mieszaniny), «Regula legis. To jest Reguła ustawy» (dane ceny dwu gatunków wina i mieszaniny, oraz jéj ilość; w drugim zadaniu «czworakie wino»; wyznaczyć ilości gatunków mieszanych), «Regula positionis Reguła położenia» (podział proporcyjonalny zapomocą pojedyńczego

[4]) linije.

fałszywego założenia), «Regula augmenti Reguła pomnożenia» (gdyby ktoś kupił 9 funtów, to zostałoby 13 gr., gdyby 14 f. to 1 gr.; ile kosztuje funt i ile miał pieniędzy), «Regula residui Reguła zbytku» (kupiec sprzedał towar za 33 zł. i na każdym zł. stracił 12 gr.; ile go kosztował ten towar), «Regula fusti» (dane stosunek ilości mieszanych gatunków, ich cena i ilość mieszaniny; jaka jéj wartość), «Regula pagamenti. Regula commutationis» r. frymarkow. Reguła o zagadnieniu jako wiele kto ma pieniędzy; «o sędzye» (sąd pełen wody), Reguła budowania, reguła o złocie i srebrze, nakoniec «Regula falsi Reguła fałszu», «ze dwoiej liczby fałszywej wziętej na wolą rachującego, przyjdzie prawdziwa a pytana liczba») i «Regula Detri conversa. Reguła detri wywrócona». Jeżeli autor nie usprawiedliwia wskazówek, jakie daje w tych różnych regułach, to przynajmniéj licznymi próbami stara się wpoić przekonanie o prawdziwości podawanych przepisów. — Może w stopniowaniu zadań początkowych, w różnorodności podejmowanych kwestyj z życia praktycznego, w samym jej języku wreszcie dopatrywać należy wielkiéj poczytności arytmetyki Wojewódki, która sprawić mogła to, iż egzemplarze wszystkich trzech jéj wydań są dziś tak wielką rzadkością.

Nader starannym opracowaniem zaleca się Benedicti Herbesti Neapolitani *Arithmetica linearis* napisana w r. 1560 (data przedmowy) dla arcybiskupiéj szkoły szlacheckiéj w Skierniewicach, któréj autor, pochodzący z Nowego Miasta na Rusi (karta 10-ta) w roku 1571, mając lat 40, wstąpił do zakonu Jezuitów, a umarł w Jarosławiu roku 1593. W wydaniu [1]) z r. 1566 (Cracoviae, Siebeneycher, egz. bibl. głównej w Warszawie) arytmetyka obejmuje karty 6—33 (liczbowane); obfituje ona w rysunki abaku (jest ich 31), przedstawiające szczegółowo liczenie kamykami. Treść jest taka. Po 4 działaniach na liczbach całkowitych, «de progressione» (karta 21) «de tribus numeris integris» (k. 23), «de tribus numeris fractis» (k. 26), i «de tribus numeris, et societatis temporis; Caput ultimum» (k. 29). Reguła trzech tak na liczbach całkowitych jak i ułamkowych (takież tu krzyże, jak na str. XXI) taksamo traktowana, jak u Kłosa i Wojewódki, szczegółowiéj tylko i nieco wyraźniejszym rozumowaniem opatrzona; w regule spółki autor opowiada wprost otrzymanie wypadków. Rachunki w regułach objaśnione na abakach, które autor pionowymi kréskami dzieli na potrzebną ilość przedziałów; gdy zaś jest liczba wieloraka, to wszystkie jéj części ustawia obok siebie w jednym takim przedziale.





[1]) Znane są wydania z lat 1561, 4, 6, 9, 77.


Umyślnie do tego miejsca odsunęliśmy przedstawienie tego, jak na linijach wykonywano cztéry działania, gdyż dopiéro u HERBESTA są należyte wyjaśnienia, a liczby dane są większe.

Widzimy tu obok na abaku, jak mówi KŁOS, «położoną» liczbę. Na najniższej «linii» są 4 kamyki («calculi», HERBEST); a więc jedności jest 4. Taksamo dziesiątków 3. Na trzeciéj są 2 kamyki, więc dwie setki; nadto nad *trzecią* liniją kamyk, więc 5 *setek*; razem setek 7. Czytelnik łatwo daléj sobie objaśni, że mamy tu nałożoną liczbę 695 305 734. Niekoniecznie trzeba było mieć linije: dość było postawić większe kamyki dla oznaczenia rzędów, by obok nich kłaść liczmany. (Prócz krzyżyków, odpowiadających tysiącom, tysiącom tysięcy..., u HERBESTA na przecięciu téjże pionowéj kréski z linijami 6-tą i 11-tą są kółka, oznaczające więc 100 000 i 100 000 × 100 000.)

Dodawanie łatwo sobie objaśnimy na drugim rysunku:


Mamy tu dane dwie liczby: 932 i 818. Aby je do siebie dodać, zbiéram z piérwszéj linii 2 i 3 liczmany; zamiast 5-u kładę równoważny 1-en nad liniją, zamiast zaś 2 nad piérwszą liniją, kładę 1-en na drugiéj. Zbiéram te 5 liczmanów z drugiéj linii i kładę 1 nad tą liniją. Na trzeciej linii jest 7; zostawiam 2, a zamiast 5-u kładę 1 en nad linją. Nakoniec zamiast 2-ch liczmanów nad 3-cią liniją kładę 1-en na 4-éj. Odczytuję otrzymaną sumę: 1750.

Ten zaś rysunek objaśni nam odejmowanie:



Mamy tu dane dwie liczby: 3374 i 836. Aby je od siebie odjąć, zabiéram z czwartéj linii 1 liczman i zamiast niego kładę 2 nad trzecią liniją; jeden z nich i jeden odjemnika znoszą się; usuwam je. Również dlatego usuwam 3 i 3 liczmany z trzeciéj kréski, 2 i 2 z drugiéj; zaś zamiast 1-go nad drugą kréską odjemnéj, kładę 5 na drugiéj i z téj linii usuwam 1 i 1; zostaje na drugiej 4. Zamiast 1-go z nich stawiam 2 nad piérwszą kréską i t. d. Pozostanie na abaku reszta 2538.


Mając pomnożyć 365 × 48, połóżmy, jak robi HERBEST, obie te liczby na linijach (KŁOS kładzie jednę, WOJEWÓDKA większą):



Tu w trzecim przedziale dodaliśmy obwódki, obejmujące składowe części iloczynu, «Summa producta non collecta», które, według tegoż HERBESTA (karta

16), tak otrzymamy. Dotknąwszy palcem piérwszéj linii, nad którą mamy w mnożnéj 5, z uwagi, że $5 \times 8 = 40$, zgodnie z tym «jak palec wskazuje», położymy 4 kamyki na następnéj, t. j. na drugiej linii *(a)*. «Robiąc krok na drugą liniją» (ze względu na następną wyższą liniją mnożnika), $5 \times 4 = 20$, dwa kamyki, «jako takie, które ze względu na palec» 20 wyrażą, umieścimy na trzeciéj linii *(b)*. Skończywszy z piérwszą liniją mnożnéj, kładziemy palec na drugiéj; mamy na drugiéj (wraz z tym, co nad drugą) 6. Trzymając tedy właściwie palec, odkładamy $6 \times 8 = 48$ tak *(c)*, jakby na téj linii, gdzie palec, były jedności, i «znowu, po podniesieniu palca na trzecią liniją», $6 \times 4 = 24$, «które, jak wskazuje (— teraz —) palec, na linijach się oznacza» *(d)*. I t. d. Zebrawszy te częściowe iloczyny razem, t. j. wykonawszy to dodawanie na linijach, otrzymujemy ostateczny iloczyn 17 520.

Dzielenie Herbest tak przeprowadza (drugi z dwu przykładów). «We «wszystkich poematach Wirgilijusza 798 020 wiérszy; jeżeli na oddzielnych «stronnicach po 46 wiérszy napiszesz, to zapomocą dzielenia dowiész się, ile «stronnic objąć może te wiérsze. Ilość wszystkich wiérszy, jako części ca«łości, powinna być dzielną; 46, jedna część całości, dzieli. Ile więc razy «dzielna zawiéra dzielnik, tyle wskazanych będzie potrzebnych stronnic z owy«mi wiérszami. Położony zatym palec na szóstéj linii, gdy 46 w 7-u nie «mieści się, ani jego połowa, zejdzie na liniją piątą, gdyż tam już 46 w 79



«wejść może. Po wzięciu więc raz «46-u z 79-u (to zaś, co się bierze, «zawsze znika z linij), pozostanie «33, a jeden kamyk (— calculus —) «na owéj piątéj linii w miejscu ilo«razu niech będzie oznaczony. Zno«wu 46 całkowicie w 33-ch mieścić «się nie może, lecz połowę tego wziąć «możesz. Weź przeto z 33-ech po«łowę dzielnika, 23, a pozostanie, «jak wskazuje palec, 10, połowę zaś «kamyka [1]) do liczby ilorazu dołącz. «Na czwartą następnie liniją przeło«żywszy palec, znajdziemy, ile razy «46 w 108, lecz jeżeli tego odrazu «wyznaczyć nie możemy (nie mogą «zaś, chyba w tych rzeczach wyćwi«czeni), pojedyńczo dzielnik z dziel«néj ma być unoszony (— od dzielnéj odejmowany —). Po zniesieniu przeto «raz 46-u ze 108-u, pozostanie 62, a jeden kamyk na czwartéj linii ilorazu «przybędzie. Znowu gdy raz 46 zabierzesz z 62...» i t. d. — «Dzieło «z 798 020 wiérszami Wirgilijusza mieć będzie 17 348 stronnic, a pozostanie «nadto wiérszy 12, które na innéj stronie należy napisać, co także na figurze «wyobrazimy». (Tu dopiéro jest dany podobny powyższemu rysunek.)

Tak tedy uczono u nas działań na liczbach w XVI stuleciu, w złotym okresie zygmuntowskim. Nie przeszkadzało to, jak widzieliśmy, temu, że

[1]) T. j. kamyk pod tą liniją, na któréj wtedy jest palec.

radzono sobie doskonale z najróżnorodniejszymi adaniami na regułę trzech, a działania na liczbach ułamkowych wykonywano wcale wprawnie.

Wprawdzie w następnych stuleciach wydawnictwo arytmetyk «linijowych» prawie w zupełności ustaje, co wskazuje, że w wieku XVII powszechnie już do naszych szkół zaprowadzono arytmetykę «cyfrową», jednak nie tak łatwo było w zupełności wyrugować z użycia kamyki i linije. Dowodu na to dostarcza ostatni rozdział arytmetyki ks. Józefa Marquarta, Scholarum Piarum, stanowiącéj część piérwszą jego dzieła: *Nauka matematyczna...*, w Wilnie w r. 1772 (bibl. główna w War.). Dawszy temu rozdziałowi (str. 115 — 121) tytuł: «Arytmetyka liczmańska», autor zajmuje się przedstawieniem liczby i wykonywaniem 4 działań zapomocą liczmanów, kładzionych nie na linijach narysowanych, lecz obok «znaków odmiennych», (jakby owych większych kamyków u Herbesta; por. wyżéj). Kończy zaś autor ten rozdział taką uwagą: «Używają Arytmetyki liczmańskiej żydzi w rachunkach swoich, «dla tego, że jest nieomylną, gdy się z uwagą czyni, pamięci w robocie nie «fatyguje, zwłaszcza nabywszy zręczności w odbywaniu wszelkich rachunków.»


Najdawniejsze ślady świadomego i systematycznego badania własności liczb spotykamy w świecie greckim.

Według świadectwa Aristotelesa «Pitagorejczycy piérwsi matematykę naprzód posunęli». Aristoksen wyraźniej tak o tymże mówi: «Pitagoras arytmetyce jakby największą nadawał ważność i przez to głównie naprzód ją posunął, że ją postawił po nad potrzeby [1]) kupieckie i wszelkie rzeczy rozważał pod postacią liczby». Mogły więc być przedtym pewne badania, a przynajmniéj odpowiednie spostrzeżenia pewnych własności liczb, ale najdawniejsze teoretyczne dociekania w tym kierunku poczynają się od Pitagorasa z Samos. — Urodził się on w r. 580 (według innych w r. 569) przed Chr., przybył do Italii w r. 540 (inni twierdzą: w r. 510), założył tam szkołę w Krotonie, a umarł w r. 500 (inni przyjmują, iż umarł wkrótce po roku 509, a nawet w r. 470). Szkoła zaś przeżyła swego twórcę całe pół wieku. Nie przytaczając tu mniéj lub więcéj prawdopodobnych opowieści o życiu tego mędrca, jakie podają przedstawiciele t. z. szkoły nowopitagorejskiéj, o sześć stuleci późniéj w Aleksandryi powstałéj, winniśmy tu zaznaczyć, że według świadectwa Isokratesa, którego działalność piśmiennicza przypada około r. 393 przed Chr., jak i według wzmianek wielu innych autorów, Pitagoras przebywał czas jakiś w Egipcie i prawdopodobnie przyswoił sobie ówczesną wiedzę tamtejszych kapłanów. Ślady bowiem wyraźne dokładnéj znajomości urządzeń tego stanu w Egipcie, tak ściśle spojonego, a tak zamkniętego w sobie, przejawiają się w przepisach wewnętrznych życia, a poczęści i w badaniach filozoficznych, jakie cechują szkołę Pitagorasa. Może więc i cała jego nauka pozostawała w związku z tym, co było przedmiotem badań mędrców egipskich. Przebywanie zaś Pitagorasa w Babilonie jest rzeczą nader wątpliwą.

---

[1]) T. j. że zajmował się nią nie ze względu na jéj zastosowania przy rozwiązywaniu zadań, odnoszących się do stosunków kupieckich.

Nie zdaje się, aby Pitagoras zajmował się rozwiązywaniem lub objaśnianiem zadań arytmetycznych z życia powszedniego lub kupieckiego. Przeciwnie, wszystko to, co według najnowszych badań krytycznych Pitagorasowi i jego szkole niewątpliwie przypisane być może, odnosi się do teoretycznych badań własności liczb. A więc przedewszystkiem: podział liczb na parzyste i nieparzyste, a pierwszych na parzysto-parzyste (podzielne przez 4) i parzysto-nieparzyste; podział liczb na «kwadratowe» i niekwadratowe. Następnie przeróżne sumowania szeregów liczb: suma początkowych liczb nieparzystych po sobie następujących jest zawsze liczbą kwadratową, co zręcznie było objaśniane zapomocą zawsze kwadratowéj siatki punktów, powiększającej się stopniowo przez dodawanie coraz nowego «gnomonu», t. j. następnéj liczby nieparzystéj, przedstawionéj szeregiem punktów, tworzących jakby kąt prosty o równych ramionach:



suma początkowych po sobie następujących liczb parzystych jest liczbą «nierównoboczną», t. j. iloczynem dwu czynników, różniących się o jedność:
$2=1\times2$; $2+4=6=2\times3$; $2+4+6=12=3\times4$; $2+4+6+8=20=4\times5$ i t. d.; suma początkowych liczb naturalnych jest liczbą «trójkątną». Pitagoras miał określić stosunek do przyjaciela przez liczby 220 i 284, które posiadają tę własność, iż suma dzielników jednéj liczby od niéj mniejszych jest równa drugiéj i nawzajem (zob. § 15, us. 6); podobne liczby nazwano «zaprzyjaźnionymi». Nakoniec średnia arytmetyczna i średnia gieometryczna dwu liczb były określane tak, jak to obecnie się czyni, a średnia harmoniczna (zob. § 28, us. 20) dwu liczb, jako taka liczba, która od jednéj z danych jest mniejsza o taką samę jéj część, o jaką część drugiej jest od téj drugiéj większa (t. j. liczba h jest średnią harmoniczną dwu liczb a i b, jeżeli jednocześnie

$$h=a-\frac{a}{n} \quad \text{i} \quad h=b+\frac{b}{n},$$

skąd, rugując n, otrzymujemy dzisiejsze jéj określenie). Wspomniany już wyżéj (str. XXII Jamblichus przyznaje nadto Pitagorasowi używanie proporcyj ciągłych arytmetycznéj i gieometrycznéj, proporcyi harmonicznéj, jak również proporcyi «muzycznéj», którą tworzą dwie dane liczby i ich średnie arytmetyczna i harmoniczna, np.

$$6:9=8:12 \qquad \left(\text{ogólnie } a:\frac{a+b}{2}=\frac{2ab}{a+b}:b\right),$$

o którejto proporcyi, zwanéj późniéj także «doskonałą» (jako gieometryczna, w którą wchodzą liczby powstałe z proporcyj arytmetycznéj i harmonicznéj), miał Pitagoras w Babilonie się dowiedzieć.

Co do przypisywanego również PITAGORASOWI odkrycia, iż wszystkie harmoniczne dla naszego ucha tony są w związku ze stosunkami liczb najprostszych, zaznaczymy tu tylko, że np. $\frac{1}{2}$ długości struny, wydającej pewien ton, wyda ton o oktawę, $\frac{2}{3}$ zaś jej długości wyda ton o kwintę wyższy, a długości strun tonów znanego akordu: C, G, C, odpowiadają liczbom 1, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, tworzącym proporcyją harmoniczną, gdyż

$$(1-\tfrac{2}{3}) : 1 = (\tfrac{2}{3}-\tfrac{1}{2}) : \tfrac{1}{2}.$$

Na podobnéj drodze prowadzone badania, niezależnie od wpływu na rozwój nauki o proporcyjach, doprowadzały pitagorejczyków do wielu teoretycznych wyników, które musiały się wyraźnie zaznaczyć, jeżeli za czasów wzmiankowanego wyżej ARISTOKSENA z TARENTU, ucznia ARYSTOTELESA (384—322), powstała szkoła empiryczna muzyków, jako przeciwstawienie pretensyjonalnym muzykom-matematykom — Co się tyczy znanego wyrażenia przez pitagorejczyków istoty wszelkich rzeczy i różnych pojęć zapomocą liczb, jak i wogóle całéj ich mistyki liczebnéj, to te kwestyje tu opuszczamy, jako nie należące właściwie do naszego przedmiotu. —

Badania gieometryczne, których początek odnieść należy do TALESA z MILETU (640—548, lub dłużéj) i jego szkoły, wielce pobudzone przez PITAGORASA i jego uczniów, były wciąż daléj z wielkim zamiłowaniem przez Greków uprawiane. Doprowadzało to ich do coraz nowych zastosowań własności proporcyj, a wszczególności do wyczerpującego rozważania tworzenia nowych proporcyj z danych, jak również do rozważania proporcyj, w których oba wyrazy jednego z dwu stosunków były liczbami kwadratowymi lub liczbami sześciennymi, co, wrazie gdy oba wyrazy drugiego stosunku nie są takimiż liczbami, przedstawia w rzeczywistości wprowadzenie do badań liczb niewymiernych, które też Grecy dokładnie pojmowali. Dziś, traktując odpowiednie kwestyje gieometryczne nieco inaczéj, nie kładziemy na podobne proporcyje takiego nacisku, jak to gieometrowie greccy czynili. — Zauważymy tu tylko, że własności, iż między dwiema liczbami kwadratowymi znajduje się jedna liczba dwuwymiarowa («powierzchniowa» a między dwiema sześciennymi dwie trójwymiarowe («bryłowe») tworzące proporcyją z liczbami danymi (to jest: $a^2 : ab = ab : b^2$, zaś $a^3 : a^2b = ab^2 : b^3$, lub $a^3 : ab^2 = a^2b : b^3$), starożytni nazywali twierdzeniami platońskiemi (życie PLATONA [1]) od 429 do 348, zaś HIPPASOS, pitagorejczyk, ARCHITAS z TARENTU (430—365), EUDOKSYJUSZ z KNIDOS (408—355), oraz TEMNONIDES i EUFRANOR (bliżéj nieznani) doprowadzili ilość «mezotet» (μεσότητες), szczególnych proporcyj [ἀναλογία [2]), analogija] z trzech pewnych liczb utworzonych, do 10-u (t. j. prócz proporcyj ciągłych arytmetycznéj i gieometrycznéj, oraz proporcyi harmoniczněj, rozróżnili jeszcze następujące proporcyje, mające miejsce między odpowiednimi każdym razem trzema liczbami, które ogólnie oznaczymy literami a, b i c [3]):

$$a : c = (b-c) : (a-b);\quad b : c = (b-c) : (a-b);\quad a : b = (b-c) : (a-b);$$
$$a : c = (a-c) : (b-c);\quad a : c = (a-c) : (a-b);\quad b : c = (a-c) : (b-c);$$
$$b : c = (a-c) : (a-b).$$

[1]) W «Prawach» zaznacza, iż liczba 5040 jest podzielna przez 59 różnych liczb między którymi są wszystkie liczby od 1 do 10.

[2]) BOECYJUSZ ten wyraz przetłomaczył jako «proportionalitas».

[3]) Takie proporcyje będą tworzyć kolejno np. liczby (a, b, c): 6. 5, 3; 5, 4, 2, 6, 4, 1; 9, 8, 6; 9, 7, 6; 7, 6, 4; 8, 5, 3.

Że badanie własności proporcyj Grecy prowadzili nietylko ze względu na zastosowania gieometryczne, jak również, że badania własności liczb pierwszych względem siebie, a także poszukiwanie największego spólnego dzielnika i najmniejszéj spólnéj wielokrotnéj doprowadzili do takiéj doskonałości, iż do odpowiednich wówczas należycie udowodnionych twierdzeń, jak i metod postępowania, niema dziś nic do dodania, tego dowodzą *Elementa* (στοιχεια) EUKLIDESA (około r. 285 przed Chr.), pierwszego przedstawiciela szkoły aleksandryjskiéj. Według PROKLUSA (410—485 po Chr.), «EUKLIDES, który zebrał *Elementa*, wiele rzeczy znalezionych przez EUDOKSYJUSZA w całość uporządkował, wiele z tego, co TEOTETES zaczął, do końca doprowadził, a nadto to, co przez poprzedników powierzchownie było udowadniane, na gruntownych oparł dowodach». W większości wydań *Elementów* [1]) jako przeznaczonych do nauki gieometryi, są opuszczane księgi VII, VIII i IX, obejmujące różne podania arytmetyczne, a podawane są tylko księgi I—VI, XI i XII. Takim też jest polskie tłomaczenie JÓZEFA CZECHA (Wilno, 1807; 2-gie wyd. 1817). Aby czytelnikowi choć częściowo podać możność zaznajomienia się z tym, jakie już kwestyje o podzielności liczb EUKLIDES w księgach arytmetycznych rozważa, przy odpowiednich ustępach rozdziału V niniejszéj książki znajdują się cytaty z *Elementów*. Jak zaś EUKLIDES drobiazgowo bada proporcyje, można częściowo przekonać się łatwo, czytając ks. V w przekładzie CZECHA. Dodamy tu tylko, że w odpowiednich dowodzeniach liczby są przedstawiane zapomocą długości linij prostych (całe jednak rozumowanie jest tak prowadzone, iż bezpośrednio do liczb oderwanych odniesione być może), oraz zauważymy, że gdy ks. V poświęca rozważaniu proporcyj, zachodzących między wielkościami, to proporcyjonalność liczb występuje dopiero od ks. VII, co tym więcéj dziwi, że, choć według pojęć greckich nie wszelkie wielkości mogły być objęte przez liczby, to jednak, jak ARYSTOTELES wyraźnie mówi: «wielkości w szczególnych przypadkach mogą być liczbami.» Może tradycyja ówczesna, z którą EUKLIDES się liczył, nie dozwoliła mu złączyć tych dwu wykładów w jeden, a może pozostawił księgę V jako całość, obmyśloną przez EUDOKSYJUSZA, na co wskazuje PAPPUS (wiek IV po Chr.). Zwróćmy tu jeszcze uwagę na EUKLIDESA określenie liczby doskonałéj i twierdzenie o takich liczbach (por. § 15, us. 6).—

Ułamki często się spotykają u pisarzów greckich. Najczęściej oni przedstawiają je w ten sposób, iż, napisawszy liczbę (por. str. 17), którą nazywamy licznikiem, dodają u góry z prawéj strony akcent, a po napisanéj liczbie, którą my umieszczamy w mianowniku, dwa akcenty, i takie wyrażenie mianownika piszą dwa razy obok siebie. Jeżeli przedstawiali ułamek o liczniku 1, to pisali sam mianownik i raz tylko, a szczególnych znaków używali dla przedstawienia ułamków $\frac{1}{2}$ i $\frac{2}{3}$. Często jednak wyrażają, podobnie jak Egipcyjanie (por. str. XIII), ułamki o liczniku różnym od jedności jako sumę ułamków, mających w liczniku jedność; tak postępują miernicy greccy, jak również [2])

[1]) Rozpowszechnione w różnych językach wydania mają za podstawę pierwszą edycyją tekstu greckiego w Bazylei w r. 1533 i wraz z nią posiadają też same, wciąż powtarzające się, lub nieco zmienione ustępy niezrozumiałe, jako grzeszące pewną niedokładnością. Dopiero PEYRARD znalazł w biblijotece paryskiéj, pochodzący ze zbiorów watykańskich z IX-go wieku odpis tekstu greckiego, znacznie poprawniejszy, który wraz z tłomaczeniami łacińskim i francuskim ogłosił w Paryżu w r. 1814—1818.

[2]) O sposobie ARCHIMEDESA wyrażania wielkich liczb zob. str. 24.

Archimedes (prawdopodobnie 287 — 212) przy podnoszeniu całkowitych z ułamkami do kwadratu. — Klaudyjusz Ptolemeusz (około r. 140 po Chr.) w *Wielkim zebraniu*, znanym pod nazwą przejętą od Arabów, „*Almagest*“ (będącą skróceniem i modyfikacyą tytułu greckiego), używa ułamków sześćdziesiątkowych pochodzenia babilońskiego (por. str. XV). Mianowicie 360-te części okręgu koła i 120-te średnicy nazywa cząstkami (τμήματα) a tak połowy pierwszych, jak i drugie dzieli na 60 równych części, zwanych później po łacinie „partes minutae primae“, a te jeszcze na 60, „partes minutae secundae“ (skąd: minuty, sekundy i później tercyje), a ułamki te pisze nie oznaczając mianowników. [Rozważanie takich ułamków, tak w astronomicznych, jak i w innych rachunkach, trwało powszechnie aż do wieku XVI (a u nas jeszcze w wieku XVII); używano ich tak, jak teraz dziesiętnych, np. dla wyrażania ilorazu lub pierwiastka kwadratowego, wyliczenia zaś ułatwiał „canon vel tabula sexagenorum“. Przy pisaniu takich ułamków postępowano wciąż jednostajnie, tak iż np.

o I II IV
2 37 54 8 oznaczało $2+\frac{37}{60}+\frac{54}{60\times 60}+\frac{8}{60\times 60\times 60\times 60}$

Ułamki te w wieku XVI zaczynają ustępować dziesiętnym, które początkowo pisano tak, jak owe sześćdziesiątkowe; np: ułamek 2,3456 pisano naprzód

o I II III IV IV IV
2 3 4 5 6, później 23456 , albo 2,3456 .]

Aleksandryja nie była siedliskiem wyłącznie uczonych i uczących się Greków. Owszem, prócz nich, Egipcyjanie, Asyryjczycy, Indusowie, Żydzi przyjmowali czynny udział w naukowym życiu szkół tamtejszych. Stąd pochodzi pewne wzajemne oddziaływanie literatury naukowéj jednych z tych narodów na inne, i dlatego «szkole aleksandryjskiéj» nie można przyznawać czysto greckiego charakteru. — Jeden z objawów takiego wzajemnego oddziaływania widzieliśmy w ułamkach sześćdziesiątkowych. Innym jest ten, iż początkowe litery alfabetu, których Indusowie u siebie używali w wieku II po Chr., przez Aleksandryją przechodzą do Rzymu i występują tam jako wzmiankowane wyżéj «apices» Boecyjusza.

Nie możemy tu szczegółowo śledzić dalszych badań nad własnościami liczb, z żywym zajęciem i wytrwale prowadzonych przez wielu aleksandryjskich uczonych, czego wyraźne i dość liczne ślady się zachowały. Wspomnimy tylko o trzech najwybitniejszych w tym kierunku badaczach. — Nikomachus z Geoazy (prawdopodobnie z Arabii; około r. 100 po Chr.), należący do głośnéj szkoły nowopitagorejczyków, napisał sławne dwie księgi *Wstępu do arytmetyki*, obejmujące wyniki dociekań daléj prowadzonych według wskazówek pozostałych po szkole Pitagorasa (między innymi nowymi rzeczami występują tu liczby «wielokątne» i «bryłowe», czyli tak zwane «figuryczne»), któreto dzieło było długo przedmiotem studyjów wielu uczonych (w téj liczbie Boecyjusza). — Teona ze Smyrny (około r. 130), również nowopitagorejczyka, nietylko zajmują podobne powyższym roztrząsania, ale nadto ta własność liczb kwadratowych, iż: gdy jest dana jakakolwiek liczba kwadratowa, to albo ona, albo liczba o jedność mniejsza, jest jednocześnie podzielona przez 3 i 4, lubtéż z tych dwu liczb jedna jest podzielona przez 3, a druga przez 4; odpowiednio więc do tego, można liczby kwadratowe podzielić na cztery grupy. W tym twierdzeniu z zakresu obecnie tak rozwiniętéj nauki o «resztach kwa-

dratowych», spoczywa zarodek oddzielnéj gałęzi badań matematycznych, którą dziś nazywamy teoryją liczb. — DIOFANTUS z ALEKSANDRYI (co do epoki jego życia bardzo sprzeczne są wskazówki; najprawdopodobniéj żył na początku wieku IV) w swéj *Arytmetyce* zajmuje się takimi zadaniami liczebnymi, które go doprowadzają do wypisywania zapomocą skróceń w odpowiednim wysłowieniu istotnych równań pierwszych czterech stopni tak z jedną, jak i z dwiema niewiadomymi; rozwiązania jednak tych równań, tylko w liczbach wymiernych, wynajduje DIOFANTUS sposobami nie mającymi cechy metodycznego postępowania. W takichto zadaniach, znajdują się ustępy, w których jest mowa o szczególnych własnościach liczb. Tak np. całkiem ogólnie DIOFANTUS mówi o tym, że każda liczba kwadratowa może być nieskończenie wielu sposobami wyrażona jako suma dwu kwadratów (oznaczywszy ogólnie daną liczbę kwadratową przez a^2, można to tak przedstawić:

$$a^2 = \left(\frac{2m}{m^2+1}.a\right)^2 + \left(\frac{m^2-1}{m^2+1}.a\right)^2,$$

przy jakimkolwiek m). W innym miejscu jest mowa o wyrażeniu iloczynu dwu czynników (5×13), z których każdy jest sumą dwu kwadratów, dwoma sposobami jako sumy dwu kwadratów,

$$(a^2+b^2)(c^2+d^2) = (ac+bd)^2 + (ad-bc)^2 = (ac-bd)^2 + (ad+bc)^2.$$

Okolicznościowo również jest zaznaczone, że dana liczba postaci $4.a + 3$ nie może być sumą dwu kwadratów. Różnica dwu liczb sześciennych jest zawsze sumą dwu takichże liczb. I t. d. Ogłoszenie drukiem dzieła DIOFANTESA w łacińskim przekładzie w końcu wieku XVI, a w poprawniejszym w początkach wieku następnego, wywołało w wieku XVII głębsze badania własności liczb, które w drugiéj połowie wieku XVIII wytwarzają oddzielną gałąź matematyki, teoryją liczb, wciąż już rozrastającą się wynikami dociekań najznakomitszych matematyków. —

Jak Indusowie rachowali przed powstaniem u nich (por. str. 18) systematu pozycyjnego, t. j. przed epoką wprowadzenia zera, tego pewnych śladów dziś niema. Późniéj zaś spotyka się u nich odejmowanie tak wykonywane, jak my teraz je przeprowadzamy (niekiedy według sposobu dziś używanego we Francyi; zobacz str. 51, odsyłacz). Mnożyli zaś liczby różnymi sposobami. W jednym z nich nie zaczynają od najmniejszych części, lecz przeciwnie od największych, co jest usprawiedliwione tym, że jeszcze dotąd wykonywają rachunki pręcikiem na tablicy posypanéj piaskiem; zastępywanie więc jednych cyfr innymi nie przedstawia w tym razie niedogodności. Inny z ich sposobów mnożenia wyłożymy niżéj, mówiąc o podręczniku BROŻKA. Dzielenie wykonywano w sposób dosyć zawikłany. Sprawdzają dodawanie, odejmowanie i mnożenie zapomocą próby przez 9 (§ 13. us. 17). Przedstawiając ułamki, piszą licznik nad mianownikiem, nie oddzielając ich od siebie poziomą kreską, a astronomowie używają ułamków sześćdziesiątkowych, nie pisząc mianowników. Podnoszenie do potęg i wyciąganie pierwiastków (kwadratowych i sześciennych) uważają za działania elementarne, których sześć liczą.

Badania matematycznae w zabytkach piśmiennych dawniejszych występują u Indusów tylko jako przygotowania do astronomii i astrologii, lub też

jako ustępy okolicznościowo wtrącone. Najważniejszymi dla nas pomnikami wiedzy dawnéj indyjskiéj są dzieła astronomiczne, które pozostawili: Arjabhatta (urodzony w r. 476 po Chr.), Brahmagupta (ur. w r. 598) i Bhaskara Akarja (ur. w r: 1114) — Pierwszy z nich zajmuje się zadaniami na regułę trzech, tak «prostą», jak i «odwrotną»; dwaj ostatni rozwiązują także zadania na regułę trzech złożoną. Zadania na procent składany podaje już Arjabhatta; a u tamtych występują zadania na regułę mieszaniny i znane zadania o napełnianiu studni. Bhaskara używa fałszywego ułożenia jako wyrobionéj już metody. Wszyscy zajmują się zadaniami na «odwrócenie», w których porządek, w jakim należy wykonać działania wskazane dla wyznaczenia liczby szukanéj, jest wprost przeciwny zachowanemu w wypowiedzeniu zadania. Tak np. Bhaskara: «Piękna dzieweczko z błyszczącymi oczyma, «jeżeli dobrze pojmujesz prawdziwą metodę odwrócenia, to mi powiedz, jaka «to jest liczba, która pomnożona przez 3, następnie o $\frac{3}{4}$ iloczynu powiększona, «przez 7 podzielona, o $\frac{1}{3}$ ilorazu zmniejszona, przez siebie samę pomnożona, «o 52 zmiejszona, wskutek wyciągnięcia pierwiastka kwadratowego, dodania «8-u i podzielenia przez 10, wydaje 2?» (Odp. 28). — Wszyscy trzéj wymienieni pisarze sumują szeregi kwadratów i sześcianów liczb naturalnych, Brahmagupta sumuje liczby trójkątne, a Bhaskara podaje wyrażenia na ilość kombinacyj oraz na ilość przemian (tych ostatnich także przypadku częściowo jednakowych elementów). — Zaznaczymy jeszcze dodatkowo, że, głównie w dziełach wymienionych trzech pisarzów, występuje gieometryja indyjska rozwijająca swe metody niezależnie od metod greckich, że algiebra powstała u Indusów i rozwijała się świadomie, t. j. doszła do wytworzenia pewnych jednostajnych metod postępowania, że nakoniec zastosowanie algiebry do gieometryi i nawzajem również narodziło się w krainie Indusu i Gangesu i doprowadziło tamtejszych uczonych do poważnych wyników.

Umyślnie tu przytoczyliśmy te szczegóły, aby uzasadnić pojęcie w ostatnich dopiero czasach poczynające się rozpowszechniać, iż arabscy matematycy wzmiankując w swych pracach, iż wykładają naukę indyjską, i przedstawiając systemat pozycyjny pisania liczb jako pomysł Indusów, nie czynili tego w celu otoczenia swych dzieł urokiem dalekiego wschodu, lecz w owych zaznaczeniach dali tylko dowód swéj chwalebnéj sumienności. Niesłusznie więc postępowano przez tyle wieków, upatrując kolebkę algiebry u Arabów, a arabskim mianując powszechny teraz sposób pisania liczb — Co się zaś cyfr teraźniejszych tyczy, to one są tegoż pochodzenia, co «apices» Boecyjusza: powstały z początkowych liter alfabetu, używanego w Indyjach w II stuleciu po Chr. (Zero tamże około r. 400 zaczęło być w użyciu.) Z Aleksandryi rozpowszechniły się one także na północy i zachodzie Afryki. W wieku VIII Arabowie znali nietylko owe cyfry [w tych postaciach, w jakich je oni pisali (odmiennych od używanych u nich na wschodzie), nazywają się one «gubar», piaskowe, prawdopodobnie od posypywanéj piaskiem tablicy Indusów (str. XXXII)], ale także zero [sanskryckie «sunja», a arabskie «as-sifr» (skąd cyfra; zob. str. 19) oznacza: puste, próżne]. W Rzymie, choć znano owe litery (cyfry), «apices», i posługiwano się nimi, pisząc np. «6 razy 9 jest LIV», nie zdołano jednak wpaść na pomysł oznaczania osobnym znakiem linii, niezajętéj na abaku przez «apices» (por. str. XVIII). Próżno więc w Rzymie w używaniu «apices» upatrywać źródła systematu pozycyjnego. — Dodać można do téj kwestyi to jeszcze, że Arabowie, którzy pisali od ręki prawéj ku lewéj (Indusowie przeci-

wnie) i w tym także kierunku (oile nie wypisywali liczb wyrazami [1]) całymi), pisali pierwotnie liczby (poczynając od części największych) przy pomocy liter swego alfabetu (por. str. 17), musieli, przejmując systemat pozycyjny, znaléść go już należycie wyrobionym, przyswoić go sobie nie oddzielnie, lecz wraz z całym szeregiem zastosowań, prostotą metody imponujących, kiedy go nie zmodyfikowali zgodnie z kierunkiem swego pisma. Jedynym tylko piętnem tego, żeśmy ten systemat przedstawiania liczb wzięli nie wprost od Indusów, lecz przez pośrednictwo Arabów, jest liczenie miejsca zajmowanego przez cyfry od prawéj ku lewéj.

Epoka przeniesienia stolicy kalifów do Bagdadu (768), leżącego pośrodku między dwiema krainami, z których jedna miała wspaniałą przeszłość naukową, a druga ówcześnie pielęgnowała naukę u siebie i daléj ją rozwijała, jest początkiem oddziaływania indyjskiéj i greckiéj literatury na kształtujące się życie naukowe potężnych wtedy wyznawców proroka, którymto życiem troskliwie się opiekowali kalifowie z rodu Abbasidów, Almanzur, Harun Alraszyd, Almamun. Jeszcze w VIII stuleciu Arabowie zaznajomili się z astronomią i arytmetyką Indusów, a w następnym już pracowicie tłomaczą dzieła Ptolemeusza, Euklidesa, Apolonijusza, Archimedesa, Diofantusa i niektórych późniejszych uczonych aleksandryjskich, oraz sami już budują obserwatorya w Damaszku i Bagdadzie i prowadzą daléj wyliczenia astronomiczne i gieodezyjne. Przy tych rachunkach posługują się systematem pozycyjnym, który nazywają «indyjskim», choć, wpisując wypadki ostateczne do swych tablic, uciekają się do abecadłowego wyrażania liczb. We wszystkich zaś podręcznikach arabskich do nauki rachunków, w których są znaki liczebne, panuje wyłącznie systemat pozycyjny.

Autor sławnego pierwszego traktatu o algiebrze i kierownik wielkich prac astronomicznych, podjętych na zlecenie kalifa Almamuna, Muhammed ibn Musa Alchwarizmi (t. j. M., syn Mojżesza, z prowincyi dziś nazywanej Charizm, albo Chiwa), który żył w pierwszéj ćwierci wieku IX, ułożył podręcznik arytmetyczny, o którym do niedawna tyle tylko wiedziano, że «księga o sztuce «rachowania celuje po nad innymi krótkością i przystępnością, a okazuje du«cha i bystrość Indusów w znakomitych wynalazkach». Znaleziony w r. 1857 w biblijotece w Cambrigde łaciński rękopis (*Trattati d'aritmetica, pubblicati da* B. Boncompagni, Rzym, 1857, *N. 1)* pod tytułem: *Algorithmi de numero Indorum*, okazał się tłomaczeniem z początku wieku XII owéj zaginionej arytmetyki Alchwarizmi. W tym tytule umieszczony, a znajdujący się także na początku tekstu, wyraz «Algoritmi» jest przeróbką przytoczonego przydomka Muhammeda. Ten wyraz, jakotéż inne jego wersyje: algorithmi, algorismi, alchaurismi i t. d., a późniéj: algorithmus, algorismus (najdziwaczniéj objaśniane; jedno objaśnienie przytoczymy niżéj z Sacro Busco) były używane na oznaczenie nauki rachowania na cyfrach [czyli, według wyrażenia Wojewódki (dedykacyja): «jako Niemcy mówią na piorku»], wskutek czego wykonywających rachunki na cyfrach i wykonywających na abaku nazywają odpowiednio: algorytmistami i abacistami. [Widzieliśmy, że Jan z Łańcuta, Kłos, Wojewódka przez algorytm rozumieją wogóle arytmetykę. Obecnie używa się w nauce wyraz algorytm na oznaczenie powtarzającego się postępowania w ra-

[1]) Używane przez Arabów wschodu osobne znaki liczebne, zwane «diwani» mają być skróceniami odpowiednich liczebników.

chunku, które staje się [1]) regułą.] Z téj arytmetyki Alchwarizmi przytoczymy tu tylko to miejsce, w którym on doskonale mówi o zerze, gdy w liczbie po oddzieleniu dziesiątków nic nie pozostaje: «jeżeli nic nie pozostanie, «kładź koło, żeby miejsce nie było próżne, lecz niech będzie to koło, które «je zajmuje, aby, gdyby (miejsce) próżne było, nie zmniejszały się miejsca «i drugie nie mogło być piérwszym».

Arabowie widocznie bardzo wielki kładli nacisk na rozpowszechnienie w masach nauki rachunków. Dowodzi tego, popiérwsze, wielka bardzo ilość dzieł, które o niéj napisali, a następnie, że w późniejszych arytmetykach widocznie mają na myśli szérszy zastęp uczących się, gdyż zwykle opuszczają potrzebną tylko astronomom i uczonym wogóle rzecz o wyciąganiu pierwiastka kwadratowego i sześciennego, jakoteż o ułamkach sześćdziesiątkowych (co w początkowych arytmetykach jest szczegółowo wykładane), a zajmują się tylko dodawaniem, odejmowaniem, społowianiem, podwajaniem (to działanie zwykle po poprzednim; taksamo Alchwarizmi), mnożeniem, (początkowo tylko takim, jak uIndusów, od większych części), dzieleniem liczb całkowitych (różnymi metodami), często próbą przez 9 («indyjską»), cztérema działaniami na ułamkach, które tak piszą, jak Indusowie (str. XXXII), wreszcie wskazówkami do rozwiązywania zadań, między którymi jest metodycznie używana reguła fałszywego założenia, zwana w późniejszych przekładach łacińskich albo regula duorum falsorum, albo regula augmenti et deminutionis. Już zaś Alchwarizmi w swéj algiebrze mówi o regule trzech, którą mógł tylko przejąć od Indusów. Widzimy więc, że arytmetyka Arabów jest oczywiście pochodzenia indyjskiego.

Choć zajęci głównie astronomiją, gieometryją i algiebrą, Arabowie prowadzili daléj badania teoretyczne własności liczb, przejęte od Greków i Indusów. Nie mogąc tu przytaczać niektórych istotnie ciekawych własności, przez Arabów zaznaczonych i dowodzonych, zrobimy tu tylko wzmiankę o dwu szczegółach mniejszéj naukowéj ważności, lecz będących w pewnym związku z poprzednio przytoczonymi pojęciami. Tabit ibn Kurra (836 — 901) podaje przepis tworzenia pary liczb zaprzyjaźnionych z trzech liczb piérwszych oznaczonéj postaci (por. str. 373). Najdawniejszy ślad tak zwanych «kwadratów magicznych» (t. j, takich ustawień jakby na polach szachownicy, tworzących odpowiedni kwadrat, kwadratów początkowych liczb naturalnych, iżby tak suma liczb każdego poziomego i pionowego rzędu, jak i suma liczb w każdéj przekątnéj, była ta sama) jest rozważany w pismach arabskich już w X stuleciu, gdy w Bizancyjum występuje w wieku XIV, a w Indyjach w XVI.

Usadowiwszy się w Hiszpanii (w wieku VIII), Arabowie żyli tam tą samą strawą naukową, co ich współwyznawcy na wschodzie. Mimo bowiém różnic plemiennych Arabów właściwych, Syryjczyków, Greków, Persów, Turków, Koptów, Berberyjczyków, Iberyjczyków, Gotów i t. d., mimo waśni wewnętrznych, mimo zazdrości naukowéj Arabów zachodu i wschodu, przeszkadzającéj np. w ujednostajnieniu pisania cyfr, należy ówczesny świat islamski, t. j. Arabów w ogólniejszym pojęciu tego wyrazu, uważać za jednę całość, któréj

[1]) Tak np. mówimy, że: poszukiwanie największego spólnego dzielnika dwu liczb, wyrażanie ułamka zwyczajnego w postaci ułamka ciągłego, rozwiązywanie w liczbach całkowitych równań nieoznaczonych stopnia 1-go z dwiema niewiadomymi polegają na tym samym algorytmie, albo np. algorytm największego spólnego dzielnika, algorytm wielkości nieskończenie małych i t. d.

części nie przestają na siebie oddziaływać. Cała więc literatura naukowa, powstała na wschodzie arabskim, jest przedmiotem studyjów Arabów hiszpańskich. Ich emirowie z rodu Omaijadów w swéj stolicy, Kordubie, gromadzą wielką biblijotekę i opiekują się naukami, głównie astronomiją, która kwitnie także w Toledo, a w końcu wieku X mają już własnych uczonych. Za ich następców, śród ciągłych walk i częstych niepowodzeń, niemogła samodzielna nauka zakwitnąć u Arabów hiszpańskich. Zawsze jednak pojawiają się poważni miejscowi uczeni aż do połowy wieku XIII, choć już wtedy tylko państewko Granady jest w mocy saraceńskiéj. W tym czasie Alfons X, król kastylski (1252 — 1284), idąc za przykładem kalifów, zwołuje na swój dwór astronomów maurów, żydów i chrześcijan, aby ułożyli znane późniéj pod jego imieniem tablice astronomiczne, jak również, aby na narzecze kastylskie przekładali astronomiczne dzieła arabskie.

Wcześniéj jednak, bo już na początku wieku XII, zaczęto na łacinę tłomaczyć dzieła czyto arabskie, czytéż tylko przez Arabów używane. W taki sposób około r. 1120 dokonany został piérwszy przekład łaciński *Elementów* Euklidesa przez Atelhart'a z Bath, mnicha z Anglii, prawdopodobnego tłomacza wzmiankowanego powyżéj podręcznika arytmetycznego Alchwarizmi. Od połowy tegoż XII stulecia pojawia się cały szereg tłomaczeń z arabskiego różnych dzieł filozoficznych, medycznych, przyrodniczych, matematycznych, astronomicznych i astrologicznych. Tak Gherardo z Kremony (1114—1187) tłomaczy przeszło 70 dzieł, a w téj liczbie ponownie Euklidesa, po raz piérwszy *Almagest* i cały szereg prac greckich. I t d.

Za samodzielną przeróbkę dzieła arytmetycznego Alchwarizmi, dokonaną przez uczonego żyda Jana z Sewilli (Johannes Hispanensis), wielu uważa jego *Liber alghoarismi* (napisany około połowy wieku XII; *Trattati d'ar. pubblic. d.* B. Boncompagni, *N. 2*), który służył za wzór wielu późniejszym podobnym podręcznikom arytmetycznym. Cantor utrzymuje, iż ono jest niezależne od owego dzieła Alchwarizmi i jest tylko tłomaczeniem innego niewiadomego autora arabskiego.

Za to owocem wielkiéj pracy i talentu jest dzieło *Liber abaci* Leonarda z Pizy, zwanego Fibonacci (t. j. syna Bonifacego), napisane w r. 1202, a uzupełnione w r. 1228 (*Scritti da* Leonardo Pizano, *pubbl. d.* B. Boncompagni, t. I, 1857), które doznawało długo ogromnéj wziętości. Obejmuje ono w swobodnym i samodzielnie pomyślanym wykładzie arytmetyczną i algiebraiczną wiedzę Arabów. Autor, mimo ogromu materyjału, zdołał ją przedstawić wzorowo jasno, podając wszędzie należyte dowody, jeżeli one nie leżą w samym uszykowaniu wypowiadanych prawd. W podobny sposób jest ułożona jego *Practica gieometriae* (z r. 1220), matematyczne zaś pisma różne *Flos*, a więcéj *Liber quadratorum* z r. 1225 (te trzy prace: *Scritti* ..., t. II, 1862) częściowo przedstawiają owoce oryginalnych badań tego znakomitego uczonego. Leonardowi z Pizy zawdzięczać więc należy rozpowszechnienie w świecie chrześcijańskim arytmetyki i algiebry w zakresie i metodami, jakie były w użyciu u Arabów, a w szczególności wprowadzenie systematu pozycyjnego i metod rachunkowych Indusów, przeciwstawienie ich rachowaniu na abaku, podniesienie bardzo niskiego poziomu ówczesnych badań matematycznych przez przystępne wyłożenie owoców pracy naukowéj Greków i Indusów, które, wraz z przyczynkami Arabów, tą drogą prędko się do szkół przedostały. Późniéj dopiero przekłady łacińskie tłomaczeń arabskich dzieł greckich, a następ-

nie łacińskie tłomaczenia bezpośrednio z greckich oryginałów wpłynęły odżywczo na rozwój nauk wogóle, a matematyki w szczególności.

* *
*

Tadeusz Czacki jedyny dotąd zwrócił uwagę na pojawianie się cyfr «arabskich» w dawnych naszych dokumentach. Oto, co on o tym mówi: «wiem tylko, że w Polsce przed Kazimierzem Wielkim, nie widziałem cyfer «arabskich w przywilejach. W jednym traktacie teologicznym czyli kommen«tarzu Joannis de Cracovia 1332. roku widziałem cyfry arabskiemi zwane, «a oprócz dwóch przywilejów Kazimierza Wielkiego i jednego Elżbiety, do «panowania Władysława Jagiełły w tranzakcyjach publicznych cyfrowéj liczby «nie widziałem. W piętnastym wieku zaczęły być powszechniéj w Polsce «używane.» [1])

Jakeśmy wspomnieli (str. XIX), piérwszy w Polsce drukowany podręcznik arytmetyczny, *Algorithmus* [2]) Iohannis de Sacro Busto (1509), jest właściwie arytmetyką cyfrową. Wydanie r. 1509 zaczyna się od rodzaju przemowy: wystawiania ważności i pożytku arytmetyki, z przytoczeniem przeróżnych odpowiednich wyrzeczeń. Ma to tytuł: «Laudatiuncula aritmetice». Poczym: «Incipit textus Algorithmi magistri Iochannis de Sacro Busto». (Tego wszystkiego niema w owym wydaniu bez wymienionego miejsca i roku). Odtąd tekst obu wydań jest prawie [3]) identyczny. Porządek treści taki: wstęp (tu: «Est enim nomen ipsius Algorithmus et dicitur ab algos, id est ars, «et rithmus quod est numerus, quasi ars numerandi»), a daléj w podziale liczb (na «digitus», «articulus», «compositus»), nakoniec wyliczenie siedmiu działań: liczenie i t. d., z których siódme, wyciąganie pierwiastków jest podwójne: kwadr. i sześ., o liczeniu [tu: «decima vero (figura) dicitur theca, vel circulus, vel cifra, vel figura nihili»], o dodawaniu, o odejmowaniu, o społowianiu, (późniéj) o podwajaniu, o mnożeniu, o dzieleniu, o postępie (sumowanie szeregów liczb naturalnych, zaczynających się od 1 lub od 2), o wyciąganiu pierwiastków (z podziałami już wzmiankowanymi). (Wydanie r. 1509) «Finis» [poczym «Perutilis ac subtilis Algorithmi practica linealis» na dwu stronnicach; na pierwszéj objaśnienie wartości liczmana («denarius») na linijach i między linijami, oraz rysunek abaku [4]), na drugiéj: o mnożeniu, prawidło dzielenia (7 wiérszy), prawidło postępów («regula progressionum»; 5 wiérszy) i o podwajaniu.] W obu wydaniach niema wykonanego ani jednego rachunku—przepisy na wykonywanie działań opowiedziane są słowami zapomocą ogólnego mó-

---

[1]) A daléj dodaje: «Wszelako w nadaniach literowa liczba dość często łacińska, «a najczęściéj ruska, została użytą. Niech ta uwaga zastanawia czytających przywileje. «Byłem świadkiem, jak przez taką niewiadomość jedno miasto utraciło dobrodziejstwo «posiadania wielości łanów litera ruską *k* czterdzieści znaczącą wyszczególnionych.» *O litewskich i polskich prawach* (1800 — 1), tom, w wydaniu hr. E. Raczyńskiego (Poznań, 1843—4) str. 94.

[Jak zaś sobie inaczéj jeszcze radzono, zob. niżéj na str. 10 w ostatnim odsyłaczu.]

[2]) Albo Żebrawski błędnie cytuje (str. 76) za Wiszniewskim przez tego ostatniego (*Historyja Literatury*, t. IV, str. 177) podany tytuł tego wydania pierwszego Hallera, albotéż istniało drugie wydanie także Hallera również z r. 1509, mające także 12-cie kart in 4-to, oraz na tytule: orzeł, herb Krakowa i pogoń. (Ostatniego przypuszczenia nie uwzględniam, przy obliczaniu znanych 8 wydań téj książki).

[3]) Zauważyłem różnice tylko co do kilku wyrazów głównie na dwu ostatnich kartach.

[4]) Niezgodny z tekstem, bo liczman oznaczający 5 zamiast być pod drugą linią jest pod pierwszą, taksamo 50 i t. d.

wienia o jednościach, dziesiątkach, setkach i t. d. Liczby wymieniane są tylko w ustępach o liczeniu i o postępie. O ułamkach niema wzmianki.

Nie mamy w wieku XVI arytmetyk cyfrowych w języku polskim. Z kilku zaś takich łacińskich arytmetyk owego jeszcze wieku zrobimy tu wzmiankę o tych dwu, które miały więcéj niż jedno wydanie.

W porównaniu z poprzednią arytmetyką znakomitym dziełem jest *De VI. Arithmeticae practicae speciebus* Henrici Glareani *Epitome* (skrót), którego jedno wydanie, jako «denuo ab Authore recognita», wyszło w Krakowie r. 1549 (bibl. kór.; str. 76), a inne bez wymienionego roku (również u Szarfenbergera w Krakowie; prawdopodobnie wcześniéjsze). Są to przedruki obcéj książki (jedno takie wydanie Friburgi Brisgoiae, 1539). Przedmowa (str. 5 — 22) jest poświęcona nauce o podziałach liczebników i ich przytoczeniu: Cardinalia (tu zestawione z sobą rzymskie, greckie i pozycyjne pisanie liczb), distributiva, syncopata, Ordinis, In Arius, Syncopata frequentiora, Relativa Numeralia, Multiplicativa ab his derivata, In Anus, Adverbia Numerandi. Następuje (str. 23) właściwa arytmetyka. We wstępie (co jest aryt. i o jéj podziale na teor i prak.) wzmianka o dwu tomach Boecyjusza, następnie o liczeniu (o cyfrach, że są od Indusów lub Chaldejczyków przyjęte) tak rzymskim jak i greckim, wraz z podziałem liczb na «digitus», «articulus» i «compositus». Dodawanie (str. 30) i odejmowanie (str. 35) bardzo szczegółowo i dobrze objaśnione z licznymi przykładami. Mnożenie (str. 42) zaczyna się od wynajdywania iloczynów dwu liczb jednocyfrowych, których suma jest mniejsza od 10-u (por. niżéj przy Brożku), daléj tabliczka [1]) mnożenia o 100 kwadratach i uwagi o niéj. Mnożenie liczb wielocyfrowych (str. 49) po ogólnym opowiedzeniu jest objaśnione na dwu przykładach 365×24 i 300×20. Pierwsze z tych mnożeń tak jest uszykowane:

2	
1 2 2	
1 1 4	
6 2 0 0	
3 6 5	Multiplicandus
2 4	Multiplicans
8 7 6 0	Summa producta

t. j. 2 r. 3, 6 i piszę je nad kréską nad 2-ką; 2 r. 6, 12 i piszę 1 nad (poprzed.) 6, a 2 obok 6; 2 r. 5, 10 i piszę podobnie 1 w drugim, a 0 w pierwszym wiérszu, licząc od kreski, obok już napisanych cyfr; następnie 4 r. 3, 12 i piszę je w trzecim wiérszu od kreski tak, aby 2-ka była nad 4-ką mnożnika; 4 r. 6, 24 i piszę 4 na wolnym następnym miejscu w drugim wiérszu, a 2 na poprzednim miejscu w czwartym wiérszu; 4 r. 5, 20 i piszę 0 na wolnym następnym miejscu w piérwszym wiérszu, a 2 na odpowiednim w trzecim; nakoniec wykonywam dodawanie kolumn tych cyfr, pisząc sumę pod kreską, poprowadzoną pod mnożnikiem. — Dzielenie (str. 53) objaśnione na kilku przykładach; w pierwszym idzie o dzielenie 8760 przez 365.

2	
1 4	
2 5 2	
8 7 6 0	
3 6 5	
3 6	
(24	

(Początkowo jest nad liniją liczba 8760, a pod liniją liczba 365). 3 w 8-u 2 razy; piszę 2 za półksiężycym. 2 r. 3 (przekréślam) 6, odejmuję 6 od 8 (przekr.) i nadpisuję 2; 2 r. 6 (przekr.) 12, które odejmuję od 27 (przekr. te cyfry 2 i 7) i nadpisuję nad tylkoco przekréślonymi odpowiednio cyfry 1 i 5; 2 r. 5 (przekr.) 10, które odejmuję od 56, przekr. cyfrę 5 i nadpisuję nad nią 1). (Jest teraz do podzielenia 1420; piszę ponownie dzielnik 365 ale każdą cyfrę o jedno

[1]) Tabliczka ta jest już wypisana (o 130 kwadratach: 10×13) w książce Jana z Łańcuta.

miejsce daléj wprawo, t. j. 3 pod 6, 6 pod 5, obok którejto cyfry piszę 5). Znowu: 3 w 14-u 4 razy; piszę 4 obok 2 za półksiężycem; 4 r. 3 (przekr.) 12, odejmuję je od 14 (przekr.) i t. d. — Potym szósta «species»; t. j. o postępie (str. 62), sumowanie, gdzie jest mowa o postępach 1, 2,..., 7; 2, 4,..., 10; 3, 6,..., 15; 4, 8,..., 36 i ich sumach. (Str. 65) «De regula proportionum» jest najsłabszym ustępem. Jest to właściwie taźsama, co w innych przytoczonych już naszych arytmetykach reguła trzech na liczbach całkowitych. Stosunki są rozważane bardzo pobieżnie (jest właściwie mowa tylko o wykładniku stosunku) w ustępie ostatnim (str. 70); «De omnium Proportionum origine compendiolorum». O ułamkach niema mowy.

Trzy są znane wydania książki *Arithmetices introductio ex variis authoribus continuata* bezimiennego autora (wszystkie w Krakowie; w każdym kart 20) z lat 1549, 1556 i 1565. Ponieważ już pierwsze z tych wydań jest «denuo diligenter revisa», przeto mogło być jeszcze wydanie wcześniejsze. Żebrawski zaznacza, iż w wydaniu pierwszym na str. przedostatniéj jest pomieszczona wartość pieniędzy w języku polskim. Łukaszewicz (t. I, str. 93) tak tę książkę jak i poprzednią zalicza do ówczesnych podręczników szkolnych. —

Najważniejszą z arytmetyk wydanych u nas w wieku XVII jest bezwarunkowo *Arithmetica integrorum* (liczb całkowitych), którą w r. 1620, jako «primus hic Novodworscianae fundationis [1]) fructus» ogłosił «Ioannes Broscius Curzeloviensis» (Jan Brożek z Kurzelowa), ówcześnie noszący tytuł «Ordinarius [2]) academiae cracoviensis astrologus» (egz. z bibl. kór.). W roku 1884 akademija umiejętności w Krakowie wydała osobne dzieło: *Ian Brożek (I. Broscius), akademik krakowski 1585—1652. Jego życie i dzieła, ze szczególnem uwzględnieniem prac matematycznych. Ze źródeł rękopiśmiennych opracował* Jan Nep. Franke. (z portretem Brożka). Do tej książki [3]) odsyłamy czytelnika dla poznania należytego zasług Brożka na polu gieometryi i astronomii i około spraw akademii Krakowskiej wogóle. Tu zajmiemy się wyłącznie pracą Brożka w zakresie arytmetyki.

Wspomniawszy tu tylko, że nauka arytmetyki była przedmiotem wykładu na akademii niezależnie od innych części matematyki [4]), zaznaczymy naprzód, że nastrój wykładu niektórych ustępów drugiéj połowy Arithmetica integrorum Brożka mógłby wskazywać, że autor miał na myśli znacznie już starszą młodzież. Początkowa jednak część téj książki obejmuje wykład tak przystępny i szczegółowy, z podanymi do rozwiązania zadaniami tak prostymi, iż mogła być przeznaczona do nauki w spółczesnéj w Krakowie szkole średniéj [5]), która za staraniem rektora akademii Stanisława Zawackiego powstała w r. 1588,

---

[1]) Widać więc, że, przynajmniéj początkowo, fundusz oddzielny na wydawanie dzieł użytecznych, powierzony akademii przez kawalera Nowodworskiego, nie był przeznaczany na drukowanie panegiryków i t. d. (jak chce Łuk., t. I, str. 210).

[2]) «Astrologus» należał do «Collegium minus» (Łuk., t. I, str. 55, 74), (a nie jak chcą niektórzy, do «Collegium majus»), równie, jak i profesor astronomii fundacyi «Stobneriano-Dąbrowsciana», którego obowiązkiem (a nie astrologa) było układanie kalendarza (Łuk., t. III, str. 70).

[3]) Szczegółowy rozbiór tej książki pomieściłem w petersburskim «Kraju» (r. 1885, N. 2, w «Dodatku literackim»).

[4]) Zob. Łuk., t. III, str. 67, 140. 154; t. II, str. 103, a także artykuł prof. F. Karlińskiego w dziele zbiorowym *Zakłady uniwersyteckie w Krakowie* (Kraków, 1869) *str.* 128.


[5]) Takby wnioskować można również z przemowy wstępnéj: «Adolescenti Arithmeticam hanc lecturo S.»

a następnie wskutek hojnéj fundacyi Bartłomieja Nowodworskiego (1617) podźwignięta z czasowego upadku i do świetnego na owe czasy doprowadzona stanu, przez dość długi jeszcze przeciąg czasu [znakomicie zasilona legatem (1631) Gabryela Prowencyjusza [1]), po uszlachceniu Władysławskiego powiększonym przez Władysława IV, z którego nadto rozkazu zamknięto szkoły jezuickie w Krakowie] kwitnęła i cieszyła się bardzo licznymi uczniami (ta szkoła pozostawała wciąż pod zarządem akademii, aż do reformy w r. 1777) (Luk., t. III str. 432—459). Arytmetykę Brożka zalicza Łukaszewicz (t. I, str. 231) do książek używanych w Polsce w ówczesnych szkołach. — W rozdziale I «O określeniu arytmetyki i jéj podziale» (str. 1), Brożek potępia podział arytmetyki na praktyczną i teoretyczną («speculativa»), a natomiast «proponuje» jéj podział na prostą («simplex»), «która rozważa pojedynczą naturę liczb» i porównawczą («comparativa»), «która ustanawia porównywanie liczb». Tu także mówi o podziale na «digitus», «articulus» i «compositus». W roz. II «O liczeniu» (str. 8), zaznaczywszy, że cztéry działania są liczeniem, porównywa znaki liczebne do liter alfabetu i bardzo jasno wykłada zasady systematu pozycyjnego, objaśniwszy je na przykładach trafnie dobranych. [Téj zalety, cechującéj również wszystkie przykłady przez Brożka podawane, daléj już podnosić nie będziemy. Dodamy tylko, iż często jest widoczną staranność Brożka w wybiéraniu takich właśnie przykładów, któreby usuwały wątpliwości czytelnika w mogących się zdarzyć przypadkach szczególnych.] — W roz. III «Jakim sposobem dawni Rzymianie liczby oznaczali» (str. 13) przytacza naprzód przykłady historyczne, iż w liczeniu dawni Rzymianie liczyli na setki tysięcy (np. 121 setek tysięcy i t. d.), a następnie, po wzmiance o tym, że oni nie znali cyfr (figurae) 0, 1, ..., 9, mówi: «Kopernik w ks. «I, roz. 12 te figury liczebne nazywa indyjskimi, jakoby przez Indusów wymy-«ślone były» i wykłada znakowanie rzymskie. — W roz. IV (str. 17) «Jakim sposobem Grecy liczby oznaczali» jest na przykładach mowa o myryjadach pojedynczych, podw., i potr., a zarazem o tysiącach tysięcy, tysiąc razy tysiącach tysięcy i t. d., a także o milijonach i milijonach milijonów (wykładu znaków liczebnych greckich niema. Rozdziały V «O dodawaniu» (str. 21) i VI «O odejmowaniu» (str. 30) uczą wykonywania tych działań sposobami dzisiejszymi, a postępowanie wrazie, kiedy cyfra w odjemnéj jest mniejsza od odpowiedniéj w odjemniku, jest przeprowadzone aż trojakim sposobem. — W «dodatku (str. 38) Brożek powstaje przeciwko uważaniu osobnych działań: podwajania i społowiania, z uwagi, że należałoby podobnie tworzyć działania: potrajanie i t. d., i objaśnia, jakto prosto owe podwajanie i społowianie się wykonywa (tu ułamek $\frac{1}{2}$ przy społowianiu liczby nieparzystéj). — Rozdział VII «O mnożeniu» (str. 40). Brożek rozważa naprzód iloczyny dwu czynników jednocyfrowych, przedewszystkim równych sobie, a następnie nierównych i wtedy zaraz zmienia porządek ich następstwa. Późniéj szczegółowo rozważa tabliczkę mnożenia, «mensa Pythagorae», o 81 kwadratach, kładąc zaraz szczególny nacisk na liczby kwadratowe w tej tabliczce. Następnie wraca do tworzenia iloczynów dwu liczb jednocyfrowych, których suma jest większa od 10 (dość, by była nie mniejsza od 10). Tak np., gdy mamy 8 pomnożyć przez 7,


---

[1]) Według ustawy sejmu z r. 1609, przytoczonéj przez Sołtykowicza *(O stanie akademii krakowskiéj*, Kraków, 1810, str. 187). — Często nazywają go Premancovius, lub inaczéj.

to zważywszy, że «odległość» («distantia») od 10-u piérwszéj liczby jest 2, a drugiéj 3, i rozmieściwszy te liczby tak:



z pomnożenia 2 przez 3 otrzymamy 6 jedności szukanego iloczynu, a odejmując czyto 3 od 8, czytéż 2 od 7, otrzymamy 5 dziesiątków szukanéj liczby [1]). Brożek jeszcze inaczéj wyznacza iloczyny dwu czynników jednocyfrowych większych od 5-u. Liczby od 1 do 5 przedstawia wyprostowywaniem jednego palca od wielkiego do małego, liczbę 6 przygięciem małego palca ku dłoni, a wyprostowaniem reszty, liczbę 7 przygięciem ku dłoni małego i czwartego, a wyprostowaniem reszty i t. d. Wyznaczenie iloczynu 6 i 8 objaśnia na przerysowanéj obok figurze. Mnożąc liczbę wyrażoną przez podniesione palce ręki lewéj, na któréj jest uwidoczniona liczba 6, t. j. liczbę 4, przez odpowiednią liczbę 2, wyrażającą ilość podniesionych palców ręki prawéj, na któréj mamy liczbę 8, otrzymamy 8 jedności szukanego iloczynu. Obliczając zaś zgięte palce u obu rąk (1 + 3), mamy 4 dziesiątki tego iloczynu [2]). —




Następuje mnożenie liczb wielocyfrowych przez siebie zupełnie w dzisiejszéj formie. Poczym wykład wykonywania mnożenia w kratkach, t. j. jednym ze sposobów, jakich Indusowie (str. XXXII) używali. Przedstawimy ten sposób na liczbach np. 6784 i 4107. W kierunku linii AB (litery A, B, C, D są w oryginale) jest wypisana jedna liczba, w kierunku BD druga. Iloczyny oddzielnych liczb jednocyfrowych są wypisane we właściwych kratkach: dziesiątki ich nad, a jedności pod ukośną kreską. Dodając następnie do siebie jednocyfrowe liczby, znajdujące się w tych samych ukośnych rzędach, otrzymujemy na kierunku ACD iloczyn 27861888. — Jeszcze Brożek szeroko wykłada, jako pożyteczne przy mnożeniu wielkich liczb, postępowanie, tym się różniące od zwykłego, że się mnoży przez cyfry mnożnika, poczynając z lewéj strony, ku czemu przygotowywa on uprzednio tabliczkę iloczynów mnożnéj (większego czynnika) przez liczby jednocyfrowe i sprawdza ją drobiazgowo próbą przez 9. Kończy rzecz o mnożeniu rozważaniem przypadków, gdy dane liczby kończą się na zera (podzisiejszemu), podaniem zadań i próbą mnożenia przez 9. — Rozdział VIII «O dzieleniu» (str. 76). Po ustępie o dzieleniu liczb dwucyfrowych przez jednocyfrowe przy pomocy tabliczki mnożenia i przy pomocy napisanego szeregu liczb naturalnych do 100, przechodzi do dzielenia liczb wielocyfrowych. Działania odpowiadające jednéj cyfrze ilorazu dzieli, za Stifel'em [1]), na trzy tempa, które oznacza literami Q («quaere»,

---

[1]) Taksamo w arytmetyce Glareanus'a Herbest bez wypisywania takiego krzyża, robi to samo kamykami na linijach. — Łatwo takie postępowanie ogólnie uzasadnić.

[2]) Sposobu tego używają teraz jeszcze w wielu szkołach we Francyi (por. *Guide du maître pour l'enseignement d'arithmétique... par* Exsséric, Paryż, 1880).

szukaj), M («multipla», mnóż) i S («subtrahe», odejmij). Samo zaś dzielenie przeprowadza naprzód sposobem podobnym do tego, jaki poznaliśmy przy



arytmetyce GLAREANUS'a, z tą tylko różnicą, że BROŻEK wypisuje iloczyn dzielnika przez cyfrę ilorazu pod dzielnikiem, a następnie dopiéro całą tę liczbę odejmuje odpowiednio od dzielnéj lub reszt dzielenia. Tak np. dzieli 7168 przez 7:

2
7168
7777 (1024
7148
2

Przy kilkucyfrowym zaś dzielniku BROŻEK nie przekreślą dzielnika, lecz po wykonaniu tego, co odpowiada każdéj oddzielnéj cyfrze ilorazu, zmazuje z tablicy dzielnik, kreskę i to co jest pod nią, tak iż wykonywane na tablicy dzielenie 7744256 przez 2864 tak się stopniowo u niego przedstawia:

1	1	1	4
2016	20164	20164	20164
7744256	7744256	7744256	7744256
2864 (2	2864 (27	2864 (270	2864 (2704
5728	20048		11456

Uzupełnia to opowiedzeniem takiego wykonywania dzielenia, jak w książce GLAREANUS'a. Zaznaczywszy wady tych metod, BROŻEK powiada: «podobał mi się sposób nowszych» (uczonych) («probatur mihi modus recentiorum») i wykłada ową nową metodę, która prowadzi do takiego dzieleniu:

---

[1]) MICHAŁ STIPEL, autor wydanéj w Norymberdze w r. 1544 *Arithmetica integra*, dzieła złożonego z trzech części: o liczbach wymiernych, o liczbach niewymiernych i algiebry.

	7744256	
I	2864	(2
	5728	
	20162	
II	2864	(7
	20048	
	1145	
III	2864	(0
	0000	
	11456	
IV	2864	(4
	11456	

Nic nie zostaje.

W drugim zaś przykładzie nie wypisuje już wiérszy, utworzonych przez same zerą, lecz tylko zaznaczywszy jako cyfrę ilorazu 0, przypisuje następującą cyfrę dzielnéj. W owym drugim przykładzie dzielnik jest 6-cyfrowy; BROŻEK tworzy uprzednio przez dodawanie tabliczkę jego iloczynów przez liczby jednocyfrowe i sprawdza ją, mnożąc dzielnik dwa razy przez 3. Korzystając zaś z téj tabliczki, nie podpisuje za każdym razem dzielnika, tak iż to jego dzielenie tym się tylko różni od dzisiejszego, że kolejne cyfry ilorazu znajdują się obok odpowiadających im częściowych iloczynów odejmowanych. Po podaniu zadań, mówi nieco o ułamkach, wypadających w ilorazie, i o ich skracaniu. Zamyka zaś rzecz o dzieleniu uwagami odnoszącymi się do przypadków, gdy dane liczby są zakończone na zera. — Rozdział IX «O liczbach pierwszych i złożonych bezwzględnie («per se»), oraz pierwszych i złożonych względem siebie» («inter se») (str. 101). Tu mówi o podzielności przez 2, 3, 4, 5, 6, 7[1]), 8[2]), 9, 10 i 12, oraz zaznacza, że łatwo wyprowadzić warunki dla liczb 20, 30, 40, 50; 16, 32, 64, 128; 24, 48 i t. d. Następnie cytuje w oryginale i tłomaczy na łacinę określenie EUKLIDESA (taksamo z innymi tu określeniami) liczby pierwszéj i złożonéj, rozważa sito ERATOSTENESA, mówi o dwu liczbach pierwszych względem siebie i złożonych względem siebie («a które liczby pewna spólna miara mierzy») i o wynajdywaniu ich największéj spólnéj miary (przez kolejne dzielenie). — Rozdział X «O regule proporcyj» (str. 112). Naprzód BROŻEK, przypomniawszy podany na początku podział arytmetyki na prostą i porównawczą, mówi, że «tak jest 1 do mnożnika, jak mnożna do iloczynu», «i tak dzielna do dzielnika, jak iloraz do 1». Powstaje przeciwko «barbarum Detri nomen», gdyż reguła odnosi się do 4 liczb, a może być mowa i o 6. Następnie o wyznaczeniu czwartéj niewiadomej zpośród 4 liczb proporcyjonalnych i zastosowania do zadań (tu zachodzą ułamki). Gdy danych jest 5 liczb, sprowadza je (zapomocą mnożenia dwu par liczb danych) do 3, a następnie rozważa proporcyją. Proporcyją tak pisze: «jak 7 do 35, tak 48 do czego?». Podobnie traktuje regułę spółki i «regułę proporcyj odwrotną».

Nadto może szczegółowo wyłożywszy ściśle arytmetyczną część tej książki, pokrótce już tylko zaznaczymy treść drugiéj jéj połowy. — Rozdział XI «O postępach» (str. 127) obu rodzajów z różnymi zadaniami na sumowanie oraz z zaznaczeniem, z porównania dwu postępów (0, 1, 2,...; 1, 2, 4,...), logarytmów (przy podstawie 2), jako znakomitego odkrycia NAPIER'a [3]). —

---

[1]) Gdy liczba dana jest sumą 3, 6, 9, albo 12 wyrazów postępu gieometrycznego z wykładnikiem 2, albo 4, albo 16, lecz «niech chłopiec (puer) to opuści», a do tego wróci po postępach.

[2]) Po zwykłéj, podaje cechę METIUS'A: podwoić cyfrę dziesiątków, cyfrę setek pomnożyć przez 4, a do tych iloczynów dodać cyfrę jedności (por. § 13, us. 16).

[3]) «Pro Logarithmorum tabulis tibi magné Nepere Praemia quae tribuent digna «Mathematici?» (w oryginale kursywą). — Dzieło NAPIER'A, obejmujące logarytmy naturalne wstaw i stycznych (co minutę kąta), wyszło w r. 1614 w Edymburgu, a przedruko-

Roz. XII «O liczbach kwadratowych» (str. 138). Roz. XIII «O sześcianach» (str. 147) (w obu także systematycznie i szczegółowo wyciąganie pierwiastków). Roz. XIV «O różnych przykładach« (str. 160), z rozmaitych autorów sławne zadania (niektóre kosmograficzne). Tu także (str. 195—8) dodawanie i odejmowanie liczb wielorakich (podzisiejszemu). Roz. XV «O liczeniu zapomocą wskaźników i na abaku [1]) szachowym» (str. 198). Mowa tu jest o tym, jak Ioannes Nepebus wyraża liczby dane jako sumy potęg liczby 2; wykładniki tych potęg (poczynając od 0), lub odpowiednie litery abecadła, są wskaźnikami («indices») składników; wykonywanie działań na danych liczbach, jak mnoż., dziel., wyciąg. pierw. kw., można zastąpić działaniami prostszymi na tych liczbach, dodaw. zaś i odejm., wrazie jednakowych składników, nieco uprościć. Brożek wypisał tu tablicę potęg liczby 2, odpowiadających wskaźnikom od 0 do 100 i wykonywa działania. Jest to więc rachunek logarytmami (przy podstawie 2), co Brożek wyraźnie zaznacza na końcu. Ostatni rozdział XVI «O laskach» (str. 229—252), t. j. o rachowaniu według Napier'a przy pomocy czworokątnych słupków mających na każdéj ze ścian bocznych wypisane w kratkach przedzielonych ukośnie (podobnie jak na str. XLI) liczby pewnego szeregu z tabliczki mnożenia.

Z książki téj łatwo wnieść można, iż Brożek nietylko znał tak literaturę klasyczną, jak i spółczesne ważniejsze prace naukowe, ale nadto, że z prawdziwym zamiłowaniem i wielką jasnością sam uczyć musiał, jeżeli to tak się wyraźnie odbiło w tym podręczniku, który metodą wykładu, praktycznie obmyślanego i z rzetelnym zapałem przeprowadzonego, tak wyprzedził epokę, w jakiéj był ułożony. Wczytując się w oddzielne ustępy, dochodzi się do przeświadczenia, iż Brożek był wytrawnym pedagogiem, zbyt często może powołującym się w swym podręczniku na przeróżnych autorów, lecz wolnym od rutyny i wszelkiej pedanteryi, umiejącym prosto i w sposób zniewalający do skupienia uwagi wykład swój prowadzić.

Ioannis Broscii *de numeris perfectis disceptatio. Qua ostenditur a decem millibus ad centies centena millia, nullum esse perfectum numerum, atque ideo ab unitate usque ad centies centena milia, quattuor tantum perfectos numerari.* Cracoviae, 1637, (małe 4-o, kart 6), w Amsterdamie w r. 1638. W krótkiéj téj rozprawie Brożek dowodzi, że między 10 000 a 10 000 000 niema liczby doskonałéj (zob. niżéj § 15, us. 6), że między 1 a 10 000 000 są tylko cztery liczby doskonałe (6, 28, 496, 8128), które podpadają pod regułę Euklidesa, (por. str. 189, odsyłacz 1-y), że Michał Stifel mylnie ogłosił liczbę 130 816 jako doskonałą, że również mylnie Piotr Bongus podał jako doskonałą 2 096 128, oraz zajmuje się podzielnością liczb postaci 2^m—1, podając [2]) bez dowodzenia

---

wane w Lionie w r. 1619. Objaśnienie wyrachowywania logarytmów w wydaniu edym. z r. 1619, przedrukowanym w Lionie w r. 1620. Termin «logarithmus» pierwszy raz w wydaniu z r. 1614.

[1]) Ów «Abacus scacchiae» jest szachownicą o 24×24 polach czarnych i białych. Idąc od jednego wierzchołka szachownicy do przeciwległego naokół jéj, czyto w jednę, czy w drugą stronę, mamy rzędy odpowiadające kolejnym potęgom 0, 1, 2, . . . , (46) liczby 2. Gdy więc mamy np. pomnożyć 8 przez 64, to na przecięciu 4-go np. poziomego z 7-ym pionowym rzędem natrafimy na pole pewnego koloru, a posuwając się, jakby ruchem laufra, w kierunku odpowiadającym linii, łączącej początkowe pola wzmiankowanych rzędów, dojdziemy do jednego lub drugiego pola brzeżnego w rzędach, którym odpowiada szukany iloczyn. Odpowiednio z dzieleniem.

[2]) Petri Bongi Bergomatis *numerorum mysteria* 1585 i 1618.

10 twierdzeń, według których liczby téj postaci są podzielne przy $m=2n$ przez 3, przy $m=4n$ przez 5, przy $m=3n$ przez 7, przy $m=10n$ przez 11, przy $m=12n$ przez 13, przy $m=8n$ przez 17, przy $m=18n$ przez 19, przy $m=11n$ przez 23, przy $m=28n$ przez 29, przy $m=5n$ przez 31 [1]).

Apologia pro ARISTOTELE et EUKLIDE *contra* PETRUM RAMUM *et alios Additae sunt duae disceptationes de numeris perfectis. Authore* IOANNE BROSCIO... Dantisci... 1652, powtórnie w Amsterdamie w r. 1699. Pierwszą ze wzmiankowanych w tytule dwu rozpraw o liczbach doskonałych jest praca powyżéj już omówiona. Druga z tych rozpraw: De numeris perfectis disceptatio altera (str. 121—174) rozpada się na dwie części. W początkowéj BROŻEK rozważa 20 z pośród liczb przez BONGUSA za doskonałe uznanych i okazuje, że 10 z nich jest doskonałych, i że co do pozostałych BONGUS się pomylił; roztrząsanie oparte jest na twierdzeniu EUKLIDESA przy uwzględnieniu dzielników liczb postaci 2^m-1 aż do $m=100$. W końcowéj zaś części BROŻEK, zauważywszy, że niema [2]) reguły na tworzenie pary liczb zaprzyjaźnionych (por. niżéj § 15, us. 6), zastanawia się nad własnościami znanej starożytnym pary liczb (220 i 284) i przez analogią szczęśliwie pomyślaną [3]) tworzy nieznaną doówczas parę liczb zaprzyjaźnionych 17296 i 18416.

Wiadomości o kilkunastu późniejszych arytmetykach czytelnik znajdzie w artykule *Arytmetyka* WINCENTEGO TRYBULSKIEGO, ogłoszonym w tomie I *Encyklopedyi wychowawczéj* (Warszawa, 1880), o któréjto pracy niżéj oddzielnie tu mówić będziemy. W tym tedy artykule [4]) z podręczników wieku XVII są opisane: na str. 362 — 6 «M. IOHANNIS TONSKI I. U. et M. D. in Acad. Crac. Math. Profess. *Arithmetica vulgaris...*» (1640 w Ingolsztacie; 1645 bez miejsca druku; ŁUK. mówi: «wiele wydań»); na str. 353—361 «*Arithmetyka. To jest Nauka Rachunku Na trzy podzielona Xięgi. W Pierwszey...* Przez K. S. pilnie napisana» (autor KRZYSZTOF SCHEDEL, typograf J. K. M.; pierwsze wydanie bez roku, według BANDKIEGO między 1660 a 1665; inne r. z 1735 oba w Krakowie); na str. 372 «*Arithmetica curiosa....* Auctore R. P. ADALBERTO TYLKOWSKI Societatis Jezu in Collegio Varsavien:...» (1668 w Krakowie; znacznie powiększona 1689; 1690) i na str. 361—2 wierszowana «*Geometry Polskiego Zabawa o arytmetyce albo rachowaniu*» Jezuity STANISŁAWA SOLSKIEGO wyjątek z dzieła *Geometra polski* (Krak., 1683) wydał JULIJAN BAYER w Warsz. 1863; na [5]) str. 366 — 372 «*Arithmetica practica...* a M. IOANNE STANISLAO FORMANKOVIC in Alma Universitate Crac. Doctore et Professore.» (1669 w Krakowie). Króciutkie lecz poważne kompendyjum TOŃSKIEGO obejmuje staranne rozważanie ułamków sześćdziesiątkowych i dziesiętnych; niéma w nim jednak tego skróconego sposobu dzielenia, który BROŻEK podał był już

[1]) Znane twierdzenie FERMAT'a o podzielności liczb (jeżeli a jest liczbą niepodzielną przez liczbę pierwszą p, to różnica $a^{p-1}-1$ jest podzielna przez p.

[2]) Ściśle mówiąc istniało prawidło (znane w Europie od r. 1852) podane przez matematyka arabskiego TÁBIT ibn KURRA (836—901 po Chr.).

[3]) Że metoda wskazana przygodnie przez BROŻKA jest ogólna, dowiódł p. I. N. FRANKE w przytoczonym powyżéj swem dziele.

[4]) Z arytmetyk wcześniejszych, o których wiadomości są tu wyżej podane, TRYBULSKI widział tylko podręcznik HERBESTA, o którym mówi na str. 346—9.

[5]) Rozmieszczenie liczb przy rozwiązywaniu zadań na regułę fałszywego założenia, przytoczone przez TRYB. na str. 368, jakoteż odpowiednie prawidło, jest już w książce WOJEWÓDKI.

jako nowość. Téj pracy nie dorównywają inne z wyliczonych tu arytmetyk, choć są one najwięcéj używanymi podręcznikami szkolnymi owego wieku. Książka zaś Tylkowskiego obejmuje bałamuctwa, które do pewnego stopnia objaśniają, dlaczego nawet te szkoły Jezuitów, w których był kurs «filozofii», obejmujący między innymi Euklidesa (Łuk., t. I, str. 250), tak mało rospowszechniały w narodzie najprostsze pojęcia matematyczne wogóle.—Szkoły bazylijańskie były gorsze od jezuickich, na których się wzorowały. Szkoły zaś nowych kultów religijnych, do naszego narodu wniesionych, były obsadzone prawie wyłącznie obcymi nauczycielami, najczęściéj mało dbającymi o kraj, w którym czasowo tylko przebywali, a zwracającymi głównie swą uwagę na łacinę, a jeszcze więcéj na konfesyjne wychowanie młodzieży i sposobienie jéj do dysput religijnych. Z tego więc względu nauka matematyki miała wyznaczoną nawet w takich szkołach średnich bardzo podrzędną rolę. Wprawdzie socynijanie ogłosili dla użytku szkoły w Rakowie «Ioach. Stegmani *Institutionum Mathematicarum Libri II*, quibus initia I Aritmeticae, II Geometriae pro incipientibus dilucide explicantur, et ad praxin variae accomodantur» (I str. 64; II str. 190; r. 1630), któréj autor był rektorem owéj nietoleracyjnéj szkoły (zamkniętéj przez sejm r. 1638), a w arytmetyce téj, zdaje się po raz piérwszy w Polsce, występują ułamki dziesiętne (Łuk., t. I, str. 369). Nie była również wyjątkiem szkoła braci czeskich w Lésznie, choć przez pewien okres w swym istnieniu wsławiła się troskliwie obmyślanymi metodami nauczania, choć w gronie nauczycieli liczyła szanowanego ówcześnie matematyka i architekta (polaka) Jana Dekana, choć nakoniec stała się tak rozgłośną za rektorstwa (1636 — 1642) głębokiego myśliciela-wychowawcy, sławnego Komenijusza (Jana Amosa Komeńskiego). Dowodu na to dostarcza znakomite dzieło Komenijusza: *Wielka dydaktyka* (polski przekład: Warszawa, 1884), w któréj rzecz o nauczaniu matematyki i jego założeniach jest dotknięta bardzo powierzchownie i tylko w paru wielce ogólnikowych uwagach (rozdziały XXIX—XXXI).

Równie wiek XVII, jak i znaczna część wieku XVIII nie sprzyjały u nas rozwojowi nauk wogóle, a matematyki wszczególności. Wojny zewnętrzne częste zarazy morowe, rokosze i ustawiczne niesnaski wewnętrzne najróżnoro dniejszéj natury, spaczone wychowanie publiczne musiały się odbić na umysłowym życiu narodu. Co więcéj, zastój naukowy jest tak ogólny, że przed siębrane od czasu do czasu nieliczne usiłowania reformy szkół znajdują swój wyraz jedynie w narzekaniach i protestach, lub początkowaniach bezowocnych. Akademija krakowska, w któréj «kolonijach» najprędzej zdawałoby się mógł nastąpić zwrót ku lepszym metodom nauczania, zajęta sporami z Jezuitami, jałowymi a kosztownymi sprawami religijnymi, a jednocześnie ubożejącą wciąż wskutek niedochodzenia dochodów i marnienia funduszów, nie pielęgnuje należycie nauk filozoficznych u siebie, nie może więc tymsamym przygotować dobrych nauczycieli dla swoich «kolonij», któretéż coraz więcéj chyliły się do upadku. Akademija zamojska była instytucyją pozbawioną wszelkiéj powagi i wartości naukowéj i zaznaczyła się tylko wydawnictwem kalendarzy jéj profesora Stanisława Duńczewskiego. Akademija zaś wileńska w ręku Jezuitów była tą samą ich szkołą średnią jałową (od któréj się różniła prawem udzielania stopni naukowych, więcéj szczegółowymi studyjami scholastycznymi i czasowymi wykładami prawa kanonicznego i cywilnego).

Reforma szkół pijarskich, rozpoczęta w r. 1740 przez wielkiego obywatela STANISŁAWA KONARSKIEGO (poprzednio i te szkoły niewiele się od spółczesnych jezuickich różniły) i przez niego następnie ustalona wskutek zmiany urządzeń w «prowincyi polskiej» (1754) tego zakonu, wprowadziła do nauczania wogóle lepsze metody, wydobywając szkoły średnie z długiego zastoju i upadku. Nieliczne lecz niezłe szkoły Teatynów także zaczęły się cieszyć wziętością. Pobudzeni spółzawodnictwem, Jezuici, przynajmniéj w szkołach znajdujących się w główniejszych miastach, za sprawą swych prowincyjałów, koronnego JÓZEFA DOMARADZKIEGO i litewskiego MICHAŁA JUNIEWICZA, również wprowadzili pożądane zmiany w sposobach nauczania. Tak Pijarzy, jak i Jezuici zaczęli wysyłać zdolniejszych młodych swych członków, sposobiących się do stanu nauczycielskiego, do Niemiec, Francyi, Włoch i Czech, którzy po powrocie przyczyniali się do dalszego postępu szkół. — Rosszérzono znacznie wykład matematyki, przeznaczając więcéj na nią godzin, nauczając jéj troskliwiéj i systematyczniéj. Prócz więcéj wyczerpujących kursów arytmetyki, wprowadzono wykład algiebry i gruntowniej nauczano gieometryi. — Liczne pojawiają się arytmetyki, głównie przez członków obu zgromadzeń układane, lub przez nich tłomaczone, albo tylko dla użytku szkół jezuickich przedrukowywane w Polsce, z uwzględnieniem miar miejscowych. — Ożywienie w nauczaniu arytmetyki dosadnie charakteryzuje ten fakt, że gdy w piérwszéj połowie w. XVIII pojawiają się tylko dwie nowe artmetyki łacińskie dla użytku szkół jezuickich (Wilno, 1733; Kalisz, 1745, skrót wydania weneckiego z r. 1740 dzieła TACQUET'a), to w przeciągu dwudziestu lat od r. 1757 do 1777 pojawia się 5 arytmetyk łacińskich (przedruki dwu arytmetyk HÖLL'a, prof. akad. jez. w Klausenburgu, w r. 1760 w Poznaniu, z których jedna powtórnie w Nieświeżu w r. 1768; arytmetyki Pijara SIKORSKIEGO w 1761 w Warsz., Reformata KLECZEWSKIEGO 1771 we Lwowie i «*Arithmetica pro suprema Grammatices classe* e germanico in latinum translata» w Krak., bez wymienienia autora i roku; później w r. 1782 w Zamościu wydał jeszcze arytmetykę łacińską SŁAWIŃSKI, Bazylijanin ze szkoły przy klasztorze w Zamościu), a 11 polskich (w r. 1757 w Krak. KACZWIŃSKIEGO «za dozwoleniem starszych do Druku podana»; w r. 1760 w Berdyczowie TORŻEWSKIEGO; w r. 1765 we Lwowie Jezuity SIEKIERZYŃSKIEGO; w r. 1766 w Warsz. Pijara SKARADKIEWICZA, wydawana ponownie w r. 1771 i 1776 w Warsz.; wspomniana już na str. XXVI arytmetyka Pijara MARQUARTA w Wilnie 1772; «*Arythmetyka praktyczna kieszonkowa* . . . . .» w r. 1773 w Warsz , bez wymienienia autora, którym był Pijar OBERMAYER, powtórnie wydana w r. 1811 w Warsz.; «Arytmetyka podług reguł JMC. Pana BENIAMINA HEDERICHSA . . . z niemieckiego języka na polski . . .» w r. 1774 w Warsz.; «*Arytmetyka praktyczna* . . .» w r. 1775 w Warsz., bez wymien. autora, którym jest Pijar BIELSKI, z nieco odmiennym tytułem w tymże r. 1775 i 1793 w Warsz., a z wymienieniem autora w Warsz. w 1806 r. 11, 13 i 15; w r. 1775 w Kaliszu nauczyciela tamtejszéj szkoły księdza CZARNOCKIEGO; «*Arytmetyka prostacka* czyli nowy sposób czynienia rachunków, którego nieumiejących czytać nawet łatwo nauczyć można . . . » Pijara SIRUCIA w Wilnie, 1777, «*Nauka Rachownicza* Dla Młodzi uczącey się w Akademii Krakowskiey» w Krak. 1777, po polsku i po łacinie, przeznaczona dla nauki liczb całkowitych w «kolonijach» akademii). Staranne zestawienie porównawcze treści ważniejszych z wyliczonych tu arytmetyk czytelnik znajdzie we wzmiankowanym artykule TRYBULSKIEGO na str. 373—8,

z którego się przekona, jak powolny one wnosiły postęp do nauczania u nas arytmetyki.

Otwarcie przez STANISŁAWA-AUGUSTA, wkrótce po koronacyi, korpusu kadetów w Warszawie prawdopodobnie przyczyniło się również do wyrobienia lepszych metod nauczania. Jakim był EDLING, nauczyciel matematyki elementarnéj, nie wiemy, ale drugi dyrektor korpusu, PFLEYDERER z Tybingi, wykładający matematykę wyższą i fizykę, pozostawił jak najlepsze ślady swej działalności, troskliwéj o dobre metody nauczania, i szczerym przez spółczesnych był otoczony szacunkiem [1]).

Zamknięcie zakonu Jezuitów w r. 1773, a przeznaczenie ich dóbr, wskutek wniosku JOACHIMA CHREPTOWICZA, na oświatę publiczną, i otworzenie Komisyi Edukacyjnéj, piérwszego na świecie ministerstwa oświaty, wywołało tyle pożądaną i gruntowną reformę wychowania we wszystkich jego stopniach. Różnorodność spraw, podległych nowéj magistraturze, kłopoty z ochranianiem i rewindykowaniem powierzonych jéj pieczy funduszów, przeprowadzanie reform, dozór i administracyja szkół, nie dozwalały członkom Komisyi Edukacyjnéj, mającym nadto liczne inne zajęcia, zająć się drobiazgowym rozważaniem metod nauczania, oraz oceną lub wygotowaniem podręczników. Na wniosek więc IGNACEGO POTOCKIEGO utworzono w marcu r. 1775 Towarzystwo do ksiąg elementarnych (rozeszło się ono w kwietniu r. 1792), pozostające wciąż pod główną prezydencyą wnioskodawcy, którego towarzystwa najczynniejszym członkiem był eks-jezuita GRZEGORZ PIRAMOWICZ [2]). W Towarzystwie do ksiąg elementarnych (składało je 10 zawsze członków) oceniano i wyrabiano w ostatecznej redakcyi podręczniki szkolne, ułożono znakomite «Ustawy dla stanu akademickiego», roztrząsano wszelkie potrzeby naukowe szkół, troskliwie opracowano elementarz dla szkół początkowych, a ślady tej wytrwałéj pracy ujawniano nazewnątrz od imienia Komisyi Edukacyjnéj. Z nieogłoszonych dotąd drukiem protokołów tego Towarzystwa widać, iż pierwszą jego czynnością było ułożenie obwieszczeń do konkursu na projekty podręczników szkolnych, które Komisya Edukacyjna ogłosiła w kraju i zagranicą. Z otrzymanych wielu projektów książki elementarnéj do matematyki, nadesłany w listopadzie r. 1776 pod dewizą z CONDILLAC'a «Celui qui n'a pas appris «à réfléchir, n'est pas instruit, ou il l'est mal, ce qui est pire encore» [1]), na skutek opinij wzmiankowanego wyżéj PFLEYDERERA, Pijarów POPŁAWSKIEGO i NARBUTTA, oraz PIRAMOWICZA, został przyjęty w styczniu r. 1777. Autorem okazał się SZYMON LHUILIER, nauczyciel szkół w Gienewie, który od listopada tegoż roku zaczął nadsyłać częściami arytmetykę. Rękopis oceniali troskliwie naprzód PFLEYDERER, a następnie inni członkowie Towarzystwa, a piérwszy komunikował autorowi rezultaty tych uwag, który odpowiednie zmiany wprowadzał. Na tłomacza wybrano eks-jezuitę JĘDRZEJA GAWROŃSKIEGO (ur.

---

[1]) Por. *Mowę* PIRAMOWICZA 7 marca r. 1782 str. (10—11). Zasługi PFLEYDERERA na polu trygonometryi podniósł p. CZAJEWICZ we wstępie historycznym do swej *Trygonometryi płaskiej i kulistej* (Bibl. mat. fiz. S. III, T. VI).

[2]) W tomie V «Rozpraw» wydz. filol. ak. um. w Krak. dr. WŁADYSŁAW WISŁOCKI ogłosił cenną pracę *Poczet chronologiczny prac drukowanych i piśmiennych* GRZEGORZA PIRAMOWICZA (1877).

[3]) «Kto nie nauczył się rozważać, nie jest wykształcony, lub jest źle wykształcony, «co jest jeszcze gorsze».

w r. 1740), wychowańca uniwersytetów w Wiedniu i Rzymie, byłego nauczyciela w kolegijum jez. w Poznaniu (gdzie robił obserwacyje astronomiczne), lektora królewskiego, kanonika i później biskupa (1804—1813) krakowskiego, którego przekład arytmetyki czytano i niekiedy modyfikowano na pełnych sesyjach Towarzystwa, Czytanie to trwało od połowy stycznia do końca kwietnia na cotygodniowych posiedzeniach (taki sam był tryb postępowania w jesieni r. 1778, w r. 1779 i 1780 z obu częściami *Geometryi* Lhuilier'go; z jego zaś *Algebry* w r. 1781 czytano już tylko wyjątki; tłómaczem obu dzieł również Gawroński). Od lutego r. 1782, w miejsce Pfleyderera, powołanego do pracy w kraju rodzinnym, wszedł do Towarzystwa Lhuilier, sprowadzony do kraju przez ks. Czartoryskiego (w tymże roku Lhuilier ogłasza w Warsz., zalecone przez Tow. do ks. elem. nauczycielom szkół, dzieło: «De relatione mutua capacitatis et terminorum figurarum geometrice considerata: seu de Maximis et Minimis, pars prior, elementaris») i czynny udział w jego pracach przez lat parę przyjmuje. Tak wypracowana *Arytmetyka dla szkół narodowych* wyszła w r. 1778 w drukarni Szkoły Głównéj w Krakowie, a następnie, również pod opieką tegoż Towarzystwa, tamże w r. 1785, 1786 (8-vo, str. 248); później zaś pojawiają się różne jéj wydania w Wilnie, Warszawie i Krakowie w r. 1802, 4, 7, 9, 10, 11, 14, cztéry w jednym r. 1817, w r. 1819 i niekorzystnie zmienione w 1841 (Tryb., str. 383). Autor tego podręcznika, Lhuilier (ur. w r. 1750 w Genewie), z innego jeszcze konkursu wyszedł zwycięzko: w r. 1786 otrzymał nagrodę akademii berlińskiéj za pracę na ogłoszony temat: «jakie pojęcie jasne i dokładne należy sobie utworzyć o nieskończoności w matematyce». Ogłosił on pofrancusku i połacinie bardzo wiele prac, odnoszących się do matematyki tak elementarnéj jak i wyższéj. «Był on przeważnie człowiekiem rozważnym i profesorem wytrawnym. Rzucił światło na wiele ciemnych punktów teoryi, nie przywiązawszy swego nazwiska do jakiegoś znaczniejszego odkrycia»[1]). Owóż właśnie, *Arytmetyka dla szkół narodowych* najwięcéj może przekonywa o tych przymiotach autora. Przedewszystkiem Lhuilier, mając pisać algebrę i gieometryją, ograniczył mądrze zakres arytmetyki, nie wtłaczając w nią tego, co jest obcym arymetyce. Dzieło składa się z czterech części: I. «O rachunkach w liczbach całkowitych», II. Zamykająca w sobie cztery arytmetyczne działania na liczbach wielorakich, to jest różne gatunki rzeczy oznaczających» (str. 79), III. «O rachunkach w liczbach łamanych» (str. 106), IV. O regule trzech»[2]) (str. 164 – 248) w 3-im wyd.). Zaznajomiwszy ucznia przy pomocy sposobów poglądowych z najprostszymi liczbami i działaniami na nich (przyczym bardzo szczegółowe i trafne czyni uwagi), autor, nie stawiając żadnych zgóry

---

[1]) «Winniśmy jednak zaznaczyć, zdaje się słusznie, jego rozkład na czynniki sumy «lub różnicy dwu ilości wykładniczych, jego rozwiązanie zadania o wpisaniu w koło wie«lokąta, którego boki przechodzą odpowiednio przez punkty dane, nakoniec jego zastosowa«nie do trójkątów kulistych prostokątnych twierdzenia o kwadracie przeciwprostokątnéj». «Umarł około r. 1810» Larousse *Grand dictionaire universel du XIX siècle* (Paryż 1873, artykuł «L'Huillier»).

[2]) O regule Trzech prostéj (Directa). O Regule trzech odwrotnéj (inversa). Uwagi stosujące się do dwóch rozdziałów poprzedzających. O Regule procentu i o Regule odtrącania onego. O regule spółki (societatis). Przystosowanie Reguły Trzech do zamian pieniędzy. Przystosowanie reguły trzech do miar i wag w miastach znakomitszych Europy używanych. O regule trzech Składanéj Composita. Wykład niektórych skróceń i praktycznego używania Reguł poprzedzających.

określeń lub prawideł, metodą ściśle indukcyjną uczy wykonywania działań na liczbach, wychodząc zawsze z działań na liczby mianowane. Ścisłym i przystępnym rozumowaniem objaśnia każdy krok, nie przechodzi jednak nigdy w pedantyczność. Prawidła wypowiada dopiero po przerobieniu wielu zadań. Podaje wciąż trafne uwagi, które dziś bynajmniéj nie są przestarzałe. Osobliwie jest troskliwy, by wielkiemi liczbami nie przygnębiać dziecięcych umysłów, a drobiazgowe i słuszne podaje wskazówki, jak mianowicie zachować stopniowanie przy wyborze liczb, poczynając od łatwiejszych. Rozróżnia doskonale w działaniach liczby oderwane od mianowanych, zaznacza starannie dwojakie założenie dzielenia i t. d. Sam LHUILIER scharakteryzował swą pracę następującą uwagą, którą wypowiada przy części trzeciéj, t. j. przy rozpoczęciu nauki o ułamkach: «żeby uczniowie nie napamięć i za samymi tylko regułami «idąc, uczyli się rachunków na liczbach łamanych, ale przy każdym przy«kładzie im podanym zastanawiali się i uważali, jakby ich sam rozum do te«go, a nie innego sposobu rachowania prowadził, choćby nawet żadnych prawi«deł na to nie było, które zapewnie nie skądinąd się wzięły, tylko z pilnego «uważania i roztrząsania natury każdego w szczególności działania». Z układu książki widać, iż LHUILIER rozumiał tylko nauczanie na lekcyi, był nieprzyjacielem wszelkich zapamiętywań reguł i postępowań mechanicznych. Z głębokiem przeświadczoniem wypowiadamy nasze przekonanie, iż dzieło to jest najlepszym, z istniejących, zbiorem wskazówek dla uczących, jak prowadzić w wielu razach zajęcia w czasie lekcyj. Jako takie dzieło, polecamy je dla uważnego odczytania go wszystkim starannym nauczycielom.— Wracając jeszcze do książki (nie mamy co przytaczać tu jéj treści), tu jeszcze tylko zaznamy, że wykład ułamków dziesiętnych, jako ułożony w epoce przed rozpowszechnieniem się ich pod wpływem systematu metrycznego, jest bardzo krótki. Zadania zaś na regułę trzech są rozwiązywane i objaśniane znakomicie zapomocą sprowadzania do jedności lub niekiedy metodą rozkładową. (Rzecz bowiem o stosunkach i proporcyach LHUILIER wykłada w rozdziale VIII części I *Geometryi dla szkół narodowych*). Odzielne kwestyje należy teraz w szkole średniej ogólnéj wykładać nieco inaczéj, uwzględniając więcéj stronę teoretyczną, ale zresztą nastrój téj książki jest zupełnie dzisiejszy [1]). Przekład GAWROŃSKIEGO jest na owe czasy znakomity pod względem języka, z którym nie mogą iść w porównanie wyliczone poprzednio arytmetyki polskie w. XVIII. GAWROŃSKI położył w tłómaczeniach dzieł LHUILIER'go podwaliny naszego dzisiejszego języka matematycznego, doskonalonego późniéj przez JANA ŚNIADECKIEGO.

---

[1]) W r. 1816 na posiedzeniu warszawskiego towarzystwa przyjaciół nauk wystąpił Pijar ANTONI DĄBROWSKI, prof. uniw. warsz., z powierzchowną rozprawą: *Uwagi nad sposobem dawania matematyki w szkołach publicznych*, w któréj stawia takie zarzuty *Arytmetyce dla szkół narodowych* (str. 23 odbitki): «1-ód, że nie wszystkie działania «fundamentalne są tak gruntownie wyłożone, jak być powinny, czego dowodem jest, że «najlepszy z uczniów, umiejący całą Arytmetykę z LHUILIER'go, zapytany o iloczyn, gdy «jest mnożnikiem zero, zawsze prawie da fałszywą odpowiedź, i nigdy dostatecznie nie wy«łoży, dlaczego niektóre iloczyny są mniejsze od swoich czynników, a niektóre ilorazy więk«sze aniżeli dzielna; 2-re, że na działania trudniejsze nie podaje prawideł, które jednak «w umiejętnościach i naukach tym są, jak powiedział CONDILLAC, czym są poręcze na mo«ście, nie żeby pomagały podróżnym do przeprawy, lecz żeby broniły ich od upadku». Drugi zarzut nie jest słuszny: prawidła główniejsze LHUILIER podaje, tylko nie wyróżnia ich szczególnym drukiem, a, wierny swéj zasadzie, wyżéj przytoczonéj, ciągle rozumu-

Pominęlibyśmy nader ważny rys w reformie nauczania u nas w ogóle, przez Komisyją Edukacyjną przeprowadzonéj, gdybyśmy tu choć nie zaznaczyli pieczołowitości, z jaką ta magistratura zajęła się sposobieniem nauczycieli szkół średnich. Objąwszy zarząd wszelkich szkół, które też prawie wszystkie bez szemrania się poddały, Komisyja Edukacyjna zrazu zaprowadziła w nich gruntowne zmiany, a przez swoich wizytatorów gromadziła materyjały do gruntownéj szkół naprawy. Ostatecznie projekty [1]) reformy obu akademij w Krakowie i Wilnie (nazwanych Szkołami Głównymi), wszystkich szkół średnich, oraz ogólne uwagi o szkołach parafijalnych uległy kodyfikacyi w Towarzystwie do ksiąg elementarnych. Z protokółów tego Towarzystwa (którego członkiem już przedtym został ks. Hugo Kołłątaj) widać, iż od początku r. 1781 do końca kwietnia wszyscy członkowie Towarzystwa gorliwie wypracowywują oddzielne części projektu, którego ostateczną redakcyją prowadzi Piramowicz. Tegoż roku we wrześniu rozdano uroczyście przepisy pod tytułem jeszcze «Projektu» zgromadzonym w Warszawie rektorom szkół wydziałowych koronnych, natychmiast wprowadzono je w życie w całym kraju, a w r. 1783 wydano je (z pewnemi zmianami), jako obowiązujące «*Ustawy... dla stanu akademickiego*» t. j. nauczycielskiego Szkół Głównych, wydziałowych i podwydziałowych). Z tych *Ustaw* [2]) łatwo widzieć można, jak wielki już nacisk położono wówczas na przygotowywanie nauczycieli szkół średnich, jaką ważność téj sprawie nadano, jak rozumnie i troskliwie obmyślono te ramy, które już wypełnić miały gorliwość i talent wykonawców. Tu tylko przytoczymy fakt, najlepiéj mówiący o przejęciu się Komisyi Edukacyjnéj ważnością téj myśli jeszcze przed wygotowaniem «*Projektu*». W r. 1780 kandydatów ze szkół wydziałowych litewskich wysłano na koszt Komisyi do lepszéj ówcześnie Szkoły Głównéj w Krakowie i jednocześnie Komisyja posłała do Jana Śniadeckiego wezwanie do Paryża, aby podróż swę do Anglii odłożył na czas późniejszy, a jaknajprędzéj zjechał do Krakowa dla zajęcia się owymi kandydatami... Przy tak sposobionych nauczycielach poważny był nastrój, a owocna działalność tych szkół, w których pracowali, lub później już tylko dosługiwali swych lat owi byli kandydaci Komisyi Edukacyjnéj. Oddziaływali ci ostatni swoim przykładem na młodszych, nie tak troskliwie już przygotowywanych, nauczycieli, jak o tym świadczyły doniedawna jeszcze żywe wspomnienia ludzi starszych.

Jeszcze jeden owoc działalności owego Towarzystwa do ksiąg elementarnych wchodzi w zakres naszego przedmiotu. Od pierwszych dni swego

---

jąc, na prawidła się nie powołuje, lecz postępuje «jak sam rozum do tego prowadzi». Nie podaje zaś prawideł np. na wykonywanie dzielenia liczb całkowitych, które więcéj jest ćwiczeniem na poprawne dość trudne opisanie postępowania, dobrze już przez ucznia pojętego, niż ową «poręczą na moście». Co się tyczy zarzutu pierwszego, to druga jego część jest słuszną: rzeczywiście, Lhuilier odpowiedniego nacisku nie robi. Za to początkowa część zarzutu pierwszego nie przynosi zaszczytu wypowiadającemu go. Zero występuje jako liczba dopiéro w algiebrze; w arytmętyce zaś jest znakiem, służącym do zapełnienia miejsca niezajętego przez cyfrę znaczącą. Dlatego dobry nauczyciel nigdy nie użyje w arytmetyce wyrażenia: mnożyć przez zero, lub zero mnożyć przez oznaczoną liczbę. Żadne zadanie arytmetyczne do czegoś podobnego nie doprowadza.

[1]) Najważniejszy projekt przedstawił wzmiankowany wyżéj Popławski (*Mowa* Piramowicza 7 marca r. 1782, str. 13).

[2]) *Ustawy* te przeprukowano w r. 1872 we Lwowie jako tom I *Biblijoteki pedagogicznéj i dydaktycznéj*.

istnienia, Towarzystwo, jak to widać z jego protokółów, troska się ciągle o elementarz dla szkół początkowych. Różne projekty powstają, rozmaite przygotowania się robią. Nie do nas należy kreślić ciekawe dzieje tych obmyślań. Ostatecznie wydany został w r. 1785 «*Elementarz dla szkół parafialnych narodowych*» (w drukarni Szkoły Głównéj koronnéj; egz. bibl. głów. w Warsz.). Składa się on z cztérech części: I. Nauka pisania i czytania (str. 43), II. Katechizm początkowy (str. 44—48) (autorem obu części członek Tow., Pijar Onufry Kopczyński), III. Nauka[1]) obyczajowa (str. 1—54) (Piramowicza) i IV. Nauka rachunków (str. 55—120) (Gawrońskiego). Ta *Nauka rachunków* pozostanie nazawsze niespożytym dowodem, iż metoda poglądowa w zastosowaniu do arytmetyki została do naszych szkół początkowych wprowadzona i systematycznie była w nich uprawiana jeszcze w wieku XVIII, nadługo przed tym, nim ją już w bieżącym stuleciu jako nowy całkiem pomysł zaczęto wysławiać na zachodzie, skąd późniéj, jakby świeżą zdobycz dydaktyki, przesadzono do nas. Wprowadzenie téj metody odbyło się wtedy u nas cicho, poważnie; krzewiciele jéj, przejęci tylko ważnością sprawy, tak dalece nie dbali o rozgłos, że nawet imiona autorów różnych części *Elementarza* nie są zaznaczone w zwykłéj aprobacie Komisyi Edukacyjnéj i w żadnym sprawozdaniu lub artykule wydrukowane nie były, tak iż je po raz piérwszy tu stanowczo, nie zaś jako domysł tylko, podajemy. Powiedziano tam tylko, iż to dzieło «od Towarzystwa do Xiąg Elementarnych roztrząśnione». Cała *Nauka rachunków* ma te główne zalety, jakich od podobnego dzieła dziś wymagać możemy. Przystępność, jasność, stopniowanie właściwe, objaśnienia trafne: to cechy ogólne. Co się tyczy szczegółowego wykładu, powiemy tu tylko o rozdziale I, «O liczeniu» (str. 55—65), jako przedstawiającym najwięcéj trudności w podobnéj pracy. Mamy tedy naprzód w trzech rzędach: kropki, wypisane liczebniki i cyfry (1 do 9). Według objaśnienia, należy przechodzić od któréjkolwiek do następnéj przez powiększenie o 1, a potym: «Dla większéj «Uczniów wprawy, weźmie nauczyciel dziewięć sztuk groszy miedzianych, «albo, co najłatwiéj mieć można, dziewięć ziarn grochu lub innego zboża, «i dając jedno naprzykład ziarno któremu z Uczniów, spyta się, ile ma ziarn «w ręku? odpowie: *jedno;* gdy mu do tego przyda jeszcze jedno ziarno i spy«ta się, ile ma ziarn w ręku? odpowie: *dwa*... Niech to samo powtórzy «z kilku innymi Uczniami. Niech im sam potym każe rachować od jednego «ziarna do dziewięciu. Niech naostatek sam bierze, albo któremu z Uczniów «daje po kilka razem ziarn na rękę, a drudzy niech zgadywają przez samo «widzenie, ile ma ziarn na ręku. Gdy już dobrze liczyć będą umieli od je«dnego do dziewięciu, niech im powié, że te słowa, liczby oznaczające, które «wymawiali, a które mają w drugim rzędzie pod kropkami podpisane, mogą «się krócéj wyrazić i w saméj rzeczy wyrażają tak, jak trzeci rząd okazuje, »gdzie zamiast tego słowa: jedno pisze się 1, zamiast.... Każe im podobne pi«sać na tablicy i potym wymiawiać, tak, jak mają w drugim rzędzie. Powie «im, że nie masz więcéj, jak tylko te dziewięć znaków liczbowych i że nimi «choćby największe liczby można oznaczyć, jak to potym obaczą. Zwróci «się jeszcze z nimi do wzoru i powie krótko, że jaką liczbę mają kropkami

[1]) Przedrukowane również we lwowskiéj *Bibl. ped. i dyd.* znakomite dzieło Piramowicza «*Powinności nauczyciela mianowicie zaś w szkołach parafijalnych...*» (pierwotnie wydane w r. 1787) miało wejść do składu drugiéj części elementarza, która w całości nie doszła do skutku.

«oznaczoną w pierwszym rzędzie, tęż samą mają słowem, pod nią podpisanym, «wyrażoną w drugim rzędzie, a w trzecim rzędzie pod tymże słowem mają «znak liczbowy toż samo, co i słowo, krócéj wyrażający. Będzie, wyrywając, «pytał się ich, ile jest gdzie kropek, palcem na nie, lub skazówką skazując i jak się ta liczba kropek znakiem liczbowym wyraża». Umyślnie przytoczyliśmy cały ten ustęp, aby dać czytelnikowi możność zrozumienia nastroju, jaki nietylko w tym rozdziale, ale w całym znakomicie obmyślanym elementarzu się przebija. Dalsze stopnie nauki o liczeniu są: dziesiątki: 10, 20,..., 90; świetny wykład liczb pośrednich między tymi dziesiątkami; setki: 100, 200,..., 900 i krócéj już o liczbach pośrednich; tysiące: 1000, 2000,..., 9000 i nakoniec ogólny zarys pojęcia o liczbach, mających więcéj cyfr. Na zakończenie tego rozdziału: «i uczyni im otuchę, że gdy teraz uczyć «się dobrze będą, a potym na kawałek chleba pracowicie zarabiać, tedy mają «się spodziewać, że co teraz na ziarnach rachowali, to potym ten rachunek, «a może i większy, na pieniądzach uczciwymi sposobami zebranych czynić bę«dą mogli». Rozdziały II—V poświęcone czterém działaniom; przy mnożeniu rzecz o miarach; w rozdziale o dzieleniu postępowanie przygodne z liczbami wielorakimi. Rozdział VI «O regule trzech», gdzie są rozwiązywane najprostsze zadania, według tego, jak «rozum sam naturalny człowieka podał «sposób postępowania w tym działaniu»,

Niezależnie już od Komisyi Edukacyjnéj, nakładem STANISŁAWA AUGUSTA wyszła w cztérech tomach «*Nauka matematyki* do użycia artyleryi francuskiéj, napisana przez p. BÉZOUT na polski język przełożona...» (1781—2) przez JÓZEFA JAKUBOWSKIEGO, «Kapit: i Profes: Ar: Kor:». Piérwsza część tomu I, «*Fundamenta rachunków*» (str. 208 i XVI), przedstawia kurs arytmetyki, wraz z nauką o proporcyjach, o wyciąganiu piérwiastków kwadratowych i sześciennych, o postępach, oraz o logarytmach, tak gruntownie i systematycznie, a jasno opracowany, iż to dzieło BÉZOUT wciąż jeszcze wychodzi we Francyi w ponawianych wydaniach. Jest to najlepszym dowodem trafności wówczas wyboru tego dzieła do przekładu. Arytmetyka BÉZOUT przedstawia niejako dopełnienienie arytmetyki LHUILIER'go. Gdy druga uczy praktycznie i trafnie cztérech działań na liczbach całkowitych, ułamków i rozwiązywania zadań, to piérwsza systematyzuje te wiadomości, uzupełnia je pod względem teoretycznym traktowaniem gruntowniejszym ułamków dziesiętnych (odrazu łącznie z liczbami całkowitymi) i szczegółowym przedstawieniem własności stosunków i proporcyj, a nadto wnosi do naszéj literatury piérwszy należyty wykład wzmiankowanych dalszych części tego dzieła. Szwankuje ono tylko pod względem słownictwa, które u JAKUBOWSKIEGO jest zbytnie oryginalnym.

Wydanie u nas w ostatniéj ćwierci wieku zeszłego trzech ostatnio tu zaznaczonych arytmetyk zapowiadać się zdawało jaknajlepiéj o dalszym rozwoju nauczania arytmetyki u nas. Możebytéż to nastąpiło przy innych, przyjaźniejszych warunkach ogólnych.—

Przechodzimy nakoniec do wieku XIX.

W kilkakrotnie już przytoczonym artykule TRYBULSKIEGO czytelnik znajdzie (str. 386—396) wyłożenie wypracowywanych, głównie w Niemczech, w bieżącym już wieku, metod nauczania początków arytmetyki (PESTALLOZZI, DISTERWEG i HEUSER, HENTSCHEL, GRUBE i ich następcy), jakotéż (str. 397—410), przegląd, niekiedy zbyt łagodny, ważniejszych polskich książek, do tego się odnoszących.

Chcąc wogóle mówić o naszych arytmetykach wieku bieżącego, mimowoli staje się przedewszystkiem wobec pytania, dlaczego one tak długo nie przedstawiały dalszego rozwinięcia tego poglądu na nauczanie, który widnieje ze znakomitéj książki LHUILIER'go, dlaczego niéma najmniejszego śladu jéj oddziaływania, dlaczego pod względem dydaktycznym tak długotrwały upadek zaznaczyć należy? Trafną nam się wydaje uwaga (r. 1880) TRYBULSKIEGO (str. 396): «Autor jéj (-LHUILIER-), nie wykazawszy błędów dawnéj metody «i nie potępiwszy jéj ani jednym słówkiem, tymsamym pozwolił rutynistom igno-«rować ją i pogrążyć się napowrót w błogim spoczynku bezczynności; wyło-«żywszy zaś swoje zasady ze spokojem iście matematycznym, zyskał wprawdzie «uznanie światłych mężów Komisyi Edukacyjnéj, ale nie wzbudził w tłumie «entuzyjazmu, tak niezbędnego dla przeprowadzenia w massy jakiéjkolwiek «nowéj idei; tym zaś sposobem nie ściągnął na siebie gniewu i piorunów prze-«ciwników, ale też i nie zjednał dla swéj idei gorących zwolenników i aposto-«łów. Dlategotéż zasady LHUILIER'go, jakkolwiek nadzwyczajnéj doniosłości, «nie przeszły prawie poza obręb jego własnego dziełka». Okolicznościowo zaznaczymy tu, iż szkoły średnie okręgu wileńskiego, zostające pod bezpośrednim zarządem uniwersytetu w Wilnie i jego rektora JANA ŚNIADECKIEGO, używały głównie *Arytmetyki dla szkół narodowych*.—

Chronologicznie zestawiamy[1]) tu, wydane w w. XIX arytmetyki, zbiory zadań i ważniejsze prace, o nauczaniu arytmetyki traktujące. Nie chcemy każdego z tych dzieł omawiać szczegółowo, gdyż niektóre tego nie warte, a prócz tego żyjący autorowie nowszych drażliwieby przyjmowali choćby najobiektywniejsze uwagi w takim jak niniejszy rysie historycznym wypowiedziane.

Z książek w. XVIII przedrukowywano w w. XIX *Arytmetykę dla szkół narodowych* LHUILIER'go (por. str. LIII, 1802—1841) oraz *Arytmetyka praktyczna* BIELSKIEGO (por. str. LI, 1806—1815). Bez wymienionego roku wyszła w Wilnie *Arytmetyka dziecinna czyli Nauka o rachunkowości początkowéj*.

(Sefer iter soprim, t. j. wieniec mędrców), arytmetyka dla żydów. Grodno, r. (5563) 1802; drugie wydanie Lwów 1815.

Nauka o ułomkach przez ks. TADEUSZA GIERYKOWSKIEGO, Warszawa r. 1805.

Mała arytmetyka przez pytania i odpowiedzi A. BIVADI, *z textem francuskim obok, wydana przez* HAUTEPIERRE, Wrocław r. 1806.

JÓZEF CZECH naprzód profesor matematyki elementarnéj w Szkole Głównéj koronnéj w Krakowie, a następnie pierwszy dyrektor gimnazyjum wołyńskiego w Krzemieńcu, tłomacz *Elementów* EUKLIDESA, wydał w r. 1807 w Wilnie *Krótki wykład arytmetyki*, tamże przedrukowywany następnie w l. 1809, 11, 16, 17, 27 i 28. Dziwny jest układ téj książki. Część pierwsza (do str. 98 wyd. z r. 1817) jest zestawieniem tego, co uczniowie, źle przez nauczyciela prowadzeni, nazywają niekiedy teoryją, t. j. zbiorem definicyj i prawideł, a gdzieniegdzie objaśnień, w rodzaju np. podanego po prawidle na mnożenie liczb dziesiętnych: «Przyczyna tego działania gruntuje się na naturze i spo-«sobie znaczenia ułamków dziesiętnych» (str. 17; żadnego dodatkowego niéma

[1]) Zestawienie to może nie jest wyczerpujące, gdyż odnalezienie dawniejszych podręczników szkolnych jest często bardzo trudném. Wiadomość o kilku z podanych tu książek zawdzięczam p. S. Dicksteinowi.

już objaśnienia). Toż samo w ustępach o podnoszeniu do kwadr. i sześ. i wyciąg. piérw., o postępach i o logarytmach (te ostatnie jeszcze stosunkowo najlepiéj). Reguła trzech (str. 60—62, 66—67) ledwo zaznaczona. Część druga (str. 99 —127) obejmuje «Wzory działań», jakby wyciąg z zeszytu ucznia, w którym były przerabiane zadania; pozbawione zwykle wszelkich objaśnień. CZECH położył jako wychowawca wielkie zasługi w szkole krzemienieckiéj, czego dowodem powszechny i tak poważnie wyrażony [1]) żal po jego śmierci w r. 1810. Może nauczyciel arytmetyki za dyrektorstwa CZECHA (który wykładał algiebrę), ANTONI STRZELECKI, pomimo takiego podręcznika dobrze naukę arytmetyki prowadził, ale CZECH wydaniem téj książki nie zasłużył sobie bynajmniéj na zaszczytną wzmiankę. Słusznietéż delegacyja uniwersytetu wileńskiego w r. 1811 nie uznała za możliwe wprowadzenie arytmetyki CZECHA, używanéj w szkole krzemienieckiéj, do innych szkół zostających ówcześnie pod pieczą CZACKIEGO [2]).

Ks. KALASANTY DAMCZEWSKI. *Arytmetyka, czyli nauka rachunkowa.* Wilno r. 1808.

CHAYANNES D. A. *Wykład metody elementarnéj* H. PESTALOZZI'ego tłomaczył z francuskiego A. MARCINOWSKI, Wilno r. 1808.

Nauka matematyki.... przez ALEKSANDRA KAROLA KONIKOWSKIEGO. *Tom I, obejmujący Arytmetykę.* Warszawa r. 1811. Niesłusznie zapomniana książka, zaleca się badzo jasnym wykładem, na staranném rozumowaniu opartym.

Nauka sztuki rachunkowéj.... z niemieckiego tłomaczył P. A. LIDL. Lwów 1814 i 1846.

Arytmetyka krótko zebrana dla uczącéj się młodzi w 3-ch częściach. Połock r. 1816.

Arytmetyka przez ks. IGNACEGO PRZYBYLSKIEGO. Warszawa r. 1818.

Arytmetyka praktyczna przez ANTONIEGO KOTSCHULA. Wrocław r. 1819.

Wielką w swoim czasie wziętością cieszyły się «*Zasady Arytmetyki* ułożone przez byłego profesora matematyki w szkole departamentowéj» (RADOMIŃSKIEGO), ogłoszone w Warszawie w r. 1821, a późniéj powiększone w r. 1827 (str. 258 i VI tablic miar), podzielone na dwie części w l. 1832—4 i oddzielnie część pierwsza 1841 i 1858. Dzieło RADOMIŃSKIEGO obejmuje tenże zakres głównéj treści, co książka CZECHA, i również w nim wykład ułamków dziesiętnych jest prowadzony razem z liczbami całkowitymi. Jest ona jednak kursem bezwarunkowo starannie obmyślonym i troskliwie opracowanym. Wprawdzie jest to kurs właściwie dedukcyjny; nawet podawane przepisy wykonywania działań są późniéj dopiéro objaśniane, którymto objaśnieniom łatwo niekiedy wiele zarzucić można; tu i owdzie niepotrzebne wycieczki (np. przy odejmowaniu: «różnica może tu być większa niż liczba, od któréj się odejmowało» i naturalnie: «majątek» i «dług», str. 21), i t. d., tak iż książki téj ani pod względem metody, ani objaśnień przytoczonych, ani gruntowności rozumowania, anitéż jasności w ogóle nie można postawić obok *Arytmetyki dla szkół narodowych*, albo *Fundamentów rachunków*. Lecz w każdym razie, wyczerpują-

---

[1]) Zob. artykuł p. dra PIOTRA CHMIELOWSKIEGO *Czacki Tadeusz w Encyklopedyi wychowawczéj* (t. III, 1883 str. 63).

[2]) Zob. tamże str. 66.

cym zaznaczeniem różnych szczegółów, jakotéż właściwym sobie systematem w całym wykładzie, pracowitością nakoniec widoczną z całego tego dzieła, daje się wytłómaczyć uznanie, jakim ta książka przez dość długi przeciąg czasu się cieszyła.

Nauka arytmetyki przez A. Bninskiego. Płock r. 1822.

Zbiór zadań arytmetyczn. przez Jabłonowskiego. Wilno 1822, 1853 i 1881.

Arytmetyka i pierwsze zasady algiebry.... z rosyjskiego na język polski przez Antoniego Jakubowicza *przełożone.* Warszawa 1822.

Początki arytmetyki przez Wincentego Karczewskiego. Kielce r. 1822.

Arytmetyka Antoniego Kamińskiego. Wilno, część I r. 1826, część II r. 1827; skrócone w Wilnie 1861.

Sto zadań małego rachmistrza. Warszawa r. 1832.

Werbusz Kazimierz, *Nauka o poznawaniu liczb.* Warszawa r. 1832.

Vernier H. Veron. *Arytmetyka dla użytku początkowych* tłomaczył Michał Brzostowski. Wilno 1833 i 1839.

O rachunkowości kupieckiéj przez A. Barcińskiego, 3 tomy, Warszawa r. 1833—35. Tom I przerobiony p. t. *Arytmetyka przemysłowo handlowa,* Warszawa 1835.

Tychomirow P. *Arytmetyka na szczotach albo łatwiejszy... wydoskonalony przez* Swobodzkiego, tłomaczył ks. Eliasz Niewiarowski. Wilno r. 1838.

Mnożenie i dzielenie liczb zapomocą liczebnicy przez Orlickiego. Wilno r. 1838.

Popularny wykład początków arytmetyki przez A. Barcińskiego. Warszawa 1843 i 1856.

Krótki wykład arytmetyki przez L. Zawadzińskiego. Kraków 1841 i 1846

Arytmetyka rozumowano-przykładowa przez Kozłowskiego. Wilno r. 1843.

W r. 1844 znany filozof i zacny obywatel, Karol Libelt, ogłosił w dwu tomach *«Wykład matematyki dla szkół gimnazyjalnych»* (Poznań). Początkowa część tomu I (str. 11—164) przedstawia piérwszą próbę przeszczepienia na nasz grunt niefortunnéj koncepcyi niemieckiéj, t. z. «allgemeine Arithmetik», albo «Buchstabenrechnung». W téj książce (przyjmując, że uczniowie przeszli już pobieżny kurs początków rachunków) wykłada się ogólnie sześć działań algiebraicznych na literach, mogących otrzymywać także wartości ujemne, mówi się także o liczbach niewymiernych i nieco o urojonych, a następnie dopiéro przeprowadza się w zastosowaniu, a więc na podstawie algiebraicznych prawideł, po raz piérwszy systematyczny wykład właściwéj arytmetyki, przy przerabianiu dowodzeń, gdzie tylko można, na literach (które mogą teraz oznaczać tylko liczby dodatne). Tak np. w rozdziale «O rachunkach praktycznych» dowodzi się różnych twierdzeń ogólnych. Przytoczymy tu jedno z takich twierdzeń: «Jeżeli z sześciu ilości danych A, B, C, D, M, N, (rozumiejąc «ich wartości), M zależy od A i B, a N zależy od C i D, tak, że ilekroć «B = D, to M : N = A : C, a ilekroć A = C, to M : N = B : D, natenczas «M : N = (A . B) : (C . D)». Po dowiedzeniu tego twierdzenia, 4 wnioski podobnie wysłowione i odpowiednio uzasadniane. A to wszystko dla rozwiązywania zadań takiego typu: «Kiedy 4 robotników w 5 dniach wykopuje 48 prętów «szachtowych ziemi, ilu trzeba robotników, ażeby w 6 dniach 216 prętów było «wykopanych?» — Układ ogólny téj części dzieła był do pewnego stopnia narzucony Libeltowi wymaganiami programu w poznańskim obowiązującego; z przedmowy jego jednak widać, że takie traktowanie rzeczy wydało mu się

pomysłem bardzo szczęśliwym, tak iż ani złych stron ogólnie dydaktycznych téj metody, ani tego, że ona jest nieodpowiednią dla naszéj młodzieży LIBELT całkiem nie dostrzegał. Przy tym jednak systemacie, jaki LIBELT w téj pracy przyjął, zaléca się ona ścisłością przeprowadzenia całego kursu.

BRETTNER *Wykład rachunków prąktycznych i wykład arytmetyki literowéj i algiebry*, tłomaczył z niemieckiego W. MILEWSKI. Wrocław 1846. Poznań 1859 i 1865.

Rachunkowość handlowa przez F. A. ZUBELEWICZA. Warszawa r. 1846. Dobrze ułożona książka, któréj przestudyowanie może być zalecane poświęcającym się zawodowi handlowemu.

Wadliwości dydaktyczne programu matematyki, obowiązującego w szkołach średnich austryjackich do r. 1884, a przytém niezachowanie właściwego stopniowania w rozkładzie treści, zbytni nacisk na kwestye drugorzędne w podręcznikach MOČNIKA, co jeszcze spotęgowane zostało, nieudolnemi tłomaczeniami lub przeróbkami,— wszystko to długo gnębiło naszą młodzież w szkołach galicyjskich. Wychowanie na tych arytmetykach wielu pokoleń, które może zbytnio już do takich kursów przywykły, aprobacya władz szkolnych, nie dostrzegających, jak szkodliwe dla młodych umysłów jest pozbawienie ich tego pożytku, jaki z dobrego prowadzenia nauki arytmetyki na całe wychowanie wynika, jest może przyczyną tego, że w Galicyi (pozbawionego nadto niegdyś światłego wpływu Komisyi Edukacyjnéj) żadnéj, prócz Steczkowskiego niema jakkolwiek poważnéj pracy arytmetycznéj nie wyjmując tych nowszych, w których na tytułach lub w przedmowach MOČNIK nie jest wymieniony mimo ich ścisłego z nim powinowactwa. — Ten pogląd ogólny odnieść należy do podręczników dla szkół średnich, gdyż «*Książki rachunkowe dla szkół ludowych pospolitych*» w ręku dobrze przygotowanego nauczyciela są dotąd najlepszymi z istniejących u nas książek w tym rodzaju. Mamy tu mianowicie na myśli ostatnie wydania wiedeńskie oddzielnych książeczek p. t. «*Pierwsza*»,..., «*Piąta książka rachunkowa dla szkół pospolitych austryjackich*» Wiedeń 1886—1889, Dawniejsze wydania tych książek znamy: *Nauka rachunków na pamięć*. Lwów 1847; Lwów —Lipsk 1850; *Nauka rachunkowości na pamięć*, Lwów – Stanisławów—Tarnów, druk w Wiedniu 1847; (tłom. A. STOKOWSKI) Wiedeń 1850; (STOKOWSKI) Lwów – Lipsk 1860, Wiedeń 1850; Wiedeń 1852. — *Arytmetyka przemysłowo handlowa* Wiedeń 1855.— Z wydań we Lwowic dla szkół średnich, dla klas III i IV (KRAWCZYKIEWICZ) 1857; na (?) klasę I gimn. (KRAWCZYKIEWICZ) 1864; na II klasę, 1864; na III klasę, 1864; na IV klasę, 1864; na III i IV klasę (KRAWCZYKIEWICZ) 1868; *Arytmetyka i Algiebra, pierwsza połowa* (T. STANECKI) 1870; *Arytmetyka i algiebra* na klasy wyższe gimn. i realne (STANECKI) 1872. *Arytmetyka* na klasę I i II realn. (BĄCZALSKI) 1875; na III i IV realn. (GRZYBOWSKI i BĄCZALSKI) 1875. *Arytmetyka i algiebra dla klas wyższych gimn.* (BODYŃSKI); Lwów 1878—9.

TASTU A. S. *Wychowanie macierzyńskie* tom II Arytmetyka Warszawa. r. 1847.

LOMPE J. *Przewodnik do rachunków pamięciowych*. Gniezno – Leszno 1848.

KRAWCZYKIEWICZ *Spis najcelniejszych prawideł arytmetyki*. Lwów 1848.

KRAWCZYKIEWICZ *Arytmetyka do użytku szkolnego i domowego*. Lwów 1850.

KREMER ANTONI *Zadania rachunkowe* i *Rozwiązanie rachunków*. Rogoźno r. 1850.

WRZEŚNIOWSKI W. *Arytmetyka*. Warszawa 1851 i 1854.

Część I *Elementarnego wykładu matematyki* przez JANA KANTEGO STECZKOWSKIEGO, profesora na uniwersytecie Jagiellońskim, obejmująca *Arytmetykę* (dwa wydania towarzystwa naukowego krakowskiego, w r. 1851 i 1861; 2-ie), przedstawia wykład arytmetyki na podstawie algiebry. Rolę, jaka tu przypadła arytmetyce, dosadnie scharakteryzuje ten fakt, że reguła trzech, jako zastosowanie proporcyj, wraz z nauką o proporcyjach znalazła się po ułamkach ciągłych, dwumianie NEWTON'a, pierwiastkach, liczbach niewymiernych i urojonych i logarytmach. Jednak niektóre ustępy arytmetyczne, jak o podzielności liczb i o ułamkach posiadają istotne zalety. Pod względem zaś ścisłości metodycznéj wykładu dzieło STECZKOWSKIEGO nie dorównywa pracy LIBELTA. Przeznaczenie *Arytmetyki* STECZKOWSKIEGO dopiéro dla klas «wyższych począwszy od czwartéj» usprawiedliwiało do pewnego stopnia nastrój w jéj układzie.

BAECK *Zadania arytmetyczne*. Berlin 1853.

WRZEŚNIOWSKI W. *1156 przykładów arytmetycznych*. Warszawa 1854.

VOGEL DAN. i BRENNECKE W. *Rachunki praktyczne* tłom. JUL. ZABOROWSKI. Poznań i Berlin 1854.

OLĘDZKI M. *Metoda uczenia czterech działań*. Warszawa 1856.

Wcale dobrą jest *Arytmetyka* K. GRUBECKIEGO wydawana w Warszawie 1857, 65, 67 (str. 208) i 78, obejmująca w starannym i dość systematycznym wykładzie naukę o liczbach całkowitych i ułamkach wraz z trafnymi zadaniami. Po śmierci K. GRUBECKIEGO wydana została przez MICHAŁA GRUBECKIEGO (1867) część druga, obejmująca proporcyje, regułę trzech i o podnoszeniu do kwadr. i wyciąganiu pier. kwadr., również z zadaniami. W niektórych ustępach widoczną jest taż sama staranność i istotna znajomość przedmiotu, która zaléca część piérwszą, inne za to ustępy nie dochodzą do tego poziomu. Osobliwie końcowy ustęp o regule fałszywego założenia jest bardzo słaby-

Arytmetyka wydana w Warszawie (1858—9) przez okrąg naukowy, trzy części (z zadaniami) na klasy I, II, III, a IV o sposobie prowadzenia rachunku pamięciowego, uwagi dydaktyczne i rozwiązania zadań, napisana przez A. ZABIEŁŁĘ, zaléca się dobrym wprowadzeniem pojęcia o ułamkach, ustępem o objaśnieniu miar powierzchni i objętości i t. d. Całość jednak kursu nie przedstawia ani systematycznego opracowania, anitéż zalet wybitniejszych pod względem dydaktycznym.

DIESTERWEG i HEUSER *Podręcznik metodyczny do ogólnéj nauki rachunków*, tłom. HOLTZ. Warszawa 1858.

NALEPIŃSKI *Przewodnik do uczenia rachunków z pamięci*. Warszawa 1858, 1860.

MAZUR *Rachunki pamięciowe*. Ostrów 1858 i tamże *Rozwiązania do rachunków pamięciowych* 1860.

W. WOJNARSKI *Liczydło, narząd do uzmysłowienia nauki rachunków z pamięci*. Wiedeń 1861.

Tablice PESTALLOZI'ego *do czterech działań arytmetycznych zastosowane*. Warszawa 1862.

Cztery działania z liczbami całemi (ROMAN ŻULIŃSKI). Warszawa (1862).

Stanisław Solski *Geometry polskiego zabawa o arytmetyce albo rachowaniu* z r. 1683. Wydał J. Bayer. Warszawa 1863.

Dorn *Zadania dla pisemnego rachowania w szkole elem. Tłom.* L. Weiss, 2 zeszyty. Głogów 1863.

«*Arytmetyka* z teoryją przybliżeń liczebnych» G.-H. Niewęgłowskiego, Paryż 1866. Nauka o proporcyjach i regułach po wyciąganiu pierw. kw. Wykład czterech działań na liczbach całkowitych bardzo pobieżny. Nawzór książek francuskich metoda w tym dziele zachowana jest dedukcyjną. Układ i sposób przedstawiania oddzielnych ustępów bardzo się zbliża do książek francuskich, poświęconych teoretycznemu wykładowi arytmetyki.

Macé *Arytmetyka dziadunia*, tłom. z franc. Egera. Kraków 1869.

Stachowicz K. *Nauka cztorech działań arytmetycznych* Warszawa 1872.

Dreziński *Teoretyczna i praktyczna nauka rachunkowości dla rękodzielników.* Rzeszów 1872.

Jeske A. Wszystkie wydania w Warszawie: *Arytmetyka dla dzieci* 1872; *Arytmetyka dla dzieci* 1873, 1875, w opracowaniu Z. Kamińskiego 1894; *Arytmetyka* (część I) 1872. *Arytmetyka* 1873, 1875, 1881, w lepszem opracowaniu Z. Kamińskiego 1892.

Bączalski *Nauka rachunków* i *Przewodnik metodyczny.* Lwów 1875.

Baraniecki M. A. *Arytmetyka* w «Panteonie wiedzy ludzkiéj». Warszawa 1875.

Żuliński J. *Rachunek miarami* (?) *i liczbami* (?) *dziesiętnemi.* Lwów 1877.

Kramsztyk Wykład arytmetyki handlowéj. Warszawa 1879.

Wspomniany tu kilka razy artykuł Wincentego Trybulskiego, *Arytmetyka*, ogłoszony w *Encyklopedyi wychowawczéj* (r. 1880, tom I, str. 319—435) przedstawia wielce pracowite i sumienne studyjum. Wprawdzie początek o różnych systematach liczenia, opracowany został głównie na podstawie niespecyjalnego dzieła Taylor'a w przekładzie francuskim (*La civilisation primitive*, tłom. pani Brunet), oraz przytoczonego już (str. XVII) niekrytycznego działa Hoefer'a, i wprawdzie na tym ostatnim, jak również na zeszłowiecznym dziele Montucla, *Histoire des mathématiques*, opierają się głównie tu i owdzie wzmiankowane fakta z historyi arytmetyki w starożytności i średnich wiekach, to jednak wielką zasługą Trybulskiego jest piérwsze tak mozolne rozejrzenie się w tych dawnych arytmetykach naszych, które mógł odnaleść w biblijotece głównéj w Warszawie, właściwe ich ocenienie, jak również należyte podniesienie wartości zapomnianéj już prawie *Arytmetyki dla szkół narodowych* Sam głównie zajęty nauczaniem początkowym (umarł w r. 1882 jako nauczyciel szkoły technicznéj dróg żel. warsz.-wied. i warsz.-bydg. w Wars.), ze szczególnym zamiłowaniem opracował ustęp o ruchu na zachodzie w wieku bieżącym na polu nauczania początkowego, jak również o śladach oddziaływania tego ruchu na odpowiednie nasze podręczniki. Ostatni ustęp artykułu obejmuje (od str. 410) wskazówki do nauczania początkowego arytmetyki, z których nie wszystkie (np. na str. 419, 421) trafiają do naszego przekonania.

Wyrobisz *Zagadnienia rachunkowe do liczby 20.* Kraków 1880... *do liczby 100* Kraków 1882.

Soleski J. *Nauka rachunków dla przemysłowców* Lwów 1880 i 1890.

Dickstein S. *Arytmetyka w zadaniach* Warszawa Część I 1883. Część II 1886.

Berkman M. *Początki arytmetyki.* («Bibl. mat. fiz.») Warszawa 1883.

Dickstein S. *Nauka rachunków. Cztery działania z liczbami całkowitemi.* Warszawa 1883, 1885, 1887.

Baraniecki M. A. *Arytmetyka* Warszawa 1884. (Pierwsze wydanie niniejszéj książki).

Zieleziński *Arytmetyka praktyczna.* Warszawa 1886, 1888.

Rożański S. *Nauka rachunków dla samouków.* Warszawa 1886, 1889.

Brzostowicz K. *Arytmetyka dla niższych klas gimnazyjalnych i realnych.* Sanok 1886.

Zajączkowski W. *Początki arytmetyki.* Lwów Część I 1887, 1889, 1891, Część II 1888, 1891.

Kuryłowicz S. *Nauka rachunków.* Lwów 1889

Tomasz Kłos. *Algoritmus to jest nauka liczby* z r. 1538. Wydał M. A. Baraniecki. Kraków 1889.

Zgorzalewicz J. *Wskazówki metodyczne, jak uczyć należy rachunków w szkołach ludowych.* Kraków 1892.

Fąfara J. i Soleski *Nauka rachunków.* Lwów 1893.

Baraniecki M. A. *Podręcznik arytmetyki i początków algiebry.*, w czterech częściach. Dla uczniów klas niższych gimnazyjów i szkół realnych w Galicyi. Część I i II. Kraków 1894.

Baraniecki M. A. *Krótka arytmetyka* w dwu częściach z wielu zadaniami. Kraków — Warszawa. 1894.

ARYTMETYKA.

ROZDZIAŁ I.

POJĘCIA WSTĘPNE. LICZENIE.

§ 1. POJĘCIA WSTĘPNE.

OKREŚLENIE LICZBY.

1. Gdy np. słyszymy kogoś mówiącego:

kupiłem *trzy* funty chleba,

to łatwo zauważymy, że tę samę myśl możnaby wypowiedzieć wyraźniéj, mówiąc:

kupiłem chleba *trzy razy więcéj niż jeden* funt.

Widzimy z tego, że w piérwszym wyrzeczeniu: *trzy* oznacza to samo, co w drugim wyrzeczeniu: *trzy razy więcéj niż jeden*. To zaś pojęcie „trzy razy więcéj niż jeden“ wynikło, wogóle mówiąc, z porównania ciężaru kupionego chleba z ciężarem funta; mówiąc zaś ściśléj — z wymierzenia ciężaru kupionego chleba ciężarem funta.

Przedmiot, który nam służy za podstawę w takim porównaniu, czyli przedmiot, którym mierzymy inny dany przedmiot (jak w powyższym przykładzie: funt, którym mierzymy ciężar kupionego chleba), nazywamy jednostką. Możemy więc powiedzieć:

Jednostka jestto przedmiot, służący do wymierzenia innego przedmiotu.

Podobnie, wyrażenie: „przeciąg czasu *dwudziestu cztérech* godzin stanowi dobę“ jest skróceniem wyrażenia „przeciąg czasu *dwadzieścia cztéry razy większego niż jedna* godzina stanowi dobę“. W tym przykładzie przeciąg czasu, który rozumiemy przez dobę, porównywamy z godziną, w celu wymierzenia go tą jednostką — godziną. Jako właśnie wynik z tego wymierzenia, otrzymujemy *dwadzieścia cztéry*.

Z tych dwu przykładów widzimy, że tak: *trzy* jak i *dwadzieścia cztéry* przedstawia się nam jako wynik z wymierzenia pewnego przedmiotu innym, przyjętym za jednostkę; owóż: trzy i dwadzieścia cztéry są to l i c z b y.

Do tegoż samego doprowadziłoby nas rozważanie innych przykładów.

2. Niezawsze jednak możemy pewne dwa przedmioty ze sobą porównywać, a tymmniéj wymierzać jeden z nich drugim. Tak np. ciężaru trzech funtów nie moglibyśmy porównywać z przeciągiem czasu jednéj godziny, a tymsamym mierzyć jednego z nich drugim.

Takie dwa przedmioty, które mogą być ze sobą porównywane, t. j. dwa takie przedmioty, z których jeden może być wyrażony przez drugi, nazywamy j e d n o r o d n y m i. Jednorodnymi więc np. będą nietylko: *pięć godzin* i *godzina*, ale także: *rok* i *miesiąc* (bo: rok możemy wyrazić jako dwanaście miesięcy, a nawzajem: miesiąc jako dwunastą część roku); również np. *dwa lata* i *sześć miesięcy* (bo: dwa lata jest to samo, co cztéry razy po sześć miesięcy, albo: sześć miesięcy jest czwartą częścią dwu lat).

Przedmioty, których nie można ze sobą porównywać, czyli takie, których wprost jednych przez drugie wyrazić nie możemy, nazywamy przedmiotami r ó ż n o r o d n y m i. Różnorodnymi więc będą np. *trzy funty* i *jedna godzina*, *łokieć linijowy* i *łokieć kwadratowy*.

3. Bezpośrednio z tego wynika, że *jednostka jest jednorodna z przedmiotem, który tą jednostką mierzymy*. Gdy zaś liczba, jakeśmy widzieli, jest wynikiem z wymierzenia pewnego przedmiotu innym, przyjętym za jednostkę, więc możemy powiedzieć:

Liczba jestto wynik z wymierzenia pewnego przedmiotu innym, z nim jednorodnym, przyjętym za jednostkę.

Tak np. w wyrażeniu „kupiłem trzy funty chleba“ liczba trzy jest wynikiem z wymierzenia *ciężaru* kupionego chleba *ciężarem* funta, przyjętym za jednostkę.

Podobnież, gdy mamy: trzy funty i dwanaście łutów cukru, to tu ciężar cukru wymierzamy naprzód ciężarem funta, a to, co jest już lżejsze od funta, wymierzamy ciężarem łuta. W téj więc *(jednéj)* liczbie mianowanéj złożonéj (porównaj niżéj ustęp 10-ty) używaliśmy przy wymierzaniu *dwu* (jednorodnych, różnych wielkością) jednostek i tymsamym, zgodnie z powyższym określeniem, mamy *dwie* liczby w ścisłym znaczeniu (por. us. 9): trzy i dwanaście. — Gdy zaś powiemy trzy i trzy-ósme funta cukru, to tu (jedna) liczba: trzy i trzy-ósme, jest wynikiem z wymierzenia ciężaru tego cukru (jedną) jednostką: ciężarem funta (por. § 16, us. 1 b.)

4. Ponieważ jedność jest liczbą, więc i określenie jéj powinno wypaść z powyższego określenia liczby — jako przypadek szczególny.

Widzieliśmy, że gdy pewien przedmiot wymierzamy innym, z nim jednorodnym, w tym mierzeniu przyjętym za jednostkę, to wynikiem z tego jest liczba. — Wystawmy sobie, że mając jakieś dwa przedmioty jednorodne, wybraliśmy do wymierzenia ich taki przedmiot (z nimi jednorodny), jako jednostkę, iż okazało się, że jeden z danych dwu przedmiotów jest np. pięć razy większy od jednostki wybranéj, drugi zaś jest zupełnie taki sam, jak ta jednostka (np. gdy, mając dwa ciężary, wybraliśmy, jako jednostkę, ciężar funta i okazało się, że jeden z danych przedmiotów przedstawia ciężar pięciu funtów, drugi zaś ciężar funta). Jeżeli zechcemy o obu danych przedmiotach *jednakowo się wyrazić*, to, gdy o piérwszym powiemy, że

on jest *pięć razy* większy od jednostki.

wypadnie nam o drugim powiedzieć, że

on jest *jeden raz* większy od jednostki.

A gdy w piérwszym przypadku wynikiem z tego wymierzenia jest liczba pięć, to w drugim przypadku wynikiem z wymierzenia będzie liczba jeden, czyli jedność. Z tego wypada, że

Jedność jestto wynik z wymierzenia pewnego przedmiotu drugim, takim samym.

SZEREG LICZB NATURALNYCH.

5. Gdy powiem: mam cztéry funty mąki, to o tym, że ciężar téj mąki, jest istotnie *cztéry* funty, możemy się w ten sposób przekonać. Oddzielimy taką część mąki, któréjby ciężar był taki sam, jak ciężar funta; da nam to liczbę *jedność* (piérwszą). Z pozostałéj mąki oddzielimy znowu taką część, któréjby ciężar był taki sam, jak ciężar funta; otrzymamy znów stąd liczbę *jedność* (drugą). W taki sam sposób otrzymamy jeszcze *jedność* (trzecią) i znowu *jedność* (czwartą). Więc nasza liczba *cztéry* jest to samo, co

jedność i *jedność* i *jedność* i *jedność*.

Tak liczba jedność, jak i każda liczba, z jedności powstała przez dołączenie do niéj jednéj lub wielu jedności, nazywa się liczbą całkowitą [1]). Możemy więc powiedzieć, że

Jedność i każde skupienie jedności nazywamy liczbą całkowitą.

Inaczéj nieco: ponieważ wynik z wymierzenia ciężaru cztérech funtów mąki ciężarem jednego funta jest jednoznaczny z zebraniem cztérech wyników z wymierzenia ciężaru jednego funta mąki przyjętym za jednostkę ciężarem funta

[1]) Ściśle mówiąc, liczba jedność i liczby, z jedności powstałe przez dołączenie do niéj jednéj lub wielu jedności, zostały nazwane całkowitymi, w przeciwstawieniu ułamkom (§ 17, us. 2).

(z którychto wyników każdy, jak wiemy, jest jednością), więc liczba [1]) całkowita jest jednością, albo zebraniem, czyli skupieniem jedności [2]).

6. Szereg liczb całkowitych, po sobie następujących, t. j. szereg liczb

jedność, dwa, trzy, cztéry, pięć, sześć, siedem i t. d.,

z których piérwszą jest jedność (jeden), a każda następująca powstaje z poprzedzającéj przez dołączenie do niéj jedności, nazywa się szeregiem liczb naturalnych [3]).

Mając liczbę jakkolwiek wielką, zawsze możemy do niéj dołączyć jedność i w ten sposób otrzymać następną, jeszcze większą liczbę. Więc: *szereg liczb naturalnych jest nieograniczony*, czyli: *liczb całkowitych jest nieskończenie wiele.*

7. Wypowiadanie lub przedstawianie kolejno (we właściwym porządku) liczb, stanowiących szereg liczb naturalnych, nazywa się liczeniem, a tymsamym: liczyć jestto wypowiadać lub przedstawiać kolejne liczby z szeregu liczb naturalnych.

Liczenie często zaczynamy od któréjkolwiek liczby z szeregu liczb naturalnych, a przerywamy je na któréjś z dalszych liczb tego szeregu.

Gdy mamy liczyć (albo: policzyć) przedmioty dane, to przy téj czynności wystawiamy sobie, że one wszystkie są jednakowe, czyli, że one są równe sobie, tak, iż każdy z przedmiotów, do policzenia danych, mógłby zastąpić inny, którykolwiek z nich. Skutkiem tego: liczyć przedmioty jestto wyrazić (dowiedzieć się), jak często jeden z tych przedmiotów mógłby być pomyślany, aby przedstawić wszystkie dane przedmioty.

OKREŚLENIE ARYTMETYKI.

8. Pod nazwą arytmetyki rozumieć właściwie powinniśmy naukę o liczbach, gdyż wyraz grecki aritmos [4]) znaczy: liczba. Przedmiotem więc aryt-

---

[1]) Często przyjmują (idąc za definicyą podaną przez Euklidesa w *Elementach*, księga VII, określenie 2), jako główne określenie liczby iż: liczba jest z jedności złożoną mnogością. Wymaga to uprzedniego podania określenia jedności, jako też odrazu wprowadza rozważanie liczby, niezależnie od przedmiotów, przy których pomocy to pojęcie istotnie powstaje.

[2]) W arytmetyce mamy do czynienia z liczbami, z ktorych każda jest skupieniem jedności i równych części jedności (§ 17, us. 2), t. j. z liczbami całkowitymi i ułamkowymi (ogólnie mówiąc, z liczbami wymiernymi).

[3]) Niektórzy jakąkolwiek liczbę z szeregu liczb naturalnych (t j. jakąkolwiek liczbę całkowitą) nazywają liczbą naturalną. Tak np. Schröder *(Lehrbuch der Arithmetik und Algebra*, 1873) powiada: *liczba naturalna jest sumą jedności.*

W tymże dziele znajdujemy przytoczony następujący pogląd Hesse'go na liczbę: «... liczba do pewnego stopnia jest przedstawieniem danych do policzenia przedmiotów. Gdy jednak przedmioty ze świata cielesnego są przez rzeźbiarza przedstawiane pod względem ich rozciągłości w przestrzeni i ograniczenia (kształtu), gdy malarz, fotograf, rysownik przedstawia je pod względem ich kolorytu, części oświeconych i części w cieniu, konturu, — to rachmistrz przedstawia jedności tylko pod względem ich mnogości (wielości)».

«*Liczba naturalna jest przedstawieniem jedności ze względu na ich mnogość.*»

[4]) ὁ ἀριθμὸς — złączenie, zebranie, skupienie, a także: liczba, uwaga.

metyki są działania na liczbach (ogół tych działań stanowi rachunek), oraz wszelkie badania własności liczb.

Arytmetyka rozpowszechnienie swe zawdzięcza temu, że wykonywanie działań na liczbach, oraz niektóre najprostsze liczb własności, miały swoje zastosowanie przy rozwiązywaniu różnych zadań z życia praktycznego. Przez dość znaczny przeciąg czasu zaniechano nawet całkiem badania teoretycznego własności liczb, a zajęto się wyłącznie zadaniami praktycznymi, przeważnie ze stosunków handlowych. Należyte objaśnianie rozwiązywania takich zadań stało się przedmiotem nauki młodzieży, nietylko jako rozwijające ściśle myślenie, ale także jako często bezpośrednio pożyteczne w życiu dalszym. Nauce téj, mającéj na celu nauczanie wykonywania działań na liczbach, zapoznanie się z najelementarniejszymi ich własnościami, wraz z nauką o rozwiązywaniu różnych zadań z życia praktycznego, pozostawiono nazwę arytmetyki, pod którą się rozwinęła, — nauce zaś, obejmującéj teoretyczne badania własności liczb (nie wchodzącéj w zakres ogólnego wykształcenia średniego), nadano nazwę teoryi liczb. (Niekiedy teoryją liczb nazywają arytmetyką wyższą, wtedy, w przeciwstawieniu, naukę o działaniach na liczbach i rozwiązywaniu zadań praktycznych nazywają arytmetyką elementarną). Niektórzy niemieccy autorowie, arytmetykę elementarną nazywają „arytmetyką pospolitą" (gemeine Arithmetik). Przeciwstawiają zaś jéj pod nazwą „arytmetyki ogólnéj" (allgemeine Arithmetik), naukę będącą częścią algiebry elementarnéj, mianowicie rzecz o własnościach liczb, wyrażanych ogólnie zapomocą liter i działaniach na nich, traktując tu oprócz czterech piérwszych działań, także podnoszenie do potęg, wyciąganie pierwiastków i logarytmy.

Przez arytmetykę rozumiemy naukę o działaniach na liczbach, o niektórych własnościach liczb, pomocnych do zrozumienia lub prostszego wykonywania tych działań, oraz o rozwiązywaniu odpowiednich zadań z życia praktycznego.

Rachunkiem nazywamy albo ogół wszelkich działań arytmetycznych, albotéż razem uważane te działania, które wykonano w celu rozwiązania pewnego zadania.

W miarę rozwoju nauk matematycznych wogóle i doskonalenia się metod nauczania, arytmetyka robi odpowiednie postępy. Rozumiéć to należy w ten sposób, iż modyfikuje się z czasem wykład arytmetyki przez zmianę nacisku na pewne oddzielne kwestyje. Zasada rozumowania jest niezmienna, jeżeli tylko należycie prosto została wyłożoną — zmieniają się tylko rozwinięcie szczegółów i ich zastosowanie praktyczne.

Uczymy niekiedy arytmetyki ze specyjalnym celem: przysposobienia uczniów np. do przemysłu, do handlu. Wtedy w wykładzie uwzględniamy drobiazgowo odpowiednie zadania, podajemy i objaśniamy używane, a praktyczne

w użyciu skrócenia — powstaje w ten sposób arytmetyka przemysłowa, arytmetyka handlowa.

Zauważymy jeszcze, że w kursie arytmetyki, służącym do ogólnego wykształcenia średniego, różne kwestyje, którymi się w nim zajmujemy, rozwijamy drobiazgowiéj, niż tego ich zastosowania wymagają. Robimy to, popierwsze, dlatego, aby dać wyczerpujące przedstawienie rzeczy poruszanych tak, iżby wykład każdéj z nich był w odpowiedni sposób zakończony, a powtóre, w celu obudzenia zamiłowania do systematycznego i gruntownego myślenia. Matematyka bowiém, któréj arytmetyka jest częścią i zarazem podstawą, jest w średniem wykształceniu kursem praktycznym myślenia ścisłego.

LICZBY MIANOWANE I ODERWANE.

9. Nienazbyt jednak dbano niekiedy o ścisłość wyrażeń i o ich trafność na wszelkie przypadki. Wszystkie atoli te wyrażenia, którym zarzucić możemy, iż początkowo niedość ogólnie były pomyślane [1]), powszechnie pozostawiono i nierozważnie postępowałby ten, ktoby je dziś chciał zmieniać.

Jedną z takich nieścisłości jest używanie wyrazu liczba na oznaczenie (właściwéj) liczby wraz z mianem jednostki. Tak np. *trzy funty*, *dwadzieścia cztéry godziny* nazywano wciąż liczbami. Jednakże z czasem, używając zawsze i w takim znaczeniu wyrazu liczba, wprowadzono pewne rozróżnienie. Mianowicie: liczbę w ścisłym znaczeniu wraz z mianem jednostki nazwano liczbą mianowaną (konkretną), liczbę zaś właściwą (t. j. taką, przy któréj niéma, lub nie może być wypowiedziane miano jednostki), nazwano, w przeciwstawieniu mianowanéj, liczbą niemianowaną albo liczbą oderwaną (abstrakcyjną). Powiemy więc:

Jeżeli przy liczbie jest wymienione miano jednostki, to tę liczbę wraz z mianem jednostki nazywamy liczbą mianowaną. Tak np. „trzy funty" jestto liczba mianowana.

Jeżeli zaś przy liczbie nie jest lub nie może [2]) *być postawione miano jednostki, to tę liczbę nazywać będziemy liczbą oderwaną.* Np. pięć, szesnaście i t. d.

W liczbie więc mianowanéj mamy liczbę oderwaną i miano jednostki.

10. Gdy powiém: kupiłem trzy łokcie i osiem cali wstążki, to tu: trzy łokcie i osiem cali, jako oznaczające długość jednego przedmiotu, wstążki, uważamy za *jednę* liczbę mianowaną — tym więcéj, że moglibyśmy całą tę długość wyrazić w calach (i powiedzieć: mamy przedmiot, którego długość jest osiemdziesiąt cali.) W téj jednak liczbie mamy

---

[1]) Porównaj § 16, us. 2; § 19, us. 2; § 20 us. 2.

[2]) Np. 6 funtów jest cięższe od 2 funtów *trzy* razy.

dwie jednostki (jednorodne, różne wielkością — dwojakie) łokieć i cal; oddzielne części téj liczby, jedna: trzy łokcie, druga: osiem cali, są także liczbami mianowanymi. Dlatego naszę (jednę) liczbę mianowaną: trzy łokcie i osiem cali nazywamy liczbą mianowaną złożoną, albo wogóle, z uwagi, że mamy w niéj dwojakie (a w innych liczbach mogą być trojakie [1]), czworakie [2]) i t. d.) jednostki, — liczbą wieloraką. W przeciwstawieniu temu, liczbę mianowaną taką, jak np. pięć łokci, t. j. wyrażoną przy pomocy jednéj tylko jednostki, nazwiemy liczbą mianowaną prostą. Powiemy więc:

Liczba mianowana, wyrażona przy pomocy jednéj tylko jednostki, nazywa się liczbą mianowaną prostą.

Liczba mianowana, wyrażona przy pomocy dwu, lub więcéj (jednorodnych) różnych wielkością jednostek, nazywa się liczbą mianowaną złożoną, albo liczbą wieloraką. To ostatnie nazwanie (liczba wieloraka) jest krótsze i dosadne; dlatego wyłącznie go daléj używać będziemy.

Gdy powiemy: kupiłem 5 funtów cukru, 5 łokci, 1 stopę i 6 cali wstążki i 3 kopy orzechów, to mamy tu trzy liczby mianowane, z których dwie: 5 funtów i 3 kopy, są liczbami mianowanymi prostymi, pozostała zaś: 5 łokci, 1 stopa i 6 cali jest liczbą wieloraką.

Zauważyć tu jeszcze można, że gdy mówię: kupiłem 2 łokcie płótna i 16 cali wstążki, to mamy tu dwie liczby mianowane: jednę, 2 łokcie, drugą 16 cali, odnoszące się do różnogatunkowych przedmiotów (płótno i wstążka). Jeżeli zaś powiem: kupiłem 6 jabłek i 8 gruszek, to mamy również dwie liczby mianowane — a byłaby jedna, gdybyśmy mieli powiedziane ogólnie: 14 sztuk owoców.

11. Zwykle gdy mówimy ogólnie: liczby całkowite, to rozumiemy przez to liczby całkowite (us. 5) tak oderwane, jak i mianowane proste. Gdy zaś mamy na myśli liczby wielorakie całkowite, wtedy mówimy: liczby wielorakie całkowite, albo téż wprost: liczby wielorakie [3]).

---

§ 2. LICZENIE SŁOWNE.

1. Wyrabianie się oddzielnych nazw dla liczb złożonych z dwu lub więcéj jedności odnieść należy do piérwszych chwil życia gromadnego ludzi.

---

[1]) Np. 12 sążni, 2 łokcie i 5 cali.

[2]) Np. 3 lata, 25 dni, 8 godzin i 40 minut.

[3]) Np. «rachunki w liczbach całkowitych», «działania na liczbach wielorakich» (*Arytmetyka dla szkół narodowych*, trzeci raz wydana r. 1785, str. 1 i 79).

Nazwy te nadto wyrabiać się musiały bardzo powoli. Dowodu na to dostarcza nam zamieszkujące na krańcu Afryki południowéj plemię myśliwskie Saan, znane więcéj pod nazwą Buszmanów, zostające dotąd na najniższym stopniu rozwoju, które obecnie ma o liczbach takie tylko pojęcia: jeden, dwa, trzy i wiele, a dla ich oddania posiada oddzielne wyrazy [1]). — Wielu murzynów [2]) umie liczyć tylko do pięciu.

Najprościéj—zdawałoby się—można liczby od siebie rozróżnić, nadając im wszystkim coraz inne nazwy. Z powodu jednak, że liczb jest nieskończenie wiele (§ 1, us. 6), byłoby to nader niepraktyczne — nawet wrazie, gdybyśmy się ograniczyli do tych tylko liczb, z którymi najczęściej mamy do czynienia. Trzebaby bowiém nietylko bardzo wielu nazw się wyuczać, ale nadto ciągle mieć na myśli wielkość liczby, oznaczonéj przez każdą z tak wielu nazw.

2. Do usunięcia tych trudności w wyróżnianiu jednych liczb od drugich znakomicie przyczyniło się to, że nieodrazu miano do czynienia z wielu liczbami. Długo bowiém ludzie pozostawali w warunkach tak prostych, że zupełnie im wystarczało niewiele liczb początkowych, a do ich przedstawienia wygodnie posługiwać się mogli palcami, jednocześnie wyrabiając sobie powoli oddzielne dla tych liczb nazwy.

Że istotnie palce u rąk były używane do przedstawienia liczby — o tym przekonywają nas różne okoliczności. Małe dzieci dla wyrażenia liczby, a nawet dla rachunków swoich posługują się często palcami. Nie znając języka osób, z którymi chcemy się porozumieć, wrazie odpowiedniéj potrzeby pokazujemy na przedmiot, a następnie przy pomocy palców dajemy do zrozumienia, ile takich przedmiotów chcemy wziąć, lub ile ich dać mamy. — U niektórych plemion polinezyjskich liczba pięć bywa oznaczona wyrazem [3]), który znaczy ręka. Plemię indyjskie Kora (w Ameryce) dla liczby dziesięć używa wyrażenia, oznaczającego podanie rąk. Plemiona Zulu (w Afryce południowéj) rachują wciąż na palcach, okazując dziesiątek uderzeniem o siebie obu rąk z wyprostowanymi palcami, mniejsze zaś liczby wyprostowaniem odpowiedniéj liczby palców, a dla oddania liczby pięć mówią: cała ręka, jako osiem mówią: wielki (palec), albo: zostaw (zegnij) dwa palce, i tak samo dziewięć: zostaw jeden palec [4]). — Nietylko palce u rąk, ale i palce u nóg służyły wielu ludziom pierwotnym do przed-

---

[1]) Według listownego zawiadomienia (1883, marzec) prof. uniw. lwowskiego Antoniego Rehmana, który dwa lata przebył w Afryce południowéj.

[2]) Rozumiemy tu oddzielne jednostki, a nie całe plemiona.

[3]) Zob. artykuł, który ogłosił *(Atheneum*, r. 1882, t. III) Jan Kubary: *Wyspy Nukuoro; z podróży po oceanie Wielkim* (lima, albo rima, znaczy: ręka, pięć).

[4]) Wyraźnych śladów odbywania rachunków na palcach dostarczają także zabytki egipskie, greckie i rzymskie.

Rachunek na palcach u różnych ludów odbywa się zawsze w kierunku od małego ręki lewej do małego prawej.

stawiania liczby. Dlatego np. na wyspie Mare w Australii, a także u wielu plemion indyjskich w Ameryce i niektórych murzyńskich w Afryce, jako dwadzieścia mówi się: człowiek (t. j. wszystkie palce człowieka), a nawet zaznaczono, że jedno z plemion indyjskich pojęcia 11, 12 i t. d. tak wyraża: noga jeden, noga dwa i t. d. (t. j. jeden, dwa i t. d. palce nogi).

Początkowo wystarczały ludziom dla przedstawienia liczb palce obu rąk, a dla tych liczb powoli wyrabiały się oddzielne nazwy, które z czasem upraszczały się i zmieniały znacznie pod wpływem różnych nieznanych nam okoliczności. W ten tylko sposób objaśnić sobie możemy, dlaczego w językach wszystkich ludów, wyżéj rozwiniętych istnieją nazwy osobne dla przedstawienia piérwszych dziesięciu [1]) liczb — nazwy niezłożone, podobnie jak nasze nazwy:
jeden, *dwa*, *trzy*, *cztéry*, *pięć*, *sześć*, *siedem*, *osiem*, *dziewięć*, *dziesięć*, albo *dziesiątek* [2]), gdy tymczasem nazwy nieco większych liczb są już złożone.

3. Gdy jednak z biegiem czasu zachodziła potrzeba częstszego przedstawiania liczb nieco większych, to korzystano z tego, że przez wyprostowanie palców jednéj, lub obu rąk, albo przez giest odpowiedni, oznaczający wszystkie palce człowieka, dawało się za każdym takim ruchem odrazu pojęcie o pięciu, albo dziesięciu, albo téż o dwudziestu, a tylko części liczby mniejsze przedstawiano oddzielnymi palcami.

Widocznie, takie przedstawianie liczb większych najprędzéj, najraźniéj iść musiało wtedy, kiedy się używało naraz obu rąk, gdyż rozmaite ucywilizowane narody liczą zawsze przy pomocy liczby dziesięć.

Wystawmy sobie np., że jeden człowiek chce dać drugiemu pojęcie o liczbie trzydzieści siedem, posługując się palcami rąk. Będzie więc piérwszy tak postępował: trzy razy zrzędu ukaże wyprostowane wszystkie palce obu rąk, a następnie, ukaże palców siedem. Ów zaś drugi człowiek, patrzący, zaznacza sobie naprzód, ile razy widział przedstawioną liczbę

Oznaczanie liczb do 10 przez wyprostowanie jednego tylko palca rąk spotyka się na niektórych zabytkach egipskich (np. na wielu egzemplarzach łokci).

(Pisma Greków bizantyjskich i Arabów o rachunku na palcach, prawdopodobnie dość rozpowszechnionym, uczyły za pomocą palców obu rąk przedstawiać wszystkie liczby od 1 do 9999).

[1]) Że początkowo powstać mogły oddzielnie nazwy tylko dla piérwszych pięciu liczb, a liczby od 5 do 9 wyrażały się przy ich pomocy, tego ślady mamy w mowie *niektórych* plemion murzyńskich Afryki, *niektórych* plemion indyjskich Ameryki, *wielu* plemion Australii, wyrażających 6 przez: pięć i jeden, 7 przez: pięć i dwa, i podobnie: 8: pięć i trzy, 9: pięć i cztéry — gdy spółcześnie inne z tych plemion mają już dla tych liczb oddzielne nazwy. Zauważyć jednak należy, że we wzmiankowanych sposobach liczenia na oznaczenie liczby 10 zjawia się już nazwa niezłożona.

Odtworzenie tego znajdujemy w pierwotnym liczeniu piśmiennym Greków i w liczeniu piśmiennym Rzymian (por. § 3, us. 3, 6).

[2]) Por. str. 10, odsyłacz [5]).

dziesięć, t. j. ile było dziesiątków, a następnie osobno zauważy liczbę siedem. W ten sposób, tak chcący dać pojęcie o liczbie trzydzieści siedem, jak i dowiadujący się o téj liczbie, wydzielają z niéj naprzód wszystkie całe dziesiątki, a osobno zaznaczają pozostałą część liczby, mniejszą od dziesięciu.

4. Zupełnie więc naturalnie, przy wymawianiu liczby większéj od dziesięciu, wyrobiło się to, iż oddzielamy z niéj całe dziesiątki, a osobno zaznaczamy pozostałą jéj część (t. j. część mniejszą od dziesięciu).

Jeżeli w liczbie, prócz dziesięciu, jest jeszcze jedność, to mówimy [1]: jeden na dziesięć [2]), czyli przez skrócenie (i łącząc te trzy wyrazy w jeden): jedenaście; podobnie, zamiast: dwa na dziesięć, mówimy krócéj: dwanaście, i t. d. dopóki w liczbie, prócz dziesięciu, jest niewięcéj niż dziewięć jedności. W ten więc sposób powstają nazwy: *jedenaście*, *dwanaście*, *trzynaście*, *czternaście*, i t. d. do: *dziewiętnaście* [3]).

Jeżeli w liczbie jest więcéj dziesiątków, niż jeden, to zamiast mówić: dziesięć i dziesięć [4]) i t. d., obliczamy, ile mamy tych (całych) dziesiątków i, posiłkując się liczbami dobrze już znanymi: dwa, trzy i t. d., łączymy ich nazwy z nazwą dziesięć, skutkiem częstszego użycia, w jeden wyraz. Mamy więc:

dwadzieścia [5]), *trzydzieści* [6]) *cztérdzieści*, *pięćdziesiąt* [7]),..., *dziewięćdziesiąt*.

---

[1]) Podobnie we wszystkich językach słowiańskich; w językach niemieckim i francuskim nazwy tych dwu części zestawiają się bezpośrednio: dreizehn,... neunzehn; dix-sept, dix-huit, dix-neuf. Nazwy liczb 11 i 12 w języku niemieckim, 11 — 16 we francuskim, jako mniejszych, a więc częściej używanych, uległy wcześnie znacznemu przekształceniu.

[2]) Dziesięć jest tu przypadkiem 4-tym. Porównaj odsyłacz 5).

[3]) W Biblii (szaroszpatackiéj), królowéj Zofii (żony Jagiełły): jeden na ście, jeden naćcie, dwanaćcie, dwanacie, trzynaćcie, czternaćcie, pięć naście, pięćnaćcie, sześć na ście, sześć naćcie, siedm naście, siedmnaćcie, ośmnaćcie, dziewięćnaćcie; w przekładzie (r. 1449, Świętosława s Wocieszyna statutu wiślickiego: cztyrnaćcie, cztyrnadcie, piętnadzieścia, pięćnadzieścia, pięćnaćcie, piędźnadzieścia, piętnaście, piętnadziesta, ośm'naćcie; w przekładzie (r. 1450) Macieja z Rożana statutów mazowieckich: pięćnadzieścia, pięćnaćcie, pięćnacie, pięćnadzieście; w tłomaczeniu (r. 1503) kilku statutów: siedmnadzieścia, ośimnaście, osmnaście.

[4]) Dziesięć a dziesięć — Zwód statutów przez Wawrzyńca z Prażmowa (r. 1531).

[5]) Dzieścia (niekiedy: dziesta) jest prawidłowo utworzonym przypadkiem 1-szym liczby podwójnéj oddziesiąć (dziesięć), tak jak od grosz albo skocieć, skojec —(dwa) grosza, skojca. Mówiono także: dwu dziesiątku (Bibl.), od: dwa dziesiątka (i podobnie: trzy dziesiątki, Bibl. Świętos.).

Przez analogią do: dwadzieścia powstały powyższe: piętnadzieścia, piętnadziesta.... Formy: dzieście, ście, ćcie, cie uważa się powszechnie za 4-te przypadki l. poj. Występują one tylko w połączeniach: jedenaście, dwanaćcie, pięćnadzieście, pięćnacie i t. d. W innych razach przypadek 4-ty ma formę 1-go t. j. dziesięć.

[6]) Dzieści jest przypadkiem 1-ym l. mn. Występuje niekiedy w formie dzieście (np. w rozprawie J. Przyborowskiego *Vetustissima adjectivorum...*, w zabytku z r. 1426: dwadzieście). Stąd prowincyonalizmy litewskie: dwadzieście, trzydzieście, cztérdzieście.

[7]) Dziesiąt jest przyp. 2-gim l. mn. (Tu liczebniki: dwa, trzy, cztéry, jako stojące przed wyrazami, do których się odnoszą, są przymiotnikami, a pięć,.... dziewięć są rzeczownikami; podobnie więc, jak: trzy cnoty, a pięć cnót, mamy: trzy *dzieści*, a pięć *dziesiąt*.)

Jeżeli więc mamy np. liczbę, w któréj, prócz dwu dziesiątków, jest pięć jedności, to powiemy: dwadzieścia i pięć [1]), albo krócéj: dwadzieścia pięć. Liczby więc pośrednie między dwadzieścia a trzydzieści wymówimy: *dwadzieścia jeden*, *dwadzieścia dwa*, i t. d. do: *dwadzieścia dziewięć*. Podobnie daléj:

trzydzieści jeden, *trzydzieści dwa*, *trzydzieści trzy* i t. d.

I t. d.

Każda z tych nazw nie jest częstego użycia. Dlatego dwu wyrazów, je tworzących, nie łączymy w jeden.

5. Tego, czego się teraz dość prędko uczymy w wieku dziecinnym, ludzkość dorabiać się musiała bardzo powoli. — Od chwili, gdy zaczęto liczyć całymi dziesiątkami, do czasu, w którym uczuwać się dała potrzeba krótszego wyrażenia liczb większych od liczby: dziesięć dziesiątków, grupowanie jedności w dziesiątki stało się już postępowaniem dobrze znanym, rozpowszechnionym, uważanym za dogodne. I widocznie przez analogią do tak dogodnego grupowania jedności w dziesiątki, wytworzono podobne postępowanie z owymi liczbami większymi, t. j. zaczęto skupiać dziesiątki po dziesięć w oddzielne części, osobliwie, gdy już dla oznaczenia dziesięciu dziesiątków utworzono nazwę osobną: *sto* lub *setka*.

I w takiż sam sposób, jak radzono sobie przy wypowiadaniu liczby większéj od dziesięciu, postępowano z daną liczbą większą od sta, t. j., przy wypowiadaniu jéj, naprzód były oddzielane całe sta, późniéj z pozostałéj części (mniejszéj od sta) całe dziesiątki, a nakoniec wypowiadano pozostałą część liczby, mniejszą od dziesięciu. Oddzielając w ten sposób całe setki, zaznaczano, że było

dwie ście [2]), trzy sta, cztéry sta, pięć set [3]) i t. d. dziewięć set,

a następnie, skutkiem częstego użycia, mówiono, jak teraz, łącząc te wyrazy [4]),

dwieście, *trzysta*, *cztérysta*, *pięćset*, *sześćset*, *siedemset*, *osiemset*, *dziewięćset*.

---

[1]) W Biblii kr. Zofii: dwadzieścia i ośm, XXX i sześć, do dwudziestu a do trzech, i podobnie: sto a dwadzieścia a siedm, sto dwadzieścia i trzy, sześć set a dziewięć dziesiąt, z tysiąca a z siedmi dziesiąd a z pięci, tysiąc tysiąców a sto tysiąców, a obok tego: jeno a trzydzieści, pięć a sto, dwa dzieścia a sto, sześć a trzydzieści a sto, CCC a dwa LXX, sześćdziesiąt trzysta, dwa tysiąca a dwa a LXXX a C, i jeszcze: siedm a trzydzieści ku stu, oraz: przes jenego trzydzieści, przes pięci pięćdziesiąt, cztyrdzieści bez jednego,

Przytoczyłem w tym ustępie tylko materyał, potrzebny dla objaśnienia powstania nazw dzisiejszych, według pracy źródłowéj Antoniego Kaliny prof. uniw. lwowskiego: *O liczebnikach w języku staropolskim* (*Rozprawy* wydz. filol. akad. um. w Krakowie, tom VI), w której czytelnik znaleść może wiele innych szczegółów ciekawych.

[2]) Jestto liczba podwójna (podobnie jak np. w przysłowiach: mądréj głowie dość dwie słowie; cztéry gęsi, dwie niewieście: gotowy jarmark w mieście). — W Biblii kr. Zofii: dwie ście, dwie secie (tamże: dwie lecie).

[3]) Mówimy: trzy*sta*, cztéry*sta*, ale: pięć*set*, sześć*set* i t. d. (por. str. 10, odsyłacz [7]).

[4]) I przedłużając przedostatnią zgłoskę tych wyrazów, ze złączenia powstałych.

6. Podobnie wyrażenie: dziesięć set zostało z czasem [1]) zastąpione przez nazwę krótszą: *tysiąc*. Ponieważ jednak tak tysiąc, jak i większe liczby są rzadziéj używane, więc wyrazów, użytych do wypowiedzenia liczb: dwa tysiące, trzy tysiące i t. d. w jeden nie łączymy.

Wyrażenia: *dziesięć tysięcy*[2]), *sto tysięcy* [3]), jako rzadko używane, nie zostały [4]) zastąpione nazwami osobnymi.

7. Długo mówiono: tysiąc tysięcy. Było to jednak równie niedogodnym, jakby np. dziesięćdziesiąt. Z czasem téż tysiąc tysięcy zostało zastąpione przez: *milijon* [5]).

Dziesięć milijonów, *sto milijonów* również nie mają nazw oddzielnych [6]).

Tysiąc milijonów, gdy jest mowa o pieniądzach, zastępuje się odniedawna przez *milijard*.

8. Liczby jeszcze większe bardzo rzadko wypada wypowiadać (por. § 3, us. 18).

Obecnie znajdują się u nas w użyciu dwa sposoby wypowiadania liczb bardzo wielkich. Jedni, idąc za przykładem Francuzów, tysiąc milijonów nazywają *bilijonem*, tysiąc bilijonów *trylijonem*, tysiąc trylijonów *kwatrylijonem* [7])

---

[1]) W różnych językach indo-europejskich nazwy liczb 2—9, 10, 100 są pokrewne sobie, gdy tymczasem nazwy liczb 1000, jako wielce w tych językach rozmaite, powstawać już zapewne musiały po rozdzieleniu się szczepów, w każdym z nich oddzielnie.

[2]) Starożytni Grecy dość często używali liczby 10,000, mając osobną dla niej nazwę (μύριοι,-αι,-α).

[3]) W życiu potocznym objawia się u nas dążność do krótszego wyrażania setek tysięcy. Tak np., zamiast mówić: cztérysta tysięcy, mówią niekiedy: cztérykroć, jako skrócenie wyrażenia cztérykroć sto tysięcy, i podobnie mówią np. cztérykroć sześćdziesiąt tysięcy, przez co nie należy rozumiéć: 4 razy 60,000.

[4]) W sanskrycie istnieją oddzielne nazwy dla 1, 10, 100, 1000, 10 000, 100 000, 1000 000. 10 000 000, 100 000 000, oraz dla liczb przedstawionych 1-ścią z 10-ma, 12-ma i t. d. (z parzystą liczbą zer), aż do 1 z 20-u zerami; nazwy zaś liczb przedstawionych przez 1 z 9-ma, 11-ma i t. d., aż do 1 z 21-m zerem tworzą się w poprzednich przez dodanie wyrazu: wielki.

[5]) Wyraz: milijon (prawdopodobnie wyraz włoski, zgrubiały od mille, jako: wielki, tysiąc, mający oznaczać początkowo we Włoszech 10 beczułek złota) w tym znaczeniu spotyka się po raz piérwszy w wydanéj we Włoszech arytmetyce P a c i o l i (r. 1494), bardzo rozpowszechnionej. — W arytmetykach polskich: tysiąc tysięcy, a nawet tysiąc tysięcy tysięcy i t. d.; spotyka się aż do końca trzeciej ćwierci XVIII stulecia. Wyrazu «milion» użył w prawdzie w swym *Algorytmie* K ł o s w r. 1538 (zob. wstęp historyczny), ale on się dopiero u nas w w. XVIII częściej pojawia.

[6]) Mówią często: jedności tysięcy, jedności miljonów, a dla dopełnienia: jedności proste (!) Ten sposób mówienia jest sprzeczny z istotnym pojęciem (jedynie istniejących) jedności w danéj liczbie. Zamiast więc mówić: w liczbie jest tyle jedności tysięcy, tyle jedności milijonów i przez to wprowadzać pojęcia nie odpowiadające naturze tych części liczby, należy wyrażać się wprost: w liczbie jest tyle tysięcy, tyle milijonów, podobnie jak się mówi: tyle dziesiątków tysięcy, tyle setek, tyle dziesiątków. Por. § 3, us. 20.

[7]) Wyrazy bilijon, trylijon i t. d. powstały w początku XVII stulecia, lecz rozpowszechniły się dopiero w XVIII.

i t. d., gdy drudzy, zgodnie z Niemcami, *bilijonem* nazywają milijon milijonów, milijon bilijonów *trylijonem*, milijon trylijonów *kwatrylijonem* i t. d. [1]).

9. W takito sposób uniknęliśmy potrzeby tworzenia osobnéj nazwy dla każdéj liczby (por. us. 1). Zapomocą niewielu wyrazów, mianowicie zapomocą wyrazów:

jeden, dwa, trzy, cztéry, pięć, sześć, siedem, osiem,
dziewięć, dziesięć, sto, tysiąc, milijon, ...,

przez odpowiednie ich łączenie jesteśmy w stanie wypowiedzieć rozmaite liczby.

Na tym właśnie polega nasze liczenie słowne.

10. Ponieważ, jak widzieliśmy, ten sposób liczenia rozwinął się z tego, że każde dziesięć jedności skupiamy w oddzielny dziesiątek i to postępowanie daléj ściśle stosujemy, skupiając dziesięć dziesiątków w setkę i t. d., więc nazywamy go sposobem, albo systematem dziesiątkowym liczenia.

11. Podobnie, jak systemat dziesiątkowy powstał z ilości palców obu rąk, taksamo z ilości palców jednéj ręki, lub z ilości wszystkich palców człowieka (por. us. 2, 3) mogły powstać systematy: piątkowy i dwudziestkowy.

Systemat piątkowy, dokładnie wykształcony, t. j. taki, w którymby (przynajmniéj) liczba 5 razy 5, t. j. 25, miała osobną nazwę (a tymwięcéj liczby: 5 razy 25, t. j. 125, i t. d.), nigdzie nie powstał. Przeszkodziła temu ta okoliczność, że już dla liczby 2 razy 5, t. j. dla 10, zjawiała się nazwa osobna, prosta [2]), tak, iż w liczeniu dalszym liczba 10 (albo niekiedy 20) bierze przewagę.

Systemat więc piątkowy występuje tylko częściowo przy wyrażaniu liczb 6, 7, 8, 9, jako téż w liczebnikach złożonych oznaczających 15 — 19, 25, 26 i t. d., u niektórych ludów, tak używających systematu dziesiątkowego jak i dwudziestkowego.

Systemat dwudziestkowy, należycie wyrobiony posiadają: Azteki (w Meksyku), którzy mają oddzielne wyrazy dla liczb 20 („policzone czyli rachunek") 20.20, t. j. 400 („włosy"), 20.20.20, t. j. 8000 („worek"), i plemię indyjskie

---

[1]) Ten ostatni sposób liczenia był wprowadzony do szkół naszych przez wydaną i do użytku zaleconą (r. 1778) przez Komisyą Edukacyjną *Arytm. dla sz. nar.* Mimo to, pod wpływem tak studyów, odbywanych we Francyi, jak i książek późniejszych, stosowanie się do sposobu francuskiego jest dziś u nas więcéj rozpowszechnione.

Moim zdaniem jest rzeczą małéj wagi wybór stanowczy między tymi dwoma sposobami pojmowania wyrazów bilijon i t. d. W nauce szkolnéj dopiéro przy powtarzaniu kursu arytmetyki właściwą jest o tym wzmianka, a wtedy można przytoczyć oba sposoby pojmowania. W klasach zaś niższych nie należy przygnębiać wyobraźni uczącego się rozważaniem tak wielkich liczb.

[2]) Por. str. 9, odsyłacz [1]).

Maya (w Yukatanie), mające osobne wyrazy dla liczb 20, 400, 8000, 160,000. — Walijczycy, szczep celtycki, mówią: 20 do 10 (t. j. 30), dwa 20 (t. j. 40), 10 i dwa 20 (t. j. 50) i t. d. do 90 włącznie. W podobny sposób mówią w niższéj Bretanii, zamieszkałéj także przez szczep celtycki. Wszystkie takie sposoby wyrażania liczb znajdują się również w mowie Basków. Francuskie: soixante-dix, soixante-onze i t. d., quatre-vingts, quatre-vingt-dix i t. d. quatre-vingt-dix-neuf [1]) uważa się powszechnie jako ślad wpływu celtyckiego sposobu liczenia. W mowie Rezyjan, plemienia słowiańskiego, zamieszkałego w północnych Włoszech (w prowincyi Udine): trikradwujsti (trzykroć 20), trikradwujsti nu desat (70), sztirkradwujsti (80), sztirkradwujsti nu desat (90), nu petnijst (95) [2]). Albańczycy (półwysep Bałkański) mówią (tylko): δυ-ξέτ (dwa 20). Duńczycy: tresindstyve (trzykroć 20), firesindstyve (80), a nadto: półtrzeciakroć dwadzieścia (halvtredsinstyve, 50), półczwartakroć dwadzieścia (70) i półpiętakroć dwadzieścia (90). Liczba 100 posiada jednak zawsze nazwę niezłożoną. — Podobne uwzględnienie w liczeniu liczby 20 ma miejsce u wielu plemion indyjskich w Ameryce, u niektórych murzyńskich w Afryce, a także u ludów Kaukazu, oraz plemion, zamieszkujących niektóre wyspy Australii.

12. W układach miar, które różne ludy wytworzyły, przeważną rolę gra liczba 12 i jéj dzielniki [3]). Ta sama przyczyna, któréj następstwem są takie podziały miar, wpływać musiała także na liczenie [4]).

Tak np. w niższéj Bretanii mówią: tri-ouec'h (wym. triuekh), trzy sześć (18, gdy Walijczycy tę liczbę wyrażają: deu-naw, dwa dziewięć), i podobnie triouec'h ugent (18.20).

Buramani, inaczéj Bolanami nazywani (na zachodnich brzegach Afryki, między Sierra Leone i Senegambiją), mówią podobnie: sześć dwa (razy), sześć cztéry (razy), gdy chcą wyrazić liczby 12 i 24, oraz: sześć i jeden (7).

Fryzowie dawni mówili: dwanaściedziesiąt (tolftich, 120). — Podobny system mieszany dziesiątkowo-dwunastkowy posiadali częściowo Skandynawi i Anglosasi.

Na téjże drodze prawdopodobnie powstał systemat sześćdziesiątkowy w rachunkach astronomicznych Babilończyków, który dotąd przetrwał w podziałach okręgu koła i w podziałach godziny.

---

[1]) A także niekiedy: six-vingts (120), quinze-vingts (300), rzadziéj: sept-vingts (140), huit-vingts (160). — W niektórych jednak okolicach Francuzi mówią: septante (70), octante (80) i nonante (90).

[2]) Por. Jana Baudouina de Courtenay, prof. uniw. w Dorpacie: *O Słowianach we Włoszech (Ognisko*, 1882).

[3]) Podziały dziesiętne miar (np. nasze pręciki i ławki) wytworzyły się pod wpływem rachunków piśmiennych.

[4]) Stąd: tuzin, kopa...

Jedno z plemion murzyńskich w gurach Kameruńskich używa liczebników: $40 = 30+10$, $50 = 30+20$, $60 = 2\times30$, $70 = 2\times30+10$ i t. d. [1]).

— Nowo-Zelandczycy posiadają zupełnie wykształcony systemat jedenastkowy: mają osobne nazwy dla liczb: 11, 121, 1331, mówią: 11 z 1-ym, 11 z 2-ma i t. d., 2 razy 11, 3 razy 11 i t. d. [2])

---

§ 3. LICZENIE PIŚMIENNE.

1. Gdy stosunki ludzkie tak się rozwinęły, że należało zostawiać ślad tego, co się mówiło, lub też przesyłać myśl swoję osobom oddalonym, czyli, gdy upowszechniało się to, co dziś przez pismo rozumiemy, wynikła potrzeba przedstawiania liczb, czyli odtworzenia liczenia słownego przez *liczenie piśmienne.*

2. To przedstawianie liczb służyło do utrwalenia tego, co już było rozpowszechnione w liczeniu słownym, a więc: w zgodzie z nim być musiało.

Najprościéj było obmyślić inny znak na oznaczenie jedności inny dla dziesięciu, jeszcze inny dla sta i t. d. Gdy więc chciano przedstawiać liczbę np. sześćdziesiąt siedem, to stawiano [3]): sześć jednakowych znaków, z których każdy oznaczał dziesięć, i siedem jednakowych znaków, z których każdy oznaczał jedność, tak, iż dla przedstawienia téj liczby sześćdziesiąt siedem potrzebowano trzynastu znaków. W podobny sposób liczbę np. dwadzieścia trzy przedstawiano pięciu znakami. Według téj za-

---

[1]) Zob. p. S Szolca Rogozińskiego: *Rysy charakterystyczne murzyńskiego narzecza „Bakwiri"* .... (*Rozprawy* wydz. filol. ak. um. w Krakowie, tom XIII. str. 151, r. 1889).

[2]) Fakty przytoczone w us. 2, 6, 7, 11, 15 czerpałem z prac następujących: Pott, *Die Sprachverschiedenheit in Europa an den Zahlwörtern nachgewiesen, sowie die quinäre und vigesimale Zählmethode* (1868) Hankel, *Zur Geschichte der Mathematik* (1874) i Cantor, *Vorlesungen über Gesch. der Math.* (I, 1880). Ostatni dwaj autorowie często się na przytoczonéj pracy Pott'a, jak również na poprzednim jego dziele: *Di qu. u. vig. Zählmethode bei Völkern aller Welttheile* (1847) (tego dostać nie mogłem).

[3]) Przy piśmiennym przedstawieniu liczby właściwymi znakami, zawsze, zgodnie z przyjętym kierunkiem pisania, części większe liczby stają przed mniejszymi. Jedyny wyjątek od téj zasady powszechnéj znaleziono w rękopisach syryjskich z VI i VII wieku po Chrystusie przedstawianiu liczby 3 przez znak liczby 1 i (skrócony) znak liczby 2, t. j. znak liczby 2 stoi po znaku liczby 1, co się także powtarza przy pisaniu liczb 8, 13 i t. d. w ich częściach, przedstawiających tę liczbę 3.

(Przytaczane w tym § fakty czerpię z wzmiankowanych dzieł Hankel'a i Cantor'a, jak również z pracy tego ostatniego: *Mathematische Beiträge zum Kulturleben der Völker*, 1863).

sady przedstawiając liczbę dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć, potrzebaby dwudziestu siedmiu znaków [1]).

3. U Rzymian, skutkiem tego, że oni posiadali jeszcze osobne znaki, przedstawiające liczby: pięć, pięćdziesiąt, pięćset, pisanie liczb było znacznie krótsze, chociaż opiérało się na téj saméj zasadzie [2]). Używali oni znaków następujących:

I	V	X	L	C	D	M
1	5	10	50	100	500	1000

---

[1]) To się ściśle stosuje do przedstawiania liczb w piśmie hieroglificznym Egipcyjan, w którym używano znaków



1 10 100 1000 10000 100000 1000000 10000000

rozmaicie obecnie objaśnianych przez uczonych (tak np. w znaku liczby 1000 jedni widzą kwiat lotusu, inni kaganek i t. d.

Ta sama zasada stawiania znaków, odpowiadających częściom liczby, obok siebie w jednym, dwu lub trzech wiérszach jest przeprowadzona w piśmie klinowym Babilończyków (czyta się je od lewej ku prawéj)



ale tylko do liczby 100. Po stu bowiém, liczba mniejsza, stojąca z lewéj strony większéj, wskazuje, ile razy tę większą należy sobie wystawić powtórzoną. W ten sposób powstały znak liczby 1000 dopuszcza znów przed sobą znak liczby mniejszéj, mnożącéj tamtę, jak to widzimy na rysunku na liczbach 10 000 (nie należy więc go uważać za 20. 100), 30 000, 100 000. Z większych liczb pewnym jest, iż Babilończycy pisali liczby 36 000 i 120 000 tak: 30.1000 i 6.1000, 100.1000 i 20.1000. — Fenicyjanie (o ile wszystkie znane zabytki wykazują) mieli podobny sposób pisania liczb.

[2]) Podobnie Grecy początkowo (od VI wieku przed Chr., w ciągu trzech stuleci przeważnie) przedstawiali liczby. Jednością był znak I (kréska), liczbę 5 przedstawiali literą Π, częściéj w kształcie Γ (piérwszą literą wyrazu πέντε), 10 literą Δ (piérwszą wyrazu δέκα), sto literą H (litera ta była początkowo znakiem przydechu, który jest wyraźny na początku wyrazu ἑκατόν), 1000 literą X (χίλια), 10 000 literą M (μυρια), nadto dla liczb 50, 500, 5000, 50 000 mieli znaki powstałe z połączenia znaku liczby 5 z odpowiednimi znakami liczb 10, 100, 1000, 10 000 w taki sposób, jak np. ⌈Ⓜ (500).

Znaki Rzymian V, X, L, oraz znaki w najdawniejszych czasach przez nich używane dla liczb 100 i 1000, powstały z odpowiednich znaków dla liczb u Etrusków, które znów

Więc np. liczbę: sześćdziesiąt siedem przedstawiali zapomocą takich znaków: pięćdziesiąt, dziesięć, pięć, jeden, jeden (pisząc zawsze większe części przed mniejszymi): LXVII, a zatym pięciu znakami, a nie trzynastu, jak powyżéj (us. 2). Liczbę jednak dwadzieścia trzy przedstawiali XXIII, a więc także (us. 2) za pomocą pięciu znaków.

4. Wcześnie jednak powstało na Wschodzie przedstawianie liczb, oparte na tym, że każda liczba: jeden, dwa,...., dziewięć, dziesięć, dwadzieścia,...., dziewięćdziesiąt, sto, dwieście,...., dziewięćset; tysiąc, dwa tysiące i t. d. otrzymała osobny znak [1]), lub literę alfabetu, do których dodawano odpowiednie znaczki [2]), wskazujące, że te litery są przedsta-

---

wytworzyły się według wszelkiego prawdopodobieństwa z odpowiednich liter, istniejących w alfabecie etruskim (jak się jednak u Etrusków pisały odpowiednie liczebniki, a tym samym: czy te znaki liczebne są w związku z piérwszymi literami wyrazów odpowiednich — dotąd nie zdołano dociec). — Z czasem znaki C i M (początkowe litery wyrazów: centum, mille) wyrugowały poprzednio dla tych liczb używane znaki, oraz powstał znak D (może przez społowienie owego znaku dawniejszego dla tysiąca: koła wydłużonego w kierunku poziomym, z pionową średnicą), a także powstał używany niekiedy znak Q (jako VI i prawdopodobnie z VI powstały). — Przy przedstawianiu większych liczb w różnych czasach postępowano rozmaicie. Najogólniéj dodanie poziomej kreski nad znakiem powiększa jego wartość 1000 razy. Tak np. $\overline{XX} = 20\,000$, $\overline{C} = 100\,000$, $\overline{M} = 1\,000\,000$.

[1]) Jak w piśmie hieratycznym Egipcyjan.

[2]) Żydzi używali w ten sposób 22 liter swego alfabetu, które im wystarczyły na oznaczenie tych liczb, aż do 400; dla liczb zaś 500, . . . , 900, które początkowo przedstawiali: 400, 100 i t. d., później używali odmiennych kształtów pięciu z użytych już liter, kształtów, które one przyjmowały, stając na końcu wyrazów. Dla oznaczenia, że te litery oznaczają liczby, dodawali, zwykle po ostatniéj, dwa haczyki. Mogli w ten sposób przedstawiać liczby do 999. Aby zaś oznaczyć 1000, 2000, . . . , 10 000, 20 000 i t. d., używali znów liter tych samych i w tym samym porządku, stawiając nad nimi dwie kropki, których nie stawiano wrazie, jeżeli mniejszą część oznaczająca litera, stojąc przed odpowiadającą większéj, już tym samym wskazywała, że ona oznacza tysiące. Liczbę 15 pisali 9, 6 tylko dlatego, że litery, oznaczające 10, 5 były początkowymi wyrazu Jehowa, — czego starannie unikali.

Wzmiankowane powyżej początkowe oznaczanie liczb przez Greków ustąpiło z czasem sposobowi ich pisania, opartemu na podobnéj, jak u Żydów, zasadzie (powstało ono w wieku V przed Chr.). 24 litery alfabetu jońskiego (którego około r. 400 zaczęto używać w Atenach), oraz trzy litery dawniéj używane (a nie, jak chcą niektórzy, wprost fenickie), t. z. episemy, dostarczyły znaków dla pisania liczb od 1 do 999, a dla odróżnienia stawiano nad tymi literami kreskę poziomą. Tysiące oznaczano tymi samymi literami, co liczby od 1 do 9, dodając z lewéj strony u dołu kreskę, w rodzaju przecinka. Dziesiątki tysięcy i części większe oznaczano znów tymi samymi literami, dopisując po nich albo przed nimi, albotéż nad nimi Mo lub M. W pierwszym razie zastępowano często znak M. przez samę kropkę (co dało powód do błędnego mniemania, jakoby kropka miała znaczenie pozycyjne). — Tak np. $\overline{\omega\lambda\alpha} = 381$, ale $\omega.\lambda\alpha = 800\,031$. — Niezależnie od tego używano (powstałego spółcześnie z tylko co opisanym) przedstawiania 24 piérwszych liczb przez 24 litery alfabetu jońskiego. (W ten właśnie sposób policzbowano późniéj w Aleksandryi pieśni Homera.)

Arabowie pierwotnie oznaczali podobnie oddzielnymi literami liczby do 400, a 500 i t. d. pisali tak, jak początkowo Żydzi, t. j. 400, 100 i t. d. W tym przedstawianiu liczb panował jednak nieporządek: litera, która w Bagdadzie oznaczała 90, na północy Afryki przedstawiała 60 i t. d.

Starosłowiańskie pisanie liczb powstało bezpośrednio z greckiego.

wieniem nie dźwieku, ale pewnéj liczby. — W tym sposobie pisania liczb dla przedstawiania liczb mniejszych od sta potrzeba było 18-u znaków różnych, dla przedstawiania liczb mniejszych od tysiąca potrzeba było 27-u znaków różnych.

Ale liczby do dziesięciu były przedstawiane tylko jednym znakiem, liczby od dziesięciu do sta wyrażano dwoma znakami lub nawet jednym (np. trzydzieści), liczby od sta do tysiąca wyrażano albo trzema znakami (np. trzysta piętnaście), albo dwoma (np. trzysta dwadzieścia, trzysta pięć), albo nawet jednym znakiem (np. trzysta), i t. d.

5. Wszystkie takie sposoby przedstawiania liczb, jako zaznaczające oddzielnie części liczby, będące skupieniem dziesięciu jedności, i t. d., a więc, jako ściśle (choć niejednakowo) odtwarzające liczenie słowne dziesiątkowe, są *systematami dziesiątkowymi pisania liczb*, t. j. podstawą ich jest dziesięć.

Z nich jednak systemat rzymski pisania liczb, jako wprowadzający osobliwe znaki dla przedstawienia liczb pięć, pięćdziesiąt, pięćset, jest systematem mieszanym, dziesiątkowo-piątkowym, w którym jednak przeważa znacznie podstawa dziesięć (bo niema znaku na liczby: pięć razy pięć, pięć razy dwadzieścia pięć i t. d.)

6. W tych wszystkich systematach wartość znaku, przedstawiającego jakąś część liczby, nie zależy od miejsca, na którym ten znak się znajduje.

Tak np. według sposobu rzymskiego pisania liczb, w liczbach:

sześćdziesiąt siedem	LXVII
osiemdziesiąt osiem	LXXXVIII
sto sześćdziesiąt	CLX
dwa tysiące pięćdziesiąt	MML

znak L zawsze oznacza pięćdziesiąt, niezależnie od tego, na którym miejscu się znajduje.

Aby jednak uprościć pisanie takich liczb, jak IIII, VIIII, XIIII,..., XXXX, XXXIIII,..., LXXXX i t. d., Rzymianie używali skrócenia, opartego na takiéj umowie: jeżeli znak I postawimy przed znakiem V lub X, to rozumieć należy liczbę pięć, lub dziesięć o jedność zmniejszoną, czyli: IV — cztéry, IX — dziewięć; podobnie, gdy postawimy X przed L lub C, oznaczamy tym, że pięćdziesiąt, lub sto o dziesięć są zmniejszone: XL — czterdzieści, XC — dziewięćdziesiąt; również, gdy C stanie przed D lub M, to zmniejsza się wartość tych znaków o sto: CD — czterysta, CM — dziewięćset [1]).

---

[1]) Bardzo rzadko, spotyka się jednak IIX, jako osiem. Etruskowie większy użytek robili z takiéj samej zasady: stawiali dwa, a nawet trzy znaki zmniejszające przed pewnym znakiem. — Należy zauważyć, że chociaż w sanskrycie, w językach greckim, łacińskim (jak

Tak np. cztérdzieści dziewięć Rzymianie pisali: albo XXXXVIIII, albo krócéj XLIX, dziewięćset cztérnaście: albo DCCCCXIIII, albo krócéj CMXIV.

Gdy więc napiszemy liczby

XI i IX,

to widzimy, że I po X powiększa, a I przed X zmniejsza dziesięć o jedność. Podobnie, gdy napiszemy

DC i CD,

to C po D powiększa, a C przed D zmniejsza pięćset o sto.

Skrócenie to sprawiło, iż w rzymskim sposobie pisania liczb wartość napisanéj liczby zależała niekiedy od porządku, w jakim znaki użyte po sobie następowały. (Powtarzamy: odnosi się to tylko do znaku I względem znaków V i X, do znaku X względem znaków L i C i do znaku C względem znaków D i M.)

7. Znacznie późniéj, bo już w kilka wieków po Chrystusie, powstał u Indusów [1]) (w Azyi południowéj) ten sposób piśmiennego przedstawiania liczb, którego dziś powszechnie używamy [2]). Dlatego nazywamy go indyjskim [3]).

---

również np. w mowie wielu plemion indyjskich w Ameryce), w ten sposób wypowiada się wiele liczb, to jednak znalazło to swoje odtworzenie w liczeniu piśmiennym tylko u Etrusków i u Rzymian.

[1]) Z posiadanych dotąd różnorodnych wskazówek wypada, że:

a. Indusowie używali wielu rozmaitych sposobów przedstawiania liczb (tak np. jeszcze na początku wieku XIX, na wyspie Cejlon, choć lud używał cyfr takich, jakich powszechnie dziś używamy, to jednak miejscowi uczeni używali osobnych 9-u znaków dla 1—9, osobnych 9-u znaków dla dziesiątków od 10 do 90, oddzielnego znaku dla sta i oddzielnego dla tysiąca, pisząc np. siedemset w ten sposób, iż znak dla sta poprzedzali znakiem dla siedmiu).

b. Używane w Indyjach w wieku II po Chr. litery na oznaczanie liczb przeszły do Aleksandryi, a stąd w zastosowaniu do rachowania na abaku (por. we wstępie historycznym ustęp o Boeccyuszu), do Rzymu, a także do północno-zachodniéj Afryki, ulegając pewnym zmianom.

c. Wprowadzenie zera, a tymsamym ścisłéj zależności wielkości części liczby, przedstawionéj przez cyfrę, od miejsca, na którym się ona znajduje, mogło nastąpić po II stuleciu po Chr.

d. Do wprowadzenia przedstawiania pozycyjnego liczb mogły się przyczynić nazwy wielkich liczb, używane w księgach religijnych (por. str. 12, odsyłacz [4]).

e. Ostatecznie jako epokę wprowadzenia zera (sunja) uważać należy mniéj więcéj rok 400 po Chr.

f. Kształt dzisiejszych cyfr powstał z liter indyjskich używanych przez Arabów Zachodu, o których mowa pod b., ulegał różnym zmianom, a ustalił się z wynalezieniem druku.

[2]) Arabowie Zachodu nauczali go w swych szkołach od wieku VIII. — Od Arabów przedostał się on do świata chrześcijańskiego w wieku XII. — Ten sposób pisania liczb, dość powoli jednak, usuwał z powszechnego użycia liczby rzymskie.

[3]) Do tego, cośmy już powiedzieli o powstaniu tego sposobu pisania liczb, dodamy jeszcze, że Arabowie pisali w kierunku od prawej ku lewéj) w takim téż kierunku pisali liczby według pierwotnego swego (por. str. 17, odsyłacz [2]) sposobu, poczynając od większych części (por. str. 15, odsyłacz [3]). Pisząc zaś liczby według sposobu, którzy sami nazywają indyjskim, pisali je od lewéj ku prawéj, jak Indusowie: musieli więc go przyjąć już dobrze wyrobiony, kiedy go nie przyswoili sobie więcéj, nie zastosowali doń kierunku, w którym pisali dawniejsze swoje znaki liczebne.

Znaki używane w tym sposobie przedsiawiania liczb nazywamy cyframi [1]). Cyfra więc jestto każdy oddzielny znak, służący do przedstawienia liczby.

Wszystkich cyfr różnych jest tylko dziesięć.

Dziewięć spośród nich, zwane cyframi znaczącymi [2]), oddzielnie stojąc, przedstawiają piérwsze dziewięć liczb: 1 (jeden), 2 (dwa),..., (dziewięć).

8. Gdy mamy większą liczbę, np. pięćdziesiąt sześć, czyli 5 dziesiątków i 6 jedności, to, aby ją napisać, wypadłoby postawić cyfrę 5, rozumiejąc, że ona ma nam przedstawić dziesiątki zawarte w naszéj liczbie, a prócz tego cyfrę 6, jako przedstawienie pozostałych jedności. Gdy te dwie cyfry napiszemy obok siebie w takim porządku, w jakim one były w wyrażeniu

5 dziesiątków 6 jedności,

t. j. gdy napiszemy

56,

i gdy to zestawimy z przedstawieniem liczby pięć (jedności)

5,

to widzimy, że dla oznaczenia pięciu dziesiątków, możemy używać téj saméj cyfry 5, co dla oznaczenia pięciu jedności, byle ją postawić tak jak w liczbie

56,

t. j. na miejscu drugim, licząc miejsca [3]) od strony prawéj. — Podobnie trzydzieści siedem, albo osiemnaście, t. j. liczby, w których mamy

3 dziesiątki 7 jedności, 1 dziesiątek 8 jedności,

napiszemy:

37, 18.

9. Ale jak napisać liczbę np. trzydzieści, lub liczbę dziesięć? Liczba trzydzieści, t. j.

3 dziesiątki,

---

[1]) Zero nazywane było przez Arabów as-sifr (puste, próżne), jako tłómaczenie wyrazu sunja, oznaczającego zero u Indusów. Z tego wyrazu arabskiego pochodzi widocznie nazwa: cyfra. Tak np. w arytmetykach u nas wydanych wyraz zero spotyka się poraz piérwszy w arytmetyce łacińskiéj Höll'a (1760, Poznań, przedruk wydania klausenburskiego), gdy we wcześniejszych, a nawet w kilku późniejszych w znaczeniu zera używa się stale wyraz: cyfra. (Cyfry zaś znaczące nazywano: figurami, numerami, charakterami, albo nawet wprost liczbami).

O powstaniu kształtów cyfr mówiliśmy wyżej. Nie jest więc cyfra obrazem liczby. Dlatego téż chęć dopatrzenia w kształcie cyfry odpowiedniej ilości części linii łamanéj jest tylko... sztuczką łamaną.

[2]) «Chiffres significatifs».

[3]) Jak Arabowie.

podług tego, jak pisaliśmy liczby 56, 37, 18, powinna być wyrażona przez cyfrę 3 postawioną na drugim miejscu (licząc od strony prawéj). Gdy cyfra 3 ma się znaleść na miejscu drugim, to aby miejsce, przez nią zajęte, było drugie, trzeba, żeby pierwsze miejsce było przynajmniej zaznaczone, przez coś zajęte. — Ponieważ w naszéj liczbie trzydzieści, prócz 3 dziesiątków, niéma już jedności, to, aby 3 mogło zająć miejsce drugie, wypadnie nam na miejscu pierwszym postawić jakikolwiek umówiony znaczek, któryby nam wskazywał, że w naszéj liczbie niéma oddzielnych jedności, któreby można postawić na miejscu pierwszym. — Owóż, jako taki właśnie znaczek używa się:

0,

zero

tak, iż liczbę trzydzieści i podobnie liczbę dziesięć, czyli liczby, w których mamy:

3 dziesiątki żadnych jedności, 1 dziesiątek żadnych jedności,

napiszemy:

30, 10.

10. Stosując to postępowanie (us. 8, 9) przy pisaniu większych liczb, liczbę np. pięćset dwadzieścia sześć, czyli liczbę, w któréj mamy

5 setek 2 dziesiątki i 6 jedności

napiszemy:

526,

tak, iż cyfra 5, postawiona na miejscu trzecim (licząc od strony prawéj), przedstawia setki. Liczbę zaś: pięćset sześć, t. j. liczbę, w któréj mamy: 5 setek żadnych dziesiątków 6 jedności, napiszemy: 506, gdzie znowu postawiliśmy 0 na miejscu drugim dlatego, żeby to drugie miejsce zająć, zaznaczyć, aby tymsamym można było cyfrę 5, jako przedstawiającą setki, postawić na miejscu trzecim. Podobnie: pięćset wypadnie nam napisać: 500; sto zaś: 100, i t. d.

Taksamo sobie wytłomaczymy, dlaczego np, liczbę dwa tysiące trzysta dziewięć napiszemy: 2309; dwa tysiące: 2000; tysiąc: 1000, a tymsamym, dlaczego tysiące stają na miejscu czwartym.

Również liczbę: trzydzieści sześć tysięcy cztéry, czyli liczbę, w któréj mamy: 3 dziesiątki tysięcy 6 tysięcy żadnych setek żadnych dziesiątków 4 jedności, napiszemy: 36004, i dostrzeżemy, że dziesiątki tysięcy oznaczają się cyfrą, znajdującą się na miejscu piątym.

Podobnież setki tysięcy oznaczamy cyfrą na miejscu szóstym milijony cyfrą na miejscu siódmym, dziesiątki milijonów cyfrą na miejscu ósmym i t. d.

W ten sposób liczby mniejsze od 10 przedstawiają się jedną cyfrą;

liczby od 10 do 99 (zawsze) dwiema cyframi, liczby od 100 do 999 trzema cyframi i t. d.

11. Widzieliśmy tu, że w tym sposobie pisania liczb bardzo jest nam użyteczny znak 0 (zero), który stanowi dziesiątą cyfrę systematu indyjskiego.

Z tego zaś, w jaki sposób robimy z niego użytek, wypada, że

Zero jestto cyfra, służąca przy pisaniu liczby tylko dla zajęcia pewnego miejsca, aby inne cyfry (znaczące) można było postawić na takim z porządku miejscu, na którym one postawione być mają,

albo innemi słowy:

Zero wskazuje nam, że w liczbie niéma tych części liczby, które bywają oznaczane na miejscu, przez zero zajętym.

12. Zauważymy tu, że czy powiemy: trzysta pięć, co napiszemy 305, czytéż powiemy, że w téj liczbie nie mamy żadnych dziesiątków tysięcy, żadnych tysięcy, 3 setki, żadnych dziesiątków, 5 jedności, co napiszemy

00305,

— to zawsze wyjdzie na jedno. Tę samę również liczbę będziemy mieli, gdy napiszemy 0305, lub 0000305. Wogóle więc: *liczba się nie zmieni, jeżeli z lewéj strony, przed pierwszą cyfrą, dopiszemy ilekolwiek zer.* Dlatego téż zer na początku liczby, jako niepotrzebnych, nie piszemy, ale dopisać je możemy, ilekroć toby było pożyteczne.

13. Gdy zestawimy ze sobą np. liczby

3524
18046
495
524087

to widzimy, że w każdą z nich wchodzi cyfra 4, ale w pierwszéj oznacza 4 jedności, w drugiéj 4 dziesiątki, w trzeciéj 4 setki i t. d., t. j., że *wartość części liczby, przedstawionéj przez cyfrę, zależy od miejsca, na którym ta cyfra jest postawiona.*

Ta zależność wartości części liczby, przedstawionéj przez cyfrę, od miejsca czyli „pozycyi" — którejto zależności, jak widzieliśmy (us. 5, 6), niéma, wogóle mówiąc, w innych sposobach pisania liczb — sprawia, iż systemat dziesiątkowy indyjski pisania liczb nazywa się także pozycyjnym.

14. Zastanawiając się nad tym, jak możemy przedstawiać coraz większe liczby, łatwo dochodzimy do wniosku, że przy pomocy dziesięciu cyfr

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

jesteśmy w stanie, dzięki zeru, przedstawić wszystkie liczby, jakie tylko pomyśléć możemy, w sposób do pewnego stopnia podobny do tego, w jaki przy pomocy ograniczonéj ilości liter abecadła przedstawiamy całą rozmaitość wyrazów naszéj mowy — z tą wszakże różnicą, że nie każde zgrupowanie liter przedstawia wyraz istniejący w mowie, gdy tymczasem wszelkie zgrupowanie cyfr zawsze przedstawi liczbę.

15. Zauważymy jeszcze, że, przedstawiając jakąkolwiek liczbę, na pierwszym (licząc od strony prawéj) miejscu oznaczamy jedności, na drugim dziesiątki, t. j. części liczby 10 razy od jedności większe, na trzecim setki, t. j. części liczby 10 razy większe od dziesiątków, na czwartym tysiące, t. j. części liczby 10 razy większe od setek, na piątym dziesiątki tysięcy, t. j. części liczby 10 razy większe od tysięcy, i t. d. Więc np. w liczbie

682307

każda z oddzielnych części liczby, przedstawionych przez cyfrę np. 2, jest 10 razy większa od każdéj z części liczby, przedstawionych przez cyfrę 3; a 10 razy mniejsza od każdéj z części liczby, przedstawionych przez cyfrę 8; każda znów z części liczby, przedstawionych przez cyfrę np. 3, jest 10 razy większa od części liczby, oznaczanych na miejscu, zajętym przez zero, a 10 razy mniejsza i t. d.

16. Ze wszystkiego, cośmy mówili o powszechnie teraz używanym sposobie pisania liczb, wypada, że:

W systemacie dziesiątkowym, ogólnie teraz stosowanym przy pisaniu liczb, wyrobionym pierwotnie przez Indusów, posługujemy się tylko dziesięciu znakami, zwanymi cyframi; jedna z nich służy tylko do zaznaczania miejsca, niezajętego przez odpowiednią część liczby, każda zaś z pozostałych dziewięciu cyfr, może przedstawiać różne części liczby, zależnie od miejsca, na którym jest postawiona, w taki sposób, iż oddzielne części liczby, oznaczone przez cyfrę, stojącą na jakimkolwiek miejscu, są dziesięć razy większe od części liczby, wyrażonych przez cyfrę, stojącą obok tamtéj z prawéj strony [1]).

17. Czytanie i pisanie liczb. Z tego, cośmy już poprzednio (us. 8, 9, 10) mówili o pisaniu liczb, wprost wypada, że: *gdy napisana liczba ma niewięcéj niż cztéry cyfry, to, czytając ją, wymawiamy, zaczynając z le-*

[1]) Gdy wypada pisać liczby porządkowe, to zwykle stawia się końcówkę przy liczbie, np. ustęp 16-y (szesnasty) § 3-go (trzeciego). Ale także niekiedy zaznaczają, że pewna liczba jest porządkowa, przez postawienie po téj liczbie kropki. Tak np. na zaleceniu przez Komisyją Edukacyjną *Arytmetyki dla szkół narodowych* do użytku w ówczesnych zakładach naukowych znajdujemy: dnia 2 października roku 1778. — Przy imionach panujących liczby porządkowe piszą się zawsze znakami rzymskimi, których zwykle używa się także dla przedstawienia liczb porządkowych na tablicach pamiątkowych.

wéj strony, każdą cyfrę znaczącą oddzielnie i przy każdéj dodajemy zaraz nazwanie części liczby, jakie bywają oznaczane na miejscu, które ta cyfra zajmuje. Np. 2357 czytamy: dwa *tysiące* trzysta pięćdziesiąt siedem (dodajemy: *jedności* tylko wtedy, gdy idzie nam o szczególną dobitność); 307 czytamy: trzysta siedem.

Podobnież, *gdy mamy napisać liczbę niewiększą od 9999, to w myśli wystawiamy ją sobie rozłożoną na składowe części: tysiące, setki, dziesiątki, i pozostałe jedności i, zaczynając od największych części, piszemy cyfry oznaczające, ile jest oddzielnych takich części, a w braku części do oznaczenia już po cyfrze znaczącéj piszemy na odpowiednich miejscach zero,* jak to szczegółowo objaśnione było w ustępach 9-ym i 10-ym.

18. W taki sam sposób postępowalibyśmy z większymi liczbami gdyby w naszéj mowie były oddzielne nazwy na dziesięć tysięcy, sto tysięcy, dziesięć milijonów i t. d. Gdy jednak tych nazw nie posiadamy,a zamiast mówić np. trzysta tysięcy i pięćdziesiąt tysięcy i siedem tysięcy krócéj, a jednak równie dokładnie możemy powiedzieć: trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy, więc np. liczbę

357 307

przeczytamy: trzysta pięćdziesiąt siedem *tysięcy* trzysta siedem *(jedności)*. Podobnie liczbę

26 350 027

przeczytamy: dwadzieścia sześć *milijonów*, trzysta pięćdziesiąt *tysięcy*, dwadzieścia siedem *(jedności)*. W ostatnim przykładzie przeczytaliśmy 26, jakby liczbę oddzielną, a późniéj dodaliśmy: milijonów, t. j. nazwę części liczby, oznaczanych na miejscu, zajętym przez ostatnią cyfrę liczby 26, t. j. przez cyfrę 6; podobnież daléj wymówiliśmy 350, jakby liczbę oddzielną, a późniéj dodaliśmy: tysięcy, t. j. nazwę części liczby, oznaczanych na miejscu zajętym przez 0, t. j. przez ostatnią cyfrę téj liczby 350. A więc:

Przy czytaniu liczby większéj wystawiamy ją sobie podzieloną od strony prawéj, na grupy trzycyfrowe [1]*, a każdą taką grupę, poczynając od strony lewéj, czytamy oddzielnie, jakgdyby liczbę osobną, dodając tylko nazwę części liczby, oznaczanych na miejscu, zajętym przez ostatnią cyfrę téj grupy* [2]. Tak np., gdy mamy napisane 41560000724 dukatów, czyli 41 560 000 724 dukatów, to przeczytamy: 41 milijardów 560 milijonów 724 dukatów.

---

[1]) Ostatnia więc grupa (t. j. pierwsza od strony lewéj) może zawierać niekiedy dwie lub jednę cyfrę.

[2]) To prawidło obejmuje w sobie prawidło us. 17-go, jako przypadek szczególny.

Jeżeli rozumiemy (§ 2, us. 8) bilijon, trylijon i t. d. w ten sposób jak Francuzi, to *powyższe prawidło rozciąga się na jakkolwiek wielkie liczby*. Np. liczbę 5 514 102 345 678 901 przeczytamy: 5 kwatrylijonów 514 trylijonów 102 bilijony 345 milijonów 678 tysięcy 901 (jedności). Jeżeli zaś rozumieć te nazwy będziemy na sposób niemiecki, to na czytanie liczb większych od 999 999 999 prawidło tak się przedstawi: *trzeba wystawić sobie liczbę podzieloną od strony prawéj na grupy sześciocyfrowe i każdą grupę, poczynając od strony lewéj, czytać oddzielnie, jakgdyby liczbę osobną, dodając nazwę części liczby, oznaczanych na miejscu zajętym przez cyfrę ostatnią tej grupy*. Np. liczbę 5514 102345 678901 przeczytamy: 5514 bilijonów 102345 milijonów 678901 (jedności).

Gdy mamy przed oczyma liczbę złożoną z bardzo wielu cyfr, to, aby dać o niéj pojęcie, zwykle jako dostateczne uważamy zaznaczenie, z ilu cyfr ona się składa i jakie są jéj początkowe (t. j. od strony lewéj) cyfry. Np. gdy mamy przeczytać: Ziema waży w przybliżeniu 5 955 625 500 000 000 000 000 000 kilogramów, to powiemy: Ziemia waży w przybliżeniu taką liczbę kilogramów, która się wyraża 25-u cyframi, z początkowymi cyframi: 5, 9, 5, 5. Również, gdy, obliczając, ile będzie ziarn na wszystkich 64 polach szachownicy, wrazie, jeżeli położymy na pierwszym polu 1 ziarno, na drugim 2 ziarna, na trzecim 4 ziarna, na czwartym 8 ziarn i t. d. (wciąż podwajając ilość ziarn), znajdziemy, że na szachownicy będzie ziarn

18 446 744 073 709 551 615,

to, aby dać pojęcie o téj liczbie słowami, powiemy: ilość ziarn będzie przedstawiona liczbą dwudziestocyfrową, z początkowymi cyframi 1, 8, 4 — Samo się przez się rozumie, że ilość wypowiadanych początkowych cyfr zależy od tego, jak dalece chcemy (i niekiedy: jak dalece możemy) dać dokładne pojęcie o podobnie wielkiéj liczbie. Gdy zaś możemy i pragniemy przedstawić komuś tak wielką liczbę zupełnie ściśle, to daleko praktyczniéj nie wypowiadać jéj słuchającemu, ale mu ją napisać.

19. Gdy słyszymy wypowiadaną liczbę większą od 10 000, to *w przypadku, gdy w liczbie niéma milijonów, a są tysiące, zauważywszy naprzód, ile jest tych tysięcy, wypisujemy ilość tysięcy, jakgdyby osobną liczbę; jeżeli w danéj liczbie jest jeszcze część mniejsza od tysiąca, to (w razie potrzeby uzupełniwszy tę część z początku jednym lub dwoma zerami* (us. 12), *tak, aby się ona stała liczbą trzycyfrową) piszemy ją całą obok tysięcy ze strony prawéj; jeżeli zaś słyszymy wypowiedziane tylko tysiące, to napisawszy ilość tysięcy, jakby osobną liczbę, dopisujemy ze strony prawéj trzy zera*. Np., gdy nam dyktują: dwieście osiem tysięcy sześć, to powinniśmy sobie w myśli tak tę liczbę przedstawić: 208 *tysięcy* 006 (jedności i skutkiem tego napiszemy 208 006; gdy zaś nam mówią trzydzieści tysięcy, to, napisawszy 30, dopiszemy trzy zera i miéć będziemy 30 000.— *Podobnie postępujemy, gdy w danéj, do napisania liczbie są milijony*. Np.

trzydzieści sześć milijonów osiem tysięcy sześćdziesiąt pięć; przedstawiamy sobie tę liczbę jako: 36 *milijonów* 008 *tysięcy* 065 (jedności) i piszemy: 36 008 065. Taksamo: trzy milijony dziewięćdziesiąt pięć, t. j. 3 *milijony* żadnych (a więc: 000) *tysięcy* 095 (jedności), czyli 3 000 095. Również: 208 milijonów, ponieważ nic więcéj nie słyszymy, napiszemy: 208 000 000.

Gdy w dyktowanéj liczbie słyszymy bilijony, trylijony i t. d. [1]), to, umiejąc wprawdzie pisać różne (aż do dziewięciocyfrowych) liczby i zoryjentowawszy się, jak dyktujący rozumie znaczenie bilijona, trylijona i t. d. (§ 2, us. 8), łatwo, pisząc uważnie, możemy te liczby dobrze napisać, bacząc tylko na to, cośmy wyżéj (us. 18) mówili o czytaniu takich liczb.

20. Ta okoliczność, że, skutkiem braku oddzielnych nazw dla dziesięciu tysięcy, sta tysięcy, dziesięciu milijonów i t. d. (§ 2, us. 6, 7), zachodzi potrzeba, przy czytaniu liczb większych, wystawiania ich sobie, jako podzielonych na trzycyfrowe (a przy uwzględnianiu bilijonów i t. d., pojmowanych poniemiecku, na sześciocyfrowe) grupy, sprawiła to, iż wielu utrzymuje i naucza, że w liczbie są trzycyfrowe (lub sześciocyfrowe) k l a s y — więc: klasa jedności, klasa tysięcy, klasa milijonów i t. d.) — (lub: klasa jedności, klasa milijonów, klasa bilijonów i t. d.) — a następnie: jedności proste, jedności tysięcy, jedności milijonów (por. str. 12 odsyłacz [6]) i t. d. (lub jedności proste, jedności milijonów i t. d.), dziesiątki proste i t. d. [2]).

Taki podział nie leży w naturze liczby, a pozornie wynika, jakeśmy widzieli, z braku nazw oddzielnych na dziesiątki tysięcy i t. d. Jako dowód posłużyć nam może to, że Grecy, posiadając nazwę na dziesięć tysięcy (por. str. 12), wypowiadali większe liczby w ten sposób, iż odpowiednio do tego wypadłoby do liczb, według sposobu teraz używanego napisanych, wprowadzić podział na cztérocyfrowe klasy [3]). W sanskrycie zaś podobny podział byłby zgoła niemożliwy (por. str. 12 odsyłacz [4]).

21. Gdy mamy liczbę np. 3675 i mamy odpowiedzieć na pytanie; ile w niéj jest (wszystkich) set? to zauważymy, że w téj liczbie mamy

---

[1]) Takich liczb w niższych klasach szkół dyktować nie należy (por. str. 13 odsyłacz [1]).

[2]) Nawet często, ucząc pisania liczb, naprzód wykładają dogmatycznie cały ten nienaturalny aparat, wprowadzający nie istniejące pojęcia o rzekomych jednościach tysięcy i t. d., albo o «jednościach różnego r z ę d u», a następnie, przystępując do uczenia liczenia, wymagają od uczącego się, aby ten schemat miał on ciągle na myśli, choć uczeń pojąć nie może, skąd się to wzięło. Jestto pozostałością z dawnego mechanicznego wykonywania rachunków. Sprawia ona jednak, że, ściśle rzecz biorąc, liczenie piśmienne właściwie poprzedza liczenie słowne.

[3]) Archimedes, aby ująć w pewien systemat przedstawianie liczb większych od zwykle używanych, wprowadza o k t a d y, tak, iż pierwszą oktadę stanowić miały wszystkie liczby mniejsze od myriady myriad, 10000. 10000, czyli od 100 000 000, drugą oktadę wszystkie liczby, poczynając od myriady myriad, mniejsze od liczby, którą dziś przedstawiamy przez 1 z 16-ma zerami, i t. d., aż do myriady myriad oktad, t. j. aż do 1 z 800 000 000 zer; te zaś wszystkie liczby, mniejsze od tej 1 z 800 000 000 zer, tworzyły p e r y j o d pierwszy. Po tym następował peryjod drugi liczb i t. d.

3 tysiące, a tysiąc jestto dziesięć set, więc 3 tysiące jestto *trzy* razy *dziesięć* set, albo (§ 2, us. 4) *trzydzieści* set, a że nadto w liczbie jest *sześć*set, więc razem mamy: *trzydzieści sześć set*, t. j. tyle set, ile otrzymamy, przeczytawszy początkowe cyfry danéj liczby do cyfry, stojącéj na trzecim (odpowiadającym setkom) miejscu (włącznie), jakby przedstawiające liczbę oddzielną. — Podobnie znajdziemy, że, z uwagi, iż każde sto jestto dziesięć dziesiątków, 36 set jest 36 razy dziesięć dziesiątków, i taksamo, jak np. 5 razy dziesięć jest 50, zamiast: 36 razy dziesięć, możemy powiedzieć: 360, czyli 36 set jest to samo, co 360 dziesiątków. Gdy nadto w naszéj liczbie jest jeszcze 7 dziesiątków, to w danéj liczbie mamy (wszystkich) dziesiątków 367, t. j. tyle, ile wypadnie, gdy, zatrzymawszy się na cyfrze 7, stojącéj na drugim miejscu (odpowiadającym dziesiątkom), przeczytamy wszystkie od początku cyfry, jakby przedstawiające liczbę osobną. — Tak np. w liczbie

8 406 275

mamy: milionów 8, (wszystkich): setek tysięcy 84, dziesiątków tysięcy 840, tysięcy 8406, setek 84062, dziesiątków 840627, jedności 8 406 275.

ROZDZIAŁ II.

DODAWANIE I ODEJMOWANIE LICZB CAŁKOWITYCH.

§ 4. DODAWANIE.

OKREŚLENIE DODAWANIA.

1. Jeżeli mając dwie liczby, np. 5 i 3, chcemy je złączyć w jednę, t. j. chcemy znaleść liczbę, która byłaby skupieniem tylu jedności, ile jest ich razem w obu danych liczbach 5 i 3, to, aby dobrze zrozumieć, czym jest właściwie odszukiwanie owéj jednéj liczby, musimy się zastanowić nad tym, jak radziliśmy sobie z takim zadaniem w pacholęcym wieku, gdyśmy nie nabyli jeszcze wprawy w prędkie wypowiadanie liczby szukanéj. — Robiliśmy tak: liczbę 3 wystawiliśmy sobie przedstawioną czyto trzema ziarnami, czytéż trzema wyprostowanymi palcami; następnie z téj liczby 3 oddzieliliśmy naprzód (piérwszą) jedność i, wystawiając sobie, że ją dołączamy do liczby 5, powiedzieliśmy (głośno, lub w myśli): 5 i 1 jest 6; dołączając podobnie (drugą) jedność, powiedzieliśmy: 6 i 1 jest 7; nakoniec dołączając (trzecią, ostatnią) jedność, powiedzieliśmy: 7 i 1 jest 8. Do 5 więc doliczyliśmy po jednéj (wszystkie) jedności liczby 3. — Takie postępowanie, zapomocą którego, mając dwie liczby dane, do jednéj z nich doliczamy jedności drugiéj z tych liczb i odnajdujemy liczbę, która jest skupieniem tylu jedności, ile ich jest razem w obu danych liczbach, jest najprostszym w arytmetyce działaniem, zwanym dodawaniem (porównaj us. 5-y). Możemy więc powiedzieć, że:

Zapomocą dodawania doliczamy do jednéj z danych dwu liczb jedności liczby drugiéj. Przez to więc jedna z danych liczb powiększa się o tyle jedności, ile ich ma druga, czyli: powiększa się o drugą liczbę, tak, iż często, zamiast mówić np.: do 5 dodać 3, mówimy: 5 powiększyć o 3.

2. W przytoczonym przykładzie, uskuteczniając dodawanie, mówiliśmy: *pięć* i jeden, *sześć*; sześć i jeden, *siedem*; siedem i jeden, *osiem*, głośniéj wymawiając wyrazy: pięć, sześć, siedem, osiem, t. j. liczyliśmy (§ 1, us. 7). Liczenie to zaczęliśmy od 5 (jednéj z danych liczb), a przerwaliśmy je na 8, t. j. na liczbie w szeregu liczb naturalnych.

1, 2, 3, 4, **5**, 6, 7, **8**, 9, 10, 11 i t. d.

zajmującéj po 5 trzecie miejsce, t. j. takie z porządku miejsce, ile druga z danych liczb, t. j. liczba 3, ma jedności.

Dopóki nie wprawiliśmy się w prędsze wykonywanie, dopóty w taki sposób dodawaliśmy dane dwie liczby do siebie. Dopiero późniéj, kiedyśmy nabyli należytej wprawy, znaleźliśmy się w możności odrazu mówić: 5 i 3 jest 8, albo 6 i 7 jest 13. Że takie prędkie wykonywanie dodawania jest tylko skutkiem wprawy, o tym przekonywa nas najlepiéj ta okoliczność, że jeżeliby ktoś nam zaprzeczył, iż z dodania np. 4 i 5 wypada 9, to dla przekonania go o tym sposobem najprostszym, będziemy do 4 doliczać po jedności wszystkie jedności liczby 5. Zatym istotnie: *w dodawaniu idzie nam o liczenie, które się zaczyna od jednéj z danych dwu liczb, a przerywa na liczbie, zajmującéj po niéj w szeregu liczb naturalnych to z porządku miejsce, które wskazuje ilość jedność w drugiéj z liczb danych.*

Gdy zaś skutkiem nabytéj wprawy, mówimy odrazu 5 i 3 jest 8, 6 i 7 jest 13 i t. d. [1]), to dodawanie, będąc zawsze liczeniem, przedstawia się jako *liczenie skrócone, zapomocą którego w szeregu liczb naturalnych od jednéj z danych do dodawania liczb przechodzimy odraza do liczby, zajmującéj po niéj miejsce, wskazane przez ilość jedności drugiéj z danych liczb.*

3. Mając do 5-ciu dodać 3, doliczamy do 5-ciu wszystkie jedności liczby 3, tak, iż otrzymana liczba 8, prócz jedności liczby 5, zawiera jeszcze jedności liczby 3 — jest skupieniem tylu jedności, ile ich jest w obu danych do dodania liczbach, czyli składa się z jedności liczby 5 i jedności liczby 3. Dlatego liczby 5 i 3, t. j. liczby dane do dodania, nazywają się s k ł a d n i k a m i. Co się zaś tyczy liczby 8, t. j. liczby szukanéj, którą otrzymać mamy z dodania składników, to ona złacińska nazywa się s u m ą. A ponieważ suma jest skupieniem tylu jedności, ile ich jest w obu danych do dodania liczbach, więc: *suma jest większa od każdego ze składników.*

W dodaniu więc naszym, mając dwie liczby, 5 i 3, zwane składnikami, odnaleźliśmy liczbę 8, będącą skupieniem jedności obu składników, zwaną sumą. Zatym:

Dodawanie jestto działanie, zapomocą którego, mając dwie liczby, zwane składnikami, odnajdujemy liczbę, która jest skupieniem jedności obu składników, zwaną sumą. (Por. us. 5-ty.)

4. Dla oznaczenia, że dwie liczby mamy dodać do siebie, piszemy jednę obok drugiéj, stawiając między nimi znak +, który wymawiamy: więcéj, albo: i, albotéż (us. 1): p o w i ę k s z o n e o, np. 5 + 3 czytamy: 5 więcéj 3, albo: 5 i 3, albotéż: 5 powiększone o 3.

---

[1]) Jakotéż, gdy przy dodawaniu większych liczb używamy (us. 12, 14) krótszego sposobu postępowania.

Dla połączenia ze sobą dwu różnych postacią wyrażeń téj saméj liczby (albo często umyślnie dla wskazania, iż dwa, postacią różniące się wyrażenia, przedstawiają tę samę liczbę), używamy znaku =, który się czyta: równa się, a niekiedy: jest to samo, co, lub przez skrócenie: jest.

Możemy więc napisać np.

$$5 + 3 = 8,$$

co przeczytamy: 5 więcéj 3 równa się 8, albo: 5 i 3 jest 8.

Ponieważ zaś 5 + 3 przedstawia tę samę liczbę, co 8, suma liczb 5 i 3, więc także 5 + 3 nazywamy często sumą liczb 5 i 3, t. j. wyrażenie, powstałe przez połączenie składników znakiem +, nazywamy często ich sumą, czyli: *wskazane dodawanie składników nazywamy często sumą.*

5. Jeżeli kilka liczb danych, np. 5, 3, 6, 2 i 7, chcemy złączyć w jednę liczbę, t. j. chcemy znaleść liczbę, która byłaby skupieniem tylu jedności, ile ich jest razem w liczbach 5, 3, 6, 2 i 7, to trzeba naprzód do liczby 5 doliczyć jedności liczby 3, t. j. do 5-u *dodać* 3, i powiemy: 5 i 3 jest 8 (czyli piszemy 5 + 3 = 8); następnie do otrzymanéj liczby 8 doliczyć jedności liczby 6, t. j. do 8-u *dodać* 6, i powiemy: 8 i 6 jest 14 (czyli 8 + 6 = 14); późniéj podobnie do 14 *dodać* 2, więc: 14 i 2 jest 16 (czyli: 14 + 2 = 16), i znowu do 16 *dodać* 7, więc: 16 i 7 jest 23 (czyli 16 + 7 = 23).

Widzimy więc, że postępowanie to złożone jest z dodawań (po dwa składniki):

$$5 + 3 = 8;\ 8 + 6 = 14;\ 14 + 2 = 16;\ 16 + 7 = 23.$$

Jeżeli w dodawaniu ostatnim, t. j. w 16 + 7 = 23, zamiast liczby 16 napiszemy poprzednie jéj wyrażenie (gdyż 16 jest to samo, co 14 + 2), to mieć będziemy [1]).

$$14 + 2 + 7 = 23,$$

a jeżeli tu zamiast liczby 14 napiszemy poprzednie jéj wyrażenie 8 + 6, to

$$8 + 6 + 2 + 7 = 23,$$

a gdy nakoniec jeszcze teraz zamiast 8-u napiszemy 5 + 3, to

$$5 + 3 + 6 + 2 + 7 = 23.$$

Dwa zaś te różne postacią wyrażenia, jedno 5 + 3 + 6 + 2 + 7, drugie 23, jako połączone znakiem =, przedstawiają tę samę liczbę, są sobie równe, t. j. liczba 23 jest skupieniem jedności liczb danych: 5, 3, 6, 2 i 7, o co właśnie nam szło.

Postępowanie to, jak widzieliśmy, rozpada się na kilka dodawań po dwa składniki, czyli: jest dodawaniem złożonym. Dodawanie zło-

[1]) Pisząc kredą na tablicy, możemy, zmazawszy 16, zamiast téj liczby napisać 14 + 2 i t. d.

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie BIBLIOTEKA GŁÓWNA

żone zwykle wprost dodawaniem nazywamy. Wszystkie liczby dane nazywamy składnikami, a liczbę, która jest skupieniem jedności składników, sumą [1]). Powiemy więc ogólnie:

Dodawanie jestto działanie, zapomocą którego, mając dwie lub więcéj liczb danych, zwanych składnikami, odnajdujemy liczbę, zwaną sumą, która jest skupieniem jedności składników.

Zasadniczym więc jest dodawanie tylko dwu składników. Dodawanie większéj ilości składników sprowadza się do kilku dodawań po dwa składniki.

Dodawanie wielu składników jako złożone z dodawań po dwa składniki z szeregu liczb naturalnych, doprowadza (us. 2) do pewnej liczby (sumy) w szeregu liczb naturalnych; t. j. *suma liczb z szeregu liczb naturalnych jest także liczbą tego szeregu.*

Zadanie więc nasze mogliśmy tak wysłowić: wykonać dodawanie liczb 5, 3, 6, 2, 7. Te liczby były składnikami; sumą ich była liczba 23.

Zauważymy jeszcze, że *często wskazane dodawanie składników nazywamy sumą* (us. 4); tak. np. możemy mówić: suma $5+3+6+2+7$.

WŁASNOŚCI SUMY.

6. Przy pomocy znaków $+$ i $=$, zamiast: 3 jestto 1 i 1 i 1, możemy napisać:

$$3=1+1+1$$

i podobnież

$$5=1+1+1+1+1$$

$$8=1+1+1+1+1+1+1+1$$

w skutek tego, mając sumę $5+3$ możemy napisać:

$$5+3=1+1+1+1+1+3,$$

albo jeszcze zamiast 3 pisząc $1+1+1$,

$$5+3=1+1+1+1+1+1+1+1.$$

Gdybyśmy zaś mieli sumę $3+5$ to podobnie:

$$3+5=1+1+1+5$$

albo:

$$3+5=1+1+1+1+1+1+1+1,$$

obie więc te sumy: $5+3$ i $3+5$ mogą być przedstawione przez:

$$1+1+1+1+1+1+1+1=8$$

t. j. przedstawiają tę samę liczbę, innymi słowy $5+3$ jest toż samo co $3+5$, czyli:

Suma dwu składników nie zależy od ich porządku.

---

[1]) Zamiast więc mówić: jedność i każde skupienie jedności nazywamy liczbą całkowitą (§ 1, us. 5), możemy powiedzieć: jedność i wszelką sumę jedności nazywamy liczbą całkowitą.

7. Gdy mamy sumę np.

$$5 + 3 + 6 + 2 + 7$$

to tę sumę pięciu składników możemy uważać jako skupienie (us. 5) 5-iu jedności piérwszego składnika, 3-ch drugiego, 6-iu trzeciego, 2-u czwartego 7-u piątego. Ponieważ skupienie 3-ch jedności i 6-u jedności jest toż samo co skupienie 6-u jedności i 3-ch jedności (us. 6), przeto skupienie 5-u jedności, 6-u jedności, 3-ch, 2-u i 7-u jedności czyli suma:

$$5 + 6 + 3 + 2 + 7$$

przedstawia tę samę liczbę co poprzednia suma.

Dwa więc te różne postacią wyrażenia, przedstawiające tę samę liczbę, można połączyć (us. 4) znakiem $=$ tak, iż

$$5 + 3 + 6 + 2 + 7 = 5 + 6 + 3 + 2 + 7.$$

Podobnie rozumując, moglibyśmy w sumie $5 + 6 + 3 + 2 + 7$ przestawić między sobą np. składniki sumy $5 + 6$, a wyrażenie $6 + 5 + 3 + 2 + 7$ przedstawiłoby tę samę liczbę, co poprzednie wyrażenia, tak iż

$$5 + 3 + 6 + 2 + 7 = 6 + 5 + 3 + 2 + 7$$

I podobnie, w sumie $6 + 5 + 3 + 2 + 7$ przestawiając między sobą składniki sumy $3 + 2$, otrzymamy odmienne od poprzednich wyrażenie téj samej liczby, mianowicie $6 + 5 + 2 + 3 + 7$, tak iż

$$5 + 3 + 6 + 2 + 7 = 6 + 5 + 2 + 3 + 7.$$

i t. d. Porównywając z sobą te i inne wyrażenia, które w ten sposób otrzymywać możemy przez kolejne przestawianie dwu obok siebie stojących składników, i przypatrując się rozmaitemu porządkowi, w jakim te same składniki w różnych wyrażeniach sumy po sobie następują, widzimy, że możemy składniki sumy dowolnie przestawić, czyli, że w ogóle:

Suma nie zależy od porządku składników.

8. Z téj własności wypada, że

Aby do sumy dodać pewną liczbę, można tę liczbę dodać do którego-kolwiek składnika tej sumy. Np., aby do sumy $5 + 3 + 2 + 6 + 9 = 25$ dodać 4, można np. do składnika 3 dodać 4, bo, gdy $5 + 3 + 2 + 6 + 9 + 4 = 25 + 4$, to z uwagi, że suma nie zależy od porządku składników, zamiast $5 + 3 + 2 + 6 + 9 + 4$ możemy napisać $5 + 3 + 4 + 2 + 6 + 9$, a w tym wyrażeniu sumy (us. 3) skupienie 3-ch jedności i 4-ch jedności zastąpić przez skupienie 7-u jedności, czyli uważać sumę $3 + 4$ za jednę liczbę, co zaznaczymy, pisząc:

$$5 + \overline{3 + 4} + 2 + 6 + 9 = 5 + 7 + 2 + 6 + 9 = 25 + 4.$$

gdzie kreska pozioma wskazuje, iż do 5 mamy wprost dodać sumę wypadłą z dodania $3 + 4$, (zob. Uwaga).

I nawzajem: *jeżeli do któregokolwiek składnika sumy dodajemy pewną liczbę, to tymsamym do téj sumy dodajemy tęż samę liczbę,* bo jeżeli $5 + 3 + 2 + 6 + 7 = 23$, to

$$5+3+4+2+6+7=5+3+4+2+6+7=5+3+2+6+7+4=$$
$$=\overline{5+3+2+6+7}+4=23+4.$$

Jeżeli zamiast mówić: dodać, powiemy: powiększyć o (us. 1), to powyższe własności możemy tak wypowiedzieć: *aby sumę powiększyć o pewną liczbę, można którykolwiek z jéj składników powiększyć o tę liczbę*, i: *jeżeli którykolwiek składnik sumy powiększymy o pewną liczbę, to w skutek tego suma powiększy się o tę liczbę.*

To rozumowanie opiera się na tym, że suma jest skupieniem jedności składników (us. 5). Jeżeli więc sumę kilku liczb chcemy powiększyć o jakąś liczbę, czyli o jedności, których zebraniem jest ta liczba, to można to sprawić, doliczając te jedności do któregokolwiek składnika, czyli powiększając go o tę samę liczbę (us. 1), o którą chcemy powiększyć sumę. I nawzajem, jeżeli którykolwiek składnik powiększymy o jakąś liczbę, t. j. doliczymy jéj jedności do tego składnika, to w sumie będzie o tyleż jedności więcéj, czyli suma powiększy się o tę samę liczbę.

Uwaga. Zamiast zakréślać wyrażenie złożone (wchodzące w skład wyrażenia jeszcze więcéj złożonego), które chcemy uważać jako jednę liczbę, wobec tego, że takie zakreślenie jest często niedogodne, albo niewyraźne, rozpowszechniło się używanie w tym celu n a w i a s u, t. j. ujmuje się w nawias to, co chcemy razem uważać jako liczbę jednę. Zamiast więc pisać np.

$$5+\overline{3+4}+2+6+7=23+4$$

możemy napisać

$$5+(3+4)+2+6+7=23+4.$$

Przez takie zatym zamknięcie sumy 3 + 4 w nawiasie zaznaczamy dobitnie, że uważamy 4 nie za liczbę, która ma być dodana do sumy 5+3, ale za liczbę, która ma być dodana wprost do składnika 3, a stąd dopiéro powstała suma 3+4=7 ma być następnie dodana do składnika 5.

9. Gdy więc mamy np. do sumy liczb 5 i 3 dodać liczbę 6, to możemy tę liczbę 6 dodać albo wprost do sumy 5+3, albotéż do jednego z jéj składników, a do liczby stąd otrzymanéj dodać drugi składnik. Te sposoby otrzymywania liczby, przedstawionéj przez sumę 5+3+6, możemy, przy pomocy nawiasów, tak uwydatnić:

$$(5+3)+6;\quad 5+(3+6);\quad (5+6)+3.$$

Ilość tych sposobów przedstawiania i otrzymywania sumy 5+3+6 znacznie się powiększy, gdy przestawiać będziemy między sobą składniki, mianowicie;

$$(5+3)+6;\ (3+5)+6;\ 6+(5+3);\ 6+(3+5);$$
$$5+(3+6);\ 5+(6+3);\ (3+6)+5;\ (6+3)+5;$$
$$(5+6)+3;\ (6+5)+3;\ 3+(5+6);\ 3+(6+5).$$

Gdybyśmy do tego mieli jeszcze dodać liczbę np. 2, to z jednego wyrażenia, np. z wyrażenia $5+(3+6)$ wypadłoby nam wprost (bez przestawiania składników między sobą):

$5+(3+6)+2; 5+(3+\overline{6+2}); 5+\overline{(3+6}+2); 5+\overline{(3+2}+6); (5+2)+(3+6),$

a w każdym z tych wyrażeń przestawiając jeszcze składniki, mielibyśmy:

$5+(3+6)+2;\ 5+(6+3)+2;\ (3+6)+5+2;\ (6+3)+5+2;\ (3+6)+2+5;$

i t. d., i t. d.

Z tego widzimy, że *dodawanie trzech lub więcéj składników może być uskutecznione przy domocy dodawań częściowych którychkolwiek składników, wziętych w jakimkolwiek porządku.*

Uwaga. Mieliśmy tu np. $5+(3+\overline{6+2})$, to znaczy, że liczbę, którą otrzymamy, gdy do 3 dodamy sumę $6+2$, co więc powinniśmy tak oznaczyć $3+(6+2)$, że tedy tę liczbę $3+(6+2)$ mamy dodać do liczby 5; możnaby więc wyraźniéj zamiast $5+(3+\overline{6+2})$ napisać $5+(3+(6+2))$. Tu jednak dwa podobne nawiasy czynią przestawienie takie niezręcznym. Dlatego, zamiast nawiasu ( ), mającego objąć $3+(6+2)$, użyjemy, dla wyraźniejszego przedstawienia, innego nawiasu, np. [ ], i rzeczywiście, gdy napiszemy

$$5+[3+(6+2)],$$

wtedy to, o co nam idzie, przedstawi się wyraźniéj.

Gdybyśmy tę sumę mieli dodać np. do liczby 7, to, aby rzecz wyraźnie przedstawić, najlepiéjby było wprowadzić jeszcze nawias np. { }; wtedy przedstawilibyśmy to tak:

$$7+\{5+[3+(6+2)]\}.$$

Jeżeli mamy np. wyrażenie

$$(3+2)+\{8+[5+(6+7)]+(9+1)\},$$

to ono oznacza, że do sumy, otrzymanéj z dodawania $3+2$, mamy dodać odrazu całą liczbę, otrzymaną z dodania do 8 naprzód sumy, wypadłéj z dodania do 5 liczby, powstałéj z wykonania dodawania $6+7$, a następnie sumy liczb 9 i 1.

Przy pomocy nawiasów moglibyśmy postępowanie uskutecznione w początku ustępu 5-go, t. j. dodawanie liczb 5, 3, 6, 2 i 7, tak przedstawić:

$$\{[(5+3)+6]+2\}+7=23.$$

Podobnie przedstawilibyśmy wyraźnie np. sposób powstawania liczby np. 6 w szeregu liczb naturalnych:

$$6=(\{[(1+1)+1]+1\}+1)+1.$$

ROZKŁAD LICZBY NA SKŁADNIKI.

10. Wyraziwszy jakąkolwiek liczbę, większą od jedności, jako sumę jedności (us. 6), np.

$$7=1+1+1+1+1+1+1,$$

możemy te jedności rozmaicie dodawać częściowo (us. 9). Miéć więc będziemy np.

$$7 = (1+1+1+1)+(1+1+1) = 4+3$$
$$(1+1)+(1+1+1+1+1) = 2+5$$
$$(1+1+1+1)+1+(1+1) = 4+1+2$$

i t. d.

Widzimy więc, że liczbę 7 możemy przedstawić jako sumę składników: 4 i 3; lub: 2 i 5; lub: 4, 1 i 2; lub: 3, 3 i 1, i t. d. — Podobnież, gdyby była dana jakakolwiek inna liczba. A więc:

Każdą liczbę możemy rozmaicie rozkładać na składniki (na części).

Tak np. $35=10+25=12+23=20+15=3+32=11+24=30+5$ i t. d.; podobnież np. $692=500+140+48+4=600+90+2$ i t. d.

Wrazie więc potrzeby, przy wykonywaniu jakiegokolwiek działania, mamy prawo każdą liczbę rozłożyć na składniki. Samo się przez się rozumié, że wrazie potrzeby tak rozłożymy liczbę na składniki (na części), jak nam to będzie najdogodniéj.

WYKONYWANIE DODAWANIA.

11. Gdy mamy dodać do siebie liczby np. 24 i 35, to należałoby do liczby 24 doliczać po jednéj wszystkie jedności liczby 35 (us. 1). Byłobyto jednak postępowanie zbyt długie, nużące uwagę i, skutkiem tego, łatwo prowadzące do omyłek.

Zastanowiwszy się nad tym, że nam tu idzie o znalezienie liczby, którąby była skupieniem tylu jedności, ile ich jest razem w obu liczbach 24 i 35, czyli o wyrażenie sumy $24+35$ przez jednę liczbę, możemy, mając do tego prawo, rozłożyć dane do dodania liczby na części w najdogodniejszy sposób (us. 10). Następnie zaś, dodawanie tak rozłożonych na części liczb uskutecznić przy pomocy dodawań częściowych (us. 9) w sposób taki, iżby postępowanie stało się najkrótszym i najpewniejszym, a przytym, aby owo postępowanie mogło być stosowane do jakichkolwiek liczb, danych do dodania.

Ponieważ ta jedna liczba, któréj szukamy, będzie wiadoma, gdy odnajdziemy jej dziesiątki i jednostki, więc postaramy się wykonać takie dodawania częściowe, aby jedno z nich dało nam dziesiątki, drugie zaś jedności sumy. Dane do dodania liczby najdogodniéj będzie rozłożyć na

części, oddzielając ich dziesiątki od pozostałych jedności, t. j. $24=20+4$, $35=30+5$, tak iż

$$24+35=20+4+30+5.$$

A że to dodawanie $20+4+30+5$ możemy zastąpić przez dodawanie częściowe, łącząc składniki, jak nam się podoba (us. 9), a nadto chcemy, żeby jedno dodawanie częściowe dało nam dziesiątki sumy, drugie zaś jéj jedności, przeto trzeba oddzielnie dodać 20 i 30, a oddzielnie 4 i 5. Przy pomocy nawiasów (us. 8) oznaczymy to wyraźnie, pisząc

$$20+4+30+5=(20+30)+4+5),$$

a więc

$$24+35=20+4+30+5=(20+30)+(4+5)=50+9=59;$$

tu $20+30$ czyli 2 dziesiątki więcéj 3 dziesiątki jest 5 dziesiątków, t. j.

$$20+30=50.$$

Również, gdy mamy dodać np. 323 i 564, to, zamiast do liczby 323 doliczać po jednéj wszystkie jedności liczby 564, postąpimy w sposób podobny, jak w zadaniu poprzednim, t. j. rozłożymy liczby 323 i 564 na części, mianowicie na setki, dziesiątki i jedności,

$$323+564=300+20+3+500+60+4.$$

Zastąpimy następnie to dodawanie przez dodawania częściowe, dodając setki do setek, dziesiątki do dziesiątków, pozostałe jedności do jedności, t. j. $(300+500)+(20+60)+(3+4)$, co wykonawszy miéć będziemy $800+80+7$, części składowe liczby 887. Całe więc to postępowanie da się piśmiennie tak przedstawić:

$$323+564=300+20+3+500+60+4=$$
$$=(300+500)+(20+60)+(3+4)=800+80+7=887.$$

Zupełnie taksamo rozumując przy dodawaniu liczb 263, 501, 4125, tak zaznaczymy to postępowanie piśmiennie:

$$263+501+4125=200+60+3+500+1+4000+100+20+5=$$
$$=4000+(200+500+100)+(60+20)+(3+1+5)=$$
$$=4000+800+80+9=4889.$$

Gdy mamy dodać np. 88 i 47, to w ten sposób objaśniając i odpowiednio zaznaczając postępowanie, miéć będziemy naprzód:

$$88+47=80+8+40+7=(80+40)+(8+7)=120+15;$$

ponieważ zaś każdą liczbę możemy rozłożyć na części, jak nam się podoba, więc daléj: $120+15=100+20+10+5=100+(20+10)+5=$
$=100+30+5=135$.

W ten sam sposób, gdy mamy dodać liczby np. 365, 7497, 966, odpowiednio rozumując, tak przedstawiamy to postępowanie:

$$365+7497+966=300+60+5+7000+400+90+7+900+60+6=$$
$$=7000+(300+400+900)+(60+90+60)+(5+7+6=$$
$$=7000+1600+210+18=$$

$=(7000+1000)+(600+200)+(10+10)+8=8000+800+20+8=8828.$

Widzimy więc, że zasadę tego postępowania możemy ogólnie tak wypowiedzieć: *wykonywanie dodawania polega na tym, aby liczby dane do dodania rozłożyć na części tak, iżby dogodnie można było oddzielnie wykonać dodawanie, odpowiednich części tych liczb, a sumy, wypadłe z tych dodawań częściowych, znów dodać do siebie, aby otrzymać jednę liczbę, sumę szukaną liczb danych.*

12. To postępowanie któreśmy tylkoco objaśnili, w zupełności odtwarza pamięciowe wykonywanie dodawania. Tak np., gdy mamy w pamięci dodać liczby: 24 i 35, to mówimy tak: 24 jestto 20 (albo 2 dziesiątki) i 4; 35 jestto 30 (albo 3 dziesiątki) i 5; dodaję: 20 i 30 jest 50 (5 dz.); 4 i 5 jest 9, a 50 i 9 jest 59. Podobnie, gdy mamy dodać np. 286 i 47, to mówimy: 286 jestto 200 i 80 i 6; 47 jestto 40 i 7; mam naprzód 200; dodaję 80 i 40 jest sto dwadzieścia, zaś dwieście i sto dwadzieścia jest trzysta dwadzieścia; 6 i 7 jest 13, czyli dziesięć i trzy; trzysta dwadzieścia i dziesięć (dwadzieścia i dziesięć jest trzydzieści) jest 330, a jeszcze 3, razem: 333.

Przy wykonywaniu pamięciowym dodawania trzech lub więcéj liczb, naprzód dodajemy w ten sposób dwie liczby do siebie, do ich sumy dodajemy trzecią i t. d. (porów. us. 5-y).

13. Ze względu na pośpiech i na wyraźność rachunku zwykle w piśmienne przedstawienie dodawania wprowadzamy pewne skrócenia.

Nie wypisujemy więc przedewszystkim, rozkładu danych do dodania liczb na części (jak to robiliśmy w ustępie 11-ym); gdy bowiém mamy napisaną liczbę, to ten rozkład łatwo sobie przedstawiamy, nie wypisując go jednak: wiemy przecież dobrze, że w liczbie np. 564 jest 5 setek (500), 6 dziesiątków (60) i 4 jedności, a tymsamym w rachunku wypisywanie tych części byłoby zbyteczne.

Chcemy jednak, nie wypisując tych rozkładów liczb na części, móc odpowiednie części oddzielnie do siebie dodawać, t. j. dziesiątki do dziesiątków, jedności do jedności, setki do setek i t. d, (us. 11). W tym tedy celu, *aby odpowiednie części składników miéć blisko siebie, podpisujemy składniki pod sobą tak, iżby jedności znalazły się pod jednościami*, a tymsamym dziesiątki pod dziesiątkami i t. d. W zadaniach więc ustępu 11-go wypadnie je tak wypisać:

24	323	263	88	365
+35	+564	+501	+47	+7497
		+4125		+966

Należy teraz wykonać dodawania częściowe: dziesiątki dodać do dziesiątków i t. d. Gdzie jednak pisać wypadki tych częściowych doda-

wań? Oczywiście, że *będzie najzręczniéj i najwyraźniéj, gdy wypadek z częściowego dodawania dziesiątków napiszemy pod dziesiątkami składników, wypadek z częściowego dodawania jedności napiszemy pod jednościami i t. d.* — Aby jednak nie mieszać liczb danych z tą, która nam z dodawania wypadnie, aby odróżnić je od siebie, t. j. *aby oddzielić składniki od sumy, prowadzimy pod wypisanymi pod sobą liczbami, danymi do dodania, kréską poziomą* [1]*, pod którą będziemy pisali to, co z dodawań częściowych otrzymamy.*

W piérwszych trzech przykładach [2]) możemy dodawania wykonać, zaczynając je czyto od strony lewéj, czytéż od strony prawéj [3]):

24	323	263
+35	+564	501
59	887	4125
		4889

— każdym razie cyfry, otrzymane z podpisania wypadków z dodawań częściowych pod dodawanymi częściami, razem uważane, wprost przedstawią szukaną sumę danych składników.

Inaczéj rzecz się ma z zadaniem:

88
+47
125
3

Gdy zaczniemy ze strony lewéj wykonywać dodawanie, to naprzód otrzymamy dziesiątków 12; podpiszemy je. Gdy zaś następnie dodamy jedności — wypadnie mam 15 — podpiszemy 5 pod jednościami, a 1 dziesiątek trzeba będzie dołączyć do dziesiątków (porównaj to zadanie w us. 11-ym), czyli napisaną już pod dziesiątkami cyfrę 2 zamienić na 3. A więc, jeżelibyśmy dodawanie wykonywali od strony lewéj, wypadłoby nam zmieniać tu raz postawioną cyfrę, coby pozbawiło rachunek pożądanéj czystości. — Jeżeli zaś zaczynamy dodawanie od strony prawéj, to, z dodania 8 i 7 otrzymawszy 15 (jedności), napiszemy pod jednościami 5, a 1 dziesiątek wypadnie dodać do tego, co otrzymamy z dodania 8 i 4. Ale ponieważ $(8+4)+1=(1+4)+8$ (us. 9), więc możemy, po napisaniu 5 (jed-

---

[1]) Moglibyśmy téj kréski nie stawić, jeżeli bylibyśmy pewni, że, przeglądając późniéj te rachunki, sami nie zapomnimy, a inni się domyślą, że ostatnia liczba jest sumą liczb nad nią będących.

[2]) Gdy mamy pod sobą podpisane trzy lub więcéj składników, nie potrzeba już pisać znaku +, bo wtedy nie może być wątpliwości co do rodzaju działania, które mamy wykonać.

[3]) Albo nawet, jak w przykładach drugim i trzecim, ze środka.

ności), do pozostałego (z dodania jedności) 1-ego dziesiątka dodać 4, a następnie do tego dodać 8 dziesiątków; otrzymawszy 13 dziesiątków, podpiszemy tę liczbę dziesiątków tak, aby cyfra 3 była na miejscu drugim od strony prawéj. W ten sposób, nie zmieniając cyfry raz postawionéj, dzięki wykonywaniu działania od strony prawéj, mamy odrazu

$$\begin{array}{r} 88 \\ +47 \\ \hline 135 \end{array}$$

Widzimy więc, że *częściowe dodawania dlatego wykonywamy zaczynając od strony prawéj, że, gdybyśmy je wykonywali od strony lewéj, mogłaby zajść potrzeba, przy wykonywaniu dodawań częściowych, zmienienia cyfry raz napisanéj.*

Zamiast tu mówić: 1 dziesiątek i 4 dziesiątki jest 5 dziesiątków, zaś 5 dziesiątków i 8 dziesiątków jest 13 dziesiątków, zauważywszy, że cyfry 1, 4 i 8 są na miejscu drugim, co w czasie roboty mamy naoku, jakotéż, że wypadające 13 ma być tak napisane, żeby cyfra 3 znalazła się na miejscu drugim, możemy znacznie skrócić poprzedni sposób wyrażania się, mówiąc wprost: 1 i 4 jest 5; 5 i 8 jest 13, a samo się przez się rozumié, że tu jest mowa o dziesiątkach.

Tak np. w zadaniu:

$$\begin{array}{r} 3065 \\ 74097 \\ 9068 \\ \hline 86230 \end{array}$$

postąpimy tak: znajdziemy $8+7+5=20$; pod kolumną cyfr dodanych (zob. Uwaga), aby zająć miejsce (§ 3, us. 11), postawimy 0, a 2 dodamy do cyfr następnéj (od strony prawéj) kolumny; znalazszy $2+6+9+6=23$, napiszemy 3 pod kolumną cyfr tylkoco dodanych, a 2 pozostaje nam do dodania do cyfr następnéj kolumny, lecz gdy w téj kolumnie cyfr znaczących niéma [1]), więc obok napisanéj już cyfry 3 piszemy 2 (gdyż oprócz tych 2-u niéma niczego innego do zaznaczenia na tym miejscu); znalazszy następnie $3+4+9=16$, stawiamy pod cyframi dodanymi 6, a 1 dodamy do 7 w następnéj kolumnie; $7+1=8$, a te 8 piszemy (pod kréską) pod 7.

Uwaga. Gdy jest mowa o liczbie jednocyfrowéj, to zwykle zamiast powiedzieć: liczba przedstawiona przez cyfrę, mówimy krócéj, wprost: cyfra. Tak np., znalazszy $8+7+5=20$, zamiast mówić: pod kolumną cyfr dodanych, ściśléj się wyrażając, należałoby powiedzieć: pod kolumną cyfr przedstawiających jedności dodane. — Podobnie, zamiast powiedzieć

[1]) Gdyby w piérwszéj od strony prawéj kolumnie (lub w kilku sąsiednich kolumnach poczynając od piérwszéj) były same zera, to: ponieważ niéma nic do postawienia na tym miejscu pod kréską, a ze względu na cyfry znaczące, jakie następnie pod kréską wypadnie postawić, miejsce to zajęte być winno, piszemy na nim zero (§ 3, us. 11).

jednocyfrowa liczba dziesiątków, mówimy często: cyfra dziesiątków, i t. d.

14. Widzimy więc wogóle, że zwykłe postępowanie przy dodawaniu da się ująć w takie prawidło:

Aby dodać do siebie składniki, podpisujemy je jedne pod drugimi (w jakimkolwiek porządku) *tak, żeby jedności znalazły się pod jednościami, a pod ostatnim składnikiem prowadzimy kreskę poziomą i dodajemy do siebie cyfry piérwszéj od strony prawéj kolumny, następnie drugiéj i t. d.; jeżeli z takiego dodawania częściowego wypadnie nic więcéj niż 9, to wypadek podpiszemy pod kreską, pod kolumną cyfr dodanych; jeżeli zaś z takiego dodawania częściowego wypadnie więcéj niż 9, to z otrzymanéj liczby oddzielamy dziesiątki, pozostałą część podpisujemy pod kolumną cyfr dodanych, a cyfrę dziesiątków dodajemy do cyfr następującéj kolumny (uważając ją w dalszym postępowaniu za cyfrę do owéj kolumny należącą).*

W dodawaniu do siebie wielu liczb, skutkiem wprawy nabytéj, przy wykonywaniu posuwając pióro (lub krédę) tak, aby kolejno stawało przy dodawanych cyfrach, nie wymawiamy cyfr dodawanych (przy których w danym momencie trzymamy pióro, czytéż krédę), lecz odrazu wypowiadamy sumę wypadającą z dodania téj cyfry. Tak np. w zadaniu:

75326	odrazu mówimy (odpowiednio pióro przesuwając):
827	5, 12, 13, 13, 20, 26; piszę 6; 2, 6, 8, 8, 10, 12, 14;
3320	piszę 4; 1, 4, 9, 12, 20, 23; piszę 3; 2, 2, 5, 10;
40501	piszę 0; 1, 5, 12; piszę 12; otrzymałem sumę:
27	120 346.
345	
120346	

15. Jeżeli nam wypadnie wykonać dodawanie składników, ustawionych w poziomym wiérszu, to niekiedy wykonywamy w ten sam sposób dodawanie, nie podpisawszy składników pod sobą, przekréślając tylko cyfry, w miarę ich dodania. Tak np., gdy mamy:

285+42+30+5967,

to mówimy: 7 (przekréślając je), 7 (przekréślając 0), 9 (przekréślając 2), 14 (przekréślając 5), (i postawiwszy znak =, w przyzwoitéj po nim odległości) piszemy 4,

285+42+30+5977= 4;

następnie 1, 7 (przekréślając 6), 10 (przekréślając 3) i t. d., tak iż działanie stopniowe będzie przyjmować piśmiennie takie postaci:

285+42+30+5967= 24; (1, 7, 10, 14, 22)
285+42+30+5967= 324; (2, 11, 13)
285+42+30+5967=6324. (1, 6)

16. Chcąc sprawdzić, czy dodawanie jest dobrze wykonane, t. j. chcąc wykonać próbę [1]) dodawania, możemy tę próbę oprzeć na tym, że suma nie zależy od porządku składników (us. 7). Możemy więc jakkolwiek inaczéj uporządkować składniki i dodać je do siebie; otrzymana suma winna być taż sama, co poprzednio. (Przypuszczamy tu, że omyłki, którąśmy mogli popełnić przy dodawaniu składników w początkowo przyjętym porządku, nie popełnimy przy innym porządku składników dodawanych). Taka próba jest próbą dodawania przez dodawanie.

Najprościéj (bo bez ponownego wypisywania składników) można wykonać próbę w ten sposób: jeżeliśmy w dodawaniu sprawdzanym cyfry kolumn poprzednio dodawali, zaczynając z dołu i wciąż ku górze postępując, to, przy sprawdzaniu, możemy cyfry kolumn dodawać z góry wciąż ku dołowi. Jest bowiém prawdopodobieństwo, że przy odmiennym porządku cyfr dodawanych w oddzielnych kolumnach nie popełnimy omyłki, któraby się w ten sam sposób na sumie odbić miała, jak omyłka w pierwotnym dodawaniu — jeżeliśmy ją zrobili.

17. Gdy mamy wykonać dodawanie liczb mianowanych prostych, to, aby można je było skupić w jednę liczbę, sumę, wszystkie dane liczby mianowane, t. j. składniki, winny być wyrażone przy pomocy téj saméj jednostki (§ 1, us. 10), przy któréj pomocy wyrazimy sumę, jako jednę liczbę mianowaną prostą. Gdy więc mamy np. dodać do siebie 3 godziny, 11 godzin, 5 godzin, to z doliczenia godzin do godzin wypadną nam godziny, których będzie tyle, ile otrzymamy z dodania liczb 3, 11, 5, t. j. ilość wszystkich godzin będzie wyrażona przez sumę $3+11+5$. Widzimy że:

Ażeby dane liczby mianowane proste dodać do siebie i otrzymać z tego dodawania liczbę mianowaną prostą, potrzeba, aby wszystkie składniki były wyrażone przy pomocy téj saméj jednostki.

Suma, wypadająca z dodawania liczb mianowanych prostych, jest wyrażoną przy pomocy téj saméj jednostki, co składniki. Liczba oderwana, zachodząca w sumie, powstaje przez dodanie do siebie liczb oderwanych składników, tak, iż, aby dodać 3 godziny, 11 godzin, 5 godzin, wykonamy: $3+11+5=19$,

3 godz.	a ponieważ skupialiśmy z sobą godziny, więc otrzy-
11 godz.	mana liczba 19 jest ilością godzin; dlatego pod
5 godz.	kréską podpisujemy: 19 godzin.
19 godz.	

Podobnie, mając zadanie: dodać do siebie 2056 funtów, 405 funtów, 14 funtów, 40 527 funtów, podpiszemy pod sobą te składniki, nie zapomi-

[1]) Próbą działania nazywamy nowe działanie, mające na celu sprawdzenie wypadku działania poprzedniego.

nając miana jednostek [1]), podkréślimy, liczby oderwane do siebie dodamy sposobem wiadomym i przy sumie, powstałéj z dodania liczb oderwanych, postawimy oznaczenie téj saméj jednostki, przy pomocy któréj są wyrażone składniki. Będzie więc:

2056 fun.
405 fun.
14 fun.
40527 fun.

43002 fun.

Odpowiédź: z dodawania otrzymamy 43 002 funty.

---

§ 5. ODEJMOWANIE.

OKREŚLENIE ODEJMOWANIA.

1. Przypuśćmy, że z dodawania dwu składników, z których jeden był np. 5, otrzymaliśmy sumę, np. 8, a chcemy się dowiedzieć, jaki był drugi składnik. Przypomnijmy sobie, że wtedy, kiedyśmy odpowiedniéj wprawy nie posiadali, aby znaléść ów drugi składnik, postępowaliśmy tak: pięć i *jeden*, sześć (a tę jedność zaznaczaliśmy np. odchyleniem jednego palca); sześć i *jeden*, siedem (jeszcze odchylamy następny palec), siedem i *jeden*, osiem (znów odchylamy palec). Aby więc z liczby 5 otrzymać 8, trzeba było do 5-u dodać $1+1+1=3$, czyli szukany składnik drugi jest 3. Takim przeto postępowaniem, mając sumę dwu składników i jeden składnik, wynaleźliśmy składnik drugi. Działanie to nazywa się odejmowaniem. Możemy więc powiedzieć:

W odejmowaniu mamy na celu z danych: sumy dwu składników i jednego z tych składników—wyznaczenie pozostałego składnika téj sumy.

2. Ponieważ tu do 5-u doliczaliśmy po jedności dopóty, dopóki nie doszliśmy do 8-u, więc właściwie odejmowanie wykonywa się zapomocą doliczania do mniejszéj z danych liczb tylu jedności, ilu ich potrzeba, aby od téj mniejszéj z danych liczb dojść do drugiéj, większéj. Zebranie zaś doliczonych jedności przedstawia liczbę szukaną.

---

[1]) Bardzo jest pożytecznie przy uczeniu arytmetyki przestrzegać, aby uczniowie wypisywali przy *każdéj* liczbie mianowanéj nazwanie jednostki. Takie zaznaczanie systematyczne liczb mianowanych i oderwanych, ciągłe ich rozróżnianie pobudza do ścisłago nadania miejsca właściwego każdéj liczbie w rozumowaniu przeprowadzanym, co, jak to zobaczymy w ciągu dalszym, prowadzi za sobą ważne następstwa, osobliwie przy dzieleniu. Naturalnie należy przestrzegać, aby uczeń rozumiał, iż, jak w powyższym zadaniu, miano jednostki w składnikach wypisane jest dlatego, aby uzasadnić miano jednostki sumy; wykonywa się zaś dodawanie liczb oderwanych.

Tak, że gdybyśmy w szeregu liczb naturalnych

1, 2, 3, 4, **5**, 6, 7, **8**, 9, 10, 11, 12 i t. d.

odrzucili tyle początkowych cyfr, ile wskazuje 5, mniejsza z danych liczb, a następnie prowadzili liczenie nanowo, zaczynając od 1 (więc: pokazując na 6, mówilibyśmy 1, i t. d.), to, przerywając je na miejscu, zajętym przez większą z liczb danych, przez to nowe liczenie doszlibyśmy właśnie do liczby szukanéj 3. Możemy więc powiedzieć, że:

Odejmowanie staje się liczeniem, jeżeli, odrzuciwszy w szeregu liczb naturalnych wszystkie liczby początkowe aż do mniejszéj z danych do odjęcia liczb włącznie, na pozostałych liczbach prowadzimy nanowo liczenie ad jedności i przerywamy je na miejscu, zajętym przez drugą z liczb danych.

Dopóki, skutkiem wprawy, nie nabyliśmy możności prędszego wykonywania odejmowania, t. j. mówienia odrazu: 5 od 8-u jest 3, 6 od 13-u jest 7 i t. d., dopóty wykonywaliśmy odejmowanie, doliczając wciąż po jedności do mniejszéj liczby danéj, aż do otrzymania większéj z liczb danych. Tym właśnie sposobem udowodnić możemy najłatwiéj, że z odjęcia np. 5-u od 8-u wypada 3 — jeżeliby kto temu zaprzeczał.

3. Powiedzieliśmy, że w odejmowaniu, mając sumę dwu składników i jeden składnik, odnajdujemy drugi składnik. Owóż ta suma dana, czyli większa (§ 4, us. 3) z liczb danych nazywa się w odejmowaniu odjemną, druga zaś z liczb danych, czyli wiadomy składnik, nazywa się odjemnikiem. Liczba szukana, którą otrzymujemy z wykonania odejmowania, nazywa się resztą. A ponieważ odjemna jest sumą dwu składników, z których jeden (wiadomy) jest odjemnikiem, drugi zaś (szukany) jest resztą, więc *z dodania reszty do odjemnika wypadnie odjemna*, t. j. (§ 4, us. 4).

reszta + odjemnik = odjemnéj.

Mając to na względzie i używając powyższych nazw dla liczb wchodzących do odejmowania, możemy to, cośmy w ustępie 1-ym o odejmowaniu powiedzieli, wysłowić w ten sposób:

Odejmowanie jestto działanie, w którym, mając dane dwie liczby: odjemną i odjemnik, poszukujemy liczby, zwanéj resztą, po któréj dodaniu do odjemnika otrzymujemy odjemną.

W naszym zadaniu: od 8-u odjąć 5, liczba 8 jest odjemną, a 5 odjemnikiem; otrzymana liczba 3 jest resztą, bo $5+3=8$, co możemy (§ 4, us. 6) jeszcze inaczéj wysłowić: bo $3+5$ jest 8.

4. Ponieważ z dodania reszty do odjemnika otrzymujemy odjemną, więc reszta, wskazująca nam, ile trzeba do odjemnika doliczyć jedności, aby otrzymać odjemną, pokazuje nam ile odjemna jest większa od odjemnika (§ 4, us. 1, 3), ile się od niego różni, czyli: reszta pokazuje nam: jaka jest różnica między odjemną a odjemnikiem. Dlatego resztę nazy-

wają różnicą i mówią, że *odejmowanie jestto działanie, za pomocą którego, mając dwie liczby: odjemną i odjemnik, dowiadujemy się, ile odjemna jest większa od odjemnika.* Gdy bowiém suma jest większa od każdego ze składników (§ 4, us. 3), więc *odjemna jest większa od odjemnika* o różnicę, czyli resztę. Mówimy jeszcze: w odejmowaniu odjemną zmniejszamy o odjemnik i otrzymujemy resztę. Więc zamiast mówić: od 8 odjąć 5, możemy mówić: 8 zmniejszyć o 5.

5. Zamiast resztą lub różnicą, liczbę wypadającą z odejmowania nazywamy także nadmiarem, lub niedomiarem, mianowicie: nadmiar odjemnéj nad odjemnik, a: niedomiar odjemnika do odjemnéj. Więc np., gdy mamy liczby 8 i 5, to: nadmiar 8-u nad 5 jest 3; niedomiar 5-u do 8-u jest 3.

6. Dla oznaczenia, że dwie liczby mamy od siebie odjąć, piszemy naprzód odjemną, a po niéj odjemnik, kładąc między nimi znak —, który czytamy mniéj, albo bez np. 8 — 5 czytamy: 8 mniéj 5, albo 8 bez 5-ciu. Używając zaś jeszcze znaku = (§ 4 us. 4), możemy to odejmowanie tak przedstawić:

$$8 - 5 = 3.$$

Ponieważ wyrażenie 8 — 5 przedstawia liczbę 3, więc możnaby także wyrażenie 8 — 5 nazywać resztą lub różnicą; (§ 4, us. 4, 5). Upowszechniło się jednak nazywanie wyrażenia 8 — 5 tylko różnicą; a więc: *wskazane odejmowanie nazywamy często różnicą* liczb, do tego odejmowania wchodzących.

7. Zastanawiając się nad tym, cośmy mówili w ustępach 1-ym i 3-im, widzimy, że odejmowanie jest związane z dodawaniem tak, iż z liczb wchodzących do dodawania, np. $3 + 5 = 8$, możemy ułożyć dwa odejmowania: $8 - 5 = 3$ i $8 - 3 = 5$. Zestawiając to ze sobą:

$$3 + 5 = 8,$$
$$8 - 5 = 3,$$
$$8 - 3 = 5,$$

widziwy, że ta liczba, któréj szukaliśmy w dodawaniu, jest daną w odejmowaniu, i odwrotnie, liczba szukana w odejmowaniu jest daną w dodawaniu; możemy więc powiedzieć, że [1])

Odejmowanie jest działaniem odwrotnym dodawaniu dwu składników.

Ponieważ w odejmowaniu odjemna jest większa od odjemnika, więc w szeregu liczb naturalnych zajmuje miejsce dalsze niż odjemnik (jeden składnik)

---

[1]) Dlaczego niéma działania odwrotnego dodawaniu trzech lub więcéj składników? Odpowiedź na to łatwa. Dodawanie trzech lub więcéj składników jest działaniem złożonym z kilku dodawań po dwa składniki (§ 4, us. 5). Dodawanie zaś może miéć odwrotne sobie działanie proste, gdy ono samo jest działaniem niezłożonym, a więc: tylko dodawanie dwu składników.

o tyle miejsc, ile wskazuje drugi składnik (§ 4, us. 2), t. j. różnica, będąca sama także liczbą tego szeregu. Powiemy więc o naszym odejmowaniu, że różnica dwu liczb z szeregu liczb naturalnych, jest także liczbą tego szeregu [1]).

Oczywiście, że, gdy do pewnéj liczby wypada nam jakąś liczbę dodać i tę samę liczbę odjąć, np. mając 8, dodać 3 i odjąć 3 (albo: odjąć 3 i dodać 3), liczba dana nie zmieni się: otyle bowiém liczbę 8 powiększamy (§ 4, us. 1), dodając 3, oile ją zmniejszamy (us. 4), odejmując 3. Zwykle wtedy mówimy: *dodanie i odjęcie téj saméj liczby, jako działania wprost sobie odwrotne, wzajemnie się znoszą.*

WŁASNOŚCI SUMY.

8. W tym § 4-m ustępie 8-ym widzieliśmy, że

a. *Jeżeli do któregokolwiek składnika sumy dodajemy pewną liczbę, to tymsamym do téj sumy dodajemy tęż samę liczbę.*

b. *Aby do sumy dodać pewną liczbę, można tę liczbę dodać do któregokolwiek z jéj składników.*

Z tego, że suma jest skupieniem jedności składników (§ 4, us. 5), wypada, że jeżeli jeden ze składników sumy rozłożymy na dwa (§ 4, us. 10) i zamiast całego początkowo danego składnika weźmiemy tylko jednę z tych dwu jego części, t. j. od tego składnika odejmiemy liczbę, będącą drugą jego częścią, to jedności téj liczby nie wejdą w skład sumy nowéj, czyli suma początkowo dana stanie się o tęż samę liczbę mniejszą; innymi słowy:

c. *Jeżeli od któregokolwiek składnika sumy odejmujemy pewną liczbę, to tymsamym odejmujemy ją od sumy.*

Gdy od sumy kilku składników chcemy odjąć jakąś liczbę, t. j. chcemy, aby suma była skupieniem mniejszéj ilości jedności, mniejszéj o tyle jedności, ile ich jest w owéj liczbie, to, jeżeli pośród składników sumy jest składnik większy od owéj liczby, możemy go rozłożyć na dwie części: jednę równą owéj liczbie, drugą część pozostałą, i tę ostatnią właśnie wziąć zamiast całego tego składnika. Wtedy bowiem, na zasadzie własności c., od sumy odejmujemy owę liczbę [2]). A zatym

d. *Aby od sumy odjąć pewną liczbę, można ją odjąć od jednego z jéj składników, większych od téj liczby* [3]).

---

[1]) Łatwo zauważyć, że to ma miejsce tylko dzięki temu, że odjemna jest większa od odjemnika.

[2]) Łatwo można to i poprzednie rozumowanie przeprowadzić na przykładach liczebnych.

[3]) Albo opuścić składnik równy téj liczbie, jeżeli taki składnik w sumie danéj się znajduje.

Z zestawienia ze sobą własności a. i c., albotéż własności b. i d. wypada, że suma składników się nie zmienia, jeżeli do jednego składnika dodamy pewną liczbę, a od innego odejmiemy tę samę liczbę; wtedy bowiém dodajemy do sumy i od niéj odejmujemy tę samę liczbę, skutkiem czego ta suma się nie zmienia (us. 7). Możemy więc powiedzieć:

e. *Jeżeli do jednego ze składników sumy dodajemy pewną liczbę, a od innego jednocześnie odejmujemy tę samę liczbę, to suma się nie zmienia.*

Możemy téż inaczéj wysłowić (por. § 4, us. 8) własności c., d. i e., mówiąc „zmniejszyć o", „powiększyć o", zamiast „odjąć" (us. 4), „dodać".

WŁASNOŚCI RÓŻNICY.

9. Jeżeli mamy sumę *dwu* składników i chcemy, nie zmieniając jednego składnika, do téj sumy dodać, lub od niéj odjąć pewną liczbę, to, według własności b. i d., us. 8-go należy do drugiego składnika (bo innego już niéma) odpowiednio dodać, lub od niego odjąć tę samę liczbę. Tak np. jeżeli mamy sumę dwu składników, $13+5=18$, i, nie zmieniając składnika 5, dodajemy do sumy 18 liczbę np. 4, to tymsamym do drugiego składnika, do 13-u, wypadnie dodać tę liczbę 4, t. j. $(13+4)+5=$ $=18+4$.

Ponieważ zaś odjemna jest sumą reszty i odjemnika (us. 3), t. j.

reszta + odjemnik = odjemnéj,

więc

a. *Jeżeli do odjemnéj dodajemy, lub od niéj odejmujemy pewną liczbę, nie zmieniając odjemnika, to wypadnie odpowiednio do reszty dodać, lub od niéj odjąć tę samę liczbę.* Tak np., gdy, mając $18-5=13$, do odjemnéj dodamy np. 4, to do reszty 13 wypadnie także dodać 4, i rzeczywiście: $22-5=17$; również, gdy mając $18-5=13$, od 18 odejmiemy 2, to skutkiem tego od reszty 13 wypadnie także odjąć 2, i rzeczywiście: $16-5=11$.

Podobnież, gdy sumy *dwu* składników nie zmieniamy, a do jednego ze składników dodajemy pewną liczbę, to, według własności e., us. 8-go od drugiego składnika wypadnie odjąć téż samę liczbę. Więc:

b. *Jeżeli odjemnéj nie zmieniamy, a do odjemnika dodajemy, lub od niego odejmujemy pewną liczbę, to skutkiem tego tę samę liczbę wypadnie odpowiednio od reszty odjąć, lub do niéj dodać.* Np., gdy, mając $18-5=13$, do odjemnika 5 dodamy 1, to od reszty 13 wypadnie odjąć 1, jakoż: $18-6=12$; jeżeli zaś, mając $18-5=13$, od odjemnika 5 odejmiemy 4, to do reszty 13 wypadnie dodać 4, i rzeczywiście: $18-1=17$.

Gdy nakoniec, do odjemnéj i do odjemnika dodamy jednocześnie tę samę liczbę, to wskutek dodania jéj do odjemnéj, do reszty, według

własności a., wypadnie dodać tę liczbę, wskutek zaś dodania jéj do odjemnika, wypadnie od reszty, według własności b., odjąć tę samę liczbę, zatym (us. 7) reszta zmianie nie ulegnie. Toż samo ma miejsce, gdy tak od odjemnéj, jak i od odjemnika tę samę liczbę odejmiemy. A więc:

c. *Jeżeli jednocześnie albo do odjemnéj i odjemnika dodajemy tę samę liczbę, albo od odjemnéj i od odjemnika odejmujemy tę samę liczbę, to reszta się nie zmienia.* Np., gdy mamy $18-5=13$, to, dodając do odjemnéj 18 i do odjemnika 5 tę samę liczbę, np. 2, otrzymamy resztę niezmienioną 13, i rzeczywiście $20-7=13$; podobnież, jeżeli $18-5=13$ i tak od odjemnéj 18 jak i od odjemnika 5 odejmiemy np. 4, to otrzymamy resztę także 13, i rzeczywiście: $14-1=13$. (Tę własność moglibyśmy taksamo wyprowadzić, jak powyżéj własność a.).

Możemy również inaczéj wysłowić własności powyższe, mówiąc: „zmniejszyć o", „powiększyć o", zamiast „odjąć", „dodać".

Przy pomocy nawiasów (§ 4, us. 8) nasze przykłady możemy wyraźniej przedstawić w ten sposób:

$$18-5=13.$$

a. $(18+4)-5=13+4$; $(18-2)-5=13-2$.

b. $18-(5+1)=13-1$; $18-(5-4)=13+4$.

c. $(18+2)-(5+2)=13$; $(18-4)-(5-4)=13$.

Z własności b. wypadn, że gdy do odjemnika w odejmowaniu np. $18-5=13$ dodawać będziemy np. naprzód 1, późniéj 4, następnie 3, daléj 2, to różnica o też liczby odpowiednio będzie się zmniejszała:

$$18-(5+1)=13-1,$$
$$18-(5+1+4)=13-1-4,$$
$$18-(5+1+4+3)=13-1-4-3,$$
$$18-(5+1+4+3+2)=13-1-4-3-2.$$

Jeżeli tu zamiaćt 13 napiszemy tę samę liczbę, przedstawioną (us. 6) przez różnicę $18-5$, to miéć będziemy

$$18-(5+1+4+3+2)=18-5-1-4-3-2,$$

t. j. gdy od pewnéj liczby mamy odjąć sumę kilku składników, to możemy od liczby danéj odjąć naprzód jeden składnik, od otrzymanéj liczby drugi składnik i t. d., czyli: *gdy mamy od pewnéj liczby odjąć sumę dwu lub więcéj składników, to możemy to odejmowanie wykonać, uskuteczniając odejmowanie częściowe oddzielnych składników.*

WYKONYWANIE ODEJMOWANIA.

10. Gdybyśmy np. mieli od 59 odjąć 24, to zgodnie z tym, cośmy zauważyli o wykonywaniu pierwotnym odejmowania (us. 1, 2), należałoby do 24 doliczać po jedności dopóty, dopókibyśmy niedoszli do liczby 59;

zebranie zaś wszystkich doliczonych jedności przedstawiłoby szukaną resztę.

Takie postępowanie byłoby zbyt długie i łatwoby do omyłek prowadziło.

Gdy idzie o rachunek pamięciowy (który się zawsze wyrabiał przed piśmiennym), to do krótszego wykonania tego odejmowania doprowadziła nas myśl dodawania do odjemnika odrazu całych dziesiątków, a więc: 24 i 10 jest 34; 34 i 10 jest 44; 44 i 10 jest 54; teraz już nie możemy dodać całego dziesiątka (bo wypadłoby 64, więcéj niż odjemna 59); dodaliśmy 30 i mamy 54; aby z 54 otrzymać 59, trzeba do 54 doliczyć 5 jedności; więc szukana liczbą składa się z 30 i 5, czyli jest nią 35. — To postępowanie jeszcze skracamy, skutkiem nabytej wprawy, i mówimy tak: mam odjąć 24 od 59; 24 od 54 jest 30; 54 od 59 jest 5; 30 i 5 jest 35. — Podobnie, gdy mamy od 887 odjąć 564, to: 564 od 864 jest 300; pozostaje odjąć 864 od 887; 864 od 884 jest 20 (zatym 300 i 20 jest 320); 884 od 887 (albo krócéj: 4 od 7) jest 3; razem 323. — W przypadku, gdy mamy od 132 odjąć 47, tak rozumujemy: (nie mogąc powiedzieć 47 od 137, bo 137 większe od odjemnéj 132, mówimy) 47 od 127 jest 80; 127 od 132 jest 5; razem 85.

11. Aby obmyśléć krótsze postępowanie przy piśmiennym wykonywaniu odejmowania, łatwo, wobec związku zachodzącego między odejmowaniem, a dodawaniem, chciéć, podobnie jak to robiliśmy w dodawaniu [1]), *odejmowanie zadane zastąpić przez odejmowania częściowe:* jedności od jedności, dziesiątków od dziesiątków i t. d. — Aby te części odjemnéj i odjemnika, które oddzielnie będziemy od siebie odejmowali, miéć blisko siebie [2]), *podpisujemy odjemnik pod odjemną tak, żeby jedności były pod jednościami,* a tymsamym dziesiątki pod dziesiątkami i t. d., podobnie jak to robiliśmy w dodawaniu.—Co się tyczy pisania reszt z odejmowań częściowych, to, również jak w dodawaniu, będzie najzręczniéj i najwyraźniéj, gdy *resztę z częściowego odejmowania jedności napiszemy pod jednościami i t. d.* — Aby zaś oddzielić dane liczby od szukanéj, *pod odjemnikiem prowadzimy kréskę poziomą,* pod którą pisać będziemy to, co z odejmowań częściowych otrzymamy. — Wykonajmy więc np. odejmowania 59 — 24; 887 — 564, 6829 — 3128,

59	886	6829
—24	—564	—3128

1) I do pewnego stopnia w odejmowaniu pamięciowym.

2) Nie wypisując rozkładu odjemnéj i odjemnika na części, t. j. na . . . setki, dziesiątki, jedności.

Tutaj wypadki odejmowań częściowych, czyto wykonywać je będziemy od strony prawéj, czytéż od strony lewéj, razem uważane, wprost przedstawią szukaną resztę

59	887	6829
—24	—564	—3128
35	323	3701.

Zauważymy tu, że podobnie jak w dodawaniu, zamiast mówić: 2 dziesiątki od 5 dziesiątków jest 3 dziesiątki; lub 5 setek od 8 setek jest 3 setki, mówimy wprost: 2 od 5 jest 3 i piszemy 3 pod odejmowanymi cyframi, lub: 5 od 8 jest 3 i piszemy to 3 pod odejmowanymi cyframi, gdyż wczasie roboty mamy wciąż na oku, na których odpowiednio miejscach są odejmowane cyfry i na których piszemy wypadki z ich odjęcia.

W ostatnim przykładzie, gdy nam z odejmowania dziesiątków: 2 od 2-u, $2-2$, nic nie zostało, napisaliśmy pod kréską 0, zgodnie z tym, cośmy o zerze mówili w § 3-im w ustępie 11-ym. Dlategotéż mówimy: $2-2=0$, przez co pozornie możemy miéć resztę w tym także przypadku, gdy *odjemnik jest równy odjemnéj*.

Dlatego także, jeżeli mamy np. wskazane odejmowanie dwu równych sobie liczb, to, podpisując je pod sobą, jak w poprzedzających przykładach, pod kréską piszemy 0, które nam wyraźnie wskazuje, iż już zauważyliśmy, że reszty z tego odejmowania nie otrzymujemy; np.

256
—256
0

Pozornie więc można wykonać odejmowanie, gdy odjemnik jest równy odjemnéj i otrzymać wtedy resztę, t. j. zero (oznaczające, ściśle mówiąc, brak liczby).

Skutkiem tego, samiast mówić: w odejmowaniu odjemna jest większa od odjemnika (us. 4), powinniśmy to tak powiedziéć, żeby w tym wyrażeniu się naszym objąć tak przypadek, gdy odjemna jest większa od odjemnika, jak i przypadek, gdy odjemna jest równa odjemnikowi. Zrobimy to właśnie, wysławiając się w ten sposób: *odjemna jest nie mniejsza od odjemnika.*

Jeżeli mamy np. wykonać odejmowanie $53-28$, to tu nie możemy wykonać częściowego odejmowania jedności; $3-8$, bo tu odjemna jest mniejsza od odjemnika. Lecz mamy prawo rozłożyć liczbę na składniki w najdogodniejszy sposób (§ 4, us. 10); możemy więc naszę odjemną 53 tak rozłożyć na części, dziesiątki i jedności, aby te części odjemnéj nie były mniejsze od części odjemnika i aby z każdego częściowego odejmowania (dziesiątków od dziesiątków i jedności od jedności) wypadła

jednocyfrowa liczba, tak, aby te reszty częściowych odejmowań, razem przeczytane, odrazu przedstawiły jednę liczbę. Nie możemy np. odjemnéj tak rozłożyć: $53=44+9$, bo odejmując od tego $28=2$ dziesiątki $+8$, mielibyśmy wprawdzie jedno odejmowanie jedności od jedności, $9-8$, ale drugie: $44-2$ dzies. nie byłoby odejmowaniem dziesiątków od dziesiątków. Nie moglibyśmy również odjemnéj tak rozłożyć: $53=3$ dziesiątki $+$ 23 (jedności), bo odejmujac od tego $28=2$ dzies. $+8$, otrzymalibyśmy z odjęcia jedności $23-8=15$, liczbę dwucyfrową (a niejednocyfrową), która wraz z resztą częściowego odejmowania dziesiątków $3-2=1$ (dziesiątek) nie utworzyłaby odrazu szukanéj reszty, a trzebaby dopiéro zbiérać: 1 dziesiątek $+15=1$ dzieś. $+1$ dzieś. $+5=2$ dzieś. $+5$. Próbując tak różnych rozkładów odjemnéj, przekonamy się, że najdogodniejszym (i jedynym takim) jest rozkład $53=4$ dziesiątki $+13$ (jedności), bo wtedy odejmując $28=2$ dziesiątki $+8$ (jedności) otrzymujemy z częściowych odejmowań: 2 od 4 jest 2 (dziesiątki), a: 8 od 13 jest 5 (jedności); te reszty częściowe 2, 5, podpisane pod odejmowanymi cyframi, razem uważane, odrazu przedstawiają liczbę jednę: 25.

```
413
 53
-28
 25
```

Podobnie, gdy mamy np. wykonać odejmowanie $7646-1278$

```
 7646
-1278
------
```

to nie możemy wykonać ani odejmowania częściowego jedności: $6-8$, ani odejmowania częściowego dziesiątków: $4-7$, bo w każdym z tych odejmowań odjemna jest mniejsza od odjemnika, co być nie może. Łatwo jednak temu zaradzić, jeżeli odjemną 7646 tak właśnie rozłożymy na części, aby, popiérwsze, dziesiątki odjemnéj nie były mniejsze od dziesiątków odjemnika i jedności odjemnéj nie mniejsze od jedności odjemnika, i powtóre, aby wtedy częściowe reszty postawione pod kréską, razem uważane, odrazu przedstawiały jednę liczbę. Próbując różnych rozkładów liczby 7646, przekonamy się, że obu tym warunkom zadosyć uczyni tylko taki rozkład: 7 tysięcy, 5 setek, 13 dziesiątków, 16 jedności, tak że gdy go nadpiszemy nad odjemną i od odpowiednich części tak rozłożonéj odjemnéj będziemy odejmowali części odjemnika w jakimkolwiek porządku, np. od strony lewéj: 1 od 7 jest 6 (piszę); 2 od 5 jest 3; 7 od 13 jest 6; 8 od 16 jest 8, to wtedy te reszty (6 tysięcy 3 setki 6 dziesiątków 8 jedności), razem uważane, przedstawiają szukaną resztę: 6368.

```
7 513 16
 7646
-1278
------
 6368
```

Podobnież, gdy mamy np. $650\,588-25\,679$, to tak postąpimy: po-

nieważ 8 jedności jest mniejsze od 9 jedności, trzeba w odjemnéj rozłożyć 8 dziesiątków na 7 dziesiątków i 1 dziesiątek, a ten 1 dziesiątek wyrazić jako 10 jedności, co razem z 8 jednościami da nam 18 jedności,

64915718
650588
—25679
624909

które nadpisuję nad jednościami; pozostałe 7 dziesiątków, jako niemniejsze od 7 dziesiątków w odjemniku, zostawiam (a więc z odejmowania częściowego dziesiątków reszty nie będzie); ponieważ daléj 5 setek odjemnéj jest mniéj niż 6 setek odjemnika, a w odjemnéj niéma tysięcy na czwartym miejscu, więc rozkładamy 5 dziesiątków tysięcy na 4 dziesiątki tysięcy i 1 dziesiątek tysięcy, który wyrażam jako 10 tysięcy; z nich 9 tysięcy zostawiam, a 1 tysiąc wyrażam jako 10 setek, co razem z 5 setkami stanowi 15 setek. W ten sposób odjemna 650 588 została rozłożoną na 6 setek tysięcy, 4 dziesiątki tysięcy, 9 tysięcy, 15 setek, 7 dziesiątków i 18 jedności. Tak rozłożywszy odjemną na części, mogę rozpocząć odejmowanie z któréjkolwiek strony (choćby ze środka); zaczynając od strony prawéj, mam: 9 od 18 jest 9; 7 od 7, żadnéj reszty, ale piszę 0, aby zająć miejsce drugie, gdyż będą cyfry do postawienia na miejscu trzecim i dalszych; 6 od 15 jest 9; 5 od 9 jest 4; 2 od 4 jest 2; a gdy od 6 nie mam nic do odjęcia [1]), więc piszę 6. Mam więc resztę 624909.

Widzimy więc, że ogólnie, to postępowanie, t. j. *wykonywanie odejmowania polega na rozłożeniu odjemnéj na części tak, aby każda część odjemnéj nie była mniejszą od odpowiedniéj części odjemnika i aby reszty, wypadłe po wykonaniu oddzielnych odejmowań odpowiednich części, razem uważane, odrazu utworzyły jednę liczbę.*

12. Gdybyśmy, wykonywając odejmowanie, zawsze nadpisywali nad odjemną jéj rozkład, który nam dozwala w tak dogodny sposób zadane odejmowanie zastąpić przez odejmowania częściowe, to przygotowanie takie odjemnéj zajmowało by nam nieco czasu, a co ważniejsze, pozbawiałoby rachunek czystości, któréj musimy przestrzegać. Osobliwie jest to niedogodne, gdy np. odjemna wypada nam jako suma kilku liczb, od któréj mamy odjąć odjemnik, np. gdy mamy zadanie: od sumy liczb 256,

256
1342
2766
4364
—2689
1675

1342, 2766, odjąć liczbę 2689. Gdzież tu nad odjemną 4364 nadpisać odpowiedni jéj rozkład? Trzebaby chyba umyślnie ją powtórnie w innym miejscu napisać i tam dopiéro wykonywać odejmowanie, poprzednio przygotowawszy ów rozkład odjemnéj. Moglibyśmy wprawdzie ten rozkład w pamięci zrobić, ale przy większych licz-

[1]) Moglibyśmy także tak powiedzieć: przed 2 możemy sobie wyobrazić zero (§ 3, us. 12), więc 0 od 6, jest 6.

bach nie możnaby się na to spuszczać. Dlatego w praktyce ani tego rozkładu nie nadpisujemy nad odjemną, ani go całego nie utrzymujemy w pamięci. Postępujemy zaś w następujący sposób. Ponieważ, przygotowując rozkład odjemnéj na części, dla pewności (t. j. dla niepoprawiania się późniejszego) zaczynamy od strony prawéj, więc, nie dokonywając odrazu całego rozkładu odjemnéj, wykonywać go będziemy (od strony prawéj) cześciowo wmiarę potrzeby dla wyznaczenia cyfry reszty. Tak w naszym zadaniu, wykonywając odejmowanie, powiemy: 9 większe od 4, więc rozkładam [1]) 6 dziesiątków na 5 dziesiątków, które zostawiam, i 1 dziesiątek, który wyrażam jako 10 jedności, a one wraz z 4 jednościami stanowią 14 jedności: 9 od 14 jest 5; i t. d. Albo, opuszczając nazwy: dziesiątki, jedności i t. d. (us. 11), mówić będziemy: 9 większe od 4; rozkładam 6 na 5 i 1; 1 (cyfra) na drugim miejscu jest (przedstawia) 10 na piérwszym, więc 9 od 14 jest 5; 8 większe od 5; rozkładam 3 na 2 i 1; 1 na trzecim jest 10 na drugim; 8 od 15 jest 7; 6 większe od 2; rozkładam 4 na 3 i 1; 1 na czwartym jest 10 na trzecim; 6 od 12 jest 6; 2 od 3 jest 1; reszta; 1675. — Gdyby było np.

4067
—2687
1380

to mówilibyśmy: 7 od 7 piszę 0; 8 większe od 6, więc rozkładam 4 na 3 i 1; 1 na czwartym jest 10 na trzecim, które rozkładam na 9 i 1; 1 na trzecim jest 10 na drugim; 8 od 16 jest 8; 6 od 9 jest 3; 2 od 3 jest 1. Przed nabyciem odpowiedniéj wprawy, przy cyfrach, jak w tym zadaniu 4, 0, które winniśmy sobie wystawiać, jako zastąpione przez cyfry 3, 9, stawiamy zwykle u góry kropki, lub kréski. Późniéj, wprawiwszy się, tego nie robimy.

Z przykładów tego i poprzedzającego ustępów widzimy, że *dlatego rozpoczynamy wykonywanie odejmowania od strony prawéj, że nie rozkładamy uprzednio całéj odjemnéj odpowiednio na części, ale uskuteczniamy ten rozkład szęściowo, wmiarę potrzeby wyznaczenia cyfry reszty.*

(Rozpoczynanie od strony lewéj wyznaczania cyfr reszty, a tymsamym i rozkładu częściowego odjemnéj, prowadziłoby niekiedy za sobą zmienianie tak cyfr reszty, jak i części rozkładu odjemnéj).

---

[1]) Używają tu «pożyczam», chociaż «zwracanie pożyczonego» późniéj miejsca niéma. Jak widzieliśmy, objaśnienie i wyrażanie się, zgodne z istotnym sposobem wykonywania rozkładu odjemnéj, nie przedstawia żadnéj trudności do wprowadzenia ich w użycie — wobec niczym nieusprawiedliwionego «pożyczania».

Francuzi postępują inaczéj. Gdy np. mają wykonać odejmowanie

4364
—2639
1725

to rozumują w ten sposób: 9 większe od 4; dodaję do odjemnéj i odjemnika tę samę liczbę (us. 9), t. j. do odjemnéj 10 jedności, do odjemnika 1 dziesiątek; więc: 9 od 14 jest 5; 4 od 6 jest 2, i podobnie daléj, 6 większe od 3, więc 6 od 13 jest 7, a 3 od 4 jest 1; reszta: 1725. (Nadto zamiast mówić: odjemna mówią, liczba większa, a: odjemnik rozumieją przez: liczbę mniejszą).

13. Widzimy więc, że zwykłe postępowanie przy odejmowaniu da się ująć w takie prawidło:

Aby odjąć od siebie dane dwie liczby, podpisujemy odjemnik pod odjemną tak, żeby jedności znalazły sie pod jednościami, a pod odjemnikiem prowadzimy kréskę poziomą; następnie, zaczynając od strony prawéj, odejmujemy cyfry piérwszéj, drugiéj i t. d. kolumn od siebie, wykonywając jednocześnie, wmiarę potrzeby wyznaczenia cyfry reszty, rozkład odjemnéj na części tak, aby każda część odjemnéj nie była mniejsza od odpowiedniéj części odjemnika i aby reszty wypadłe z odjęcia jedności od jedności, dziesiątków od dziesiątków i t. d., podpisane pod kréską, pod cyframi, z odjęcia których powstały, razem uważane, odrazu utworzyły jednę liczbę, resztę. W tym celu, jeżeli która z cyfr odjemnika jest większa od odpowiedniéj cyfry odjemnéj, to tę część odjemnéj powiększamy o 10, stojącą zaś obok (ze strony lewéj) cyfrę odjemnéj zmniejszamy o 1; gdyby tą cyfrą było zero, to zamiast zera wystawiamy sobie 10, a poprzedzającą (od strony lewéj) zmniejszamy o 1 i t. d.

14. Chcąc wykonać próbę odejmowania, możemy ją oprzéć na tym, że (us. 3)

reszta + odjemnik = odjemnéj;

więc, jeżeli dobrze wykonaliśmy odejmowanie, to po dodaniu znalezionéj reszty do odjemnika, powinniśmy otrzymać odjemną. Np.

jeżeli:	to:	albo (§ 4, us. 6):
4364	1675	2689
−2689	+2689	+1675
1675,	4364	4364

(Wszelkie próby, które prowadzą za sobą pisanie liczb nowych, albo w innym porządku, winniśmy pisać na boku, albotéż na osobnym kawałku papiéru, aby nie zmniejszać wyraźności rachunku głównego). Jest to więc próba odejmowania przez dodawanie.

Opiérając się zaś na tym, cośmy mówili w ustępie 7-ym, że z liczb wchodzących do dodawania dwu składników można utworzyć dwa odejmowania (jeżeli $8-5=3$, to $8-3=5$, bo oba te odejmowania są odwrotne temuż dodawaniu $5+3=8$), możemy wykonać próbę odejmowania przez odejmowanie. Jeżeli bowiém odejmowanie jest dobrze wykonane, to, po odjęciu reszty od odjemnéj, otrzymać powinniśmy poprzedni odjemnik, np.

jeżeli:	to:
4364	4364
−2689	−1675
1675,	2689

15. Gdy mamy wykonać odejmowanie liczb mianowanych prostych, to, ponieważ (us. 3)

odjemna = odjemnikowi + reszcie,

a w dodawaniu liczb mianowanych prostych (§ 4, us. 17), suma jest wyrażona przy pomocy téj saméj (jednéj) jednostki, przy pomocy któréj są wyrażone składniki, więc:

Ażeby z odejmowania liczb mianowanych prostych otrzymać liczbę mianowaną prostą, potrzeba, aby odjemna i odjemnik były wyrażone przy pomocy téj saméj jednostki.

Reszta, wypadająca z odejmowania liczb mianowanych prostych, jest wyrażona przy pomocy téj saméj jednostki, co odjemna i odjemnik.

Gdy zatym mamy np. od 67 funtów odjąć 29 funtów, to w reszcie otrzymamy funty. Ilość zaś tych funtów będzie 67 — 29 = 38, a więc liczba oderwana, zachodząca w reszcie, powstaje z odjęcia liczby oderwanéj odjemnika od liczby oderwanéj odjemnéj. A więc: mając zadanie: od 67 funtów odjąć 29 funtów, podpiszemy 29 funtów pod 67 funtami, podkréślimy, odejmiemy liczbę oderwaną odjemnika od liczby oderwanéj odjemnéj i przy reszcie, stąd otrzymanéj, dopiszemy miano jednostki, téj saméj, jaką mamy w odjemnéj i odjemniku:

67 fun.
—29 fun.
38 fun.

Odpowiedź: z odejmowania otrzymamy 38 funtów.

16. Gdy mamy od pewnéj liczby odjąć różnicę dwu liczb, np. od 23 odjąć (us. 6) różnicę 15 — 6, co przy pomocy nawiasu (§ 4, us. 8) da się przedstawić: 23 — (15 — 6), to, aby znaléść prawidło postępowania, możemy rozumować w ten sposób. Jeżelibyśmy mieli od 23 odjąć 15, to z tego odejmowania wypadłaby pewna reszta, czyli różnica, którą możemy przedstawić (us. 6), pisząc 23 — 15. Gdy zaś w zadaniu danym, zamiast odjemnika 15 (jak w zadaniu drugim), mamy odjemnik 15 — 6, to możemy powiedzieć, że w odejmowaniu: od 23 odjąć 15, mamy zmniejszyć odjemnik 15 o 6. Skutkiem tego, jak wiemy (us. 9), reszta z tego odejmowania, t. j. różnica 23 — 15, powiększy się o 6, t. j. będzie (23 — 15) + 6. To zaś wyrażenie oznacza, że od 23 mamy odjąć 15, a do liczby, stąd otrzymanéj dodać 6, co także wprost wypada z wyrażenia bez nawiasu 23 — 15 + 6; więc [1]):

[1]) Albo nieco inaczéj: według własności b. w ustępie 9-ym, z odejmowania 23 — 15 = 8 mamy

$$23 - (15 - 6) = 8 + 6;$$

jeżeli tu zamiast 8-u napiszemy tę samę liczbę, ale w postaci (us. 6) różnicy 23 — 15, to mieć będziemy

$$23 - (15 - 6) = 23 - 15 + 6,$$

skąd widzimy, że: aby od pewnéj liczby i t. d.

$$23-(15-6)=23-15+6,$$

t. j. *aby od pewnéj liczby odjąć różnicę dwu liczb, należy od owéj liczby odjąć odjemną różnicę i do tego dodać odjemnik różnicy.*

PRÓBA DODAWANIA PRZEZ ODEJMOWANIE.

17. Ponieważ odejmowanie jest działaniem odwrotnym dodawaniu dwu składników (us. 7), więc moglibyśmy wykonać próbę dodawania dwu składników przez odejmowanie, od znalezionéj sumy odejmując jeden (którykolwiek) ze składników; wtedy, powinnibyśmy otrzymać, jako resztę, drugi składnik. Więc np.

jeżeli:	323	to:	887
	+564		−323
	887,		564

Do tegoż się sprowadza próba dodawania wielu składników przez odejmowanie. Mianowicie: wszystkie składniki sprawdzanego dodawania zastępujemy przez dwa, za jeden uważając którykolwiek z danych składników, a za drugi przyjmując sumę pozostałych składników, którą oddzielnie znaléść trzeba. Albowiém, jeżeli sumę $5+3+4+7+6=25$ uważać będziemy jako sumę dwu składników, z których jeden jest np. 7, to:

$$25=5+3+4+7+6=7+(5+3+4+6)=7+18$$

i otrzymamy $25-18=7$. Więc np.

jeżeli:	75326	to, gdy np.	75326	otrzymamy:	
	827		827		120346
	3320		3320		−79845
	40501		27		40501
	27		345		
	345		79845,		
	120346,				

Możemy także zrobić próbę dodawania przez dodawanie przy pomocy odejmowań częściowych w następujący sposób. Tak np. w powyższym przykładzie znalazszy sumę 120346;

120346 dodajemy też same składniki, wykonywając jednak dodawanie
12120 (czyto z góry na dół, czytéż odwrotnie) od strony lewéj (§ 4, us. 13). Po dodaniu cyfr piérwszéj (od strony lewéj) kolumny mamy 11, które odejmujemy od liczby 12 znalezionéj sumy, pozostaje 1, które piszemy na boku (lub na kawałku papiéru położonego pod znalezioną sumą). To 1 z następującym zerem znalezionéj sumy tworzy liczbę 10. Dodawszy cyfry drugiéj kolumny, mamy 8, które od powyższych 10 odejmujemy; pozostaje 2; przekreśliwszy

1 piszę obok 2. To 2 z następującą cyfrą 3 sumy przedstawia liczbę 23. Dodawszy cyfry trzeciéj kolumny, mamy 22; po odjęciu téj liczby od 23, pozostaje 1; przekréśliwszy 2, piszę obok 1. Ta cyfra wraz z następującą cyfrą 4 sumy daje nam liczbę 14. Dodawszy cyfry przedostatniéj kolumny, otrzymaną sumę częściową 12 odejmujemy od powyższéj liczby; pozostaje 2; przekréśliwszy 1 piszę 2. To 2 z ostatnią cyfrą sumy daje liczbę 26. Dodawszy do siebie cyfry ostatniéj kolumny i dostrzegszy, że otrzymana stąd liczba 26 jest tą samą liczbą, co powyższa, przekreślamy 2 i wnosimy tedy, że próba dobrze wypadła, albowiem suma cyfr każdéj kolumny wraz z dziesiątkami, wydzielonymi z dodania cyfr następującéj (ze strony prawéj) kolumny (§ 4, us. 14), jest należycie uwzględniona w otrzymanéj sumie.

DOPEŁNIENIE ARYTMETYCZNE.

18. Gdy mamy daną jakąkolwiek liczbę, to spośród liczb utworzonych przez 1 z zerami, większych od liczby danéj, jest jedna najbliższa, t. j. najmniejsza z nich. Tak np., dla liczby 6982 najbliższa z większych liczb utworzonych przez 1 z zerami jest 10 000.

Dopełnieniem arytmetycznym liczby danéj nazywamy różnicę między najbliższą z większych liczb, utworzonych przez 1 z zerami, a liczbą daną.

Gdy więc mamy znaléść dopełnienie arytmetyczne liczby 5 692 800, to należałoby ją odjąć od 10 000 000, t. j. wykonać odejmowanie:

10000000
— 5692800

Nadpisując nad odjemną cały rozkład jéj na części nie mniejsze od odpowiednich części odjemnika (us. 11), mieć będziemy cyfry 9 nad cyframi danéj liczby 5, 6, 9, 2, nad ostatnią zaś (od strony lewéj) znaczącą cyfrą, t. j. nad 8, mieć będziemy 10. Zamiast więc wykonać odejmowanie od strony prawéj, możemy je wykonać od strony lewéj, a nawet całkiem nie nadpisywać odjemnéj, tylko mając przed oczyma liczbę daną 5692800 wypisywać odrazu cyfry, powstające z odejmowania każdéj z początkowych (od strony lewéj) cyfr liczby danéj od 9, prócz ostatniéj cyfry znaczącéj, którą odejmiemy od 10, a nadto dopisać tyle zer, ile ich jest na końcu liczby danéj. Patrząc się więc na liczbę, wypowiadać będziemy wprost częściowe reszty 4, 3, 0, 7, 2, 0, 0 i w tym samym porządku je pisać, tak, że te cyfry utworzą nam szukane dopełnienie arytmetyczne liczby naszéj, t. j. 4 307 200. Podobnie, gdy mamy np. liczbę 939 409, patrząc się na nią wypowiadać będziemy odrazu częściowe reszty i zaraz je pisać: 0 (na początku, więc możemy go nie pisać, chyba, że i ono jest potrzebne), 6, 0, 5, 9, 1, tak, iż szukanym dopełnieniem naszéj liczby będzie liczba 60 591.

ROZDZIAŁ III.

MNOŻENIE I DZIELENIE LICZB CAŁKOWITYCH.

§ 6. MNOŻENIE.

OKREŚLENIE MNOŻENIA.

1. „Zadanie. Pewna osoba kupiła cztéry łokcie sukna, płacąc za każdy łokieć po złotych 6; wieleż dała za cztéry łokcie?

Liczba (ilość) złotych, którą ma zapłacić, składać się powinna z cztéry razy 6, a zatym ta liczha równa będzie sumie liczb cztérech jednakowych, z których każda wyrażała 6 złotych:

6 zł.
6 zł.
6 zł.
6 zł.

suma: 24 zł.

Gdyby ta osoba, zamiast łokci cztérech sukna, więcéj daleko była kupiła, trzebaby wiele czasu i miejsca do napisania 6 tyle razy, ile było łokci, a dopieroż do zebrania tego wszystkiego w jednę sumę. Do tak długiéj roboty ciężkoby równie natężonéj baczności przyłożyć i omyłki się w niéj uchronić. A trafićby się nawet mogło, że życie człowieka nie wystarczyłoby na dokończenie takim sposobem podobnéj roboty.

Szukano więc, jakby skrócić takowe dodawanie; równość liczb, mających się dodawać, skrócenie to łatwym uczyniła."[1])

Podobnych zadań, np.

Rodzina robotnika potrzebuje dziennie 4 funty chleba; ile potrzebuje funtów chleba w ciągu roku, który ma 365 dni?

Sprzedaje ktoś pszenicę, po 54 złp. korzec; po wymierzeniu okazało się pszenicy 25 korcy; ile sprzedający otrzyma złotych za tę pszenicę?

i t. d., nikt nie rozwiązuje zapomocą dodawania. Wykonywanie bowiém dodawania jednakowych składników zostało znacznie ułatwionym przez

[1]) *Arytm. dla sz. nar.*, str. 32.

wprowadzenie różnych skróceń, które były możliwe właśnie dlatego, że składniki były jednakowe.

Ponieważ zaś takie zadania, które doprowadzają do dodawania jednakowych składników, bardzo często się zdarzają, więc postępowanie skrócone w tym przypadku dodawania jest nader ważne i dlatego uważa się je za osobne d z i a ł a n i e, zwane m n o ż e n i e m. Możemy więc powiedzieć, że:

Zapomocą mnożenia krócéj wykonywamy dodawanie jednakowych składników.

2. Gdy więc mamy np. dodawanie 6+6+6+6, to mamy tu do zauważenia: powtarzający się składnik, t. j. liczbę 6, i jeszcze to, że ta liczba 6 jest wzięta jako składnik 4 razy, t. j. mamy do zauważenia drugą liczbę, wskazującą nam, ile razy 6 jest wzięte jako składnik. Powtarzający się składnik nazywamy m n o ż n ą; liczbę, wskazującą nam, ile razy mnożna jest wzięta jako składnik, nazywamy m n o ż n i k i e m; liczbę zaś, którą z mnożenia otrzymamy, t. j. sumę, która wypadłaby z dodawania, zastąpionego przez mnożenie, nazywamy w mnożeniu i l o c z y n e m.

Gdy więc np. dodawanie 6+6+6+6, t. j. dodawanie 4-ch składników, z których każdy jest 6, zastępujemy przez mnożenie, to mnożną jest liczba 6, mnożnikiem jest liczba 4, a iloczynem liczba 24, t. j. suma tego dodawania, zastąpionego przez mnożenie 6-u przez 4.

Zamiast mówić: m n o ż ę 6 p r z e z 4, z uwagi, że iloczyn (jako suma) jest zebraniem 4 razy tylu jedności, ile ich jest w mnożnéj 6, mówimy często: 6 p o w i ę k s z a m 4 r a z y [1]), albotéż: (mam, biorę, ile będzie?) 4 r a z y p o 6 j e d n o ś c i, lub krócéj [2]): 4 r a z y 6. Powiemy zatym: mnożąc 6 przez 4, otrzymam 24, albo: 4 razy 6 jest 24.

Dla oznaczenia, że dwie liczby mamy przez siebie pomnożyć, piszemy naprzód mnożną, a po niéj mnożnik, kładąc między nimi znak × albo . (kropkę w części dolnéj wiersza). Tak więc 6×4, czyli 6 . 4 czytamy: 6 pomnożone przez 4, albo: 4 razy 6. I napiszemy: 6×4=24.

Ponieważ zaś wyrażenie 6×4 przedstawia liczbę 24, iloczyn liczb 6 i 4, więc także 6×4 nazywamy często iloczynem liczb 6 i 4, t. j. wyrażenie, powstałe przez połączenie mnożnéj i mnożnika znakiem × lub . , nazywamy także iloczynem, czyli *wskazane mnożenie nazywamy często iloczynem* liczb, do tego mnożenia wchodzących.

Uwaga. Mnożną piszemy przed mnożnikiem dlatego, że ważniejszym jest wiedzieć, *co* mamy, od tego, *ile razy* to mamy, tak, iż np. 6×4

---

[1]) Należy się chronić błędnego wyrażania się: 6 powiększam o 4 razy. — Zamiast pomnożyć przez 2, pomnożyć przez 3, mówimy często: p o d w o i ć, p o t r o i ć.

[2]) Mogło na to skrócenie oddziałać także to, że mówimy: pomnożyć pewną liczbę *razy*; np. ktoś pracą a oszczędnością pomnożył swój majątek 4 razy.

niewłaściwie jest czytać: 6 razy 4, ale należy [1]) czytać: 4 razy 6 [2]), albowiém 6 razy 4 jestto: $4+4+4+4+4+4=4\times6$, gdy 4 razy 6 jest: $6+6+6+6=6\times4$ (por. us. 5).

3. Jeżeli więc mamy pomnożyć 6×4, to mamy dane dwie liczby: mnożną 6 i mnożnik 4; powinniśmy zaś znaléść iloczyn, t. j. liczbę, która by powstała z dodawania $6+6+6+6$, t. j. którąbyśmy otrzymali, biorąc mnożną jako składnik tyle razy, ile jedności jest w mnożniku. Możemy więc powiedzieć:

Mnożenie jestto działanie, zapomocą którego, mając dane dwie liczby, mnożną i mnożnik, odnajdujemy liczbę, zwaną iloczynem, którą otrzymalibyśmy z mnożnéj, biorąc ją jako składnik tyle razy, ile jest jedności w mnożniku.

Według tego, mnożnik może być jakąkolwiek liczbą z szeregu liczb naturalnych (§ 1, us. 6); może zatym w szczególnym przypadku być jednością. Mamy wtedy mnożną wziąć raz jako składnik, aby utworzyć iloczyn, np. $7\times1=7$, jest więc wtedy iloczyn = mnożnéj [3]). —

Ponieważ mnożenie jest skróconym dodawaniem jednakowych składników, więc objaśnienie mnożenia winno być oparte na tym, iż, wychodząc z dodawania jednakowych składników, dopatrywać będziemy skróceń, jakie w tym dodawaniu zrobić będzie można.

Zauważymy tu jeszcze, że rozważane tu mnożna i mnożnik są liczbami z szeregu liczb naturalnych; z tego zaś, że dodawanie składników, będących liczbami tego szeregu, doprowadza nas do sumy (iloczynu), będącego liczbą tego szeregu (§ 4, us. 2 i 5), wypada, że *iloczyn dwu liczb z szeregu liczb naturalnych jest także liczbą tego szeregu.*

TABLICZKA MNOŻENIA.

4. Jednak w przypadku, gdy *mnożna i mnożnik są liczbami jednocyfrowymi*, odszukiwanie iloczynu musi się odbywać wprost przez dodawanie. Tak np., gdy pytamy się: ile będzie 4 razy 8, to, aby odnaléść iloczyn, postąpimy tak, jakeśmy robili będąc dziećmi: odnajdziemy sumę $8+8+8+8=32$.

---

[1]) Gdy mówimy: 4 razy 6, dlatego naprzód wypowiadamy mnożnik 4, że niezręcznie jest powiedzieć: *sześć cztéry razy*, czego nawet przy pomocy cyfr napisać nie można, bo między liczbami 6 i 4 niéma powodu kłaść przecinka.

[2]) Przy początkowéj nauce należy używać wyrażeń: albo 6 wzięte 4 razy (jako składnik) albo 6 pomnożone przez 4, albo też 6 powiększone 4 razy — aby następstwo po sobie cyfr napisanych odpowiadało porządkowi, w jakim sie je w ten sposób wymawia.

[3]) Gdyby mnożna była jednością, np. 1×7, to, chociaż $1\times7=1+1+1+1+1+1+1=7$, niezawsze możemy powiedzieć, że iloczyn = mnożnikowi, gdyż to będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy mnożna 1 jest liczbą oderwaną (por. us. 6).

W ten sposób odnajdując iloczyny liczb jednocyfrowych, t. j. wykonywając dodawania, w których mnożna jest wzięta jako składnik tyle razy, ile jedności ma mnożnik, nabywamy takiéj wprawy, iż z czasem jesteśmy w stanie odrazu wypowiedzieć (bez namysłu): 4 razy 8 jest 32, albo: 5 razy 9 jest 45, i t. d.

Ponieważ zaś przy mnożeniu liczb większych iloczyny liczb jednocyfrowych wciąż nam są potrzebne, więc winniśmy kłaść nacisk na nabycie przez uczniów wprawy należytéj w wypowiadaniu bez namysłu iloczynów liczb jednocyfrowych.

Iloczyny liczb jednocyfrowych są zestawione w tak zwanéj tabliczce mnożenia:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	4	6	8	10	12	14	16	18
3	6	9	12	15	18	21	24	27
4	8	12	16	20	24	28	32	36
5	10	15	20	25	30	35	40	45
6	12	18	24	30	36	42	48	54
7	14	21	28	35	42	49	56	63
8	16	24	32	40	48	56	64	72
9	18	27	36	45	54	63	72	81

W téj tabliczce liczby, znajdujące się w którymkolwiek wiérszu poziomym (lub w któréjkolwiek kolumnie pionowéj), powstają każda z poprzedzającéj, przez dodanie liczby, w tym wiérszu (lub kolumnie) piérwszéj [1]). Tak np., w wiérszu siódmym, piérwszą liczbą jest 7; $7+7=14$ i dlatego drugą liczbą jest 14; $14+7=21$ i dlatego trzecią liczbą jest 21 i t. d. (taksamo w kolumnie siódméj). Takim sposobem w wiérszu siódmym, są liczby 7, $7+7$, $7+7+7$, $7+7+7+7$, i t. d., t. j. 7×1, 7×2, 7×3, 7×4, i t. d., t. j. iloczyny piérwszéj liczby siódmego wiérsza przez piérwsze liczby piérwszéj, drugiéj, trzeciéj, czwartéj i t. d. kolumn. Podobnie w kolumnie siódméj są postawione iloczyny piérwszéj liczby siódméj kolumny

[1]) W piérwszym przeto wierszu i w piérwszéj kolumnie są pokolei wypisane liczby od 1 do 9.

przez piérwsze liczby piérwszego, drugiego, trzeciego, czwartego i t. d. wiérszy. A więc, aby znaléść iloczyn dwu liczb jednocyfrowych [czyli, jak mówimy przez skrócenie (§ 4, us. 13): iloczyn dwucyfr], należy go szukać na przecięciu się wiérsza, którego piérwszą liczbą jest jedna z tych cyfr, z kolumną, któréj piérwszą liczbą jest druga z tych cyfr. Tak np., iloczyn 8×6 znajdziemy albo na przecięciu się wiérsza, zaczynającego się od liczby 8, z kolumną, zaczynającą się od liczby 6, albotéż na przecięciu się kolumny, zaczynającéj się od liczby 8, z wiérszem, zaczynającym się od liczby 6 [1]).

RÓŻNOŚĆ MNOŻNIKA OD MNOŻNÉJ.

5. Zauważymy, że *mnożnik ma odmienne znaczenie od mnożnéj.* Gdy *mnożna jest składnikiem*, pewnym, że tak powiemy, przedmiotem, to mnożnik oznacza tylko, ile razy mnożną mamy wziąć jako składnik, czyli *mnożnik wskazuje działanie*, które mamy wykonać na mnożnéj. Iloczyn zaś, jako suma, ma ten sam charakter, co mnożna. Zastępując mnożenie przez dodawanie, moglibyśmy uskutecznić rachunek, nie wypisując zgoła mnożnika, gdyż jeżeli np. mnożną jest 6, a mnożnikiem 4, to możemy znaléść iloczyn, nie pisząc w rachunku mnożnika, mianowicie: iloczyn $= 6+6+6+6=24$, gdy tymczasem bez wypisania mnożnéj obejść się nie możemy (por. us. 2, Uwaga).

Widoczniéj to się jeszcze przedstawi, gdy weźwiemy zadanie na mnożenie liczb mianowanych prostych. Np. pewna osoba kupiła 4 łokcie sukna, płacąc za każdy łokieć po złotych 6; wieleż dała za kupione sukno? Rozumować będziemy tak: ponieważ za jeden łokieć płaciła 6 złotych, to za 4 łokcie zapłaciła 4 *razy* więcéj (niż 6 złotych), a więc trzeba 6 *złotych* wziąć jako składnik 4 *razy*, czyli 6 *złotych* pomnożyć przez 4. Gdy mówimy: pomnożyć przez 4, to nie można tu dodać: łokcie; ta liczba 4 jest niezależną od tego, że w zadaniu odpowiadała ilość kupionych łokci. Gdybyśmy np. kupowali nie 4 łokcie sukna, ale np. 4 kaczki, płacąc za każdą po złotych 6, to również powiedzielibyśmy: trzeba 6 złotych pomnożyć przez 4. Jest więc nam wszystko jedno w mnożeniu, czemu odpowiada nasz mnożnik 4 (łokciom, czy kaczkom). — Gdy mówimy: mnożę 6 złotych przez 4, to nie możemy przy 4-ch wypowiedzieć nazwania jednostki (§ 1, us. 9), a tymczasem przy mnożnéj: 6 złotych, wypowiedzieliśmy wyraźnie: złotych — mnożnik bowiém 4 oznacza właściwie działanie, mianowicie: ile razy mnożną mamy wziąć jako skład-

[1]) Pomysł tabliczki mnożenia przypisują filozofowi starożytnéj Grecyi, Pitagorasowi, i dlatego nazywają ją tabliczką Pitagorasa.

nik. Z tego wypada, że *w mnożeniu liczb mianowanych mnożnik jest liczbą oderwaną.*

Gdy pomnożę 6 złotych przez 4,

$$6 \text{ zł.} \times 4 = 6 \text{ zł.} + 6 \text{ zł.} + 6 \text{ zł.} + 6 \text{ zł.} = 24 \text{ zł.},$$

to w iloczynie, jako sumie liczb mianowanych prostych (§ 4, us. 17), wypadły nam złote, t. j. iloczyn 24 zł., jest wyrażony przy pomocy téj saméj jednostki, co mnożna, 6 zł. A więc: *w mnożeniu liczb mianowanych iloczyn jest liczbą mianowaną, wyrażoną przy pomocy téj saméj jednostki, co mnożna* [1]). Liczba oderwana, zachodząca w iloczynie (§ 1, us. 9), jak np. w powyższym przykładzie: 24, jako iloczyn 6×4, jest niezależna od nazwania jednostki, t. j. jest iloczynem liczby oderwanéj mnożnéj, 6-u, przez mnożnik 4.

6. Jeżeli w mnożeniu liczb oderwanych mamy na myśli tylko liczbę, którą otrzymamy jako iloczyn t. j. gdy nie zaznaczamy wyraźnie, która z liczb mnożonych jest mnożną a tym samym, która jest mnożnikiem, wtedy mnożną i mnożnik nazywami czynnikami iloczynu.

ILOCZYN WIELU CZYNNIKÓW.

7. Właściwie istnieje tylko mnożenie dwu czynników, podobnie jak zasadniczym jest tylko dodawanie dwu składników (§ 4, us. 5). Ale liczbę, wypadającą np. z mnożenia 6×4, możemy sobie wystawić przedstawioną (us. 2) przez ten niewykonany iloczyn, a tymsamym tę liczbę 6×4 możemy pomnożyć jeszcze np. przez 3, t. j. $6 \times 4 \times 3$, co wyraźniéj przy pomocy nawiasu przedstawilibyśmy: $(6 \times 4) \times 3$. Jeżeli liczbę, która stąd wypadnie, wystawimy sobie jeszcze pomnożoną np. przez 5, to będziemy mieli: $6 \times 4 \times 3 \times 5$, albo wyraźniéj: $[(6 \times 4) \times 3] \times 5$. I t. d. Takie wskazane kolejne mnożenia: $6 \times 4 \times 3$, $6 \times 4 \times 3 \times 5$ i t. d. nazywamy [2]): iloczynami wielu czynników, rozumiejąc przez to liczbę, która po uskutecznieniu działań wypadnie; postępowanie zaś, mające na celu otrzymanie liczby, przedstawionéj przez iloczyn wielu czynników, nazywamy mnożeniem wielu czynników. Ono, jak widzieliśmy, sprowadza się do kilku mnożeń po dwa czynniki przez siebie — jest więc działaniem złożonym, tak, iż zasadniczym jest tylko mnożenie dwu czynników.

8. Samo się przez się rozumié, że, gdy z zadań, doprowadzających do mnożenia liczb mianowanych, nie wykonywając odrazu mnożeń, otrzymamy iloczyn wielu czynników, jeden tylko z czynników iloczynu może być liczbą mianowaną i że przy pomocy téj saméj jednostki, w któréj on jest wyrażony, jest

---

[1]) Tak iż moglibyśmy napisać 6 zł. $\times 4 = (6 \times 4)$ zł.

[2]) Podobnie, jak wskazane mnożenie dwu czynników nazywami ich iloczynem (us. 2).

również wyrażony cały iloczyn. Weźmy np. zadanie: Sążeń ma 3 łokcie; łokieć ma 2 stopy; stopa ma 12 cali; ile sążeń ma cali? Kiedy jedna stopa ma 12 cali, to 2 stopy, czyli łokieć, ma cali 2 razy więcej, t. j. 12 cali $\times$ 2, a sążeń, jako mający 3 łokcie, ma 3 razy więcéj cali niż łokieć, t. j. 3 razy więcéj niż 12 cali $\times$ 2, czyli sążeń ma 12 cali $\times$ 2 $\times$ 3. Tutaj mamy (us. 5) naprzód 12 cali $\times$ 2 = 24 cale, a następnie 24 cale $\times$ 3 = 72 cale, więc:

$$12 \text{ cali} \times 2 \times 3 = 72 \text{ cale}.$$

WŁASNOŚCI ILOCZYNU.

9. Jeżeli mamy np. 6×4, to mamy 6 wziąć jako składnik 4 razy, czyli, ponieważ 6 jest skupieniem 6-u jedności, mamy każdą z 6-u jedności wziąć jako składnik 4 razy, a w ten sposób z każdéj jedności (liczby 6) powstanie liczba 4, czyli mieć będziemy 6 razy liczbę 4, czyli liczbę 4 pomnożoną przez 6, t. j. 4×6. A więc $6 \times 4 = 4 \times 6$, t. j.

Iloczyn dwu czynników nie zależy od ich porządku,

co mamy rozumieć w ten sposób, iż przy mnożeniu dwu liczb (oderwanych) 4 i 6 przez siebie, otrzymamy tę samę liczbę z pomnożenia 6-u przez 4, co z pomnożenia 4-ch przez 6.

Rozumowanie powyższe możemy piśmiennie tak przedstawić:

$$\begin{aligned} 6 \times 4 = 6+6+6+6 = {} & 1+1+1+1+1+1 \\ & +1+1+1+1+1+1 \\ & +1+1+1+1+1+1 \\ & +1+1+1+1+1+1 \\ \hline & 4+4+4+4+4+4 = 4 \times 6 \end{aligned}$$

[6×4 oznacza, że liczbę 6 mamy wziąć jako składnik 4 razy, co piszemy; każdy składnik 6 jest sumą 6-u jedności, co wypisujemy, pisząc składniki pod sobą [1]); ponieważ suma nie zależy od porządku składników, więc te jedności możemy dodawać do siebie w dowolnym porządku; dodając je kolumnami, otrzymamy $4+4+4+4+4+4$, t. j. 6 razy 4, czyli 4×6].

10. Gdy mamy iloczyn wielu czynników, np.

$$6 \times 4 \times 3 \times 5 \times 2,$$

to ten iloczyn możemy uważać za złożony z czynnika 6, czynnika przedstawionego (us. 2) przez iloczyn 4×3 i czynników 5 i 2. A ponieważ iloczyn dwu czynników nie zależy od porządku, w jakim piszemy czynniki, więc $4 \times 3 = 3 \times 4$, a tymsamym

$$6 \times 4 \times 3 \times 5 \times 2 = 6 \times 3 \times 4 \times 5 \times 2.$$

---

[1]) Moglibyśmy wszystkie te jedności wypisać obok siebie, a następnie każde cztery jedności (zaczynając od początku, lub końca) zastąpić przez liczbę 4.

Podobnie rozumując, moglibyśmy w iloczynie $6\times3\times4\times5\times2$ przestawić między sobą np. czynniki 6 i 2; wyrażenie $3\times6\times4\times5\times2$ przedstawiałoby tę samę liczbę, co poprzednie wyrażenia, tak, iż

$$6\times4\times3\times5\times2=3\times6\times4\times5\times2,$$

i t. d. Porównywając ze sobą te i różne inne wyrażenia iloczynu, jakie otrzymalibyśmy przez kolejne przestawianie dwu obok siebie stojących czynników, przypatrując się rozmaitemu porządkowi, w jakim te same czynniki w dwu różnych wyrażeniach po sobie następują, widzimy, że w ogóle:

Iloczyn nie zależy od porządku czynników.

Jeżeli mamy np. iloczyn $6\times4\times3\times5\times2\times7$, a chcemy w nim częściowy iloczyn np. $4\times3\times2$ zastąpić przez wykonany iloczyn $4\times3\times2=24$ i postawić go np. po czynniku 5, to możność zrobienia tego udowodnimy w sposób następujący. Wiemy, że iloczyn nie zależy od porządku czynników, oraz, że, mając wskazany iloczyn kilku czynników, należy właściwie (us. 7) piérwszy jego czynnik pomnożyć przez drugi, otrzymany iloczyn przez trzeci i t. d. Mamy zatym:

$$6\times4\times3\times5\times2\times7=4\times3\times2\times6\times5\times7=12\times2\times6\times5\times7=$$
$$=24\times6\times5\times7=6\times5\times24\times7.$$

Podobnie, jeżeli w danym iloczynie chcemy czynniki 6, 3 i 2 zastąpić przez ich iloczyn wykonany, stawiając go na końcu, i miéć jednocześnie na początku iloczyn 5-u i 4-ch, to możemy uzasadnienie tego tak przeprowadzić:

$$6\times4\times3\times5\times2\times7=6\times3\times2\times5\times4\times7=18\times2\times5\times4\times7=$$
$$=36\times5\times4\times7=5\times4\times7\times36=20\times7\times36,$$

t. j. $6\times4\times3\times5\times2\times7=(5\times4)\times7\times(6\times3\times2)=20\times7\times36.$

Widzimy więc, że *w iloczynie (wskazanym) kilku czynników, możemy dowolnie wybrane czynniki zastępować przez wykonane ich iloczyny.*

11. Tego, że iloczyn nie zależy od porządku czynników, można ściśle [1]) dowieść w sposób następujący. Dowiedliśmy już (us. 9), że

a) *Iloczyn dwu czynników nie zależy od ich porządku.*

Na mocy tego łatwo będzie wyprowadzić, że

b. *Iloczyn nie zmienia się, gdy zmieniamy porządek dwu jego piérwszych czynników.* Np. $6\times4\times3\times5\times2$ ma być tą samą liczbą, co $4\times6\times3\times5\times2$. W piérwszym bowiém razie mamy liczbę, przedstawioną przez iloczyn 6×4, pomnożyć pokolei przez czynniki 3, 5, 2; w drugim zaś razie mamy liczbę, przedstawioną przez iloczyn 4×6, pomnożyć w téj saméj kolei przez też same czyn-

[1]) W początku us. 10-go nie było należycie uzasadnione dlaczegowzięty tam iloczyn możemy uważać za złożony z czynnika 6, czynnika przedstawionego przez iloczyn 4×3...

niki 3, 5, 2. A że iloczyny 6×4 i 4×6, ma mocy własności a., przedstawiają tę samę liczbę, więc mnożymy przez 3, 5, 2 w obu razach tę samę liczbę, przez co dochodzimy w obu razach do téj saméj liczby, t. j.

$$6\times4\times3\times5\times2=4\times6\times3\times5\times2.$$

c. *Iloczyn trzech czynników nie zmienia się, gdy przestawimy między sobą dwa ostatnie jego czynniki.* Np. $6\times3\times4$ ma być tą samą liczbą, co $6\times4\times3$. W iloczynie $6\times3\times4$ liczbę 6×3 możemy uważać jako mnożną, liczbę zaś 4 jako mnożnik; więc iloczyn $6\times3\times4$ oznacza, iż liczbę 6×3 mamy wziąć cztéry razy jako składnik. Każdy znowu z tych cztérech iloczynów 6×3, jako iloczyn mnożnéj 6 przez mnożnik 3, oznacza, iż mnożna 6 ma być wzięta trzy razy jako składnik. Mamy więc, pisząc każdy z cztérech składników 6×3, po zastąpieniu go przez sumę, w oddzielnym wiérszu, a następnie, (na zasadzie, że suma nie zależy od porządku składników), po zebraniu wypisanych składników kolumnami:

$$6\times3\times4=6\times3+6\times3+6\times3+6\times3=\begin{array}{ccc}6&+6&+6\\+6&+6&+6\\+6&+6&+6\\+6&+6&+6\\\hline\end{array}$$

$$6\times4+6\times4+6\times4=6\times4\times3$$

(bo wypadło nam, że liczbę 6×4 mamy wziąć 3 razy jako składnik). Zatym

$$6\times3\times4=6\times4\times3.$$

d. *Iloczyn nie zmienia się, gdy przestawimy między sobą dwa ostatnie jego czynniki.* Np. $6\times4\times3\times5\times2$ ma być tą samą liczbą, co $6\times4\times3\times2\times5$. W obu razach mamy 6 pomnożyć przez 4, a następnie przez 3; liczbę, którą w ten sposób otrzymamy, nazwijmy L. Raz więc trzeba liczbę L pomnożyć przez 5, a późniéj przez 2, t. j. $L\times5\times2$, drugim zaś razem trzeba tę samę liczbę L pomnożyć przez 2, a późniéj przez 5, t. j. $L\times2\times5$. Lecz na mocy własności c. jest $L\times5\times2=L\times2\times5$. Że zaś w obu tych wypadkach liczba L jest tymsamym, mianowicie liczbą, przedstawioną przez iloczyn $6\times4\times3$, więc zamiast L pisząc to jéj wyrażenie, mamy

$$6\times4\times3\times5\times2=6\times4\times3\times2\times5.$$

e. Iloczyn nie zmienia się, gdy przestawimy między sobą którekolwiek dwa czynniki sąsiednie. Np. $6\times4\times3\times5\times2\times7$ ma być tą samą liczbą, co $6\times4\times5\times3\times2\times7$. Na mocy własności d. mamy $6\times4\times3\times5=6\times4\times5\times3$, t. j. oba te iloczyny przedstawiają tę samę liczbę. Mnożąc te dwa wyrażenia téj saméj liczby przez 2, a następnie przez 7, dojdziemy do téj saméj liczby, t. j.

$$6\times4\times3\times5\times2\times7=6\times4\times5\times3\times2\times7.$$

f. *Nie zmieniając iloczynu, możemy którykolwiek jego czynnik sprowadzić na miejsce piérwsze, którykolwiek z pozostałych na drugie i t. d.* Opiérając się bowiém na własności e., możemy dopóty pewien czynnik, który chcemy sprowadzić na

miejsce piérwsze, wciąż przemieszczać z każdym czynnikiem, który obok niego z lewéj strony znajdować się będzie, dopóki się on nie znajdzie na piérwszym miejscu. Podobnie będziemy postępować z czynnikiem, który chcemy widzieć na miejscu drugim i t. d. W taki sposób zawsze *możemy ustawić czynniki iloczynu w dowolnym porządku*, nie zmieniając jego wartości, czyli

Iloczyn nie zależy od porządku czynników

12. Z téj własności (us. 10) wypada, że

Aby iloczyn pomnożyć przez pewną liczbę. można przez tę liczbę pomnożyć którykolwiek z jego czynników. Np., aby iloczyn $6\times4\times3\times5=$ $=360$ pomnożyć przez 2, można np. czynnik 4 pomnożyć przez 2. Gdyż $360\times2=6\times4\times3\times5\times2$, ten zaś iloczyn, z uwagi, że iloczyn nie zależy od porządku czynników, możemy napisać $4\times2\times6\times3\times5$ albo (us. 7) $4\times2\times6\times3\times5=(4\times2)\times6\times3\times5$ stąd uważając iloczyn 4×2 za jednę liczbę i przestawiając czynniki otrzymamy: $6\times(4\times2)\times3\times5$ czyli $6\times8\times3\times5$, tak iż $360\times2=6\times8\times3\times5$.

I nawzajem: *jeżeli którykolwiek czynnik iloczynu mnożymy przez pewną liczbę, to tymsamym ten iloczyn przez tę liczbę mnożymy*, bo jeżeli np. $6\times4\times3\times5=360$, to

$$6\times(4\times2)\times3\times5=(4\times2)\times6\times3\times5=4\times2\times6\times3\times5=$$
$$=6\times4\times2\times3\times5=6\times4\times3\times5\times2=$$
$$=(6\times4\times3\times5)\times2=360\times2.$$

Jeżeli zamiast, mówić „pomnożyć przez pewną liczbę", powiemy „powiększyć pewną ilość razy" (us. 2), to powyższe własności możemy tak wysłowić: *aby iloczyn powiększyć pewną ilość razy, można którykolwiek z jego czynników powiększyć tęż samę ilość razy, i: jeżeli którykolwiek czynnik iloczynu powiększamy pewną ilość razy, to skutkiem tego iloczyn powiększa się tęż samę ilość razy.*

13. Gdy więc mamy np. iloczyn liczb 5 i 3 pomnożyć przez liczbę 6, to możemy przez tę liczbę 6 pomnożyć albo wprost liczbę, przedstawioną przez iloczyn 6×3, albotéż przez 6 pomnożyć jeden z jego czynników, a liczbę, stąd otrzymaną, pomnożyć przez drugi czynnik. Te sposoby otrzymywania liczby, przedstawionéj przez iloczyn $5\times3\times6$, możemy, przy pomocy nawiasów, tak uwydatnić:

$$(5\times3)\times6=5\times(3\times6)=(5\times6)\times3.$$

Ilość tych sposobów przedstawienia i otrzymania iloczynu $6\times4\times5$ znacznie się powiększy, gdy przestawiać będziemy między sobą czynniki (jakto łatwo widzieć przez zastąpienie w § 4 ustępie 9-ym znaków + przez znaki $\times$). — Ilość sposobów otrzymania iloczynu czterech czynników będzie znacznie większą. I t. d. — Moglibyśmy (podobnie jak w dodawaniu, § 4, us. 9) powiedzieć: *mnożenie trzech lub więcéj czynników możemy uskutecznić przy pomocy mnożeń częścio-*

wych którychkolwiek czynników, wziętych w jakimkolwiek porządku (porównaj drugą część us. 10-go, str. 64).

WŁASNOŚCI SUMY.

14. Jeżeli np. liczbę, przedstawioną przez sumę $4+5+6=15$ mamy pomnożyć przez 3, t. j. [1]) $(4+5+6)\times 3$, to należy sumę $4+5+6$ wziąć 3 razy jako składnik: $4+5+6+4+5+6+4+5+6$; a że dodawanie wielu składników może być uskutecznione przy pomocy częściowych dodawań składników, wziętych w jakimkolwiek porządku (§ 4, us. 9), więc tę sumę możemy zastąpić przez sumy częściowe: jednę składników 4, drugą składników 5, trzecią składników 6, $(4+4+4)+(5+5+5)+(6+6+6)$; tu $4+4+4=4\times 3$; $5+5+5=5\times 3$; $6+6+6=6\times 3$, tak iż zastąpiwszy sumy częściowe przez te iloczyny, zamiast naszéj sumy miéć będziemy: $4\times 3+5\times 3+6\times 3$. Postępowanie to tak się piśmiennie przedstawi:

$$15\times 3=(4+5+6)\times 3=4+5+6+4+5+6+4+5+6$$
$$=(4+4+4)+(5+5+5)+(6+6+6)=4\times 3+5\times 3+6\times 3.$$

A więc:

Aby sumę pomnożyć przez pewną liczbę [2]), *można wszystkie składniki sumy pomnożyć przez tę liczbę.*

Jeżeli w iloczynach $(4+5+6)\times 3$, 4×3, 5×3, 6×3 zmienimy porządek czynników (us. 9), to otrzymamy: $3\times(4+5+6)=3\times 4+3\times 5+3\times 6$, czyli:

Aby liczbę daną pomnożyć przez sumę kilku liczb, można liczbę daną pomnożyć przez każdy ze składników tej sumy i otrzymane iloczyny do siebie dodać.

Nawzajem: *jeżeli wszystkie składniki sumy mnożymy przez pewną* (tę samę) *liczbę, to skutkiem tego sumę przez tęż liczbę mnożymy*, a także: *jeżeli daną liczbę mnożymy przez każdy ze składników pewnéj sumy i te iloczyny do siebie dodamy, to tymsamym liczbę daną mnożymy przez tę sumę.* Bo np. jeżeli, mając sumę $4+5+6=15$, pomnożymy każdy jéj składnik np. przez 3, to $4\times 3+5\times 3+6\times 3=4+4+4+5+5+5+6+6+6=(4+5+6)+(4+5+6)+(4+5+6)=(4+5+6)\times 3=15\times 3$,

t. j. $4\times 3+5\times 3+6\times 3=(4+5+6)\times 3$,

a także (us. 9) $3\times 4+3\times 5+3\times 6=3\times(4+5+6)$.

---

[1]) Gdybyśmy bez nawiasu napisali $4+5+6\times 3$, toby to nie oznaczało, że liczbę $4+5+6$ mamy pomnożyć przez 3, lecz tylko: liczbę 6 pomnożyć przez 3 i ten iloczyn dodać do sumy $4+5$.

[2]) Albo: powiększyć pewną ilość razy.

WŁASNOŚCI RÓŻNICY.

15. Z dodawania dwu składników, np. $4+2=6$, możemy przejść do odejmowania (§ 5, us. 7), np. $6-4=2$. Na mocy zaś dowiedzionych w ustępie poprzedzającym własności, mamy np. $4\times8+2\times8=6\times8$; z tego zaś dodawania dwu składników: $(4\times8)+(2\times8)=(6\times8)$ możemy przejść do odejmowania: $(6\times8)-(4\times8)=(2\times8)$, czyli pisząc bez nawiasów (któreśmy dodali tylko dla uwydatnienia, że tak w dodawaniu jak i w odejmowaniu, zachodzą tylko trzy liczby), $6\times8-4\times8=2\times8$. Jeżeli zaś tu w iloczynie 2×8 zamiast liczby 2 napiszemy (powyżéj przywiedzione) jéj wyrażenie przez liczby odejmowania pierwotnego, t. j. napiszemy (§ 5, us. 6) różnicę $6-4$, to ostatnie odejmowanie możemy napisać tak:

$$6\times8-4\times8=(6-4)\times8, \text{ albo: } (6-4)\times8=6\times8-4\times8,$$

t. j. *ażeli odjemną i odjemnik mnożymy przez tę samę liczbę, to skutkiem tego różnicę przez tę liczbę mnożymy*, i: *aby różnicę dwu liczb pomnożyć przez pewną liczbę, można odjemną i odjemnik pomnożyć przez tę liczbę.*

Z tój własności robimy niekiedy użytek przy wykonywaniu mnożenia. Tak np., gdy mamy liczbę 2359 pomnożyć przez 9, to z uwagi, że $9=10-1$,

$$2359\times9=2359\times(10-1)\times1=2359\times10-2359, \text{ albo np.}$$
$$8995\times7=(9000-5)\times7=9000\times7-5\times7,$$
$$4326\times998=4326\times(1000-2)=4326\times1000-4326\times2, \text{ i t. d.}$$

ILOCZYNY SUMY PRZEZ SUMĘ.

16. Mamy dwie sumy, np. jednę $4+5+6$, drugą $8+9$; chcemy je przez siebie pomnożyć: $(4+5+6)\times(8+9)$. Jeżeli jednę z nich, $4+5+6$, będziemy uważać (§ 4, us. 6) jako przedstawienie liczby, to, aby tę liczbę pomnożyć przez sumę $8+9$, można ją pomnożyć przez każdy ze składników sumy $8+9$ i otrzymane iloczyny do siebie dodać (us. 14), t. j. $(4+5+6)\times8+(4+5+6)\times9$. W tych iloczynach mamy sumę $4+5+6$ pomnożyć raz przez liczbę 8, a drugim razem przez liczbę 9, co możemy uskutecznić, mnożąc każdy składnik sumy $4+5+6$ przez te liczby (us. 14), tak iż otrzymamy $4\times8+5\times8+6\times8+4\times9+5\times9+6\times9$. Mamy więc:

$$(4+5+6)\times(8+9)=4\times8+5\times8+6\times8+4\times9+5\times9+6\times9$$

(i rzeczywiście $15\times17=32+40+48+36+45+54$), t. j. *aby dwie sumy przez siebie pomnożyć, można każdy składnik jednéj sumy pomnożyć przez każdy składnik drugiéj, a otrzymane iloczyny częściowe do siebie dodać* [1]).

---

[1]) Na tej własności ogólnéj opiera się wykonywanie mnożenia (por. us. 20, 24).

Gdybyśmy mieli trzy lub więcéj sum przez siebie pomnożyć, to sumę częściowych iloczynów, otrzymaną z pomnożenia dwu tych sum, pomnożylibyśmy w ten sam sposób przez trzecią i t. d.

WYKONYWANIE MNOŻENIA.

17. Gdy idzie o wykonywanie mnożenia, to, jakeśmy mówili (us. 4), należy przedewszystkim postarać się o to, aby nabrać należytéj wprawy w wypowiadaniu odrazu iloczynów liczb jednocyfrowych.

Gdy zaś już tę wprawę posiadamy, to tymsamym wiedzieć będziemy, że np. 5 dziesiątków $\times 7$ jest 35 dziesiątków, t. j., że gdy mamy 50×7, trzeba 35 tak napisać, aby cyfra 5 znalazła się na miejscu drugim (od strony prawéj) (§ 3, us. 9), a więc na miejscu piérwszym należy postawić zero (§ 3, us. 11); jest więc: $50 \times 7 = 350$. Podobnie, gdy mamy np. 800×4, czyli 8 setek $\times$ 4, to otrzymamy 32 setki (§ 3, us. 10), więc $800 \times 4 = 3200$. Taksamo $5000 \times 8 = 40000$ i t. d. [1]).

Mieliśmy tu pomnożyć przez siebie dwie liczby, z których jedna była wyrażona przez cyfrę znaczącą z zerami, np. 800, druga zaś była liczbą jednocyfrową, np. 4. Iloczyn wyrażony został przez liczbę otrzymaną z pomnożenia cyfry znaczącéj jednego czynnika przez czynnik jednocyfrowy, $8 \times 4 = 32$, do któréj to liczby dopisaliśmy dwa zera, t. j. zera, znajdujące się przy cyfrze znaczącéj w czynniku piérwszym; otrzymaliśmy 3200. A zatym wogóle,

Aby pomnożyć liczbę, wyrażoną przez cyfrę znaczącą z zerami, przez liczbę jednocyfrową, do (wiadomego z tabliczki mnożenia) *iloczynu czynnika jednocyfrowego i cyfry znaczącéj dopisujemy zera, znajdujące się przy téj cyfrze.*

18. Weźmy zadanie na mnożenie jakiéjkolwiek liczby wielocyfrowéj przez jednocyfrową, np. 692×4. Mamy więc tu znaléść (us. 3) liczbę, którą otrzymalibyśmy z mnożnéj 692, biorąc ją 4 razy jako składnik. Wykonajmy to dodawanie (§ 4, us. 14):

692	oczywiście, że, wprawiwszy się już w wypowiadanie
692	odrazu iloczynów liczb jednocyfrowych, zamiast
692	dodawać do siebie powoli 4 składniki 2, mówimy
692	odrazu: 4 razy 2 jest 8, a tę cyfrę 8 podpisujemy
2768	pod kréską, pod cyframi dodanéj kolumny, t. j.

pod cyframi 2 (składników); podobnie daléj, zamiast dodawać do siebie 4 składniki 9, mówimy odrazu: 4 razy 9 jest 36, podpisujemy 6 pod cy-

[1]) Możnaby tu powiedzieć: ponieważ iloczyn nie zależy od porządku czynników (us. 9), więc i: $7 \times 50 = 350$; $4800 = 3200$ i t. d.; ten przypadek jednak, obecnie jeszcze nam niepotrzebny, będzie ogólniéj traktowany w ustępie 23-im.

frami 9 (składników), a 3 dodajemy wraz z cyframi kolumny trzeciéj, przy dodawaniu których znów mówimy krótko: 4 razy 6 jest 24; 24+3=27, co podpisujemy tak, aby 7 było pod cyframi 6.

Jeżeli zaś zamiast wypisywać składnik 692 cztéry razy, napiszemy go raz, a pod nim (aby była blisko) napiszemy [1]) liczbę 4, która nam oznaczać będzie, że powinniśmy sobie w umyśle wystawić liczbę 692 wypisaną 4 razy, czyli 4 razy wziętą jako składnik (t. j. pod mnożną 692 podpisujemy mnożnik 4), a pod liczbą 4 poprowadzimy kréskę poziomą (jak w dodawaniu, t. j. dla oddzielenia liczb danych od szukanéj) i zupełnie taksamo będziemy postępowali, jak poprzednio,

692 to mówić będziemy: 4 razy 2 jest 8, piszę 8 pod
×4 cyfrą 2 (mnożnéj); 4 razy 9 jest 36, piszę 6 pod
2768 cyfrą 9 (mnożnéj), a 3 dodam do tego, co otrzymam z uwzględnienia cyfry 6; 4 razy 6 jest 24; 24+3=27, co piszę tak aby 7 było pod cyfrą 6 (mnożnéj). Widzimy więc, że mnożenie liczby wielocyfrowéj przez jednocyfrową wykonywa się zupełnie tak, jak dodawanie kilku jednakowych składników. Tylko: w dodawaniu mamy te składniki wyraźnie wypisane wszystkie, gdy tymczasem w mnożeniu skracamy sobie postępowanie, pisząc raz tylko, (powtarzający się) składnik i pod nim podpisując liczbę, oznaczającą, ile takich składników powinniśmy sobie wystawić wypisanych. Tym się także objaśnia, dlaczego to mnożenie zaczynamy tak jak dodawanie (§ 4, us. 13): od strony prawéj.

Podobnie: mnożenie np. 740 593×5 jest takim samym postępowaniem, jak dodawanie 5-u składników 740 593:

```
740593
740593
740593
740593
740593
740593
3702965
```

```
740593
×5
3702965
```

tak w jednym bowiem, jak i w drugim działaniu mówimy: 5 razy 3 jest 15, piszę 5 pod 3, a 1 pozostaje do dodania dalszego; 5 razy 9 jest 45, 45+1=46, piszę 6 pod 9, a 4 pozostaje do dodania; 5 razy 5 jest 25, 25+4=29, piszę 9 pod 5, a 2 pozostaje do dodania dalszego, lecz stawiamy to 2 odrazu obok (t. j. pod 0), bo prócz tych 2-u niéma niczego innego do oznaczenia na tym miejscu; daléj: 5 razy 4 jest 20, stawiam 0 (§ 3, us. 11) pod 4, a 2 pozostaje do dodania, 5 razy 7 jest 35, 35×2=37, którąto liczbę piszę tak, aby jéj cyfra 7 była pod 7.

[1]) Wszystko jest jedno, pod którą cyfrą mnożnéj podpiszemy mnożnik, bo on nam tylko symbolizuje dodawanie, odmienne ma od mnożnéj znaczenie (us. 5); zwykle jednak mnożnik jednocyfrowy piszemy pod piérwszą od strony prawéj cyfrą znaczącą mnożnéj.

17. Widzimy więc wogóle, że postępowanie przy mnożeniu liczby wielocyfrowéj przez jednocyfrową możemy ująć w następujące prawidło:

Aby pomnożyć liczbę wielocyfrową przez jednocyfrową, podpisujemy mnożnik pod mnożną i, przeprowadziwszy pod mnożnikiem kréskę poziomą, mnożymy zaczynając od strony prawéj, każdą cyfrę znaczącą [1]) *mnożnéj przez mnożnik; jeżeli z takiego mnożenia częściowego wypadnie iloczyn nie większy od 9, to podpisujemy go pod kréską pod mnożoną cyfrą mnożnéj; jeżeli zaś ten iloczyn jest większy od 9, to z otrzymanéj liczby oddzielamy dziesiątki, a pozostałą część podpisujemy pod kréską pod mnożoną cyfrą mnożnéj, cyfrę zaś dziesiątków dodamy do iloczynu powstałego z mnożenia następującéj cyfry mnożnéj przez mnożnik; na niezajętyah zaś miejscach* (jeżeli one będą), *piszemy zera.*

20. Możemy dojść do tegoż prawidła, nie posiłkując się sposobem wykonywania dodawania, ale bezpośrednio, opiérając się na tym, cośmy o mnożeniu (us. 3) powiedzieli.

Mamy np. pomnożyć 697×4, t. j. wziąć 697 cztéry razy jako składnik: $697+697+697+697$; a ponieważ możemy każdą liczbę tak rozłożyć na składniki, jak nam to będzie najdogodniéj (§ 4, us. 10), więc możemy każdy z tych składników rozłożyć (najprościéj) na setki, dziesiątki i jedności: $697 = 600+90+7$, a podstawiwszy te rozkłady, możemy wskazane dodawanie wykonać przy pomocy dodawań częściowych którychkolwiek składników, wziętych w jakimkolwiek porządku (§ 4, us. 9); oddzielnie więc możemy wykonać dodawania częściowe setek, oddzielnie dziesiątków, oddzielnie jedności, a otrzymane wypadki do siebie dodać; przedstawimy to w ten sposób:

$$\begin{array}{rrrr} 697\times 4 = 697+697+697+697 = & 600 & +90 & +7 \\ & +600 & +90 & +7 \\ & +600 & +90 & +7 \\ & +600 & +90 & +7 \\ \hline & 600\times 4 & +90\times 4 & +7\times 4 \end{array}$$

(wykonywając częściowe dodawanie setek, mieliśmy 600 wziąć 4 razy jako składnik, a więc napisaliśmy 4 razy 600: taksamo powstało 90×4 i 7×4). A więc:

$$697\times 4 = 600+4+90\times 4+90\times 4+7\times 4,$$

t. j., aby pomnożyć 697×4, należy, wogóle mówiąc, 697 rozłożyć w naj-

---

[1]) Tylko cyfry znaczące się mnoży, zera zaś się nie mnoży, gdyż zero w arytmetyce nie przedstawia liczby; przy wypisywaniu zaś cyfr znaczących w iloczynie na miejscach przez nie zajętych piszemy zera (§ 3, us. 11.)

dogodniejszy sposób na części, każdą z tych części pomnożyć przez 4 i otrzymane iloczyny częściowe do siebie dodać [1]).

Możemy więc ogólnie powiedzieć, że *wykonywanie mnożenia w przypadku, gdy mnożna jest liczbą wielocyfrową, a mnożnik jednocyfrową, polega na rozłożeniu mnożnéj w najdogodniejszy sposób na części, pomnożeniu każdéj części mnożnéj przez mnożnik i dodaniu do siebie otrzymanych iloczynów częściowych* [2]).

Należy nam tu wykonać częściowe mnożenia: 600×4, 90×4 i 7×4, a iloczyny stąd powstałe do siebie dodać; mamy więc (us. 17):

$$\begin{array}{r} 600\times4=2400 \\ 90\times4=\ 360 \\ 7\times4=\ \ 28 \\ \hline 2788 \end{array}$$

czyli

$$\begin{array}{r} 697 \\ \times4 \\ \hline 2400 \\ 360 \\ 28 \\ \hline 2788 \end{array}$$

Tak właśnie pamięciowo wykonywamy mnożenie; mając pomnożyć 697×4 mówimy mam 697 pomnożyć przez 4, t. j. 600 pomnożyć przez 4, 90 pomnożyć przez 4 i 7 pomnożyć przez 4, a to, co otrzymamy, dodać do siebie; więc 600 przez 4 jest 2400; 90 przez 4 jest 360; 2400 i 360 jest 2760; 7 przez 4 jest 28; 2760 i 28 jest 2788, a więc z pomnożenia 697-u przez 4 otrzymujemy 2788.

Wracając się do piśmiennego wykonywania mnożenia, zauważymy, że w wypisanym dodawaniu nad cyfrą 8 mamy zera innych składników, więc cyfra ta znajdzie się w sumie, t. j. piérwsza cyfra (od strony prawéj) szukanego iloczynu zależy od piérwszéj cyfry iloczynu częściowego cyfry 7 mnożnéj przez mnożnik; podobnież, druga cyfra szukanego iloczynu zależy od ilości dziesiątków, które pozostały z mnożenia częściowego cyfry 7 mnożnéj przez mnożnik i od piérwszéj cyfry iloczynu częściowego cyfry 9 mnożnéj przez mnożnik, i t. d. [3]). Nie mamy więc potrzeby wypisywania oddzielnie składników 2400, 360, 28, ale, zaczynając od mnożenia 7-u przez 4 i mnożąc następnie 9 (na drugim miejscu) przez 4, a potym 6 (na trzecim) przez 4, wypiszemy odrazu sumę, t. j. szukany iloczyn 2788; a więc rachunek krótko i wyraźnie przedstawimy, pisząc

---

[1]) Na mocy dowiedzionego w ustępie 14-ym możemy wprost powiedzieć: mając 697×4, rozkładam (§ 4, us. 10 na części $697=600+90+7$, i sprowadzam rzecz do (us. 14):
$$697\times4=(600+90+7)\times4=600\times4+90\times4+7\times4.$$

[2]) Jestto inne wyrażenie piérwszéj z własności dowiedzionych w ustępie 14-tym.

[3]) Objaśnia się tym sposobem bezpośrednio, dlaczego to mnożenie zaczynamy od strony prawej.

$$\begin{array}{r} 697 \\ \times\ 4 \\ \hline 2788 \end{array}$$

co nas doprowodza do prawidła już wypowiedzianego (us. 19).

21. Gdy mamy jakąkolwiek liczbę pomnożyć przez 10, np. 305×10, to mamy 305 jedności wziąć jako składnik 10 razy czyli z każdéj jedności z tych 305-u jedności, jako wziętéj 10 razy jako składnik, powstanie dziesięć jedności, t. j. dziesiątek. Otrzymujemy więc 305 dziesiątków, które trzeba napisać tak, aby cyfra 5 była na miejscu drugim od strony prawéj; aby więc zająć piérwsze miejsce, potrzeba na nim umieścić zero. Jest więc $305\times10=3050$, t. j., aby liczbę pomnożyć przez 10, należy do niéj dopisać zero. Jeżeli mamy 305×100, to podobnież należy 305 jedności wziąć jako składnik 100 razy; z każdéj więc z 305-u jedności, jako wziętéj 100 razy jako składnik, pozostanie sto jedności, t. j. setka. Otrzymujemy zatym 305 setek. Aby zaś tę liczbę napisać, trzeba się postarać o to, aby cyfra 5 znalazła się na miejscu trzecim od strony prawéj, i dlatego na piérwszych dwu miejscach, aby je zająć, należy napisać zera. Jest więc $305\times100=30500$, t. j., aby liczbę pomnożyć przez 100 należy do niéj dopisać dwa zera [1]). I t. d.

Z tego, cośmy mówili w us. 17-m i 19-m, łatwo wyprowadzić, że [2]) $10\times227=2270$; $10000\times350=3\,500\,000$ i t. d.

Możemy więc powiedzieć że:

Aby pomnożyć przez siebie dwa czynniki, z których jeden jest przedstawiony przez jedność z zerami, należy przypisać wszystkie jego zera do drugiego czynnika z prawéj strony [3]).

22. Z tego jeszcze wypada, że liczbę np. 40 możemy uważać jako powstałą z pomnożenia 4 przez 10, a więc $40=4\times10$; podobnie $1000=100\times10=10\times10\times10$; $14500=1450\times10=145\times100=145\times10\times10$, i t. d.

Jeżeli więc, mając np. liczbę 30568, przedstawimy ją jako (§ 4, us. 10) sumę, $30568=30000+500+60+8$, a do trzech piérwszych części zastosujemy tu powyższe wyrażenia, to miéć będziemy

$$30568=3\times10000+5\times100+6\times10+8,$$

$$30568=3\times10\times10\times10\times10+5\times10\times10+6\times10+8,$$

albo jeszcze (us. 3)

---

[1]) Przy wykonywaniu pamięciowym postępujemy podobnie.

[2]) Wyprowadzić zaś to można także z tego, co tu (us. 21) wyżéj mówimy opiérając się na tym, że iloczyn nie zależy od porządku czynników.

[3]) Mówimy także: aby liczbę powiększyć np. 10 000 razy, należy do niéj dopisać cztery zera i t. d.; i jeżeli do liczby dopiszemy np. dwa zera, to ją powiększamy 100 razy i t. d.

$$30568 = 3\times10000+5\times100+6\times10+8\times1,$$
$$30568 = 3\times10\times10\times10\times10+5\times10\times10+6\times10+8\times1.$$

23. Gdy mamy wykonać mnożenie jakiéjkolwiek liczby przez liczbę wyrażoną przez cyfrę znaczącą z zerami, np. 305×700, to, ponieważ $700 = 7\times100$, zadanie nasze sprowadza się do odszukania iloczynu $305\times7\times100$, t. j. trzeba naprzód (us. 7) wykonać mnożenie 305×7, a iloczyn, stąd otrzymany, pomnożyć przez 100 [1]), czyli do iloczynu $305\times7 = 2135$ dopisać (us. 21) dwa zera; otrzymujemy 213 500.

Możemy to nieco inaczéj objaśnić w ten sposób. Mamy 305×700, t. j. 305 wziąć jako składnik 700 razy. Wyobraźmy sobie, żeśmy wypisali tę sumę 700-t składników 305. Ponieważ dodawanie wielu składników możemy zastąpić przez dodawanie częściowe (§ 4, us. 9), więc możemy oddzielnie do siebie dodać piérwsze 7 składników, oddzielnie dalsze 7 i t. d., t. j. nasze dodawanie zastąpimy przez 100 dodawań częściowych, z których każde, jako dodawanie 7-u składników 305, może być zastąpione przez mnożenie 305-u przez 7; iloczyn zaś ten $305\times7 = 2135$ mamy wziąć 100 razy jako składnik, czyli pomnożyć go przez 100, a więc (us. 21) dopisać doń dwa zera; otrzymujemy 213 500.

Gdy w tym przypadku podpisujemy mnożnik pod mnożną dla wykonania mnożenia, zwykle podpisujemy go tak, aby cyfra znacząca mnożnika była pod jednościami mnożnéj [2]):

$$\begin{array}{r} 305 \\ \times\ 700 \\ \hline 213500 \end{array}$$

i mnożymy naprzód przez cyfrę znaczącą mnożnika, t. j. przez 7 (us. 19), a następnie do otrzymanego stąd iloczynu, t. j. do 2135, dopisujemy dwa zera.

Możemy więc powiedzić, że:

Aby pewną liczbę pomnożyć przez cyfrę znaczącą z zerami, mnożymy ją naprzód przez tę cyfrę znaczącą, a do otrzymanego iloczynu dopisujemy z prawéj strony tyle zer, ile ich jest przy téj cyfrze w mnożniku.

Gdy więc mamy np, 697×40000, to powyższe prawidło możemy tak (us. 6) przedstawić: $(697\times4)\times10000$. Lecz (us. 20) wiemy, że $697\times4 = 600\times4+90\times4+7\times4$, więc

$$697\times40000 = (697\times4)\times10000 = (600\times4+90\times5+7\times4)\times10000,$$

co dokładnie przedstawia szczegóły postępowania przy wykonywaniu mnożenia 697-u przez 40000.

Gdy chcemy np. 400×60, to (us. 22, 10):

$$400\times60 = 4\times100\times6\times10 = 4\times6\times100\times10 = 4\times6\times1000 = 24\times1000 = 24000,$$

---

1) Tak właśnie będziemy wykonywali pamięciowe mnożenia 305-u przez 700.

2) Możemy bowiem tak podpisywać mnożnik pod mnożną, jak nam to najdogodniéj (por. us. 18 i 5).

Jeżeli zaś mamy np. 69700×4000, to podobnież możemy zamiast 69700 napisać (us. 22): 597×100 i zamiast 4000 napisać 4×1000, a tymsamym $69700 \times 4000 = 697 \times 100 \times 4 \times 1000$. Iloczyn nie zależy od porządku czynników (us. 10), więc:

$$69700 \times 4000 = 697 \times 100 \times 4 \times 1000 = 697 \times 4 \times 100 \times 1000 = 697 \times 4 \times 10000.$$

A zatym możemy naprzód wykonać 697×4 i do otrzymanego iloczynu 2788 dopisać pięć zer, t. j. dwa zera mnożnéj i trzy zera mnożnika. Zwykle w podobnych przypadkach przedstawiamy rachunek w ten sposób:

$$\begin{array}{r} 79700 \\ \times 4000 \\ \hline 278800000 \end{array}$$

Jeżeli mnożna ma na końcu zera, a mnożnik jest liczbą przedstawioną przez cyfrę znaczącą z zerami, to wykonawszy mnożenie tak, jakgdyby tych zer nie było, do iloczynu otrzymanego dopisujemy z prawéj strony końcowe zera mnożnéj i mnożnika [1]).

24. Weźmy zadanie na mnożenie liczb wielocyfrowych przez siebie, np. 7256×348. Mamy tutaj (us. 3) mnożną 7256 wziąć 348 razy jako składnik. Wyobraźmy sobie, żeśmy rzeczywiście wypisali

$$7256 + 7256 + 7256 + 7256 + \text{i t. d. (348 razy)}.$$

Ponieważ to dodawanie możemy uskutecznić przy pomocy częściowych dodawań składników (§ 4, us. 9), więc możemy oddzielnie dodać piérwszych 300 składników, oddzielnie dalszych 40 i nakoniec oddzielnie 8 pozostałych:

$$\underbrace{7256 + 7256 + \text{ i t, d.}}_{300 \text{ razy}} \quad \underbrace{+7256 + 7257 + \text{ i t. d.}}_{40 \text{ razy}} \quad \underbrace{+7256 + 7256 \text{ i t. d.}}_{8 \text{ razy}}$$

Tu piérwsza część, t. j. 300 jednakowych składników 7256, może być zastąpiona przez iloczyn 7256×300; podobnież, zamiast drugiéj części możemy napisać 7256×40 i zamiast trzeciéj 7256×8, tak iż [2]).

$$7256 \times 348 = 7256 \times 300 + 7256 \times 40 + 7256 \times 8.$$

Z tego widzimy, *że mnożenie liczby wielocyfrowéj przez wielocyfrową polega na rozłożeniu mnożnika w najdogodniejszy sposób na części, pomnożeniu mnożnéj przez każdą z tych części mnożnika i dodaniu do siebie tak otrzymanych iloczynów częściowych.*

Należy tu nam wykonać częściowe mnożenia: 7256×300, 7256×40, 7256×8, i tak otrzymane iloczyny do siebie dodać.

Wykonywając częściowe mnożenia według wiadomych (us. 19, 23) prawideł i dodając otrzymane iloczyny, mamy

---

[1]) Ogólniéj w us. 26-ym.

[2]) Na mocy dowiedzionego w ustępie 14-ym, możemy wprost powiedzieć: 7256×348; rozkładamy (§ 4, us. 10) na części $348 = 300 + 40 + 8$ i sprowadzamy rzecz do mnożenia liczby 7256 przez sumę $300 + 40 + 8$ (us. 14), t. j.:

$$7256 \times 348 = 7256 \times (300 + 40 + 8) = 7256 \times 300 + 7256 \times 40 + 7256 \times 8.$$

7256	7256	7256	2176800
×300	×40	×8	290240
2176800	290240	58048	58048
			2525088.

Takie postępowanie jest jednak zbyt długie. Postarajmy się je skrócić, oile tylko można.

Widzimy przedewszystkiem, że tu trzy razy wypisywaliśmy mnożną, a liczby: 2 176 800, 290 240, 58 048 każdą dwa razy. Urządźmy więc postępowanie tak, aby mnożną napisać raz tylko i również raz tylko pisać iloczyny częściowe. Jeżeli te iloczyny częściowe mamy pisać raz tylko, to musimy je tak pisać jedne pod drugimi, jak to być powinno przy dodawaniu; a tymsamym oznaczenia mnożenia mnożnéj przez 300, przez 40 i przez 8 wszystkie powinny się znajdować nad składnikami dodawania. Osiągniemy to, pisząc nad składnikami [1])

$$\begin{array}{r} 7256 \\ \times\, 348 \\ \hline \end{array}$$

co rozumieć będziemy w ten sposób, że mnożymy 7256 nie odrazu przez 348, ale oddzielnie przez części mnożnika, t. j. przez 300, 40, 8, a te iloczyny częściowe podpiszemy pod kréską, nakreśloną dlatego, aby oddzielić liczby dane, do liczb, które następnie do siebie dodać trzeba będzie.

Zauważymy tu, że możemy mnożną mnożyć przez części mnożnika, albo w porządku, jak wyżéj: 300, 40, 8, albotéż w porządku odwrotnym: 8, 40, 300, bo to zmieni tylko porządek składników sumy (§ 4, us. 7). Z tych dwu sposobów:

7256	7256
×348	×348
2176800	58048
290240	290240
58048	2176800
2525088	2525088

wybierzemy ten, który okaże się dogodniejszym. Gdybyśmy żadnych już więcéj skróceń nie robili, to jeden z tych sposobów byłby równie dobry jak drugi. Ale pragniemy porobić wszelkie możliwe skrócenia, któreby zachowywały wyraźność rachunku. Zauważymy tu, że gdy mnożymy mnożną przez setki mnożnika, to w częściowym stąd iloczynie będą zawsze dwa zera na końcu (us. 23); ponieważ one zawsze będą, więc zrobimy

[1]) Gdy ani mnożna ani mnożnik nie mają zer na końcu, to zwykle tak piszemy mnożnik pod mnożną, aby jedności były pod jednościami. (Por. us. 26).

godziwe skrócenie, nie pisząc ich, ale zostawiając dwa miejsca niezajęte, tak, iż na tych miejscach wyobrażać sobie powinniśmy zera; podobnież możemy nie pisać zera, zawsze znajdującego się na końcu iloczynu mnożnéj przez dziesiątki mnożnika. Będziemy więc mieli

7256	7256
×348	×348
21768	58048
29024	29024
58048	21768
2525088	2525088,

co pozwala nam, zamiast mówić: mnożymy mnożną przez 300, powiedzieć: mnożymy mnożną przez 3, ale za to pisać musimy otrzymywany iloczyn mnożnéj przez 3 tak, aby pierwsza (od strony prawéj) cyfra tego iloczynu była na trzecim miejscu, t. j. pod cyfrą mnożnéj, albo, gdy jedności mnożnika są pod jednościami mnożnéj, — pod cyfrą 3 mnożnika; podobnież nie będziemy mówili: mnożę przez 40, ale przez 4, a otrzymany iloczyn postawimy tak, aby piérwsza jego cyfra była pod cyfrą 4 mnożnika. — Każde z tych częściowych mnożeń mnożnéj przez cyfrę mnożnika uskuteczniamy, zaczynając działanie od strony prawéj (us. 18, 19, 20). Z tego więc powodu, będzie zręczniéj mnożyć mnożną pokolei przez oddzielne cyfry mnożnika, zaczynając także od téj saméj strony, t. j. od prawéj, niż mnożyć mnożną przez kolejne cyfry mnożnika, zaczynając od strony lewéj, a każde częściowe mnożenie wykonywać od strony prawéj.

W ten sposób objaśniliśmy, dlaczego rachunek mnożenia 7256 przez 348 tak się zwykle piśmiennie przedstawia:

7256
×348
58048
29024
21768
2525088.

Podobnie, jeżeli mamy np. 302175×14023, to mnożenie to tak wykonamy:

302175
×14023
906525
604350
1208700
302175
4237400025

pomnożymy mnożną przez 3 i podpiszemy iloczyn pod kréską tak, aby piérwsza jego (od strony prawéj) cyfra, t. j. 5, znalazła się pod cyfrą mnożnika, przez którąśmy mnożyli, t. j. pod 3; następnie pomnożymy mnożną przez 2 i ten iloczyn tak pod poprzednim podpisujemy, aby pierwsza jego cyfra, t. j. 0, zna-

lazła się pod cyfrą 2 mnożnika (następna cyfra mnożnika, 0, służy tylko do zajęcia miejsca; niéma więc w mnożniku na trzecim miejscu części, przez którąbyśmy mieli mnożyć mnożną); mnożymy późniéj mnożną przez cyfrę 4 mnożnika, a otrzymany iloczyn podpisujemy w dalszym ciągu tak, aby piérwsza jego cyfra, t. j. 0, znalazła się pod cyfrą 4 mnożnika; nakoniec mnożymy mnożną przez cyfrę 1 mnożnika (us. 3), a iloczyn (równy mnożnéj) podpisujemy pod poprzednim tak, aby piérwsza jego cyfra, t. j. 5, znalazła się pod tą cyfrą 1 mnożnika. Tak wypisane iloczyny częściowe dodajemy do siebie, rozumiejąc na niezajętych miejscach zera a otrzymana suma jest iloczynem liczb danych. — (W tym przykładzie wypadło nam napisać zera na końcu iloczynów częściowych mnożnéj przez 2 i przez 4; takie zera piszemy, bo one nie zawsze będą; nie byłoby ich na tych miejscach, gdyby w mnożniku, zamiast cyfr 2 i 4, były np. 5, lub 7.)

25. Widzimy więc wogóle, że postępowanie przy mnożeniu liczby wielocyfrowéj przez wielocyfrową możemy ująć w następujące prawidło:

Aby pomnożyć liczbę wielocyfrową przez wielocyfrową, podpisawszy mnożnik pod mnożną i poprowadziwszy pod mnożnikiem kréskę poziomą, mnożymy mnożną pokolei przez każdą znaczącą cyfrę mnożnika, poczynając od strony prawéj, według wiadomego prawidła (us. 19); *otrzymane iloczyny częściowe podpisujemy pod kréską jeden pod drugim tak, iżby piérwsza od strony prawéj cyfra każdego iloczynu częściowego była pod tą cyfrą mnożnika, przez którą dla otrzymania tego iloczynu mnożyliśmy mnożną, a następnie tak wypisane iloczyny częściowe do siebie dodajemy, wyobrażając sobie zera na miejscach niezajętych.*

26. Wrazie, gdy w mnożnéj, albo w mnożniku, albotéż jednocześnie w mnożnéj i mnożniku znajdują się zera na końcu, mamy (us. 22, 10):

$$342100\times215=3421\times100\times215=3421\times215\times100,$$

$$3421\times205000=3421\times205\times1000=3421\times205\times1000,$$

$$341200\times215000=3412\times100\times215\times1000=3412\times215\times100000,$$

a więc ogólnie (21, 23): *jeżeli mamy pomnożyć przez siebie dwie liczby, z których jedna lub obie mają na końcu zera, to możemy je naprzód pomnożyć przez siebie, jakgdyby tych zer nie było, a do otrzymanego iloczynu dopisać z prawej strony końcowe zera czynników.* Rachunek wtedy zwykle tak przedstawimy:

342100	3421	341200
×215	×20500	+215000
17105	17105	17060
3421	6842	3412
6842	70130500,	6824
73551500,		73358000000

27. Zdarza się niekiedy, że w mnożnéj jest znacznie mniéj cyfr (znaczących), niż w mnożniku. Prędzéj wtedy wykonamy mnożenie, mnożąc mnożnik przez cyfry mnożnéj; a że przez to zachowujemy się tak, jakgdybyśmy przestawili między sobą czynniki, więc (us. 9) dochodzimy do téj saméj liczby w iloczynie, co wrazie ścisłego trzymania się prawidła (us. 25). Taktéż zwykle w tym przypadku postępujemy. Np.

42	1002
×5167	×3417
10334	6834
20668	3417
217014,	3423834.

Wrazie, gdy mamy pomnożyć przez siebie dwie liczby oderwane i gdy nie mamy potrzeby zaznaczać wyraźnie, która z mnożonych przez siebie liczb jest np. mnożną, to w tym przypadku, jeżeli chcemy, możemy liczbę, w któréj jest mniéj cyfr znaczących, napisać jako mnożnik (us. 9). — Jeżeli jednak rozumowanie, doprowadzające do mnożenia dwu liczb oderwanych przez siebie, wymaga, aby jednę z tych liczb uważać np. za mnożną (us. 6), albo jeżeli w mnożeniu liczb mianowanych (us. 5) sam charakter dwu liczb mnożonych przez siebie wyraźnie wskazuje, która z nich jest np. mnożną (us. 5), to nie można w rachunku napisać mnożnéj zamiast mnożnika i nawzajem.

Z uwagi jednak, że samo wykonanie mnożenia ma na celu tylko odszukanie iloczynu (tak, iż tego rachunku drobiazgowego nie robilibyśmy, gdybyśmy byli w stanie odrazu wypowiedzieć szukany iloczyn), jest dla nas rzeczą obojętną, czy my tym, czytéż innym sposobem otrzymujemy iloczyn, tymwięcéj, że nawet w mnożeniu liczb mianowanych możemy się oprzéć na tym, że liczba oderwana, zachodząca w iloczynie, jest niezależna od nazwania jednostki i powstaje z pomnożenia liczby oderwanéj mnożnéj przez mnożnik (us. 5). Nie przestawiając więc w rachunku mnożnéj z mnożnikiem między sobą, możemy jednak wykonywać mnożenie, mnożąc mnożnik przez cyfry znaczące mnożnéj (według odpowiednio zmienionego prawidła (us 25).

Np. stopa ma 12 cali; ile 4356 stóp ma cali? Ponieważ jedna stopa ma 12 cali, to 4356 stóp ma cali 4356 razy więcéj, i dla tego należy 12 cali pomnożyć przez (liczbę oderwaną) 4356; napiszemy:

12 cali
×4356
8712
4356
52272 cale

zamiast jednak mnożyć (us. 25) kolejno 12×6, 12×5, 12×3 i 12×4 i zająć tymi iloczynami 4 wiersze, możemy wykonać 4356×2, 4359×1 i otrzymane iloczyny częściowe pomieścić w dwu tylko wiérszach. Do otrzymanéj z dodania liczby:

52272 dopiszemy nazwanie jednostki mnożnej (us. 5), t. j. cale. Odpowiedź: 4356 stóp ma 52272 cale.

28. Jeżeli mamy przez siebie pomnożyć kilka liczb (us. 7), to należałoby piérwszą pomnożyć według wiadomych prawideł przez drugą, otrzymany iloczyn przez trzecią i t. d. Ponieważ jednak iloczyn nie zależy od porządku czynników (us. 10), więc, korzystając z tego, staramy się wmiarę wprawy, o ile można tylko, rachunek skrócić. Skrócenia te zależą oczywiście od tego, jakimi są dane czynniki. Możemy tu tylko parę ogólnych podać wskazówek.

Tak, dla skrócenia sobie roboty, mnożymy naprzód przez siebie czynniki największe, otrzymamy iloczyn przez czynnik największy z pozostałych i t. d. Przez takie postępowanie będziemy mieli mnożenia końcowe przez małe liczby, a unikniemy mnożenia wielkiej liczby przez wielką. Robić zaś tak możemy dlatego, że mamy prawo tak zmienić porządek czynników, aby piérwszym był największy, drugim największy z pozostałych i t. d.

Możemy także, w razie, gdy upatrzymy, że częściowy iloczyn niektórych czynników da nam liczbę dogodniejszą w mnożeniu, zastąpić go przez tę liczbę, gdyż w iloczynie wskazanym kilku czynników możemy dowolnie wybrane czynniki zastępować przez wykonane ich iloczyny (us. 10); zwykle przy tym zera końcowe czynników oddzielamy i, przypisawszy je do jedności (us. 22), uważamy tak powstałą liczbę jako ostatni czynnik iloczynu. Np.

$$3\times8\times37\times2\times17\times40\times125\times6008\times300\times75=6008\times(125\times8)\times$$
$$\times(75\times4)\times(37\times3)\times(17\times3\times2)\times1000=6008\times1000\times300\times$$
$$\times111\times102\times1000=6008\times102\times111\times3\times100000000=$$
$$612816\times333\times100000000=20406772800000000.$$

PRÓBA MNOŻENIA.

29. Samo się przez się rozumié, że próbę mnożenia moglibyśmy wykonać przez dodawanie (us. 1, 3) i robimy to, ale tylko wtedy, gdy mnożnik jest bardzo małą liczbą.

Możemy jednak sprawdzenie liczby, otrzymanéj jako iloczyn, oprzéć na tym, że iloczyn nie zależy od porządku czynników (us. 9). Będzie to więc próba mnożenia przez mnożenie. Mianowicie: liczbę, która w mnożeniu sprawdzanym była mnożnikiem, pomnożymy według prawidła podanego w us. 25, przez poprzednią mnożną; jeżeli w iloczynie otrzymamy tę samę, co poprzednio liczbę, to jest prawdopodobne, żeśmy sprawdzane mnożenie dobrze wykonali. Np.

3421	215
×215	×3421
17105	215
3421	430
6842	860
735515,	645
	735515.

ILOŚĆ CYFR ILOCZYNU.

30. Weźmy dwa iloczyny, każdy złożony z dwu czynników, i niech te iloczyny mają po jednym czynniku spólnym — pozostałe zaś ich czynniki niech będą od siebie różne. Np. 235×79 i 45×235. Przestawmy np. [1]) czynniki drugiego iloczynu (us. 9); wtedy oba iloczyny 235×79 i 235×45 mieć będą tę samę liczbę 235 jako mnożną. Piérwszy iloczyn przedstawia sumę, którą otrzymalibyśmy, gdybyśmy liczbę 235 wzięli 79 razy jako składnik (us. 3), drugi zaś iloczyn przedstawia sumę, którą otrzymalibyśmy, biorąc tę samę liczbę 235 tylko 45 razy jako składnik. Ponieważ zaś suma jest zebraniem jedności składników (§ 4, us. 6), więc w piérwszéj sumie, prócz jedności 45-u składników 235, t. j. prócz wszystkich jedności drugiéj sumy, są jeszcze jedności 66-ego składnika 235, 47-ego składnika 235 i t. d., czyli piérwsza suma jest większa od drugiéj, a tymsamym iloczyn 235×79 jest większy od iloczynu 45×235. Czyli: *z dwu iloczynów dwuczynnikowych, mających jeden czynnik jednakowy ten jest większy, którego pozostały czynnik jest większy.*

Jeżeli zaś mamy dwa iloczyny dwuczynnikowe i oba czynniki jednego iloczynu są większe od czynników drugiego iloczynu tak, iż większy czynnik piérwszego iloczynu jest większy od większego z czynników drugiego iloczynu i pozostały czynnik piérwszego iloczynu większy od pozostałego czynnika drugiego iloczynu, np. 235×479 i 375×228 (tu 479 większe od 375 i 235 większe od 228), to możemy utworzyć iloczyn pomocniczy, powstały z pomnożenia mniejszego czynnika iloczynu większych czynników przez większy czynnik iloczynu mniejszych czynników, t. j. 235×375. A wtedy, na mocy poprzedniego, iloczyn 235×479 jest większy od iloczynu 235×375, ten zaś iloczyn 235×375 jest większy od iloczynu 375×228, a więc tymsamym iloczyn 235×479 jest większy od iloczynu 375×228, t. j. *jeżeli mamy dwa iloczyny dwuczynnikowe i większy czynnik np. piérwszego iloczynu jest większy od większego z czynników drugiego iloczynu, a pozostały czynnik piérwszego iloczynu jest większy od pozostałego czynnika drugiego iloczynu, to iloczyn czynników większych jest większy od iloczynu czynników mniejszych.*

[1]) Moglibyśmy przestawić między sobą czynniki piérwszego iloczynu; wtedy rozumowanie byłoby nieco odmienne.

31. Jeżeli, mając wykonać np. 52401×367, chcemy zgóry wiedzieć, z ilu cyfr będzie złożony iloczyn, który otrzymamy po wykonaniu tego mnożenia, to utwórzmy dwa iloczyny dwu liczb, z których każda jest jednością z zerami, najbliższych czynników naszego iloczynu, mianowicie jeden iloczyn liczb większych, drugi zaś liczb mniejszych. Ponieważ dla liczby 52401 najbliższymi liczbami, utworzonymi przez jedność z zerami, są liczby 10 000 i 100 000, a dla 367-u liczby 100 i 1000, więc iloczyn większych liczb, t. j. 10000×1000, jest większy od naszego iloczynu, a iloczyn liczb mniejszych, t. j. 10000×100, jest mniejszy od naszego iloczynu:

$$100000 \times 1000 = 100\,000\,000$$
$$52401 \times 367$$
$$10000 \times 100 = 1\,000\,000,$$

a tymsamym dany iloczyn będzie miał nie więcéj cyfr [1]), niż iloczyn $100\,000 \times 1000 = 100\,000\,000$, a nie mniéj, niż iloczyn $10\,000 \times 100 = 1\,000\,000$. Liczba 100 000 000 jest wprawdzie liczbą dziewięciocyfrową, ale najmniejszą ze wszystkich liczb dziewięciocyfrowych; więc nasz iloczyn, jako od téj liczby mniejszy, nie może miéć 9-u cyfr, ale conajwięcéj cyfr 8. A gdy znowu 1 000 000 jest mniejszą liczbą siedmiocyfrową, więc nasz iloczyn, jako od niéj większy, nie może miéć wprawdzie mniéj niż 7 cyfr, ale może ich miéć także 7. Z tego widzimy, że o naszym iloczynie 52401×367 (liczby 5-cyfrowéj przez 3-cyfrową), nie wykonywając jeszcze mnożenia, powiedzieć możemy, że on będzie miał albo 8 cyfr, albotéż 7. — Zauważmy tu, że czynniki iloczynu miały cyfr: jeden 5, drugi 3; iloczyn zaś albo $8 = 5+3$, albo $7 = (5+3)-1$, t. j. *iloczyn dwu liczb ma albo tyle cyfr, ile ich jest w mnożnéj i mnożniku razem, albo o jednę mniéj* [2]).

JEDNOSTKI KWADRATOWE I SZEŚCIENNE, POLE PROSTOKĄTA I OBJĘTOŚĆ PROSTOPADŁOŚCIANU.


32. Figura [3]), utworzona przez cztéry linije proste, równe, z których każda spotyka się tylko z dwiema z pozostałych linij i jest względem nich jednakowo nachylona, nazywa się kwadratem. Każda z tych linij prostych nazywa się bokiem kwadratu. Mówimy, że dwa boki kwadratu, spotykając się, tworzą kąt prosty.



[1]) W naszym sposobie pisania liczb, jakakolwiek liczba w szeregu liczb naturalnych niéma więcéj cyfr od żadnéj z dalszych liczb tego szeregu.

[2]) Wogóle: jeżeli ilość cyfr mnożnéj nazwiemy m, a ilość cyfr mnożnika nazwiemy n, to iloczyn ma cyfr albo $m+n$ albotéż $m+n-1$.

[3]) Staram się tu podać przystępne dla początkujących wprowadzenie pojęć kwadratu, prostokąta, sześcianu i prostopadłościanu. Wrazie odpowiedniego przygotowania (i do-



Wogóle, gdy jakiekolwiek dwie linije proste, spotykając się, tworzą kąt taki, jak kąt utworzony przez dwą spotykające się boki kwadratu, to taki kąt nazywamy prostym. Mogą bowiém dwie linije proste, spotykające się, tworzyć kąt inny, nieprosty. Np. figura, którą tu mamy narysowaną, jest utworzona przez cztéry linije proste równe, ale żadna z nich, spotykając się z sąsiednią, nie tworzy kąta prostego. Chociaż więc wszystkie cztéry boki są równe, to jednak którykolwiek bok jest inaczéj nachylony względem jednego z boków sąsiednich, niż względem drugiego; dlatego ta figura nie jest kwadratem (nosi ona nazwę: romb).



Jeżeli bok kwadratu jest długi na stopę, to mówimy, że pole tego kwadratu jest stopą kwadratową (albo krócéj, że ten kwadrat jest stopą kwadratową). Powiemy więc: stopa kwadratowa jestto pole kwadratu, którego bok jest długi na stopę. I podobnie: cal kwadratowy jestto pole kwadratu, którego bok równa się calowi, metr kwadratowy, jestto pole kwadratu, którego bok równa się metrowi i t. d. [1]).

Jeżeli zaś chcemy wyraźnie zaznaczyć, że mamy na myśli np, stopę, cal, metr, które możemy przedstawić długością linij, to wtedy mówimy: stopa linijowa, cal linijowy, metr linijowy i t. d.

W tym znaczeniu zamiast „linijowy" używają niekiedy wyrażenia „bieżący" [2]), Gdy więc słyszymy np. „łokieć bieżący", to przez to wyrażenie rozumiéć mamy: łokieć linijowy.



33. Jeżeli bok kwadratu, który tu mamy obok narysowany, przedstawia [3]) nam stopę (linijową), to pole tego kwadratu przedstawi stopę kwadratową. Stopę (linijową) dzielimy zwykle na 12 równych części; wtedy każda z tych części nazywa się calem. Podzielamy na cale dwa prze-

---

statecznego na to czasu), a także, rozumie się, przy powtórzeniu całego kursu wprowadzić określenia, podane w tomie IV seryi III «Biblijoteki mat.-fiz.»

[1]) Ogólniéj: powierzchnią, równoważną z kwadratem, którego bok jest długi na stopę, nazywamy stopą kwadratową; i t. d.

[2]) Niewłaściwie zaś jest mówić «łokieć zwyczajny», bo łokieć kwadratowy, lub sześcienny niczego nadzwyczajnego nie przedstawiają.

[3]) Dobrze jest przy wykładzie kréślić rysunki, oile można, naturalnéj wielkości, posiłkując się starannie zrobionym wzorem miar. (Są w sprzedaży pręty drewniane, z zakończeniami mosiężnymi, wysokie na metr, mające na jednéj stronie podział na decymetry i t. d., na drugiéj na cale nowopolskie i t. d., na trzeciej na cale angielskie, czyli rosyjskie, a na czwartéj na werszki.)

ciwległe boki tego kwadratu i odpowiadające punkty podziału połączmy z sobą linijami prostymi: Wtedy ta stopa kwadratowa rozłożoną zostanie na 12 części równych, z których każda ma postać pasa [1]) ▭ szerokiego na jeden cal, a długiego na stopę, czyli na 12 cali. Ten pas możemy w podobny sposób rozłożyć na 12 równych części ▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭ , z których każda □ jest kwadratem, mającym bok długi na cal, t. j. przedstawia nam cal kwadratowy; zatym w każdym takim pasie jest 12 cali kw. Widzimy więc, że możemy kwadrat, przedstawiający stopę kw., rozłożyć na 12 równych części (pasów), z których każdy ma 12 cali kw. Gdy więc jedna część (jeden pas) ma 12 cali kw., to stopa kw., jako równa 12-u takim częściom (pasom), ma cali kw. 12 razy

12 c. kw. więcéj. Więc, *aby się dowiedzieć,, ile stopa kwadratowa*
× 12 *ma cali kwadratowych, należy 12 cali kwadratawych po-*
24 *mnożyć przez (liczbę oderwaną) 12;* a zatym stopa kw.
12 ma 144 cali kw.
144 c. kw.

Podobnie, gdy, wiedząc, że metr (linijowy) ma 10 decymetrów, chcemy się dowiedzieć, ile metr kw. ma decymetrów kw., należy w taki sam sposób kwadrat, którego bok jest długi na metr, rozłożyć na 10 równych pasów, szerokich na decymetr, długich zaś na metr, czyli na 10 decymetrów, i każdy taki pas w podobny sposób rozłożyć na 10 równych części, z których każda jest decymetrem kw. I znajdziemy,

10 dm. kw. że, *aby się dowiedzieć, ile metr kwadratowy ma*
× 10 *decymetrów kwadratowych, należy 10 decymetrów*
100 dm. kw. *kwadratowych pomnożyć przez (liczbę oderwaną) 10;* a zatym metr kw. ma 100 decymetrów kw. — I t. d.


34. Figura utworzona przez cztéry linije proste, z których każda spotyka się tylko z dwiema z pozostałych, tworząc z nimi kąty proste, nazywa się prostokątem [2]). (Każdą z tych linij prostych nazywamy bokiem prostokąta.) Przypuśćmy, że ten prostokąt ma jeden bok długi na 5 stóp, a sąsiedni długi na 5 stóp, a szerokość 3 stopy [3]). Aby się dowiedzieć, ilu stopom kw. równe jest pole tego prostokąta, nie będziemy do tego prostokąta przykładać kwadratu, przedstawiającego nam stopę kw., ale będziemy rozumować

1) Powtarzając to po przejściu ustępu 34-go, można już, zamiast: ma postać pasa, mówić: jest prostokątem.

2) Kwadrat więc jest szczególnym przypadkiem prostokąta.


3) Albo podstawa i wysokość.

w sposób podobny, jak poprzednio. Mianowicie: ten prostokąt możemy rozłożyć na 5 części równych, z których każda jest prostokątem, mającym jeden bok długi na jednę stopę, a sąsiedni na 3 stopy; każdy zaś taki prostokąt (mniejszy) możemy rozłożyć na 3 części równe z których każda jest kwadratem, mającym bok długi na stopę, czyli jest stopą kw. Widzimy więc, że dany prostokąt możemy rozłożyć na 5 prostokątów mniejszych równych, z których każdy ma trzy stopy kw.; a zatym dany prostokąt ma stóp kw. 5 razy więcéj niż jeden z tych prostąkątów mniejszych, t. j. *aby się dowiedzieć ile dany prostokąt ma stóp kwadratowych, należy 3 stopy kwadratowe pomnożyć przez (liczbę oderwaną) 5.* Dany więc prostokąt ma 15 stóp kw., t. j. pole tego prostokąta jest 15 razy większe od stopy kw. (A więc tu stopa kwadratowa służyła nam za jednostkę do wyrażenia pola prostokąta danego; por. § 1, us. 1.)



$$\begin{array}{r} 3 \text{ st. kw.} \\ \times\, 5 \\ \hline 15 \end{array}$$

35. Figura zamknięta kwadratami nazywa się sześcianem. Każdy z tych kwadratów nazywa się ścianą sześcianu; sześcian ma ścian sześć [1]). Liniją prostą, według któréj przecinają się dwie którekolwiek sąsiednie ściany sześcianu, nazywamy jego krawędzią. Sześcian ma 12 krawędzi. Ponieważ którykolwiek bok któregokolwiek kwadratu, stanowiącego ścianę sześcianu, jest jednocześnie bokiem kwadratu stanowiącego ścianę sąsiednią sześcianu, i t. d., więc wszystkie boki tych kwadratów, czyli wszystkie krawędzi sześcianu są sobie równe.




Jeżeli krawędź sześcianu jest długa na stopę, to mówimy, że objętość tego sześcianu jest stopą sześcienną (albo krócéj), że ten sześcian jest stopą sześcienną). Powiemy więc: stopa sześcienna jestto objętość [2]) sześcianu, którego krawędź jest długa na stopę. I podobnie: cal sześcienny jestto objętość sześcianu, którego krawędź ma długości cal; metr sześcienny jestto objętość sześcianu, którego krawędź równa się metrowi, i t. d.


---

[1]) Nie każda jednak figura, która ma sześć ścian jest sześcianem. (Należy uczniom pokazać jakiekolwiek sześciościany, które nie są sześcianami.

[2]) Ogólniéj: objętość równa objętości sześcianu którego krawędź jest długa na stopę.

36. Jeżeli krawędź sześcianu, który mamy tu obok narysowany [1]), przedstawia nam metr (linijowy), to objętość tego sześcianu przedstawi metr sześcienny. Metr (linijowy) ma 10 decymetrów. Podzielmy na decymetry trzy krawędzi sześcianu, będące przeciwległymi bokami dwu sąsiednich kwadratów, np. te, które są na naszym rysunku podzielone, i przez odpowiadające punkty podziału przesuńmy płaszczyzny. Wtedy ten metr sześcienny zostanie rozłożony na 10 części równych, warstw [2]), z których każda jest szeroka na jeden decymetr, a długa i wysoka na metr, czyli na 10 decymetrów. Tę warstwę możemy znowu w podobny sposób rozłożyć na 10 równych części, słupków [3]), z których każdy ma na szerokość i długość jeden decymetr, a na wysokość 10 decymetrów. Nakoniec i ten słupek możemy w takiż sam sposób rozłożyć na 10 równych części, z których każda jest sześcianem, mającym krawędź długą na decymetr, t. j. przedstawia nam decymetr sześcienny; zatym w każdym takim słupku jest 10 decymetrów sz. Widzimy więc, że możemy sześcian, przedstawiający metr sześcienny, rozłożyć na 10 równych warstw, a każdą z tych warstw na 10 równych słupków, z których każdy ma 10 dm. sz. Gdy więc jeden słupek ma 10 decymetrów sz., to jedna warstwa, jako złożona z 10 takich słupków, ma decymetrów sz. 10 razy więcéj, a więc 10 dm. sz. $\times$ 10, t. j. 100 dm. sz. Metr zaś sz., jako równy takim warstwom, ma decymetrów sz. 10 razy więcéj, a więc trzeba 100 dm. sz. $\times$ 10. Zatym, *aby się dowiedzieć, ile metr sześcienny ma decymetrów sześciennych, należy 10 decymetrów*





[1]) Lepiéj jest przy wykładzie używać sześcianu drewnianego, przepiłowanego na równe sześcianiki (np. na 1000, lub na 1728). Warstwy pionowe i słupki można łatwo odsuwać. Z tych sześcianików można ustawiać większe sześciany i prostopadłościany.

[2]) [3]) Powtarzając to po przejściu ustępu 37-go, można, zamiast: warstwa, słupek, mówić: prostopadłościan (większy i mniejszy).


10 dm. sz.
10×
100 dm. sz.
×10
1000 dm. sz.

sześciennych pomnożyć przez (liczbę oderwaną) 10, a otrzymaną z tego mnożenia ilość decymetrów sześciennych jeszcze raz pomnożyć przez (liczbę oderwaną) 10; znajdziemy, że metr sz. ma 1000 decymetrów sz.

Podobnie należy postąpić, gdy, wiedząc, że stopa (linijowa) ma 12 cali, chcemy się dowiedzieć, ile stopa sześcienna ma cali sześciennych. A więc, *aby się dowiedzieć ile stopa sześcienna ma cali sześciennych, należy 12 cali sześcienuych pomnożyć przez (liczbę oderwaną) 12, a otrzymaną z tego mnożenia ilość cali sześciennych jeszcze raz pomnożyć przez (liczbę oderwaną) 12*; zatym stopa sz. ma 1728 cali sz. — I t. d.

12 c. sz.
12
24
12
144 c. sz.
12
288
144
1728 c. sz.

37. Figura zamknięta prostokątami nazywa się prostopadłościanem. (Każdy z tych pro-



stokątów jest ścianą prostopadłościanu; liniją prostą, według której przecinają się dwie sąsiednie ściany, nazywamy zawsze krawędzią.) Przypuśćmy, że długość tego prostopadłościanu jest 12 decymetrów, szerokość 8 decymetrów, a wysokość 3 decymetry. Aby się dowiedzieć, ilu decymetrom sześciennym równa jest objętość tego prostopadłościanu, podobnież rozłożymy go na 12 prostopadłościanów mniejszych, równych sobie, a każdy z nich ma 8 jeszcze mniejszych prostopadłościanów, równych sobie. Każdy z tych najmniejszych prostopadłościanów ma 3 decymetry sz.; a więc każdy z poprzednich prostopadłościanów ma decymetrów sz. 8 razy więcej, t. j. 3 dm. sz × 8 = 24 dm. sz.; dany zaś prostopadłościan, jako złożony z 12-u prostopadłościanów, z których każdy ma objętości 24 dm. sz. ma dm. sz. 12 razy więcej, t. j. 24 dm. sz. × 12. Zatym, *aby się dowiedzieć, ilu decymetrom sześciennym jest równa objętość danego prostopadłościanu, należy 3 decymetry sześcienne pomnożyć przez (liczbę oderwaną) 8, a otrzymaną z tego mnożenia ilość decymetrów sześciennych pomnożyć przez (liczbę oderwaną) 12.* Dany więc prostopadłościan ma 288 dm. sz., t. j. jego objęty

3 dm. sz.
×8
24 dm. sz.
×12
48
24
288 dm. sz.

tość jest 288 razy większa od decymetra sześciennego. (A więc tu decymetr sześcienny służył nam za jednostkę do wymierzenia objętości prostopadłościanu danego.)

POTĘGA LICZBY. ILOCZYN POTĘG TÉJ SAMÉJ LICZBY.

38. Jeżeli wszystkie czynniki iloczynu są tą samą liczbą, to taki iloczyn nazywamy potęgą liczby, będącéj powtarzającym się czynnikiem, np. $3\times3\times3\times3\times3$; — i nazywamy taki iloczyn potęgą drugą, trzecią, czwartą i t, d. liczby, zależnie od tego, ile razy ta liczba leży w tym iloczynie czynnikiem. Tak np. iloczyn $3\times3\times3\times3\times3$ jest piątą potęgą liczby 3.

Skracając sobie pisanie takich iloczynów, umawiamy się, aby pisać jeden tylko czynnik, a liczbę oznaczającą, z ilu takich jednakowych czynników składa się nasz iloczyn, piszemy przy tym czynniku u góry z prawéj strony. Tak więc 5-ą potęgą liczby 3, t. j. iloczyn $3\times3\times3\times3\times3$, napiszemy 3^5, tak iż 3^5 i $3\times3\times3\times3\times3$ przedstawiają tę samę liczbę: $3^5=3\times3\times3\times3\times3$. Podobnie iloczyn $207\times207\times207\times207=207^4$, t. j. jest 4-tą potęgą liczby 207. Liczbę taką, jak w piérwszym przykładzie 5, a w drugim 4, oznaczającą, ile razy liczba, przy któréj ona się znajduje, zwana podstawą potęgi ma być wzięta jako czynnik, nazywamy wykładnikiem potęgi; mieliśmy tu podstawę 3 z wykładnikiem 5, oraz podstawę 207 z wykładnikiem 4.

Drugą potęgę liczby nazywamy także kwadratem liczby, tak $8\times8=8^2$ nazywamy albo: drugą potęgą liczby 8, albo: kwadratem liczby 8; trzecią zaś potęgę liczby nazywamy także sześcianem liczby; np. $5\times5\times5=5^3$ nazywamy albo: potęgą trzecią liczby 5, albotéż: sześcianem liczby 5. Liczby, które dadzą się wyrazić jako kwadrat lub jako sześcian liczby, nazywają niekiedy odpowiednio liczbami kwadratowymi lub liczbami sześciennymi. Tak p. liczby 64, 36, 144 są liczbami kwadratowymi, bo $64=8^2$, $36=6^2$, $144=12^2$; liczby zaś 8, 64, 343 są liczbami sześciennymi, bo $8=2^3$, $64=4^3$, $343=7^3$.

Korzystając z tego sposobu oznaczania iloczynów jednakowych czynników, możemy znacznie krócéj pisać niektóre iloczyny (us. 10); np.

$$3\times7\times7\times52\times4\times3\times31\times7\times31\times31\times7\times11=$$
$$=3\times3\times7\times7\times7\times7\times52\times4\times31\times31\times31\times11=$$
$$=3^2\times7^4\times52\times4\times31^3\times11.$$

Zauważymy tu, że liczby, przedstawione przez 1 z dwoma lub więcéj zerami (us. 22), są potęgami liczby 10:

$$100=10\times10=10^2,\ 1000=10\times10\times10=10^3,$$
$$10000=10\times10\times10\times10=10^4,\ \text{i t. d.}$$

Więc np. $700\times3\times70\times70\times50\times51\times3000\times70$ możemy (us. 31) przedstawić tak: $7\times7\times7\times7\times3\times3\times5\times51\times1000000000=7^4\times3^2\times5\times51\times10^9$.

39. Jeżeli mamy pomnożyć np. 3^4 przez 3^5, to (us. 10)

$$3^4 \times 3^5 = (3 \times 3 \times 3 \times 3) \times (3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3) =$$
$$= 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 3^9 = 3^{4+5};$$

podobnież łatwo dowieść, że np. $3^4 \times 3^5 \times 3^2 = 3^{4+5+2} = 3^{11}$, t. j. że *iloczyn dwu lub więcéj potęg téj saméj liczby jest także potęgą téj liczby, a jéj wykładnik jest sumą wykładników czynników.*—Ponieważ np. $3^5 \times 3 = 3^6 = 3^{5+1}$, więc drugi czynnik danego iloczynu, t. j. 3, możemy uważać za p o t ę g ę p i é r w s z ą liczby 3, gdyż ten czynnik zachowuje się w tym iloczynie tak, jakgdyby było napisane 3^1. Każdą więc liczbę możemy uważać za jéj piérwszą potęgę, więc np. $10 = 10^1$.

Odwrotnie (us. 10)

$$3^9 = 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 = (3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3) \times (3 \times 3 \times 3 \times 3) =$$
$$= 3^5 \times 3^4$$

$$3^9 = 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 = (3 \times 3 \times 3) \times (3 \times 3) \times (3 \times 3 \times 3) \times 3 =$$
$$= 3^3 \times 3^2 \times 3^3 \times 3^1$$

t. j. *potęgę pewnéj liczby możemy rozłożyć na czynniki, z których każdy jest potęgą téj liczby: suma wykładników czynników jest równą wykładnikowi danéj potęgi.*

RÓŻNE SYSTEMATY PISANIA LICZB.

40. Jakąkolwiek liczbę, np. 30568, możemy tak przedstawić (§ 4, us. 10; § 6, us. 22):

$$30568 = 30000 + 500 + 60 + 8 =$$
$$= 3 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 + 5 \times 10 \times 10 + 6 \times 10 + 8 \times 1,$$

czyli (us. 38, 39). $30568 = 3 \times 3 \times 10^4 + 5 \times 10^2 + 6 \times 10^1 + 8 \times 1.$

t. j. *dziesiątki, setki i t. d. każdéj liczby przedstawiają iloczyn liczby jednocyfrowéj przez potęgę liczby 10.* Jest to następstwem tego, że nasz systemat pisania liczb jest dziesiątkowym, t. j. ma za podstawę liczbę 10.

41. Gdybyśmy więc przy wypowiadaniu i pisaniu liczb przyjęli inną liczbę na podstawę, np. 6, to mielibyśmy s y s t e m a t s z ó s t k o w y; podobnie moglibyśmy miéć s y s t e m a t y ó s e m k o w e, d w ó j k o w e, d w u n a s t k o w e i t. d. Wtedy, podobnie jak w systemacie dziesiątkowym, liczba jakakolwiek rozkładałaby się na części, z których każda byłaby iloczynem liczby mniejszéj od 6-u (jak w dziesiątkowym: liczby jednocyfrowéj, t. j. mniejszéj od 10-u) przez pewną potęgę podstawy 6. Dla przedstawienia więc liczby używalibyśmy tylko cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tak np., jeżeli się umówimy, aby przez ujęcie liczby w nawias [ ] i dodanie z prawéj strony u dołu, jako znaczka (wskaźnika), liczby przyjętéj za podstawę, oznaczać przedstawienie liczby w innym, niż dziesiątkowy, systemacie, to

$$[250413]_6 = 2 \times 6^5 + 5 \times 6^4 + 4 \times 6^2 + 1 \times 6^1 + 3 \times 1;$$
$$[67245]_8 = 6 \times 8^4 + 7 \times 8^3 + 2 \times 8^2 + 4 \times 8^1 + 5 \times 1;$$
$$[12302]_5 = 1 \times 5^4 + 2 \times 5^3 + 3 \times 5^2 + 2 \times 1;$$
$$[1011011]_2 = 1 \times 2^6 + 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^1 + 1 \times 1.$$

Gdybyśmy przyjęli za podstawę liczbę większą od 10, np. liczbę 12, to wypadłoby mieć oddzielne (jednocyfrowe) znaki dla wszystkich liczb mniejszych od 12, czyli wprowadzić znaki na oznaczenie liczb dziesięć i jedenaście. Jeżeli np. dziesięć oznaczymy znakiem a, zaś jedenaście znakiem b, to np.

$$[49a3b5]_{12}=4\times12^5+9\times12^4+a\times12^3+3\times12^2+b\times12^1+5.$$

42. Jeżeli chcemy liczbę, napisaną w innym, niż dziesiątkowy, systemacie, przedstawić w systemacie dziesiątkowym[1]), to należy ją w powyższy (us. 41) sposób rozłożyć na części, wynaleść iloczyny częściowe i następnie wziąć sumę tych iloczynów, która przedstawi nam daną liczbę, napisaną w systemacie dziesiątkowym. Tak więc:

$[250413]_6=2\times7776+5\times1296+4\times36+6+3=22185$;

$[67245]_8=2835$; $[12302]_5=952$; $[1011011]_2=91$;

$[29a3b5]_{12}=4\times12^5+9\times12^4+10\times12^3+3\times12^2+11\times12+5=1199801.$

---

§ 7. DZIELENIE.

OKREŚLENIE DZIELENIA.

1. Podobnie jak, mając sumę dwu składników i jeden jéj składnik, mogliśmy wynaleść drugi składnik téj sumy (§ 5, us. 1), — możemy mając iloczyn dwu czynników i jeden jego czynnik, wynaleść drugi czynnik tego iloczynu. Tak np., jeżeli wiemy, że z pomnożenia przez siebie dwu czynników, z których jeden był 3, otrzymaliśmy iloczyn 12, to możemy odszukać drugi z czynników tego iloczynu.

Wtedy, kiedyśmy jeszcze odpowiedniéj wprawy nie posiadali, zadanie to rozwiązywaliśmy, szukając stopniowo liczby takiéj, iżby iloczyn jéj i czynnika 3 był 12. Mówiliśmy więc: *raz* 3 jest 3 (zamało), 2 razy 3 jest 6 (mało), *3* razy 3 jest 9 (mało), *4* razy 3 jest (właśnie) 12; zatym: szukana liczba jest *4*.

Postępowanie, zapomocą którego, mając iloczyn dwu czynników i jeden z tych czynników, wynajdujemy drugi czynnik tego iloczynu, przedstawia działanie, zwane dzieleniem. Możemy więc powiedzieć:

Zapomocą dzielenia, mając iloczyn dwu czynników i jeden z tych czynników, wynajdujemy czynnik drugi.

2. Z powyższego przykładu widzimy, że dzielenie polega na dobiéraniu różnych liczb dotąd, dopóki nie natrafimy na taką, iżby iloczyn jéj i czynnika wiadomego był właśnie drugą liczbą daną, oraz, że postę-

---

[1]) Zadania odwrotne w § 7, us. 29.

powanie to jest właściwie próbowaniem. W tym próbowaniu zaś wydaje się najpewniejszym brać po kolei liczby 1, 2, 3 4 i t. d., aż do wynalezienia liczby szukanéj.

Gdy mamy liczbę jednocyfrową, lub dwucyfrową podzielić przez jednocyfrową, to znakomitym jest dla nas ułatwieniem należyte przyswojenie sobie tabliczki mnożenia (§ 6, us. 4). Jeżeli bowiém dobrze pamiętamy iloczyny liczb jednocyfrowych, to np,, mając iloczyn dwu czynników, 42, i jeden jego czynnik 6, dla odnalezienia czynnika drugiego nie będziemy próbować liczb 1, 2, 3 i t. d., ale odrazu powiemy: 7, bo $6 \times 7 = 42$.

Jak zaś to odszukiwanie drugiego czynnika sobie ułatwić, gdy dane są inne, większe liczby, — mówić będziemy późniéj.

3. Dany iloczyn dwu czynników nazywa się w dzieleniu dzielną, czynnik wiadomy nazywa się dzielnikiem, a czynnik szukany ilorazem. Mając to na względzie i używając powyższych nazw dla liczb, wchodzących do dzielenia, możemy to, cośmy w ustępie 1-ym o dzieleniu powiedzieli, wysłowić w ten sposób:

Dzielenie jestto działanie, zapomocą którego, mając dwie liczby: dzielną i dzielnik, odnajdujemy liczbę, zwaną ilorazem, taką, iżby iloczyn dzielnika i ilorazu przedstawił dzielną.

W zadaniu: podzielić 12 przez 3, liczba 12 jest dzielną, a 3 dzielnikiem; otrzymana liczba 4 jest ilorazem, bo iloczyn 3-ch i 4-ch jest 12. Jeżeli wiemy, że liczba 3 jest tu mnożną (§ 6, us. 6, 2), to zamiast mówić: bo iloczyn 3-ch i 4-ch jest 12, powiemy: bo $3 \times 4 = 12$; jeżeli zaś liczba 3 jest mnożnikiem, powiemy: bo $4 \times 3 = 12$. Mamy więc [1]) albo:

$$dzielnik \times iloraz = dzielnéj$$

albo:

$$iloraz \times dzielnik = dzielnéj.$$

Uwaga. Niekiedy idzie nam tylko o liczebną wartość ilorazu, a jest dla nas rzeczą obojętną, czy on w mnożeniu byłby mnożnikiem, czytéż mnożną (a tymsamym, czy dzielnik ma charakter mnożnéj, czy mnożnika); wtedy iloraz i dzielnik uważamy wogóle za czynniki (§ 6, us. 6) dzielnéj (jako ich iloczynu) i wtedy wszystko jest jedno, w jakim porządku (§ 6, us. 9) te czynniki w powyższym iloczynie piszemy.

4. Dla oznaczenia, że mamy dwie liczby przez siebie podzielić, piszemy naprzód dzielną, a po niéj dzielnik, stawiając między nimi znak: Tak więc np. 12 : 3 czytamy 12 podzielone przez 3. I napiszemy

$$12 : 3 = 4.$$

Ponieważ wyrażenie 12 : 3 przedstawia liczbę 4, iloraz, więc możemy

[1]) Ogólnie: iloczyn dzielnika i ilorazu równa się dzielnéj.

je także nazwać ilorazem, t. j. *wskazane dzielenie nazywamy często ilorazem* liczb, w to wyrażenie wchodzących [1]).

5. Zastanawiając się nad tym, cośmy powiedzieli w ustępach 1-ym i 3-cim, widzimy, że dzielenie jest związane z mnożeniem tak, iż z liczb wchodzących do mnożenia np. $3 \times 4 = 12$, możemy ułożyć dwa dzielenia $12 : 3 = 4$ i $12 : 4 = 3$. Zestawiając to ze sobą:

$$3 \times 4 = 12,$$
$$12 : 3 = 4,$$
$$12 : 4 = 3,$$

zauważyć możemy, że ta liczba, której szukaliśmy w mnożeniu, jest daną w dzieleniu, i odwrotnie, liczba szukana w dzieleniu jest daną w mnożeniu. Możemy więc powiedzieć, że *dzielenie jest działaniem odwrotnym mnożeniu dwu* [2]) *czynników* [3]).

DWA PRZYPADKI DZIELENIA.

6. Ponieważ w mnożeniu różny jest charakter mnożnéj i mnożnika (§ 6, us. 6) — mnożna jest składnikiem, a mnożnik wskazuje na działanie, t. j. oznacza, ile razy mnożna ma być wzięta jako składnik — więc w dzieleniu dzielnik, jako wogóle jeden z dwu czynników iloczynu, odpowiadać może albo mnożnéj, albotéż mnożnikowi, co zasługuje na bliższe rozpatrzenie.

Jeżeli dzielnik odpowiada mnożnéj (składnikowi), to szukamy ilorazu, odpowiadającego mnożnikowi, który nam wskaże, ile razy dzielnik należy wziąć jako składnik, aby otrzymać dzielną. Innymi słowy: tu iloraz wskaże nam, ile razy dzielnik mieści się w dzielnéj.

Jeżeli zaś dzielnik odpowiada mnożnikowi, to szukamy ilorazu odpowiadającego mnożnéj, t. j. chcemy znaléść liczbę, którą biorąc jako składnik tyle razy, ile nam wskazuje dzielnik, otrzymamy dzielną. Czyli, mamy wynaléść liczbę, która byłaby częścią dzielnéj taką, że biorąc tych części tyle, ile jest jedności w dzielniku, miéć będziemy dzielną. Idzie więc nam tu o to, aby dzielną rozłożyć na tyle równych części ile jest jedności w dzielniku, i przez to oznaczyć jednę taką część.

Możemy więc powiedzieć, że mamy d w a p r z y p a d k i w d z i e l e n i u:

Jeżeli dzielnik odpowiada mnożnéj, to idzie nam o to, aby się dowiedzieć, ile razy dzielnik mieści się w dzielnéj. (W tym przypadku: dzielnik $\times$ iloraz = dzielnéj.)

---

[1]) Częściéj w innéj nieco postaci przedstawiamy wskazane dzielenie (por. § 17, us. 5)

[2]) Na pytanie: dlaczego niéma działania odwrotnego mnożenia trzech lub więcéj czynników? mamy odpowiedź: zasadniczym jest tylko mnożenie dwu (§ 6, us. 7) czynników. (Por. § 5, us. 7.)

[3]) Por. us. 9.

Jeżeli dzielnik odpowiada mnożnikowi, to idzie nam o to, aby rozłożyć dzielną na tyle równych części, ile jest jedności w dzielniku, i oznaczyć przez to jedną taką część. (W tym przypadku: iloraz × dzielnik = dzielnéj.)

Widzimy więc, że istnieją dwa wzajem się wykluczające przypadki w działaniu odwrotnym mnożeniu [1]), tak, że gdy mamy dzielenie, to zadanie, które nas do tego dzielenia doprowadziło, samo nam wyznacza, jaki mamy przypadek przed sobą.

Jeżeli jednak jest ogólnie powiedziane tylko: podzielić np. 12 przez 3, to tu nie wiemy, czy w mnożeniu (us. 3) dwu czynników: dzielnika 3 i szukanego ilorazu, mamy dzielnik 3 uważać za mnożną, czytéż za mnożnik. Mając więc 12 : 3 = powiemy ogólnie: z podzielenia 12-u przez 3 otrzymujemy 4, a na szczegółowsze pytania: co ta liczba 4 oznacza? możemy równie dobrze odpowiedzieć: iloraz 4 wskazuje nam, iż w dzielnéj 12 dzielnik 3 mieści się 4 razy, jakotéż: iloraz 4 wskazuje nam, że rozkładając dzielną 12 na 3 równe części, jako jednę taką część otrzymujemy 4 (albo innymi słowy: że 3-ą częścią 12-u jest 4).

Czy jednak dzielnik odpowiada mnożnéj, czytéż mnożnikowi, to liczba (oderwana), którą otrzymujemy w ilorazie, jest ta sama w obu przypadkach — znaczenie jéj tylko bywa różne, ze względu na to, o co nam w tym dzieleniu idzie.

7. Widoczniéj się to jeszcze przedstawi, gdy weźmiemy zadanie na działanie odwrotne mnożeniu liczb mianowanych (§ 6, us. 5). Tak np., względem zadania:

Pewna osoba kupiła 4 łokcie sukna, płacąc za każdy łokieć po złotych 6; wiele dała za kupione sukno?

6 zł. × 4 = 24 zł.

Odp. Za kupione sukno dała 24 złote.,

mogą być dwa zadania odwrotne:

a. Pewna osoba za kupione sukno dała 24 złote, płacąc za każdy łokieć po złotych 6; ile kupiła łokci?

Dla znalezienia odpowiedzi, rozumować będziemy w ten sposób. Jeżeli za każdy łokieć ta osoba płaciła zł. 6, a za wszystko sukno zapłaciła 24 zł., to kupiła tyle łokci, ile razy 6 zł. mieści się w 24 zł.; 24 zł.: 6 zł. = 4; znaleźliśmy więc, że 6 zł. mieści się w 24 zł. razy 4; że zaś powiedzieliśmy, iż ta osoba kupiła „tyle łokci, ile razy 6 zł. mieści się w 24 zł.", więc łokci było także 4:

24 zł. : 6 zł. = 4; 4 łok.

Odp. kupiła 4 łokcie.

---

[1]) W działaniu odwrotnym dodawaniu, t. j. w odejmowaniu jest tylko jeden przypadek, bo w dodawaniu składniki nie mają różnego znaczenia, gdy tymczasem w mnożeniu mnożnik ma znaczenie odmienne od mnożnéj.

b. Pewna osoba za 4 łokcie kupionego sukna dała 24 złote; po ile złotych zapłaciła za każdy łokieć sukna?

Tu rozumować wypadnie w ten sposób. Ponieważ za 4 łok. sukna ta osoba zapłaciła 24 zł., to za jeden (czyli: za każdy) łokieć sukna zapłaciła 4-ą część 24-ch zł.; trzeba więc 24 zł. rozłożyć na 4 równe części i tymsamym dowiedzieć się, jaką jest jedna taka część; 24 zł.: 4 = 6 zł.; 4-a więc część 24 zł. jest 6 zł.; więc za łokieć sukna zapłaciła 6 zł.

24 zł. : 4 = 6 zł.

Odp. Za każdy łokieć sukna płaciła po 6 złotych.

Przyglądając się uważnie powyższemu zadaniu na mnożenie i dwu wyprowadzonym z niego, zadaniom na dzielenie liczb mianowanych prostych, widzimy, że w zadaniu a. dzielnik 6 zł. odpowiada mnożnéj, a przeto jest liczbą mianowaną, wyrażoną przy pomocy téj saméj jednostki, co dzielna (§ 6, us. 5); wtedy iloraz, jako odpowiadający mnożnikowi, jest liczbą oderwaną. W zadaniu zaś b., odwrotnie, dzielnik jest liczbą oderwaną, a więc iloraz jest liczbą mianowaną, wyrażoną przy pomocy téj saméj jednostki, co dzielna. Możemy więc o tych dwu przypadkach w dzieleniu liczb mianowanych [1]) powiedzieć:

Jeżeli dzielnik jest mianowany, to jest on wyrażony przy pomocy téj saméj jednostki, co dzielna; w tym przypadku dzielenia idzie nam o to, aby się dowiedzieć, ile razy dzielnik mieści się w dzielnéj. Na to właśnie wskazuje iloraz, który jest liczbą oderwaną i, stosownie do warunków zadania, może odpowiadać liczbie mianowanéj, jak np., w zadaniu a. otrzymany iloraz 4 (liczba oderwana) odpowiadał liczbie mianowanéj: 4-m łokciom.

Jeżeli dzielna jest liczbą mianowaną, a dzielnik oderwaną, to w tym przypadku dzielenia idzie nam o to, aby rozłożyć dzielną na tyle równych części, ile jest jedności w dzielniku, i oznaczyć przez to jednę taką część, Tę właśnie część wyznacza nam iloraz, który jest liczbą mianowaną, wyrażoną przy pomocy téj saméj jednostki, co dzielna.

Zauważymy tu jednak, że w jakichkolwiek jednostkach są wyrażone liczby, dane do podzielenia, byle liczby oderwane, zachodzące w tych liczbach mianowanych (§ 1, us. 9), były te same, np.

24 zł. : 6 = 4 zł.,
24 łok. : 6 łok. = 4,
24 zł. : 6 zł. = 4,

zawsze liczba (oderwana) otrzymywana w ilorazie, jest ta sama jak to z określenia dzielenia wypada. Stosownie zaś do tego, czy po niéj ma

[1]) Dzielna w dzieleniu liczb mianowanych, jako odpowiadająca iloczynowi (§ 6. us. 5), jest zawsze mianowaną.

być postawione miano jednostki, czytéż nie, nabiéra ona znaczenia, odpowiadającego jednemu lub drugiemu przypadkowi dzielenia.

8. W tym przypadku dzielenia, gdy idzie nam o to, aby się dowiedzieć, ile razy dzielnik mieści się w dzielnéj [1]) (t. j. kiedy dzielnik odpowiada mnożnéj), możemy także powiedzieć, że idzie nam o to, aby się dowiedzieć, *ile razy dzielna jest większa od dzielnika* [2]) czyli; chcemy tu *dzielnikiem wymierzyć dzielną* (§ 1, us. 1). — A ponieważ w mnożeniu (§ 6, us. 2), powiększając mnożną (którą tu przedstawia dzielnik) pewną liczbę razy, otrzymujemy iloczyn (t. j. dzielną), więc możemy powiedzieć, że (odwrotnie) w tym przypadku dowiadujemy się, *ile razy trzeba zmniejszyć dzielną, aby z niéj otrzymać dzielnik.*

W przypadku zaś, gdy idzie nam o to, aby dzielną rozłożyć na tyle równych części, ile jedności jest w dzielniku i oznaczyć jednę taką część (t. j. gdy dzielnik odpowiada mnożnikowi), chcemy właśnie znaleść tę liczbę (mnożną — iloraz), którą powiększając (§ 6, us. 2) tyle razy, ile jedności jest w dzielniku, otrzymamy dzielną, a więc (odwrotnie), idzie nam tu o to, aby *otrzymać liczbę tyle razy od dzielnéj mniejszą, ile jest jedności w dzielniku*, czyli innémi słowy, aby *dzielną zmniejszyć tyle razy, ile jest jedności w dzielniku* [3]).

MNOŻENIE I DZIELENIE PRZEZ TĘ SAMĘ LICZBĘ.

9. Oczywiście, że gdy pewną liczbę wypada nam przez jakąś liczbę pomnożyć i przez tę samę liczbę podzielić, np. 12 pomnożyć przez 3 i po-

---

[1]) Niektórzy ten przypadek tak dalece wyróżniają, iż rozważają osobne (?) działanie «mieszczenie się«, albo «mierzenie», i nawet obmyślają oddzielny na nie znak. Nacisk jednak taki, którego nawet nie można ściśle przeprowadzić w dalszych częściach arytmetyki jest przesadą, któréj być nie powinno przy nauczaniu poważnym. Tymwięcéj, że wtedy często uwalniałoby się ucznia od należytego rozważenia warunków zadania w celu zrozumienia, który przypadek dzielenia ma on przed sobą, gdyż sam widok znaku naprowadzałby go mechanicznie do formułowania odpowiedzi. Z téj kwestyi jasno już sobie zdawano u nas sprawę przed stu laty:

«Trzeba także wytłómaczyć dzieciom, że, .. w dzieleniu dwa cele sobie założyć można, bo albo chcemy wiedzieć, ile razy jedna liczba w drugiéj zawiéra się, co wtenczas ma miejsce, gdy tak liczba dzieląca, jako i podzielna, wielość jednego gatunku rzeczy oznacza naprzykład, gdy i ta i tamta znaczy czerwone złote, albo złote, i t. d., i wtenczas wieloraz będzie wyrażał liczbę samę przez się, to jest oznaczającą tylko, że tyle, a nie więcéj razy, inne dwie liczby jedna w drugiéj się znajdowała; albotéż liczby danéj do podzielenia szukamy części jakiéj, naprzykład połowy, trzeciéj części, czwartéj i t. d., i natenczas liczba dzieląca żadnego gatunku rzeczy nie znaczy, albo przynajmniéj tak jest uważana; a zaś wieloraz wyraża liczbę znaczącą wielość tego samego rzeczy gatunku, który i liczba podzielna wyrażała ... Tę różnicę przy każdym dopiéro przykładzie pokazywać mają Nauczyciele uczniom swoim, doświadczając ich piérwéj przez pytanie, czyli wieloraz w podanym im przykładzie, będzie znaczył jaki gatunek rzeczy, czyli nie?" *(Arytm. dla sz. nar.* str. 49).

[2]) Tak np. 24 zł.: 6 zł. = 4 możemy przeczytać: 24 złote jest większe od 6-u złotych 4 razy, albo: wymierzając 24 złote 6-u złotymi, otrzymuję liczbę 4.

[3]) Tak np. 24 zł. : 4 = zł. możemy przeczytać: zmniejszając 24 złote 4 razy, otrzymuję 6 złotych.

dzielić przez 3, to liczba dana nie zmieni się: tyle bowiém razy powiększamy (§ 6, us. 2) liczbę 12, mnożąc ją przez 3, ile razy ją zmniejszamy (us. 8), dzieląc ją przez 3, czyli dana liczba 12 pozostanie bez zmiany. Zwykle wtedy mówimy *pomnożenie i podzielenie przez tę samę liczbę, jako działania wprost odwrotne sobie, wzajemnie się znoszą.*

To dzielenie o którym tu jest mowa, winno być istotnie wprost odwrotne mnożeniu przez ów mnożnik, t. j. mowa tu jest o tym przypadku dzielenia, kiedy dzielnik odpowiada mnożnikowi. W działaniach więc na liczbach mianowanych wzajemnie się znoszą: mnożnik (liczba oderwana, § 6, us. 5) i dzielnik oderwany (us. 7). Np. (24 zł. × 6) : 6 = 24 zł. i podobnie (24 zł. : 6) × 24 zł. — Gdybyśmy jednak mieli np. (24 zł. : 6 zł.) × 6, to tu liczbę wypadłą z podzielenia 24 zł. przez 6 zł., t. j. (us. 7) liczbę oderwaną 4, mamy pomnożyć przez 6 i otrzymamy (liczbę oderwaną) 24, a nie liczbę daną : 24 zł. Jest zatym (24 zł. : 6 zł.) × 6 = 24. (Zawsze jednak liczba oderwana pozostaje bez zmiany.)

DZIELNA NIE PODZIELNA PRZEZ DZIELNIK.

10. Weźmy teraz zdanie następujące: Pewna osoba kupiła 4 łokcie sukna; sukiennik chciał za nie (po 6 złotych za łokieć, t. j.) 24 złote, po targu jednak oddał to sukno za 22 złote; po ile złotych ta osoba płaciła za każdy łokieć sukna? — Gdyby płaciła po 6 zł., toby zapłaciła za 4 łokcie 6 zł. × 4 = 24., co jest więcéj niż 22 zł., płaciła więc za łokieć mniéj niż 6 złotych. Gdyby płaciła po 5 zł., toby zapłaciła za 4 łokcie 5 zł. × 4 = 20 zł., co jest mniéj niż 22 zł.; płaciła więc za łokieć więcéj niż 5 złotych. Ponieważ płaciła mniéj niż 6, a więcéj niż 5 złotych, zatym ilość złotych, które płaciła za łokieć sukna wyraża się liczbą pośrednią między 5 i 6. W każdym jednak razie ta osoba zapłaciła za łokieć sukna 5 złotych i prócz tego kwotę mniejszą od jednego złotego. — Ponieważ za wszystko sukno, t. j. za 4 łokcie, zapłaciła 22 złote, a rachując łokieć po 5 zł. należałoby zapłacić 20 złotych, więc aby aby wiedzieć dokładnie, ile zapłaciła za łokieć, trzebaby jeszcze pozostałe 22 zł.—20 zł. = = 2 zł. podzielić przez 4. Mielibyśmy tutaj dzielenie liczby 2 przez 4, t. j. liczby mniejszéj przez większą (por. us. 8), czym szczegółowo późniéj się zajmiemy [1]). Teraz zaś będziemy tylko zaznaczali, że pozostała nam z dzielnéj liczba mniejsza od liczby będącéj w dzielniku, którą należałoby jeszcze podzielić przez dzielnik. Powiemy więc w odpowiedzi na pytanie postawione w naszym zadaniu, że ta osoba za łokieć sukna płaciła 5 złotych i jeszcze to, co wypadnie z podzielenia 2-u złotych przez 4.

Gdybyśmy zaś mieli zadanie: Pewna osoba zapłaciła za sukno 22

[1]) Por. § 16.

złote, płacąc za każdy łokieć 4 złote; ile kupiła łokci? — to należałoby rozumować w ten sposób. Kupiła tyle łokci sukna, ile razy 4 złote mieści się w 22 złotych; a że 4 zł. mieści się w 22 złotych więcéj niż 5, a mniéj niż 6 razy, a nadto gdyby kupiła tylko 5 łokci, to za nie zapłaciłaby 4 zł. $\times 5 = 20$ zł., więc kupiła 5 łokci i prócz tego mniéj niż jeden łokieć sukna, za któreto sukno należy się 22 zł. — 20 zł. $= 2$ zł.

11. Weźmy ogólne zadanie: podzielić 22 przez 4. Ilorazem nie jest liczba 5, bo $4 \times 5 = 20$, mniéj niż dzielna; nie jest nim również 6, bo $4 \times 6 = 24$, więcéj niż dzielna. Iloraz więc jest większy od 5, a mniejszy od 6, czyli jest liczbą pośrednią między 5 i 6, a tymsamym liczbą nienależącą do szeregu liczb naturalnych (§ 1, us. 6). Ilorazem więc jest tu liczba 5 wraz z tym, co wypadnie, gdy $22 - (4 \times 5) = 2$ podzielimy przez dzielnik 4.

Taką liczbę, jak powyżéj 5, posiadającą tę cechę, że iloczyn jéj i dzielnika jest mniejszy od dzielnéj, a jednocześnie iloczyn téj liczby, powiększonéj o jedność, i dzielnika, byłby już większy od dzielnéj, nazywamy ilorazem niezupełnym [1]). Liczbę zaś, pozostającą z dzielnéj po odjęciu od niéj iloczynu dzielnika, i ilorazu niezupełnego, a więc mniejszą zawsze od dzielnika, którą należałoby jeszcze podzielić przez dzielnik [2]), t. j. taką liczbę, jak powyżéj 2, nazywamy resztą dzielenia, albo krócéj: resztą. (Samo się przez się rozumié — jak to zresztą widzieliśmy w przykładach ustępu poprzedzającego — że, *jeżeli dzielna jest liczbą mianowaną, to i reszta jest liczbą mianowaną, wyrażoną przy pomocy téj saméj jednostki, co dzielna.*)

W powyższym przykładzie mieliśmy $22 - 4 \times 5 = 2$, czyli (§ 5, us. 3) $4 \times 5 + 2 = 22$, t. j.

dzielnik $\times$ *iloraz niezupełny* $+$ *reszta* $=$ *dzielnéj.*

Jeżeli zaś z dzielenia nie otrzymujemy reszty, np. przy dzieleniu 12-u przez 3, to często dla dobitności wyrażamy się, że resztą dzielenia jest zero, albo że po podzieleniu 12-u przez 3 otrzymujemy w reszcie zero, lub jeszcze, że 12 dzieli się bez reszty przez 3. — Jeżeli reszta dzielenia jest zero, to iloczyn dzielnika i ilorazu $=$ dzielnéj (us. 3) i dlatego możnaby wtedy otrzymany iloraz nazywać ilorazem zupełnym. Je-

---

[1]) Quotient incomplet (Legendre).

[2]) „Można także na początku zaraz tego Rozdziału (jak tu §-u) przygotowywać dzieci do pojęcia łatwiejszego nauki o liczbach łamanych, albo ułomkach... nic jednak o tych ułomkach jeszcze im nie wspominając, ale powiadając tylko, że podzielić liczbę jaką przez 2 jestto wziąć jéj połowę, podzielić ją przez 3 jestto wziąć jéj trzecią część i t. d. i że trafia się często dzielić liczby jedne przez drugie, które kilka lub więcéj razy w tamtych się zawiérają, ale jeszcze pozostaje od nich jaka liczba mniejsza od téj, którąby ją dzielić powinna. Np. 2 znajduje się w 5 razy 2 i jeszcze zostaje 1 do podzielenia przez 2, liczbę większą". (*Arytm. dla szk. nar.*, str. 46.)

dnak iloraz zupełny nazywamy wprost: ilorazem, tak iż wtedy tylko mamy na uwadze iloraz niezupełny, gdy to wyraźnie wypowiadamy.

Jeżeli dana liczba dzieli się bez reszty przez jakąś liczbę, to mówimy, że dana liczba jest przez ową liczbę p o d z i e l n a. Tak np., liczba 12 jest podzielna przez 3, jest podzielna przez 4; liczba 24 jest podzielna przez 6, przez 8, przez 12, i t. d. — Wrazie, gdy z podzielenia liczby danéj przez jakąś liczbę otrzymujemy resztę (różną od zera), to mówimy, że dana liczba nie jest podzielna, albo: jest n i e p o d z i e l n a przez tę liczbę. Np. liczba 22 jest niepodzielna przez 4; liczba 12 jest niepodzielna ani przez 8, ani przez 5, i t. d.

Jakąkolwiek liczbę, np. 14, zawsze możemy przedstawić (§ 6, us. 3, 4) jako 14×1, tak iż $14=14\times1$, a tymsamym (us. 5, 6) $14:14=1$; $14:1=14$. Podobnie, gdy mamy np. liczbę 5, to $5:5=1$ i $5:1=5$, i t. d. Czyli: *każda liczba jest podzielna przez samą siebie i przez jedność.*

12. Widzieliśmy, że dodawanie (§ 4, us. 2, 6), odejmowanie (§ 5, us. 7) i mnożenie (§ 6, us. 3) liczb z szeregu liczb naturalnych doprowadzało nas zawsze do liczby tego szeregu, gdy tymczasem dzieląc niekiedy przez siebie (jak w poprzednim ustępie $22:4$) dwie liczby z szeregu liczb naturalnych, otrzymujemy liczbę, do tego szeregu nie należącą. Skąd to pochodzi?

Ponieważ dodawanie jest skróconym liczeniem (§ 4, us. 2), a mnożenie, jako skrócone dodawanie jednakowych składników (§ 6, us. 3), jest tymsamym także skróconym liczeniem, więc oba te działania, wykonywane na liczbach z szeregu liczb naturalnych, bezwarunkowo zawsze doprowadzą nas do liczby, do tego szeregu należącéj, gdyż w liczeniu (§ 1, us. 7) z nimi tylko mamy do czynienia.

W odejmowaniu, działaniu odwrotnym, przy dowolnie wziętéj liczbie z szeregu liczb naturalnych, jako odjemnéj, odjemnikiem mogła być tylko liczba mniejsza (§ 5, us. 4), t. j. znajdująca się w tym szeregu przed odjemną.

Drugie działanie odwrotne, dzielenie jako działanie odwrotne mnożeniu, t, j. dodawaniu jednakowych składników, wtedy tylko przy dowolnie wybranéj liczbie z szeregu liczb naturalnych, jako dzielniku, doprowadzić może do ilorazu należącego do tegoż szeregu, jeżeli dzielna zajmuje w tym szeregu miejsce albo dwa, albo trzy, albo cztéry i t. d. (wogóle całkowitą ilość) razy dalsze (licząc od 1), niż dzielnik.

Wogóle więc, iloraz liczb z szeregu liczb naturalnych niezawsze jest liczbą tego szeregu.

WŁASNOŚĆ ILOCZYNU.

13. W § 6-ym ustępie 12-ym widzieliśmy, że

a. *Aby iloczyn pomnożyć przez pewną liczbę, można przez tę liczbę pomnożyć którykolwiek z jego czynników.*

b. *Jeżeli którykolwiek czynnik iloczynu mnożymy przez pewną liczbę, to tymsamym ten iloczyn przez tę liczbę mnożymy.*

Jeżeli, mając np. iloczyn $5\times3\times4\times2\times6$, chcemy go podzielić przez jeden z jego czynników, np. przez 4, to zważmy, że (§ 5, us. 10)

$$5\times3\times4\times2\times6=5\times3\times2\times6\times4=(5\times3\times2\times6)\times4.$$

W ostatnim iloczynie, który możemy uważać jako iloczyn dwu czynników, jednego $5\times3\times2\times6$, a drugiego 4, możemy czynnik 4 przyjąć jako dzielnik, gdy dzielną przedstawiać będzie ten iloczyn dwu czynników (us. 1, 2). Wtedy ilorazem będzie pozostały czynnik, t. j. liczba przedstawiona (§ 6, us. 7) przez iloczyn $5\times3\times2\times6$, a więc

$$(5\times3\times4\times2\times6) : 4=5\times3\times2\times6,$$

t. j. *aby iloczyn podzielić przez jeden z jego czynników, należy wziąć iloczyn czynników pozostałych*, czyli — należy ów czynnik opuścić.

Opiérając się na tym, jeżeli mamy np. iloczyn $5\times12\times7$ podzielić przez liczbę np. 3, przez którą jest podzielny czynnik 12 tego iloczynu, mamy

$$(5\times12\times7) : 3=(5\times3\times4\times7) : 3=5\times4\times7=5\times(12 : 3)\times7,$$ t. j.

c. *aby iloczyn podzielić przez pewną liczbę, przez którą jeden z jego czynników jest podzielny, można ów czynnik przez tę liczbę podzielić.* I nawzajem:

d. *Jeżeli czynnik iloczynu podzielimy przez liczbę (przez którą ten czynnik jest podzielny), to skutkiem tego iloczyn przez tę liczbę będzie podzielony*, bo jeżeli np. mamy iloczyn $5\times12\times7$, to po pomnożeniu iloczynu $5\times(12 : 3)\times7=5\times4\times7$ przez 3, na mocy własności a., miéć będziemy

$$(5\times4\times7)\times3=5\times12\times7,$$

a tu możemy uważać (us. 1, 2) iloczyn $5\times4\times7=5\times(12 : 3)\times7$ jako iloraz w dzieleniu, w którym dzielną jest liczba $5\times12\times7$, a dzielnikiem 3, t. j.

$$5\times(12 : 3)\times7=(5\times12\times7) : 3.$$

Gdybyśmy, zamiast mówić „podzielić przez pewną liczbę", mówili „zmniejszyć pewną ilość razy" (us. 8), to moglibyśmy inaczéj wysłowić powyższe własności.

Z zestawienia ze sobą własności a. i c., albotéż własności b. i d., wypada, że iloczyn (t. j. liczba przezeń przedstawiona) się nie zmienia,

jeżeli jeden jego czynnik pomnożymy przez pewną liczbę, a inny przez tę samę liczbę podzielimy, albowiém wtedy iloczyn zostaje jednocześnie pomnożony i podzielony przez tęż samę liczbę, a więc (us. 9) zmianie nie ulega. Zatym

e. *Jeżeli jeden czynnik iloczynu mnożymy przez pewną liczbę, a inny jego czynnik jednocześnie przez tęż samę liczbę dzielimy* [1]*, to iloczyn się nie zmienia.*

WŁASNOŚCI ILORAZU NIEZUPEŁNEGO.

14. Rozważmy przypadek dzielenia, gdy reszta dzielenia jest różna od zera (us. 11). Podzielmy np. 22 przez 4; w ilorazie niezupełnym otrzymamy 5 a w reszcie 2, i

$$22 = 4 \times 5 + 2,$$

dzielna = dzielnik × iloraz niezupełny + reszta (us. 11).

W drugiéj części mamy tu sumę dwu składników (jeden jest 4×5, drugi 2), przedstawiającą liczbę 22, którą, po wykonaniu dodawania, otrzymujemy jako sumę. Jeżeli więc chcemy tę sumę pomnożyć przez 3, to możemy (§ 6, us. 14 oba jéj składniki przez 3 pomnożyć,

$$22 \times 3 = (4 \times 5) \times 3 + 2 \times 3,$$

albo, na mocy własności a.,

$$22 \times 3 = (4 \times 3) \times 5 + 2 \times 3.$$

Ponieważ liczba 2×3 jest mniejsza [2]) od liczby 4×3, więc, jeżeli liczbę 22×3 podzielimy przez 4×3, to otrzymamy (us. 11) jako iloraz niezupełny liczbę 5, zaś jako resztę dzielenia liczbę 2×3. Zostawiając zaś ze sobą

$$22 = 4 \times 5 + 2 \text{ i } (22 \times 3) = (4 \times 3) \times 5 + (2 \times 3),$$

widzimy, że

a. *Jeżeli dzielną i dzielnik pomnożymy jednocześnie przez tę samę liczbę, to iloraz niezupełny się nie zmieni, a reszta zostanie przez tę samę liczbę pomnożona.*

Mając: $22 \times 3 = 4 \times 3 \times 5 + 2 \times 3$ i $22 = 4 \times 5 + 2$, zastąpmy w piérwszym iloczyny 22×3, 4×3 i 2×3 przez liczby które one przedstawiają, $22 \times 3 = 66$, $4 \times 3 = 12$, $2 \times 3 = 6$. Stąd zaś wypada (us. 1, 2): $22 = 66 : 3$, $4 = 12 : 3$, $2 = 6 : 3$, co napiszemy zamiast tych liczb 22, 4, 2 w wyrażeniu $22 = 4 \times 5 + 2$. Miéć będziemy:

$$66 = 12 \times 5 + 6 \text{ i } (66 : 3) = (12 : 3) \times 5 + (6 : 3),$$

skąd widzimy, że

---

[1]) Mamy tu na uwadze tylko przypadek, kiedy ów czynnik jest przez tę liczbę podzielny. (Ogólniéj w § 20, us. 8)

[2]) § 6, us. 29.

b. *Jeżeli dzielną i dzielnik podzielimy jednocześnie przez tę samą liczbę, wrazie gdy tak dzielna, jak i dzielnik są przez tę liczbę podzielne, to iloraz niezupełny się nie zmieni, a reszta zostanie przez tę samą liczbę podzielona.*

WŁASNOŚCI ILORAZU.

15. W razie, gdy dzielna jest podzielna przez dzielnik (us. 11, 2),

dzielna = dzielnikowi × iloraz.

Jeżeli chcemy iloczyn, t. j. dzielną, pomnożyć przez pewną liczbę, a jeden z czynników, dzielnik pozostawić bez zmiany, to pozostały czynnik, iloraz, na mocy własności a. (us. 13), wypadnie przez tęż samę liczbę pomnożyć. Jeżeli zaś chcemy dzielną przez pewną liczbę podzielić, a dzielnik pozostawić bez zmiany, to podobnież, na mocy własności c., wypadnie podzielić iloraz [1]) przez tęż samę liczbę. Powiemy więc:

a. *Jeżeli dzielną mnożymy lub dzielimy przez pewną liczbę, nie zmieniając dzielnika, to tymsamym iloraz odpowiednio mnożymy lub dzielimy przez tęż samę liczbę.*

Jeżeli dzielnéj nie zmieniamy, a jeden z jéj czynników, dzielnik, mnożymy lub dzielimy przez pewną liczbę, to pozostały jéj czynnik, iloraz, na mocy własności c. (us. 13), wypadnie odpowiednio pomnożyć lub podzielić przez tę samę liczbę. A więc:

b. *Jeżeli dzielnéj nie zmieniamy, a dzielnik mnożymy lub dzielimy przez pewną liczbę, to tymsamym iloraz odpowiednio dzielimy lub mnożymy przez tęż samę liczbę.*

Jeżeli nakoniec dzielną i dzielnik jednocześnie mnożymy lub jednocześnie dzielimy przez tę samę liczbę, to z zestawienia własności a. i b. wypada, że (us. 9) iloraz zmianie nie ulegnie. A więc:

c. *Jeżeli dzielną i dzielnik albo jednocześnie mnożymy, albo jednocześnie dzielimy przez tę samę liczbę, to iloraz się nie zmienia.* (Tę własność moglibyśmy taksamo wyprowadzić, jak piérwszą z własności w tym ustępie.

Własności te można inaczej wysłowić, mówiąc «powiększyć pewną ilość razy», «zmniejszyć pewną ilość razy», zamiast «pomnożyć przez pewną liczbę», «podzielić przez pewną liczbę».

Jeżeli więc mamy np.

$$48 : 4 = 12,$$

to

---

[1]) Trzeba tu dzielić przez taką liczbę, aby nietylko dzielna, ale i iloraz były przez nią podzielne.

a. $(48\times2):4=12\times2$; $(48:2):4=12:2$.

b. $48:(4\times2)=12:2$; $48:(4:2)=12\times2$.

c. $(48\times2):(4\times2)=12$; $(48:2):(4:2)=12$.

Jeżeli więc np. $480:4=120$, to mnożąc dzielnik kolejno np. przez 3, 5, 2 miéć będziemy (b.)

$$480:(4\times3)=(120:3)$$
$$480:(4\times3\times5)=(120:3):5$$
$$480:(4\times3\times5\times2)=\{(120:3):5\}:2$$

A jeżeli tu jeszcze zamiast 120 napiszemy tę liczbę w postaci (us. 4) ilorazu $480:4$, to miéć będziemy:

$$480:(4\times3\times5\times2)=\{([480:4]:3):5\}:2.$$

t. j. *gdy mamy pewną liczbę podzielić przez iloczyn dwu lub więcej czynników, to możemy liczbę daną podzielić przez jeden czynnik, otrzymany iloraz przez drugi czynnik, ten zaś iloraz przez trzeci czynnik iloczynu i t. d.* [1]).

Z własności: gdy dzielną i dzielnik podzielimy przez tę samę liczbę, to iloraz się nie zmieni, wypada, że *gdy mamy podzielić przez siebie dwa iloczyny kilku czynników, to spólne czynniki możemy w tych iloczynach opuścić*; np. mając podzielić iloczyn $15\times6\times8\times7\times11$ przez iloczyn $3\times11\times2\times6$, możemy opuścić spólne czynniki 6 i 11 i dzielić $15\times8\times7$ przez 3×2; że zaś znowu $15=3\times5$, a $8=2\times4$, więc, wstawiając te wyrażenia dla liczb 15 i 8, mamy dzielić $3\times5\times2\times4\times7$ przez 3×2, czyli $5+4\times7$ dzielić przez 1, t. j.

$$(15\times6\times8\times7\times11):(3\times11\times2\times6)=(15\times8\times7):(3\times2)=$$
$$=(3\times5\times2\times4\times7):(3\times2)=(5\times4\times7):1=140.$$

WYKONYWANIE DZIELENIA.

16. Gdy idzie o wykonanie dzielenia, to należy przedewszystkim, jakeśmy już mówili (us. 2), umiéć korzystać z tabliczki mnożenia t. j. nabrać wprawy w tym, aby przy danym iloczynie i jednym czynniku wypowiadać odrazu czynnik drugi. Tak np., iloczyn 6-u i jakiéj liczby jest 48?, a następnie inaczéj: ile razy 6 mieści się w 48-u? oraz: jak wielka jest 6-a część 48-u? (us. 6, 8).

Później zaś, biorąc liczbę jedno lub dwucyfrową i dzieląc ją przez taką liczbę jednocyfrową, iżby iloraz niezupełny był mniejszy od dziesięciu (us. 11), przy pomocy tabliczki mnożenia odrazu będziemy w stanie powiedzieć, że, dzieląc np. 8 przez 3, otrzymamy 2 wraz z tym, co wy-

[1]) W tym ustępie, gdy była mowa o dzieleniu pewnéj liczby przez inną liczbę, przypuszczaliśmy że odpowiednie dzielenie uskutecznia się bez reszty. O uogólnieniu własności, wyprowadzanych w tym ustępie, mówić będziemy w § 17, us. 7 i w § 20, us. 6.

padnie z podzielenia 2 (bo 2 razy 3, czyli 6, jest mniejsze od 8 o 2) przez 3, że, dzieląc np. 52 przez 6, otrzymamy 8 wraz tym, co wypadnie z podzielenia 4 (bo $52-48=4$) przez 6 i t. d. Piśmiennie zwykle w taki sposób to działanie przedstawiamy: obok dzielnéj piszemy z prawéj strony dzielnik, oddzieliwszy je od siebie kréską pionową, nieco u dołu przeciągniętą, pod dzielnikiem prowadzimy kréskę poziomą, pod którą będziemy pisali iloraz (albo iloraz niezupełny)

dzielna	dzielnik
iloraz, albo iloraz niezupełny.

Gdy więc mamy np. podzielić 52 przez 6, to mieć będziemy jako iloraz niezupełny liczbę 8; aby otrzymać resztę dzielenia, wypadnie iloczyn 6×8, t. j. liczbę 48, odjąć od dzielnéj 52; z odjęcia wypadnie nam reszta 4. Napiszemy [1]) więc:

$$\begin{array}{r|l} 52 & 6 \\ \cline{2-2} -48 & 8 \\ \cline{1-1} 4. & \end{array}$$

W podobny sposób przedstawimy i dzielenie w przypadku, gdy dzielna jest podzielna przez dzielnik (us. 11), a dla wyraźności w przedstawieniu, na tym miejscu, na którym w poprzednim przypadku postawiliśmy resztę, piszemy 0 (por. § 5, us. 11), co jest dla nas widoczną właśnie wskazówką, że dzielna dzieli się przez dzielnik bez reszty. Napiszemy więc, gdy mamy np. 48 : 6,

$$\begin{array}{r|l} 48 & 6 \\ \cline{2-2} -48 & 8 \\ \cline{1-1} 0. & \end{array}$$

17. Gdy znajomość tabliczki mnożenia, nawet przy dzielniku jednocyfrowym nie wystarcza nam dla wykonania dzielenia, gdy widzimy, że w iloczynie otrzymać powinniśmy liczbę większą od dziewięciu; np. gdy mamy 25 438 : 6, to należałoby (us. 1, 1) próbować pokolei liczb 10, 11, 12 i t. d. Postępowanie jednak takie byłoby zbyt długie i nużące — należy obmyślić inne. Zauważmy, że gdy mamy zgadnąć jakąś liczbę, to naprzód staramy się wyrozumieć, między jakimi liczbami szukana liczba może się zawiérać, to jest wybadujemy, od jakiéj liczby jest większa

---

[1]) Niektórzy jednak, osobliwie w Niemczech piszą dzielnik z lewéj, a iloraz z prawéj strony dzielnéj, oddzielając te liczby od siebie kréskami pionowymi:

dzielnik | dzielna | iloraz; więc np. 6 | 52 | 8
---|---|---|---|---|---
| | | | — 48 |
| | | | 4. |

(Wprowadzała to swego czasu do nas *Arytm. dla szk. nar.*)

i od jakiéj mniejsza. Naturalnie, że przy tym wyznaczaniu liczby mniejszéj i większéj od szukanéj, staramy się wybiérać takie liczby, iżby przekonanie się o tym, czy one są mniejsze lub większe od szukanéj, niewiele nas pracy kosztowało. Oczywiście, najdogodniejszymi będą liczby przedstawione przez jedność z zerami, bo właśnie najłatwiéj jest mieć iloczyn takiéj liczby i dzielnika.

Próbujmy więc. Gdybyśmy, mając

$$25438 \mid 6$$

wzięli jako iloraz liczbę 10, byłoby [1]) $10\times6=60$, mniéj niż dzielna, więc 10 jest zamało; gdybyśmy wzięli 100, to $100\times6=600$, mniéj niż dzielna, więc 100 jest zamało; gdybyśmy wzięli 1000, to $1000\times6=6000$, mniéj niż dzielna, więc 1000 jest zamało; gdybyśmy wzięli 10000, to $10000\times6=$ $=60000$ jest już więcéj niż dzielna, więc 10000 jest zawiele. Szukana więc liczba jest większa niż 1000, a mniejsza niż 10000, skąd zarazem wypada, iż szukana liczba jest cztérocyfrowa, t. j. złożona z tysięcy, setek, dziesiątków i jedności.

Starajmy się bliżéj podejść do liczby szukanéj, próbując liczb większych od 1000, a mniejszych 10000. Wybiérając z nich, podobnie jak poprzednio, liczby, których iloczyny przez dzielnik łatwo się otrzymują, weźmiemy pod uwagę liczby przedstawione przez cyfrę znaczącą z zerami. Gdybyśmy wzięli [2]) 2000, to $2000\times6=12000$, mniéj niż dzielna, więc 2000 zamało; gdybyśmy wzięli 3000, to $3000\times6=18000$, mniéj niż dzielna, więc 3000 zamało; gdybyśmy wzięli 4000, to $4000\times6=24000$, mniéj niż dzielna, więc 4000 zamało; gdybyśmy jednak wzięli 5000, to $5000\times6=30000$, jest już więcéj niż dzielna, więc 5000, — jest więc ona złożona z liczby 4000 i pewnéj liczby mniejszéj od tysiąca (t. j., wogóle mówiąc, z setek, dziesiątków i jedności), czyli: jesteśmy pewni, że w liczbie szukanéj tysięcy mamy 4.

Wyznaczyliśmy więc tysiące ilorazu — w sposób dość dogodny. Chcielibyśmy móc w ten sam sposób znaléść następującą część liczby, t. j. setki.

Zważmy, że w dzielnéj zawarty jest iloczyn ilorazu przez dzielnik (us. 3, 11). Ponieważ w ilorazie mieć mamy liczbę cztérocyfrową, którą możemy rozłożyć na tysiące, setki, dziesiątki i jedności, więc (§ 6, us. 20) w dzielnéj zawarte są iloczyny częściowe: tysięcy ilorazu przez dzielnik, setek ilorazu przez dzielnik, dziesiątków ilorazu przez dzielnik i jedności

---

[1]) Starając się o bezwzględną dokładność powinniśmy tu (i podobnie daléj) mówić: byłby iloczyn 10 i 6-u równy 60-u. Z uwagi jednak, że idzie nam tu tylko o liczebną wartość ilorazu, możemy (us 3, 6) w tym postępowaniu tak się wyrażać, jak nam dogodniej.

[2]) Możemy nie próbować ponownie liczby 1000, bo z poprzedniego wiemy, że iloraz jest większy od 1000.

ilorazu przez dzielnik. Powyżéj wyznaczyliśmy tysiące ilorazu, t. j. największą część ilorazu. Jeżeli więc chcemy w ten sam sposób wyznaczyć setki ilorazu, to należy nasze dzielenie sprowadzić do innego, w którymby największą częścią ilorazu były setki. To zaś osiągnąć jesteśmy w stanie, zmniejszając dzielną o część zależną od tysięcy ilorazu, czyli odejmując od dzielnéj iloczyn częściowy tysięcy ilorazu przez dzielnik, t. j. liczbę $4000 \times 6 = 24000$. W pozostałéj z tego odejmowania reszcie, t. j w liczbie 1438, jest zawarty tylko iloczyn setek ilorazu przez dzielnik, dziesiątków ilorazu przez dzielnik i jedności ilorazu przez dzielnik, czyli ta reszta 1438 jest nową dzielną, po podzieleniu któréj przez dzielnik 6, otrzymamy w ilorazie liczbę trzycyfrową. Postępując więc podobnie jak poprzednio, w celu wyznaczenia największéj części, t. j. setek, weźmiemy naprzód w ilorazie 100, wtedy $100 \times 6 = 600$, mniéj niż 1438, więc 100 jest zamało; gdybyśmy wzięli 200, to $200 \times 6 = 1200$, zamało; gdybyśmy wzięli 300, to $300 \times 6 = 1800$, zawiele; więc szukana teraz liczba trzycyfrowa jest zawarta między 200 i 300; jest przeto ona złożona z liczby 200 i pewnéj liczby, mniejszéj od sta, t. j. dziesiątków i jedności; jesteśmy jednak pewni, że w szukanéj liczbie mamy 2 setki.

25438	6
—24000	4000
1438	

Aby w podobny sposób wyznaczyć pozostałą część ilorazu, należy od liczby 1438, odjąć część zależną od znalezionych już setek ilorazu, t. j. iloczyn częściowy setek ilorazu przez dzielnik, $200 \times 6 = 1200$. W pozostałéj z tego odejmowania reszcie, t. j. w liczbie 238, jest zawarty tylko iloczyn dziesiątków ilorazu przez dzielnik i jedności ilorazu przez dzielnik; jest więc ta liczba 238 nową dzielną, po podzieleniu któréj przez dzielnik 6 otrzymamy liczbę dwucyfrową. W celu wyznaczenia jéj dziesiątków tworząc znowu iloczyny $10 \times 6 = 60$; $20 \times 6 = 120$; $30 \times 6 = 180$; $40 \times 6 = 240$, widzimy, że szukana teraz liczba dwucyfrowa jest zawarta między 30 i 40, — jest więc ona złożona z 30-u i pewnéj liczby mniejszéj od 10, t. j. jedności; jesteśmy jednak pewni, że w szukanéj liczbie mamy dziesiątków 3. I gdy znów od liczby 238 odejmiemy iloczyn częściowy dziesiątków ilorazu przez dzielnik, $30 \times 6 = 180$, to pozostała z tego odejmowania reszta 58 przedstawia iloczyn jedności ilorazu przez dzielnik, któreto jedności możemy tu, z powodu, że dzielnik jest jednocyfrowy, wyznaczyć bezpośrednio (us. 16); wogóle jednak (przy dwu lub więcéjcyfrowym dzielniku) postąpić winniśmy tak: $1 \times 6 = 6$, $2 \times 6 = 12, \ldots, 9 \times 6 = 54$. Chociaż i ten ostatni iloczyn częściowy jest mniejszy od 58, lecz ponieważ

25438	6
—24000	4000
1438	200
—1200	
238	

25438	6
—24000	4000
1438	200
—1200	30
238	9
—180	4239
58	
—54	
4	

z poprzedniego wiemy, że szukana część ilorazu jest mniejszą od dziesięciu, — więc będzie nią 9 i, po odjęciu od 58-u częściowego iloczynu $9 \times 6 = 54$, pozostanie nam, jako reszta dzielenia, liczba 4. W ten sposób znaleźliśmy, że w ilorazie niezupełnym tego dzielenia mamy: 4 tysiące, 2 setki, 3 dziesiątki i 9 jedności czyli liczbę 4239. Tak iż, zamiast podpisywać pod sobą oddzielnie części tego ilorazu niezupełnego, moglibyśmy, znalazłszy, że tysięcy będzie 4, podpisać pod dzielnikiem tę cyfrę, a następnie, po oznaczeniu, że setek jest 3, postawić obok 4 z prawéj strony cyfrę 3 i t. d. [1]). — Znaleźliśmy więc, że iloraz z podzielenia 25438 przez 6, jest 4239 wraz z tym, co otrzymamy, gdy 4 podzielimy przez 6.

25224	6
—24000	42
1224	
—1200	
24	

Wrazie, gdybyśmy mieli naprzykład 25224 : 6, i wyznaczyli już, jak powyżéj, 4 tysiące i 2 setki w ilorazie, to, prowadząc działanie daléj, powiemy, że w liczbie, którą otrzymamy po odjęciu od 1224 iloczynu, częściowego setek ilorazu przez dzielnik, $200 \times 6 = 1200$, t. j. w liczbie 24, znajdują się iloczyny pozostałych części ilorazu przez dzielnik, t. j. dziesiątków ilorazu przez dzielnik i jedności ilorazu przez dzielnik. W celu wyznaczenia dziesiątków, utworzywszy iloczyn $10 \times 6 = 60$; widzimy, że otrzymujemy więcéj niż 24, t. j. że w ilorazie pozostała część (dwucyfrowa) jest mniejsza od 10, czyli, że w ilorazie niéma dziesiątków do oznaczenia ich na miejscu, które ono obok setek z prawéj strony powinny zajmować; napiszemy więc na tym miejscu zero, a liczba 24 posłuży nam do wyznaczenia jedności, co zrobimy sposobem wiadomym. — Iloraz więc z podzielenia 25224 przez 6 jest 4204.

25224	6
—24000	4204
1224	
—1200	
24	
—24	
0	

Podobnie, jeżeli mamy

62496	124

zauważymy naprzód, że gdybyśmy wzięli jako iloraz liczbę 10, to $124 \times 10 = 1240$, zamało; gdyby wziąć

[1]) Dla udogodnienia, zbadawszy na początku, przy pomocy próbowania liczb 10, 100 i t. d. ile cyfr będzie w ilorazie, dobrze jest postawić w ilorazie odpowiednią ilość kropek, aby przy pisaniu na miejscu piérwszéj, drugiéj i t. d. kropki odpowiednich cyfr, pozostałe kropki, przy tworzeniu iloczynów częściowych, uważać jako przedstawiające zera.

100, to $124 \times 100 = 12400$, zamało; a gdy weźmiemy 1000, to $124 \times 1000 = 124000$, zawiele. Iloraz więc jest zawarty między 100 i 1000, czyli jest liczbą trzycyfrową, a więc liczbą złożoną z setek, dziesiątków i jedności.

W celu wyznaczenia setek próbójemy: $124 \times 200 = 24800$, zamało; $124 \times 300 = 37200$, zamało; $124 \times 400 = 49600$, zamało; $124 \times 500 = 62000$, zamało, lecz $124 \times 600 = 74400$, zawiele, więc i t. d. — mamy w ilorazie 5 setek. Rozumując tak, jak w poprzednim przykładzie, uzasadnimy, że obok 5 setek wypadnie postawić na miejscu dziesiątków 0, a tymsamym, że liczba 496 zawiéra w sobie iloczyn jedności ilorazu przez dzielnik. Tworząc więc pokolei iloczyny $124 \times 1 = 124$; $124 \times 2 = 248$; $124 \times 3 = 372$; $124 \times 4 = 496$, widzimy że w ilorazie okok zera należy na miejscu jedności postawić 4, a nadto, że, po podzieleniu dzielnéj 62496 przez dzielnik 124, otrzymamy jako iloraz liczbę 504.

62496	124
− 62000	504
496	
−496	
0	

Gdy zastanowimy się tu jeszcze nad takim postępowaniem, łatwo spostrzeżemy, że np. w piérwszym przykładzie, szukając ilorazu liczb 25438 i 6, naprzód dowiedzieliśmy się, że ten iloraz zawiéra się między liczbami 1000 i 10000, następnie, że jest zawarty między liczbami 4000 i 5000, późniéj, że między 4200 i 4300, potym, że między 4230 i 4240, i nakoniec (us. 11), że między 4239 i 4240, t. j. widzimy, że postępowanie to polega właściwie na wyznaczeniu dwu liczb, jako liczb krańcowych, między którymi szukany iloraz się zawiéra, i na stopniowym (metodycznym) zbliżaniu do siebie tych liczb (krańcowych), obejmujących szukany iloraz.

Dzielenie jest jedynym z cztérech działań arytmetycznych, które wykonywamy od strony lewéj, a nie od prawéj. Wykonywając dzielenie od strony prawéj, możemy wypisywać cyfry ilorazu odrazu dobrze, t. j. bez potrzeby zmieniania ich następnego, tylko wtedy, gdy dzielnik jest liczbą jednocyfrową i każda znacząca cyfra dzielnéj, osobno uważana, przedstawia liczbę przez ten dzielnik podzielną, np. 690399 : 3. We wszystkich zaś innych przypadkach, jak łatwo się o tym przekonać, musielibyśmy zmieniać raz postawione cyfry; często nie uniknęlibyśmy nawet potrzeby wykonywania dzielenia (częściowego) właśnie ze strony lewéj, a nadto suma reszt częściowych dzieleń może wypaść większa niż dzielnik, co wywołuje nową potrzebę zmiany cyfr ilorazu.

Widzimy więc, że to postępowanie, t. j. *wykonywanie dzielenia polega na tym, aby z części ilorazu: jedności, dziesiątków, setek, tysięcy i t. d., wyznaczyć naprzód część największą przy pomocy próbowania; następnie, odjąwszy od dzielnéj iloczyn znalezionéj największéj części ilorazu*

przez dzielnik, otrzymaną resztę uważać za nową dzielną, a tymsamym z części ilorazu, któryby wypadł z jéj podzielenia przez (ten sam) dzielnik, t. j. z jedności, dziesiątków, setek i t. d., wyznaczyć znowu przez próbowanie część największą, i t. d., dopóki nie zostaną wyznaczone najmniejsze części w ilorazie, t. j. jedności, a otrzymane w ten sposób części ilorazu do siebie dodać.

18. W tym piśmiennym wykonywaniu dzielenia, któreśmy powyżéj na przykładach przedstawili, możemy porobić wszelkie możliwe skrócenia, byleby rachunek pozostał wyraźnym. Zauważyć więc naprzód możemy, że w częściowych iloczynach, np. tysięcy ilorazu, przez dzielnik, są na końcu trzy zera (§ 6, us. 23), które zawsze będą, jakikolwiek jest dzielnik i jakakolwiek jest cyfra tysięcy w ilorazie; możemy więc te zera, podobnie jak w mnożeniu (§ 6, us. 24), jako łatwo domyślne, opuścić. Podobnie możemy opuścić dwa końcowe zera, zawsze się zjawiające w iloczynie częściowym setek ilorazu przez dzielnik. I t. d. Wtedy piśmienne przedstawienie wykonywania dzielenia w przykładach poprzedzającego ustępu tak się przedstawi:

25438	6	25224	6	62496	124
—24	4239	—24	4204	—620	504
1438		1224		496	
—12		—12		—496	
238		24		0.	
—18		—24			
58		0			
—54					
4.					

W ostatnim dzieleniu zostało zero w częściowym iloczynie 620, gdyż to zero jest przypadkowe, nie zawsze tu bywa: niebyłoby go, gdyby w ilorazie zamiast 5-u setek było np. 6 setek.

Przypatrując się jeszcze tym skróconym przedstawieniom wykonywania dzielenia, widzimy, że w piérwszych dwu dzieleniach końcowe cyfry dzielnéj przypisujemy kilkakrotnie, chociaż one tylko wtedy są potrzebne w rachunku, gdy pod nimi są pozostałe tu, po opuszczeniu zer, cyfry iloczynów częściowych. Ponieważ te cyfry znajdują się w dzielnéj, więc mamy je wciąż na widoku, a tymsamym możemy je opuścić wszędzie, gdzie pod nimi są domyślne opuszczone zera częściowych iloczynów. Robiąc to, mamy:

```
25438 | 6          25224 | 6
-24   | 4239       -24   | 4204
  14                 12
 -12                -12
   23                 24
  -18                -24
    58                  0.
   -54
     4.
```

Ten zaś tak znacznie skrócony sposób przedstawiania piśmiennego dzielenia pozwala nam również skrócić sposób wyrażania się przy wykonywaniu tego rachunku, osobliwie, gdy zważymy, że, jak widać z tych przykładów, wmiarę użycia następujących po sobie cyfr dzielnéj wyznaczamy następujące po sobie cyfry ilorazu: tak np., w ostatnim dzieleniu piérwsze dwie cyfry dzielnéj, t. j. liczba 25, odpowiadają cyfrze 4 ilorazu, następująca cyfra dzielnéj 2 odpowiada cyfrze 2 ilorazu, następujące dwie cyfry dzielnéj 2 i 4 odpowiadają następnym znowu dwu cyfrom ilorazu 0 i 4. Skutkiem tego, wyznaczywszy w ilorazie cyfrę piérwszą, t. j. 4, nie potrzebujemy zastanawiać się nad tym, jakie części liczby ta cyfra nam przedstawia: dość tylko wiedzieć, że jest piérwszą (od strony lewéj) cyfrą ilorazu; cyfrę ilorazu, którą wyznaczymy przy pomocy następującéj cyfry dzielnéj, uważać będziemy za następującą, po wyznaczonéj poprzednio, cyfrę ilorazu, i t. d.

Zastanówmy się nad tym, jak, wrazie gdy rachunek dzielenia np. liczby 25224 przez liczbę 6, prowadzić będziemy odrazu w (ostatniéj) skróconéj postaci, możemy wyznaczać kolejne cyfry ilorazu. Idzie więc nam o to, jak mamy, nie przeprowadzając poprzedniego rozumowania odrazu przeprowadzić cały ten skrócony rachunek, a tymsamym wyznaczyć kolejno wszystkie cyfry w ilorazie.

Widzimy, że tu tak się zachowujemy, jakgdybyśmy naprzód od liczby 25 odejmowali liczbę 24, t. j. iloczyn dzielnika 6 przez piérwszą (z lewéj strony) cyfrę ilorazu. Oddzielamy więc przedewszystkim początkowe dwie cyfry dzielnéj i uważamy je jako liczbę oddzielną. Ta liczba 25 jest większa od dzielnika. Widocznie więc tu oddzieliliśmy liczbę przedstawioną przez tyle początkowych cyfr dzielnéj, ile ich najmniéj potrzeba, aby ta liczba była większa od dzielnika. Gdybyśmy jednak mieli np. 6224 : 6, to wypadłoby (dla wyznaczenia piérwszéj cyfry ilorazu) oddzielić od dzielnéj tylko cyfrę 6, którąby więc przedstawiała liczbę równą dzielnikowi.

Powiemy więc ogólnie, że: oddzielnie uważamy liczbę, przedstawioną przez tyle początkowych cyfr dzielnéj, ile ich najmniéj potrzeba, aby

ta liczba była już nie mniejsza od dzielnika. — Wracając się do naszego zadania, powiemy: oddzielnie uważając liczbę, utworzoną przez tyle, ile można najmniéj, początkowych cyfr dzielnéj 25 224, aby ta liczba była już nie mniejsza od dzielnika 6, t. j. liczbę 25, szukamy takiéj największéj jednocyfrowéj liczby, iżby iloczyn jéj i dzielnika był nie większy od 25. Tą największą z liczb jednocyfrowych (znajdziemy ją, wogóle mówiąc, przez próbowanie) jest tu liczba 4. Jest ona piérwszą (z lewéj strony) cyfrą ilorazu; podpisujemy ją więc pod dzielnikiem. — Iloczyn dzielnika przez tę cyfrę, $6 \times 4 = 24$, podpisujemy pod 25 i od 25 odejmujemy. Do otrzymanéj reszty przypisujemy [1]) następującą cyfrę dzielnéj, t. j. 2. Ta liczba 12 ma nam posłużyć do wyznaczenia następującéj cyfry w ilorazie. Mamy więc znaléść cyfrę w ilorazie, któréj iloczyn przez dzielnik nie byłby większy od 12. Taką cyfrą jest 2, którą piszemy obok poprzedniéj cyfry ilorazu, t. j. obok 4-ch. Iloczyn jéj i dzielnika, $6 \times 2 = 12$, odejmujemy od 12. Z tego odejmowania nie otrzymujemy reszty. Piszemy więc następującą cyfrę dzielnéj, 2, która powinna nam posłużyć do wyznaczenia następującéj cyfry ilorazu. Lecz ponieważ ta liczba 2 jest mniejsza od dzielnika, więc nie otzymamy cyfry znaczącéj w ilorazie, odpowiadającéj téj cyfrze 2 dzielnéj. Piszemy więc w ilorazie, obok znalezionych już cyfr, 0. — Do téj cyfry 2 dopisujemy następującą cyfrę dzielnéj, 4, a ta liczba 24 ma nam służyć do wyznaczenia następującéj (ostatniéj, bo już przypisaliśmy ostatnią cyfrę dzielnéj) cyfry ilorazu. Szukamy więc znowu takiéj cyfry, żeby mnożąc przez nią dzielnik, otrzymać iloczyn nie większy od 24. Tą cyfrą jest 4, którą piszemy w ilorazie po zerze. Od 24 odejmujemy iloczyn $6 \times 4 = 24$ i ponieważ z tego odejmowania żadnéj nie otrzymujemy reszty, a niéma więcéj cyfr dzielnéj, na miejscu reszty piszemy [2]) zero (us. 16, które nam wyraźnie wskazuje, że dzielna jest przez dzielnik podzielną.

```
25223 | 6
-24   | 4
  12
```

```
25224 | 6
-24   | 420
  12
-12
   2
```

Gdy mamy [3]) np. 17 040 690 : 567, to ponieważ liczba utworzona

---

[1]) To przypisanie cyfry zastępuje odejmowanie zera (domyślnego po 24) od cyfry 2 dzielnéj. Podobnie i daléj, Dla tego staramy się przypisywane w ten sposób cyfry stawić pod tymiż cyframi dzielnéj. Niewłaściwie, zamiast: przypisuję cyfrę, mówią często: «spuszczam», albo «składam» cyfrę.

[2]) Rozpowszechnione pisanie krések poziomych; albotéż przecinków, tak tu, jak i w poprzednich odejmowaniach (gdy niéma nic do oznaczenia pod odejmowanymi od siebie cyframi) nie jest niczym usprawiedliwione i jest zbyteczne.

[3]) «Ponieważ dzielenie liczby trudniejsze jest od poprzedzających trzech działań, należy użyć Nauczycielom wszystkich sposobów, któreby naukę o tymże dzieleniu ułatwia-

przez tyle początkowych cyfr dzielnéj, ile ich ma dzielnik, t. j. liczba trzycyfrowa 170, jest mniejsza od dzielnika, więc wypadnie nam miéć naprzód na uwadze liczbę utworzoną przez piérwsze cztéry cyfry dzielnéj, t. j. 1704. Szukamy teraz największéj jednocyfrowéj liczby, przez którą mnożąc dzielnik, otrzymalibyśmy iloczyn nie większy od 1704.

```
17040690 | 567
-1701    | 30054
  3069
 -2835
   2340
  -2268
     72
```

Gdy $567\times1=567$, $567\times2=1134$, $567\times3=1701$, $567\times4=2268$, widzimy, że powinniśmy w ilorazie, jako piérwszą (z lewéj strony) cyfrę, napisać 3. Odejmując iloczyn 1701 od liczby 1704, otrzymujemy w reszcie 3, do czego przypisujemy następującą cyfrę dzielnéj, 0. Liczba 30 jest mniejsza od dzielnika: piszemy więc w ilorazie, jako drugą, cyfrę 0. Do liczby zaś 30 przypisujemy następującą cyfrę dzielnéj, 6. Liczba 306 jeszcze jest mniejsza od dzielnika: piszemy więc znowu w ilorazie, jako następującą, cyfrę 0, a do liczby 306 przypisujemy następującą cyfrę dzielnéj, 9. Ta liczba 3069 nie jest już mniejsza od dzielnika. Szukamy więc jednocyfrowéj liczby, przez którą mnożąc dzielnik, otrzymalibyśmy loczyn nie większy od 3069. Z poprzednio wypisanych iloczynów dzielnika przez jednocyfrowe liczby, widzimy, że ostatni, t. j. iloczyn $567\times4=2268$, jest mniejszy od téj liczby 3069. Tworzymy i następne iloczyny:

$$567\times5=2835,\quad 567\times6=3402;$$

wypadnie zatym w ilorazie postawić, jako następującą, cyfrę 5. Odejmując iloczyn 2835 od liczby 3069, otrzymujemy w reszcie liczbę 234, do któréj przypisujemy następującą (ostatnią) cyfrę dzielnéj, 0. Liczba 2340 nie jest mniejsza od dzielnika. Szukając odpowiedniéj cyfry ilora-

---

ły ... Że zaś trudność w dzieleniu liczby po większéj części pochodzi z niepewności w naznaczeniu wielorazu, w którejto niepewności dopóty dzieci zostawać będą, póki długim wprawianiem się nie nabędą łatwości w zgadnieniu bez zawodu, ilekroć liczba, którą dzielić mają, zamyka w sobie tę, która ją dzieli: przeto szczególnym będzie staranie Nauczycielów, aby podali sposób uczniom swoim, którym najłatwiéj i najprędzéj natrafić mogliby na prawdziwy wieloraz, wypadający z podzielenia liczby jednéj przez drugą. Osobliwie zaś w pamięci miéć to mają, gdy przyjdą do liczb dzielących złożonych z dwóch znaków. Tam naprzód zabawić się trzeba nad przykładami takimi, gdzie znak jedności jest mały względem znaku dziesiątków, naprzykład 81.... Postąpią daléj do przykładów, w którychby znowu znak dziesiątków był bardzo mały względem znaku jedności, naprzykład 18.... Potym wynajdywać będą takie liczby dzielące, których liczba, jedności wyrażająca, coraz bardziejby zbliżała się do liczby dziesiątkow. Tak długo zaś liczb dzielących, z więcéj jak ze dwóch znaków złożonych, podawać nie będą uczniom swoim, póki ci bez omyłki nie nauczą się zgadywać wielorazów w tych liczbach podzielnych, których dzielące liczby ze dwóch tylko znaków składać się będą.«. *Arytm. dla sz. nar.* str. 45).

zu, możemy skorzystać z wypisanych już iloczynów dzielnika przez jednocyfrowe liczby. Widzimy, że iloczyn $567 \times 4 = 2268$ jest mniejszy od téj liczby, zaś iloczyn $567 \times 5 = 2835$ jest już większy. Napiszemy więc w ilorazie, jako ostatnią, cyfrę 4. Odjąwszy nakoniec iloczyn 2268 od liczby 2340, otrzymujemy, jako resztę dzielenia, liczbę 72, — Powiemy więc: z podzielenia 17 040 690 przez 567 otrzymujemy 30 054 wraz z tym, co wypadnie z podzielenia 72-u przez 567.

Widzimy nadto z tego dzielenia, że wrazie, gdy dzielnik jest liczbą, któréj iloczynów przez jednocyfrowe liczby odrazu sobie przedstawić nie jesteśmy w stanie, korzystnym jest wypisywanie na boku, lub na nałożonéj oddzielnéj kartce tych iloczynów, wmiarę potrzeby ich tworzenia. Tu np. wypadłoby nam w ten sposób wypisać naprzód iloczyny od 567×2 do 567×4, a następnie dopisać jeszcze iloczyny 567×5 i 567×6. (Por. us. 19).

W zadaniu np. 9600741 : 24, wyznaczywszy już piérwszą cyfrę ilorazu, 4, widzimy, że z odejmowania 96—96, nie otrzymujemy żadnéj reszty. Nie piszemy jednak zera (§ 5, us. 11), gdyż wypadnie nam w dalszym ciągu postawić cyfrę dzielnéj (§ 3, us. 12); brak więc wszelkiéj cyfry pod odejmowanymi liczbami, wobec postawionéj w tymże wiérszu następującéj cyfry dzielnéj dostatecznie nam wskaże, żeśmy z tego odejmowania nie otrzymali reszty. Piszemy tylko w tym wiérszu następującą cyfrę dzielnéj. Jest nią 0, więc i w ilorazie odpowiednią cyfrą [1]) jest 0. Piszemy obok następną cyfrę dzielnéj, 0; znowu więc w ilorazie 0. Piszemy obok następną cyfrę 7; mamy więc teraz (§ 3, us. 12) liczbę 7, która jest mniejsza od dzielnika; piszemy więc znowu w ilorazie 0. Przypisując zaś do liczby 7 następującą cyfrę dzielnika 4, otrzymujemy liczbę 74, która jest już większa od dzielnika. Wyznaczywszy cyfrę 3 w ilorazie i dopisawszy do reszty z odjęcia 72 od 74, t. j. do 2, następującą cyfrę dzielnéj, 1, otrzymujemy liczbę, mniejszą od dzielnika. Piszemy więc w ilorazie, jako odpowiednią (ostatnią) cyfrę, 0, a liczba 21 przedstawi nam teraz resztę dzielenia. Otrzymaliśmy więc jako wypadek dzieleniu: 400 030 wraz z tym, co wypadnie z podzielenia 21 przez 24.

```
9600741 | 24
-96     | 400030
  0074
 -72
   21
```

19. Widzimy więc wogóle, że postępowanie przy dzieleniu liczb możemy ująć w następujące prawidło:

---

[1]) Można to jeszcze dosadniéj objaśnić, postępując tak, jak w us. 17.

Aby podzielić dane liczby przez siebie, piszemy naprzód dzielną, a obok niéj, z prawéj strony, dzielnik, oddzielając te liczby od siebie kréską pionową, nieco na dół przedłużoną [1]), *pod dzielnikiem zaś prowadzimy kréskę poziomą* [2]), *pod którą pisać będziemy cyfry ilorazu. Zauważywszy naprzód, jakby osobną, liczbę, utworzoną przez tyle początkowych cyfr dzielnéj, ile ich najmniéj potrzeba, aby ta liczba była nie mniejszą od dzielnika, szukamy takiéj największéj cyfry, przez którą mnożąc dzielnik, otrzymalibyśmy iloczyn nie większy od téj zauważonéj liczby. Ta cyfra będzie piérwszą cyfrą ilorazu. Mnożymy przez nią dzielnik i otrzymany iloczyn odejmujemy od owéj liczby, przedstawionéj przez początkowe cyfry dzielnéj, podpisawszy go pod tą liczbą. Do wypadłéj z tego odejmowania reszty przypisujemy następującą cyfrę dzielnéj i znowu, mając tak powstałą liczbę, nie mniejszą od dzielnika, w taki sam sposób wyznaczamy następującą cyfrę ilorazu. I t. d. Jeżeli przypisawszy do reszty, otrzymanéj z odejmowania, następującą cyfrę dzielnéj, mamy liczbę mniejszą od dzielnika, to w ilorazie piszemy 0, a do owéj liczby przypisujemy jeszcze następującą cyfrę dzielnéj, w celu wyznaczenia następującéj cyfry ilorazu, i t. d. Wyznaczone w ten sposób cyfry, razem uważane, przedstawiają nam liczbę szukaną, a liczba, otrzymana po odjęciu iloczynu dzielnika przez ostatnią cyfrę w ilorazie, będzie resztą dzielenia.*

Gdy mamy wykonać dzielenie, w którym dzielnik jest dość wielką liczbą, a spodziewamy się wielu cyfr w ilorazie, to korzystnym jest, dla ułatwienia sobie następnie tak wyznaczania cyfr ilorazu, jak i tworzenia iloczynów częściowych dzielnika przez cyfry ilorazu, wypisać uprzednio na boku, lub na oddzielnéj kartce, iloczyny dzielnika przez kolejne liczby jednocyfrowe, tymwięcéj, że taką tabliczkę łatwo tworzyć możemy przez dodawanie dzielnika do tegoż dzielnika i do kolejno w ten sposób otrzymywanych sum. Tak np., gdy mamy 25 807 156 427 podzielić przez 3742, utworzymy tabliczkę iloczynów dzielnika przez jednocyfrowe liczby:

	3742	1
(3742+3742)	7484	2
(7484+3742)	11226	3
(11226+3742)	14968	4
(14968+3742)	18710	5
(18710+3742)	22452	6
(22452+3742)	26194	7

[1]) Aby oddzielić iloraz od podpisywanych pod dzielną liczb, osobliwie w przypadku jednocyfrowego ilorazu (zob. us. 16).

[2]) Aby oddzielić iloraz szukany od danego dzielnika.

(26194+3742) 29936 8
(29936+3742) 33678 9,

przy pomocy któréj widać odrazu, że piérwszą cyfrą w ilorazie jest 6, że od 25807 odjąć należy 22452, i t. d.

Możemy wrazie, gdy w dzielniku jest większa liczba, np. gdy mamy 25807156 : 3742, postępować w ten sposób. Idzie o wyznaczenie piérwszéj cyfry w ilorazie, t. j. ilorazu z podzielenia liczby 25807 przez 3742. Ten iloraz nie może być większy od ilorazu z podzielenia 25 przez 3, więc, conajwyżéj może być liczbą 8; nie może zaś być mniejszy od ilorazu z podzielenia 25 przez 4, a więc, conajmniéj, może być liczbą 6. Należy więc tu próbować liczb 8, 7 6. Gdyby ilorazem miało być 8, to ósma część liczby 25807 nie mogłaby w żadnym razie być mniejszą od dzielnika, że zaś biorąc ósmą część liczby 25807, otrzymujemy: 32...., więc mniéj niż dzielnik, zatym 8 jest zbyt wielką, jako piérwsza, cyfrą ilorazu. Bierzemy siódmą część liczby 25807: otrzymujemy 36..., mniéj niż dzielnik, więc i 7 jest zbyt wiele. Śmiało więc możemy powiedzieć, że należy w ilorazie napisać pozostałą już jedyną z możliwych cyfr, t. j. 6 (i rzeczywiście, szósta część liczby 25807 jest 4..., niemniéj niż dzielnik). Podobnie postępować wypada przy wyznaczaniu następujących cyfr iloczynu.

20. Jeżeli mamy np. liczbę kończącą się zerami podzielić przez liczbę przedstawioną przez jedność z zerami, którychto zer jest niewięcéj niż końcowych zer w dzielnéj, np. 54 260 000 : 1000, to w ilorazie otrzymamy 54260, bo (us. 3; § 6, us. 21) $1000 \times 54260 = 54260000$, t. j. w ilorazie otrzymamy liczbę, powstałą z dzielnéj wskutek opuszczenia trzech jéj zer końcowych, t. j. tylu, ile jest zer przy jedności w dzielniku 1000, a więc: *aby liczbę kończącą się zerami podzielić przez liczbę, przedstawioną przez jedność z zerami, wrazie gdy tych zer przy jedności jest niewięcéj niż końcowych zer w dzielnéj, należy wziąć jako iloraz liczbę powstałą z dzielnéj przez opuszczenie tylu jéj zer końcowych, ile ich jest przy jedności w dzielniku.*

Jeżeli mamy np. 1 704 069 000 : 56700, to, gdy dzielną i dzielnik podzielimy przez 100, iloraz niezupełny, jak wiemy, zmianie nie ulegnie, reszta tylko skutkiem tego zmniejszy się 100 razy (us. 14). Możemy zatym, zamiast dzielić 1704069000 przez 56700, wykonać dzielenie 17040690:567; to, co otrzymamy w ilorazie, będzie tymsamym, cobyśmy otrzymali, dzieląc przez siebie pierwotnie dane liczby; resztę tylko, jeżeli będzie, wypadnie nam powiększyć 100 razy. Tak np.

```
1704069000 | 56700        62499000 | 1240000
-1701      | 30054        -6200    | 50
------     |              ------
   3069                    499 × 1000 = 499000
  -2835
  -----
    2340                   48300 | 230
   -2268                   -46   | 210
   -----                   ----- |
     72 × 100 = 7200          23
                             -23
                             ---
                              0
```

Stąd widzimy, że, *gdy mamy podzielić przez siebie liczby zakończone zerami, to, wykonywając działanie, możemy jednakową ilość zer końcowych w dzielnéj i dzielniku opuścić, przypisując tylko do reszty, jeżeli ona będzie, tyleż zer, ileśmy ich opuścili w każdéj z danych liczb.*

Zauważmy, że nawet w przypadku, gdy dzielnik jest zakończony zerami, a ostatnia cyfra dzielnéj nie jest zerem, możemy, z uwagi, że w każdym razie tyle ostatnich cyfr dzielnéj, ile jest końcowych zer dzielnika, znajdzie się zawsze w reszcie, opuścić w czasie wykonywania dzielenia końcowe zera dzielnika i nie zważać na tyleż końcowych cyfr dzielnéj, które dopiero, po wyznaczeniu ilorazu, przypiszemy do reszty dzielenia. Tak np.

```
25438 | 600        483567 | 23000        62499 | 1240
-24   | 42         -46    | 21           -620  | 50
------|            ------ |              ------ |
  14                  23                   499
 -12                 -23
 ---                 ---
  238                 567
```

Widzimy więc, że wogóle, *gdy dzielnik zakończony jest zerami, w czasie wykonywania dzielenia możemy opuścić tak te zera dzielnika, jak i taką samę ilość końcowych cyfr dzielnéj, byle tylko do otrzymanéj reszty przypisać opuszczone cyfry dzielnéj.*

Wykonywanie piśmienne dzielenia przez liczbę jednocyfrową, gdy już posiadamy dostateczną wprawę, zwykle sobie skracamy znacznie pisząc tylko cyfry ilorazu i ostatnią (jeżeli jest) resztę. Np., gdy mamy podzielić

57803543 przez 9
6422615 iloraz
z resztą 8

postępujemy tak: 9 w 57-u 6 razy (piszę 6 pod 7-ką), $9 \times 6 = 54$, zostaje 3, 9 w 38-u 4 razy (piszę 4 pod 8-ką),..., 9 w 53-ch 5 razy (piszę 5 pod 3-ką), $9 \times 5 = 45$, pozostaje reszta dzielenia 8.

PRÓBY DZIELENIA.

21. Próbę dzielenia możemy oprzéć na tym, że (us. 3, 11)

iloraz × dzielnik = dzielnéj,

iloraz niezupełny × dzielnik + reszta = dzielnéj.

Jeżeli więc dzielenie dobrze wykonaliśmy, to, po pomnożeniu przez siebie liczby, otrzymanéj w ilorazie, i dzielnika, i dodania do tego iloczynu reszty, jeżeliśmy ją otrzymali, wypaść nam powinna dzielna. Np.

```
7500351 | 300013        300013
. . . . . | 25           ×25
. . . . .               1500065
    26                  600026
                        7500325
                           +29
 48300 | 230            7500351
-46    | 210
  23                      230
 -23                     ×210
   0                      23
                          46
                        483000
```

Jest to więc próba dzielenia przez mnożenie.

Jeżeli mamy np. $230 \times 210 = 48300$, to gdy iloczyn 48300 będziemy uważać jako dzielną, możemy, z uwagi, że iloczyn nie zależy od porządku czynników, przyjąć którykolwiek z czynników za dzielnik, np. 210, wtedy (us. 3) pozostały czynnik, 230, będzie ilorazem; widzimy więc, że gdy poprzedni iloraz przyjmiemy za dzielnik, to jako iloraz otrzymać powinniśmy poprzedni dzielnik. Podobnie, gdy np. $7500351 = 300013 \times 25 + 26$, to po odjęciu od sumy 7500351 jednego składnika, 26, otrzymamy drugi składnik (300013×25), tak iż

$$7500351 - 26 = 300013 \times 25;$$

przyjmując więc liczbę (7500351 — 26) jako dzielną, a czynnik 25 (poprzedni iloraz niezupełny) jako dzielnik, otrzymamy jako iloraz liczbę 300013, (poprzedni dzielnik).

W taki sposób możemy wykonać próbę dzielenia przez dzielenie [1]). Tak np. powyższe dzielenie możemy tak sprawdzić:

```
 48300 | 210          7500351
-42    | 230             -26
  63                 7500325 | 25
 -63                  . . . . . | 300013
   0                  . . . . .
                          0
```

[1]) Próba mnożenia i dzielenia przez 9 w § 13, us. 17.

PRÓBA MNOŻENIA PRZEZ DZIELENIE.

22. Ponieważ dzielenie jest działanie odwrotne mnożeniu dwu czynników (us. 5), więc możemy wykonać próbę mnożenia przez dzielenie, znaleziony iloczyn dzieląc czyto przez mnożną, czytéż przez mnożnik; wtedy w ilorazie otrzymać powinniśmy odpowiednio poprzedni mnożnik, lub mnożną, reszty zaś żadnéj wypaść nam nie powinno. Np.

342100	73551500	342100 | 215
×215	−6842	
17105	5131	
3421	−3421	
6842	17105	
73551500	−17105	
	0.	

ILOŚĆ CYFR ILORAZU.

23. Gdy mnożymy przez siebie dwie liczby, to nie możemy ściśle zgóry oznaczyć, wiele będzie cyfr iloczynu: wiemy tylko, że ich będzie albo tyle, ile jest w mnożnéj i mnożniku razem, albo o jednę mniéj (§ 6, us. 29).

Gdy mamy podzielić liczbę np. 8-cyfrową przez 3-cyfrową, to wrazie, gdy początkowe 3 cyfry dzielnéj tworzą liczbę niemniejszą od dzielnika (us. 18), posłużą już one do wyznaczenia jednéj (piérwszéj) cyfry w ilorazie; że zaś w miarę użycia (przypisywania do reszt) następujących cyfr dzielnéj wyznaczamy następujące cyfry w ilorazie (us. 18), więc w tym przypadku, prócz téj 1-éj cyfry, będzie cyfr tyle, ile jeszcze pozostało cyfr dzielnéj, czyli tyle, o ile jest więcéj cyfr w dzielnéj niż w dzielniku, t. j. 8—3. Wszystkich więc cyfr w ilorazie będzie (8—3)× ×1=6. — Jeżeli zaś początkowe 3 cyfry dzielnéj przedstawiają liczbę mniejszą od dzielnika, to dopiéro z początkowych 3+1=4 cyfr dzielnéj (us. 18) wyznaczymy piérwszą cyfrę w ilorazie, a więc w tym przypadku będzie w ilorazie cyfr o jednę mniéj niż poprzednio, t. j. 8—3=5 cyfr. A więc: *w ilorazie otrzymujemy tyle cyfr, o ile jest ich więcéj w dzielnéj niż w dzielniku, albo o jednę więcéj* [1]). Odrazu jednak, mając dane liczby, łatwo ściśle oznaczyć możemy, który z tych dwu przypadków miejsce miéć będzie, t. j. dokładnie powiedziéć, ile cyfr w ilorazie otrzymamy.

---

[1]) Wogóle: jeżeli ilość cyfr dzielnéj nazwiemy p, a ilość cyfr dzielnika q, to w ilorazie otrzymujemy cyfr $p-q$, albo $p-q+1$.

DOPEŁNIENIE RESZTY.

24. Weźmy dzielenie w przypadku, gdy dzielna nie jest podzielna przez dzielnik, np. 104 : 6. Otrzymamy iloraz niezupełny 17 i resztę 2, a więc (us. 11)

$$104 = 6 \times 17 + 2$$

dzielna = dzielnikowi × iloraz niezupełny + reszta.

Ponieważ reszta jest mniejsza od dzielnika, więc można znaleść liczbę, którą dodając do reszty, otrzymamy dzielnik: $6 - 2 = 4$. Stąd $6 = 4 + 2$ i (§ 5, us. 7) $6 - 4 = 2$. Możemy więc tę liczbę 2 zastąpić przez (§ 5, us. 6) różnicę $6 - 4$ i napisać

$$104 = 6 \times 17 + 6 - 4.$$

Tu mamy $6 \times 17 + 6$ i od liczby, stąd otrzymanéj, odjąć 4. Lecz iloczyn 6×17 jest sumą (§, us. 2) siedemnastu składników 6; do niéj mamy tu jeszcze dodać ten sam składnik 6. Liczba więc $6 \times 17 + 6$ przedstawia sumę osiemnastu składników 6, czyli iloczyn 6×18. Od téj zaś liczby $6 \times 17 \times 6 = 6 \times 18$ odejmując liczbę 4, otrzymujemy 104, t. j.

$$104 = 6 \times 18 - 4.$$

Tę liczbę 4, o którą reszta różni się od dzielnika, t. j. liczbę którą należy dodać do reszty, aby otrzymać dzielnik, nazywać będziemy: dopełnieniem reszty do dzielnika, albo krócéj: dopełnieniem reszty. Jest więc,

$$2 + 4 = 6,$$

reszta + dopełnienie reszty = dzielnikowi.

Zauważmy jeszcze, że ponieważ $18 = 17 + 1$, a 17 jest ilorazem niezupełnym naszego dzielenia, więc liczba 18 przedstawia: iloraz niezupełny + 1. A więc, to, cośmy powyżéj napisali,

$$104 = 6 \times 18 - 4,$$

możemy tak ogólnie przedstawić.

dzielna = dzielnikowi × (iloraz niezupełny + 1) — dopełnienie reszty.

Gdy więc, wykonywając dzielenie 1000 : 7, otrzymujemy resztę 6, to dopełnieniem reszty będzie tu liczba 1, bo $6 + 1 = 7$, i możemy napisać:

$$1000 = 7 \times 142 + 6 \text{ i } 1000 = 7 \times 143 - 1.$$

ŚREDNIA ARYTMETYCZNA.

25. Mając kilka liczb danych, możemy szukać takiéj liczby, którą biorąc zamiast każdéj z danych liczb, otrzymujemy tęż samę sumę, co z dodania liczb danych. Np., gdy mamy dane liczby: 5, 8, 26 i 16, to liczba 14 jest taką właśnie liczbą, bo

$$5+8+27+16=56,$$
$$14+14+14+14=56.$$

a więc

$$14+14+14+14=6+8+27+16.$$

Taką liczbę, jak tu 14, t. j. *liczbę, którą biorąc zamiast każdéj z danych liczb, otrzymujemy tę samą sumę, co z dodania danych liczb, nazywamy średnią arytmetyczną* [1]) *liczb danych.*

Ponieważ $14+14+14+14=14\times4$ (6, us. 2), więc

$$14\times4=5+8+27+16,$$

skąd, uważając liczbę $5+8+27+16$ za dzielną, a czynnik 4, który nam przedstawia ilość liczb danych, za dzielnik mamy (us. 5)

$$(5+8+27+16):4=14,$$

t. j. *aby otrzymać średnią arytmetyczną liczb danych, należy sumę tych liczb podzielić przez ich ilość.*

Jeżeli np. było w południe jednego dnia 15^0 (stopni) ciepła, drugiego 18^0, trzeciego 12^0, czwartego 10^0, piątego 8^0, szóstego 10^0, siódmego 11^0, to średnia arytmetyczna stanu ciepła w południe w ciągu tego tygodnia jest

$$(15^0+18^0+12^0+10^0+8^0+10^0+11^0):7=84^0:7=12^0.$$

Np. Ktoś skupił cztéry kawałki gruntu; za jeden, mający 4 mor. gi, płacił po 180 rs. za mórg; za drugi mający 2 morgi, po 240 rs. za mórg; za trzeci, mający 3 morgi, po 225 rs. za mórg; nakoniec za czwarty, mający mórg obszaru, zapłacił 315 rs. Po ile płacił średnio za mórg? Mamy tu znaléść średnią arytmetyczną 10-u liczb: 4-ch liczb 180 rs., 2-u liczb 240 rs., 3-ch liczb 225 rs. i liczby 315 rs., a więc:
(180 rs.$\times4$+240 rs.$\times2$+225 rs.$\times3$+315 rs.) : 10=2190 rs. : 10=219 rs.
Odp. Płacił średnio za mórg 219 rs.

ILORAZ POTĘG TÉJ SAMÉJ LICZBY.

26. Uzupełnimy nieco to, cośmy w zakończeniu poprzedzającego §-u mówili o potęgach liczb.

Jeżeli mamy np. $3^9:3^4$, to z uwagi, że (§ 6, us. 39) $3^9=3^4\times5^5$ możemy nasze dzielenie tak przedstawić $(3^4\times3^5):3^4$. Mamy tu iloczyń dwu czynników 3^4 i 3^5 podzielić przez jeden z tych czynników; otrzymamy więc (us. 13) jako iloraz czynnik pozostały, t. j. liczbę 3^5; więc $3^9:3^4=3^5$. Nadto widzimy tu, że wykładnik ilorazu, 5, powstał z wykładników dzielnéj i dzielnika,

[1]) W znaczeniu średniéj arytmetycznej odniedawna używają niekiedy wyrazu «przeciętna».

9 i 5, wskutek odjęcia od wykładnika dziolnéj wykładnika dzielnika, $5 = 9 - 4$. Więc $3^9 : 3^4 = 3^5 = 3^{9-4}$, t. j. *iloraz dwu potęg téj saméj liczby jest także potęgą téj liczby, której wykładnik jest różnicą wykładników dzielnéj i dzielnika.*

27. Jeżeli zastosujemy to do przypadku szczególnego, gdy dzielna i dzielnik są tymi samymi potęgami téj saméj liczby, to będziemy mieli w wykładniku różnicę liczb równych sobie (§ 5, us. 11), t. j. zero, np. $3^4 : 3^4 \times 3^{4-4} = 3^0$. Z drugiéj strony, dzieląc liczbę przez nią samę, otrzymujemy (us. 11) jedność $3^4 : 3^4 = 1$. Więc 3^0 jest to samo co 1; również $10^0 = 1$ i t. d. *Jakąkolwiek liczbę z wykładnikiem zero możemy uważać za przedstawienie jedności.*

28. Skutkiem tego możemy liczby np. 30568, 856724 (§ 6, us. 40) tak przedstawić:

$$30568 = 3\times10^4+5\times10^2+6\times10^1+8\times10^0,$$
$$856724 = 8\times10^5+5\times10^4+6\times10^3+7\times10^2+2\times10^1+4\times10^0,$$

i podobnie, np. (§ 6, us. 41)

$$[250413]_6 = 2\times6^5+5\times6^4+4\times6^2+1\times6^1+3\times6^0, \text{ i t. d.}$$

PRZEDSTAWIENIE LICZBY W NIEDZIESIĄTKOWYM SYSTEMACIE.

29. Jeżeli chcemy liczbę np. 22185 przedstawić w systemacie szóstkowym, to, ponieważ na piérwszym z prawej strony miejscu ma być postawiona część liczby, jaka się zostanie po oddzieleniu z liczby 22185 wszystkich szóstek, należy wynaleść resztę z podzielenia 22185 przez 6. Iloraz niezupełny przedstawiać nam będzie szóstki. Aby znaleść tę część liczby, którą wypadnie oznaczyć na miejscu drugim (z prawéj strony), trzeba z tych szóstek oddzieli wszystkie kwadraty liczby sześć, t. j. ten iloraz niezupełny podzielić jeszcze przez 6, a wtedy reszta będzie tym, co na miejscu drugim napisać nam wypadnie, iloraz zaś niezupełny przedstawi nam ile razy w danéj liczbie jest wszystkich $6^2 = 36$.

22185	6			
3697	6			
616	6			
102	6			
17	6			
2,				

mamy więc tu:

$$22185 = 3697\times6+3$$
$$=(616\times6+1)\times6+3 = 616\times6^2+1\times6^1+3$$
$$=(102\times6+4)\times6^2+1\times6^1+3 = 102\times6^3+4\times6^2+1\times6^1+3$$
$$=(17\times6)\times6^3+4\times6^2+1\times6^1+3 = 17\times6^4\times4\times6^2+1\times6^1+3$$
$$=(2\times6+5)\times6^4+4\times6^2+1\times6^1+3=2\times6^5+5\times6^4+4\times6^2+1\times6^1+3$$
$$=[250413]_6.$$

W podobny sposób, aby liczbę np. 1199801 przedstawić w systemacie np. dwunastkowym, wykonywamy kolejne dzielenia przez podstawę 12, a oznaczywszy 10 przez znak np. a i 11 przez znak np. b, mamy $1199801 = [49a3b5]_{12}$.

W takito sposób możemy liczbę przedstawioną w systemacie dziesiątkowym wyrazić w innym systemacie.

ROZDZIAŁ IV.

MIARY. DZIAŁANIA NA LICZBACH WIELORAKICH.

§ 8. MIARY.

1. „Rzeczy do ważenia mogą być cięższe, albo lżejsze; mierzyć przypada czasem mniéj, a czasem więcéj; jedne rzeczy trzeba płacić drożéj, inne taniéj. Z tego powodu rozmaite wagi, miary i piéniądze postanowiono. Drobne naprzykład piéniądze wygodne są do wypłacania sum małych, nie zaś wielkich. Wagi, dostateczne na pomiarkowanie ciężarów w prostych towarach, nie są dostateczne [1]) na zważenie rzeczy droższych, gdzie uchybienie małe szkodęby znaczną kupującemu, albo sprzedającemu przyniosło. Trzeba więc było wielorakie miéć pieniądze, wagi i miary; trzeba było podzielić najwyższe gatunki na niższe, których więcéj albo mniéj jeden wyższy gatunek składałoby, aby tym sposobem wygodnie i potrzebie ludzkiéj dogodzić." [2])

Rozmaite narody wytwarzały sobie dla swych potrzeb różne miary. Początkowo odnoszono wymiary różnych rzeczy do pewnych przedmiotów powszechnie znanych, jak np. do ziarn zboża, do długości wziętych z ciała ludzkiego i t. d. Ponieważ jednak te przedmioty mogły się od siebie różnić, a rozwijające się stosunki wymagały miar jednostajniejszych, więc starano się określić dokładniéj to, według czego mierzyć miano w pewnym kraju. Tak więc np. przy wymiarach, wziętych z ciała ludzkiego, miano na uwadze osoby, ważne stanowisko w narodzie zajmujące, które zwykle fizycznie bywały wówczas silnie rozwinięte; dlatego to np. stopa, miara od najdawniejszych czasów używana, u rozmaitych ludów nieco odmienna, jest jednak zawsze większa od zwykłéj teraz stopy ludzkiéj [3]).

---

[1]) „nie są dosyć".

[2]) *Arytm. dla sz. nar.*, str. 79.

[3]) U Egipcyan i Żydów np. były między innymi miary: palec (t. j. szerokość palca), pięć (szerokość dłoni), stopa, krok, droga jednego dnia i t. d.—Podobnież w Anglii, według postanowienia Henryka I z r. 1101, gyrd (odpowiadający teraźniejszemu yardowi) miara długości do powszechnego użycia, jest długością ramienia tego króla do końca trzeciego palca. Miara ta dzieli się na trzy stopy, stopa ma 12 cali, wielkość zaś cala wyznacza długość trzech wzdłuż ustawionych ziarn jęczmienia. Według różnych postanowień (ostatnie z r. 1494), ciężar 32 suchych ziarn pszenicy stanowił pennę (pennyweight) których 20 tworzyło uncyją, 12 zaś uncyj

Z czasem coraz więcéj uczuwać się dawała w każdym społeczeństwie potrzeba ujednostajnienia miar, t. j. posiadania pewnych stałych wzorów i rozciągnięcia kontroli nad kopijami tych wzorów, będącymi w powszechnym użyciu. Mimo, że w oddzielnych państwach takie wzory miar ustanawiano, że starano się o wyrób kopij dokładnych, że za używanie miar niedokładnych określano kary, doszło w wieku XVIII do tego, że w każdym prawie mieście odzielnego państwa [1]) znajdowały się inne miary, a niekiedy nawet w tym samym mieście bywały różne miary do rozmaitych przedmiotów [2]). Było to bardzo niedogodne dla handlujących: rachunki stawały się kłopotliwymi, a nadużycia łatwymi. Niedogodności te więcéj się jeszcze uczuwać dawały w stosunkach wzajemnych różnych narodów, chociaż niekiedy porównywano ze sobą dość starannie miary uważane za obowiązujące w różnych państwach i ogłaszano tablice zamiany miar.

2. Potrzeba było miéć miary dokładne i stałe, niezmienne, a nadto tak dogodne, iżby wiele narodów, jeżeli nie wszystkie, przyjąć je zechciały za swoje. Należało więc obmyśléć miary takie, żeby zasada, na któréj miary są oparte, zmianie nie ulegała, tak iż, wrazie zatracenia wyrobionych wzorów, możnaby je zawsze nanowo odtworzyć dokładnie, a nadto żeby ta zasada była tak wybrana, iżby nie była wzięta z warunków właściwych pewnemu jednemu krajowi, ale mogła być uważana za odnoszącą się równie dobrze do warunków jakiegokolwiek kraju i narodu.

Opracowanie takiego właśnie układu miar podjęli w ostatnich latach XVIII stulecia uczeni francuscy. Oparli oni ten układ na niezmieniających się wymiarach ziemi. Wymierzywszy część łuku południka ziemskiego, [3]) wnieśli z niéj o długości całego południka. Ćwierć téj długości południka wystawić sobie należy podzieloną na 10 000 000 równych części. Tę część nazwali *metrém* [4]).

---

funt (pound): miara objętości: gallon zawiérała 8 funtów pszenicy czyli mieściła 61440 ziarn pszenicy.—Stopa francuska dawna, t. z. pied du roi, albo „paryska“ ma być, według podania, długością stopy Karola Wielkiego.

[1]) Miało to miejsce nietylko w Niemczech, we Włoszech, w Polsce, we Francyi i t. d., ale nawet w Anglii, w któréj jeszcze Charta magna libertatum (r. 1215) zastrzegła jednakowe wagi w całym państwie, co różnymi czasy było ponawiane, i w któréj wyrabianie wiarogodnych kopij wzorów miary długości i ciężaru (odlanych z rozkazu Elżbiety i w r. 1588 złożonych w skarbcu) dozwalane było tylko za osobnym przywilejem.

[2]) W Paryżu np., prócz zwykłego łokcia („aune“), istniał inny dla jedwabiu, mniejszy dla sukna, a jeszcze mniejszy dla płótna. — Ilość różnych miar do mierzenia powierzchni gruntu, używanych w północnéj Francyi, wydaćby się dziś mogła prawie bajeczną: były wsi, które miały po kilka własnych miar.

[3]) W przypuszczeniu że wszystkie południki ziemskie są równe sobie.

[4]) Należy uczniom pokazać wielkość metra i jego części (por. str. 83). Również daléj pokazywać jednostki średniéj wielkości, dorównywać je z sobą i t. d.

Aby zaś jednocześnie wprowadzić ułatwienie we wszelkie rachunki, do których miary wchodzą, postanowiono, że przy podziałach wszędzie użyta, będzie liczba 10. Dla nazwania miary 10 razy większéj od metra przystawili na początku do wyrazu metr *deka* (zgrecka: 10), tak iż dekametr oznacza 10 metrów. Dla nazwania miary 10 razy większéj od dekametra, czyli 100 razy większéj od metra, użyli wyrazu *hekto* (zgrecka: 100), skąd hektometr. Podobnież dla nazwania miary 10 razy większéj od hektometra, użyli dodatku *kilo* (zgrecka: 1000), skąd kilometr. Również na oznaczenie miary 10 000 razy większéj od metra, przy pomocy dodatku *myria* (zgrecka: 10 000), utworzono myryjametr. — Co się zaś tyczy miar mniejszych od metra, to na oznaczenie części dziesiątéj, setnéj, tysięcznéj użyto odpowiednio dodatków *deci*, *centi* i *mili* (odpowiadających łacińskim nazwom 10, 100 i 1000), tak iż decymetr oznacza 10-ą część metra, centymetr oznacza 10-ą część decymetra, czyli 100-ą metra, a milimetr oznacza 10-ą część centymetra, czyli 1000-ą metra.

Nazwy tych z powyższych jednostek, które są częściéj używane, są obecnie [1]) oznaczane przez skrócenia jedną lub dwoma literami (bez oddzielnych kropek po nich) w piśmie podkreślonymi, w druku pochyłymi, (kursywą). Tak więc:

metr = *m*
decimetr = *dm*, centymetr = *cm*, milimetr = *mm*
kilometr = *km*

Dla nazw zaś: dekametr, hektometr i myryjametr, jako rzadko używanych nie przyjęto odpowiednich skróceń, należy więc je wypisywać zwykłym sposobem.

Takie więc są:

Miary długości czyli miary linijowe.

m = 10 *dm* = 100 *cm* = 1000 *mm*
dm = 10 *cm* = 100 *mm*
cm = 10 *mm*

dekametr = 10 *m* = 100 *dm* = 1000 *cm* = 10 000 *mm*
hektometr = 10 dekametrom = 100 *m* = 1000 *dm* i t. d.
km = 10 hektometrom = 100 dekametrom = 1000 *m* i t. d.
myryjametr = 10 *km* = 100 hektometrom = 1000 dekametrom = 10 000 *m* i t. d:

---

[2]) Na mocy postanowienia r. 1885 Komitetu międzynarodowego wag i miar.

W państwach, w których są zaprowadzone te miary, na milę pocztową [1]) liczą 7500 *m*. Zwykle teraz długość mili geograficznéj określa się jako pietnastą część średniego stopnia południka ziemskiego i przyjmuje się, że ma 7407 i prawie pół metra [2]).

Miary powierzchni.

Przy wymierzaniu powierzchni różnych przedmiotów używają się: metr kwadratowy [3]), który przez skrócenie oznacza się m^2, jako też:

dm^2, cm^2, mm^2;

km^2

a nadto niekiedy przy mierzeniu rozległości prowincyi, kraju i t. d. myryjametr kwadratowy. Przy obliczaniu jednak powierzchni pola ornego, pastwiska, lasu i t. p., wogóle gruntu [4]), używa się jako jednostki dekametra kwadratowego, który ma nazwę *ar* i oznacza się przez skrócenie: *a*, jak również używa się miary większéj: 100 arów, która więc nazywa się hekto-ar, czyli hektar, i oznaczana bywa przez skrócenie: *ha*; jest więc $a = 100\ m^2$, $ha = 10000\ m^2$.

Miary objętości.

Przy mierzeniu objętości różnych przedmiotów używa się miar metr sześcienny [5]), który się oznacza przez skrócenie m^3, i podobnie:

dm^3, cm^3, mm^3, km^3.

Ale przy wymierzaniu objętości [6]) zboża, owoców, a także cieczy w handlu, uważa się za jednostkę dm^3, która nosi nazwę *litr* i przez skrócenie bywa oznaczona: *l*; przy większych objętościach zboża lub cieczy w handlu jest używany z większych miar głównie hektolitr, t. j. 100 litrów, oraz niekiedy dekalitr, t. j. 10 litrów; z miar zaś mniejszych od litra używane są niekiedy na oznaczenie objętości cieczy w handlu: decylitr, t. j. 10-a część litra, i centylitr, t j. setna część litra. Nazwy te piszą

---

[1]) Francuskie «lieu» na lądzie ($^1/_{25}$ stopnia) ma $^4/_9$ myryjametra, na morzu ($^1/_2$) stopnia) ma $^5/_9$ myryjametra.

[2]) Mila geograficzna $= \frac{10\,000\,000}{90.\,15}\ m = 7407\,^1/_2\ m$, skąd wynika, iż $km = 0{,}135$ mili geogr.

[3]) Porówn. § 6, us. 32, 33.

[4]) Ale grunt pod budowę, a także często powierzchnie ogrodów, w miastach oblicza się na m^2.

[5]) Por. § 6, us. 35, 36.

[6]) Jednostką przy wymierzaniu drzewa opałowego jest we Francyi m^3, który się wtedy nazywa «stère»; używa się tam także «decistère».

się krócéj, mianowicie: hektolitr = *hl*; decylitr = *dl*, i centylitr = *cl*. Jest więc np. $m^3 = 1000l$.

Miary ciężaru, czyli wagi.

Przy ogrzéwaniu lub oziębianiu jakiegokolwiek przedmiotu zmienia się jego objętość [1]), a tymsamym dwie jednakowe objętości tego samego przedmiotu przy różnéj temperaturze bywają niejednakowo ciężkie. Należy więc dla oznaczenia jednostki ciężaru wybrać taki przedmiot, któregoby objętość przy pewnéj temperaturze szczególnie się różniła od objętości przy wszelkiéj innéj temperaturze, a nadto taki, któryby łatwo można było mieć wszędzie [2]) i bez trudności otrzymać go w stanie czystym [3]). Te wszystkie własności posiada woda. Jest ona wszędzie, a skądkolwiek czerpana, po oczyszczeniu przez dystylacyą [4]), jest zawsze jednakowa. Nadto przy pewnéj temperaturze [5]), którą zwyczajnymi środkami otrzymać można, ma objętość najmniejszą, t. j. jest najgęstsza, najściślejsza [6]). Dlatego woda najwięcej się nadaje, aby jéj ciężar w pewnych warunkach uważać za jednostkę wagi. Przyjęto więc, że ciężar jednego cm^3 wody dystylowanéj przy takiéj jéj temperaturze, przy któréj woda jest najgęstsza, uważa się za jednostkę miar ciężaru, czyli wag; ciężar ten nazywa się

gram i oznacza się przez skrócenie: *g*

Miary większe i mniejsze tworzą się podobnie, jak poprzednio. Mamy więc dekagram t. j. 10 gramów, hektogram t. j. 100 gramów, kilogram t. j. 1000 gramów; decygram t. j. 10-a część grama, centygram t. j. 100-a część grama i miligram t. j. 1000-a część grama.

Z nich częściej używane mają skrócenia:

decygram = *dg*, centygram = *cg*, miligram = *mg*;

---

[1]) Np. woda z naczynia, które wypełnia, przy znacznem ogrzaniu (jeszcze przedtym, nim wrzeć zacznie) wylewa się, a coraz więcéj marznąca sprawia pękanie gontów, rozsadza kamienie, butelki i t. d. Z téjże przyczyny części szyn, mostów żelaznych niezupełnie do siebie przystają. I t. d.

[2]) Żelazo, złoto, srebro i t. d. w niewielu tylko miejscowościach się dobywa.

[3]) Złoto, srebro, a osobliwie żelazo bardzo trudno mieć w stanie zupełnie czystym.

[4]) Przyrząd do dystylowania wody znajduje się np. w każdéj aptece. Dystylacya polega na przeprowadzeniu wody w stan pary i skroplenie téj pary w części chłodnéj przyrządu.

[5]) Przy 4 stopniach ciepła termometru Celsius'a czyli przy 3-ch i jednej-piątéj stopnia ciepła termometru Réaumur'a.

[6]) Tak, iż wrazie, gdy następnie wodę będziemy albo wciąż ogrzewali, albo wciąż oziębiali, to jéj objętość będzie się wciąż powiększała, czyli gęstość wody będzie się wciąż zmniejszała.

dekagram = *dkg*, kilogram = *kg*.

Prócz tego większe ciężary liczy się na centnary metryczne, czyli kentale metryczne [1]) po 100 *kg*, oraz na beczki czyli tony [2]) po 1000 *kg*; pierwszy oznacza się przez *q*, druga przez *t*.

Według powszechnego dziś zwyczaju tam, gdzie te miary są w użyciu, pół kilograma w drobnym handlu nazywa się funtem.

Widzimy, że wszystkie te miary linijowe, powierzchni, objętości, oraz ciężaru, oparte są na téj saméj zasadniczéj mierze, t. j. na metrze. Dlatego ten układ miar nazywa się układem metrycznym, albo systematem metrycznym, a miary te nazywają się miarami metrycznymi.

Układ ten miar, przyjęty we Francyi w końcu wieku XVIII został już teraz także wprowadzony w wielu państwach stałego lądu Europy, a w téj liczbie w Niemczech [3]) (r. 1875), w Austro-Węgrzech (r. 1876), jakotéż w wielu państwach pozaeuropejskich. Nadto we wszystkich dziełach naukowych wszelkie wymiary są przedstawiane w systemacie metrycznym.

3. We Francyi sprawę ujednostajnienia miar podjęła jeszcze Rada Filipa Długiego w r. 1321, lecz te usiłowania, jak i inne późniejsze, wobec krzyżujących się interesów osób wpływowych, spełzły na niczym. Dopiéro w roku 1778 i 1789, w różnych miastach Francyi, przy wybiéraniu deputowanych, stanowczo domagano się od nich obalenia różnorakich miar, «będących tylko powodem do nieporozumień, oszustw, a nawet ucisku». W skutek tego w r. 1790 zajęto się energicznie kwestyją ustalenia miar.

Ówcześni uczeni wskazywali dwa sposoby rozwiązania téj kwestyi, zaprojektowane przeszło sto lat przedtym. — Myśl jednego z nich powziął Huyghenes, twórca teoryi wahadła, który w r. 1664 zalecał, jako stopę zasadniczą czyli «stopę czasu» (pes horarius) przyjąć trzecią część wahadła prostego, bijącego sekundy. Gdy zaś się okazało, że ta długość zależy od szerokości geograficznéj miejsca, w którym bije wahadło, projektowano przyjąć zawsze za zasadę długość wahadła bijącego sekundy, ale już w pewnym miejscu oznaczonym, jak np. w Paryżu, albotéż na równiku [4]), lub nakoniec pod 45° szero-

---

[1]) «Quintal métrique».

[2]) Tonna — «tonne», «tonneau».

[3]) W Niemczech dodano nazwy (które jednak, prócz funta, rzadko się spotykają): *m* = Stab; *cm* = Neuzoll; *mm* = Strich; dekametr = Kette; litr = Kanne; połowa litra = Schoppen; *hl* = Fass; 50 litrów = Scheffel; 10 *g* = Neuloth; 500 *g* = Pfund; 50 *kg* = Centner, ale tonna 1000 *kg*.

[4]) Wielkimi zwolennikami téj zasady byli Bonguer i Lacondamine, którzy wymierzyli (1735 — 1746) część łuku Peruwii (dł. geogr. 298°44″0″ od — 3°4′32″ do

kości gieograficznéj. — Inny sposób podał astronom Mouton z Lijonu w r. 1670, zalecając przyjąć za zasadę długość południka ziemskiego, a mianowicie długość łuku jednéj jego minuty, któraby się dzieliła na 10, 100, 1000 i t. d. rozmaicie nazwanych przezeń części. — Nadto w r. 1790 Bonné zaprojektował [1]) przyjęcie za zasadę miar określonéj części łuku równika, jako «stopy równikowéj».

W r. 1790 w Zgromadzeniu ustawodawczem Talleyrand przedstawił żądanie ustalenia miar, skutkiem czego uchwalono, aby komisarze akademii nauk w Paryżu spólnie z członkami, wybranymi z towarzystwa naukowego w Londynie, «pod szerokością 45°, lub inną, którąby za odpowiedniéjszą uznali, wyznaczyli długość wahadła i z niéj wyprowadzili wzór niezmienny dla wszystkich miar i wag». Akademija paryska wybrała komisyją, do któréj weszli uczeni Borda, Lagrange, Laplace, Monge i Condorcet; komisyja ta 19 marca r. 1791 postawiła takie wnioski. Chociaż długość wahadła sekundowego pod szer. 45° przedstawia się jako średnia długości pod innymi szerokościami, to jednak jest ona wogóle zależną od innego elementu, czasu, oraz od dowolnego podziału dnia na sekundy, a prócz tego jest ona zbyt mała, aby było właściwym przez nią wyrażać odległości miejsc znacznie od siebie oddalonych. Nadto jeszcze nader ważnym jest wzgląd na to, że mniejszą może być niedokładność przy wyznaczaniu zasadniczéj miary ze starannie mierzonego dość wielkiego łuku południka, lub równika, niż z najstaranniéj wymierzonéj tak niewielkiéj długości wahadła. Z dwu zaś pozostałych do wyboru długości: równika i południka, równik nie zaleca się większą prawidłowością od południków. A więc, z uwagi, że wyznaczenie długości mniéj ściśle daje się wykonać, niż wyznaczenie szerokości, oraz, że pod równikiem niewielu ludzi przebywa, gdy tymczasem przez każdą miejscowość przechodzi południk, komisyja zaleca, aby «jednostką rzeczywistą» miar była ćwiartka południka ziemskiego, jéj zaś dziesięciomilijonowa [2]) część «jednostką do użycia powszechnego» a za zasadę przy wyznaczeniu jednostki wag przyjąć pewien ciężar wody dystylowanéj, ważonéj w próżni przy téj temperaturze, przy któréj ona przechodzi ze stanu stałego w ciekły. W tym celu należy wymierzyć część łuku południka paryskiego od Dunkierki do Barcelony, która przedstawia więcéj niż $9^{01}/_{27}$, przecina równoleżnik średni (t. j. 45°) i kończy się tak z jednéj jak z drugiéj strony u poziomu morza. Nadto należałoby wyznaczyć ilość wahań, któreby miara ustanowić się mająca robiła w ciągu doby, w próżni, przy poziomie morza i temperaturze lodu topniejącego, pod 45° sz., aby w danym razie

---

$+0^{0}2''31''$ sz. g. Kazali oni długość wahadła sekundowego pod równikiem wykuć w kamieniu z napisem: „Mensure naturalis exemplar, utinam et universalis".

[1]) Artykuł Munckego *Mass* w Gehlera *Phisikatisches Wörterbuch* (VII, 1836).

[2]) Przez to uczyniono ją niezależną od podziału koła na stopnie, minuty i sekundy.

można było odtworzyć tę miarę przy pomocy wahadła. W ten sposób (jak się wyraża komisja) „gdyby pamięć tych prac się zatarła, a tylko same ich wyniki się zachowały, nie przedstawiałyby one niczego, coby posłużyć mogło do poznania, który mianowicie naród powziął tę ideę i przeprowadził jéj wykonanie".

Ten projekt Zgromadzenie narodowe przyjęło 26 marca tegoż roku, a król w cztéry dni późniéj go zatwierdził. Zajęto się natychmiast w akademii nauk najrozmaitszymi studyjami przygotowawczymi do dokładnego doprowadzenia do skutku prac, pomyślanych według tak obszernego planu [1]), a następnie utworzono osobną komisyją, mającą wykonać zamierzone roboty. — Po rozwiązaniu akademii w sierpniu r. 1793 ustanowiono w kwietniu r. 1795 osobną Komisyją wag i miar, którą składali Berthollet, Borda, Brisson, Coulomb, Delambre, Haüy, Lagrange, Laplace, Méchain, Monge, Prony i Vandermonde, oraz (późniéj weszli) Darcet i Lefévre-Gineau. — W czerwcu r. 1792 Méchain i Delambre rozpoczęli obserwacyje różnych stacyj dla późniejszego obliczania trójkątów, piérwszy dla południowéj, drugi dla północnéj części południka—wśród bardzo niesprzyjających warunków, jako następstwa ówczesnego położenia Francyi. Zwalczając najrozmaitsze przeszkody, zmuszeni nawet przez pewien czas zawiesić swe prace, przeprowadzili je ze wszelką starannością i dokładnością możliwą. Do brania kątów użyto koła powtarzającego Bordy, które dozwalało wyznaczać dowolną wielokrotność kąta, a tymsamym w odpowiednim stosunku zmiejszać nieuniknione niedokładności, tak iż one prawie znikały. Na 90 trójkątów, łączących krańcowe punkty, było aż 36 takich, w których błąd sumy trzech kątów był mniejszy od 1″, a największy taki błąd w trzech trójkątach niedochodził tylko do 5″, t. j. nie dochodził do $^1/_{120}$ jednego stopnia. Obserwacyje azymutu (a także szerokości gieogr.) były czynione nietylko w obu punktach krańcowych, ale i w trzech punktach dośrednich; różnice wypadłe z rozmaitego ich uwzględniania w rachunkach nie wyniosły $^1/_{240000}$ długości mierzonego łuku. Wymierzeniem dwu [2]) podstaw, jednéj przy Melun, a drugiéj blisko Perpignan, zajął się Delambre i uskutecznił te pomiary z uwzględnieniem najdrobiazgowszym wszelkich okoliczności zapomocą linijałów (prętów, nazwanych „modules„) platynowych, redukując odczytaną długość do 13° R., czyli 16 $^{01}/_{4}$ C., wymierzając kąty pochyłości linijałów, aby zapomocą rachunku wynaléść ich długość poziomą. Długość tych podstaw wyrażono w sążniach peruwijańskich („toise de Pérou"), t. j. przyjęto [3]) za jednostkę w tych wymiarach długość tego sążnia

[1]) W tych pracach przygotowawczych brali udział: prócz osób, które weszły późniéj w skład Komisyi wag i miar, Lavoisier, Meunier i Tillet (wkrótce zmarli).

[2]) Drugą podstawę wymierzono tylko dla sprawdzenia dokładności pomiarów.

[3]) Dlatego także wszelkie późniejsze obrachowania długości łuków różnych południków dokonywają się w tychże sążniach. (Sążeń = 6 stopom, pieds du roi, czyli «paryskim»; stopa = 12 calom, cal = 12 linijom).

żelaznego, który był użyty przy mierzeniu części łuku w Peruwii (pos. str. 125, odsyłacz). Po zredukowaniu do poziomu morza, długość podstawy przy Melun wyniosła 6075″,90, a długość podstawy blizko Perpignan 6006″,249; wyprowadzając zaś tę ostatnią z poprzedniéj rachunkiem zapomocą łańcucha 53 trójkątów, je łączących, otrzymano więcéj tylko o 0″,160, t. j. o 11,52 cala, gdy odległość tych podstaw od siebie wynosiła około 33 000 s. Te obserwacje i pomiary zostały ukończone w listopadzie r. 1798.

Wobec tak przeciągających się robót, wskutek postanowienia Konwentu, jeszcze z d. 7 kwietnia r. 1795, zaprowadzono we Francyi metr tymczasowy (prowizoryczny), oraz ustanowiono nazwy (us. 2) tak miar linijowych, powierzchni i objętości, jak i mających się w przyszłości oznaczyć miar ciężaru [1]). W lipcu tegoż roku Borda i Brisson wyznaczyli ów metr tymczasowy jako długość wzoru miedzianego przy 10°C. równą 443,44 linij sążnia (żelaznego) peruwijańskiego przy 13°R.

W końcu r. 1798 zjechali się do Paryża uczeni państw wówczas Francyi przyjaznych, aby wziąć udział w sprawdzaniu robót dokonanych i w pracach dalszych Komisyi. Niektórzy z nich, jak holender Van Swinden, szwajcar Trallés, włosi Fabbroni, Mascheroni i Vassali byli wielce czynni i pomocni. Nadto mechanicy paryscy Lenoir i Fortin, dokładnością w wykończeniu przyrządów i pomysłowością w obmyśleniu niektórych z tych narzędzi, dla całéj sprawy od jéj początku wciąż świadczyli ważne usługi. — Po drobiazgowym sprawdzeniu dotychczasowych rachunków, obliczono długość mierzonéj części południka od Dunkierki do Monjouy koło Barcelony (stanowiącéj 9°,67380), po zredukowaniu do poziomu morza, na 551584,72 sążnia peruwijańskiego. Z tego, jakoteż z rezultatów pomiara łuku w Peruwii, wniesiono, że spłaszczenie (iloraz z podzielenia różnicy średnicy równika i osi ziemi przez średnicę równika) południka ziemskiego jest $^1/_{334}$; na zasadzie zaś tego wypadła długość ćwierci południka ziemskiego 5 130 740 sążni per., a zatym metr = 0,513074 sążnia per., czyli 443,295936 linii sążnia per., przy jego temperaturze 13°R., czyli 16 $^1/_2$C., gdyż przy téj temperaturze wymierzono podstawy. Postanowiono więc, że wzór metra, wyrobiony z platyny ma mieć przy temperaturze lodu topniejącego długość równą 443,296 linii sążnia peruwijańskiego (żelaznego), przy jego temperaturze 16 $^1/_4$C. — Borda i Cassini zapomocą nader starannych wyznaczeń znaleźli, że długość wahadła sekundowego w próżni w Obserwatoryjum paryskim przy 16 $^1/_4$C. wynosi 440,5593 lin. per., czyli 0,993977 metra [2]), — oznaczeniem miar ciężaru za-

[1]) Metr pochodzi od μέτρον, miara; ar od łacińskiego „arare“, orać; litr wprowadzają do wyrazu greckiego λίτρα, ciężar funta, choć była w użyciu we Francyi odpowiednia miara objętości, zwana „litron“; gram od γράμμα, gramma. oznaczająca pewien niewielki ciężarek, a „stère“ od στερεὸς twardy.

[2]) Everett, *Units and physical constants* (1879), przyjmuje tę długość równą 0,99390 *m*, a długość wahadła sekundowego pod 45° szer. 0,99356 *m*.

jęli się Lefévre-Gineau i Fabbroni. Z uwagi, że nader trudno otrzymać i utrzymać wodę w temperaturze lodu topniejącego, t. j. ściśle w temperaturze 0°C. lub R., jak również, że wtedy ze względu na bliskość przejścia wody w stan stały, może zachodzić dość znaczna zmiana gęstości, a tymsamym zmiana ciężaru danéj objętości wody, jakotéż z uwagi, że z szeregu doświadczeń, robionych spólnie z Tralles'em, okazało się, że woda przy 4°C. jest najgęstsza [1]) wybrano wodę w téj właśnie temperaturze, jako mającą posłużyć do wyznaczenia wzoru ciężaru, Z wielu doświadczeń, przy pomocy drobiazgowych rachunków wyznaczono ciężar platynowy, który w próżni równoważy ciężar decymetra sześciennego wody dystylowanéj, mającéj temperaturę 4°C., i ten ciężar przyjęto jako kilogram [2]). — Sprawozdanie ostateczne o wyliczaniu długości południka i wyznaczeniu z niéj długości metra, opracowane przez Van Swinden'a, Komisyja przyjęła 30 kwietnia r. 1799, a sprawozdanie Tralles'a o jednostce wag 30 maja. Po odczytaniu raportu ogólnego Van Swinden'a na pełnym posiedzeniu Instytutu narodowego nauk i sztuk 17 czerwca, Komisyja przedstawiła (stosownie do wzmiankowanego wyżéj postanowienia Konwentu z d. 7 kwietnia r, 1795) w d. 22 czerwca (r. 1799) prototypy platynowe metra i kilograma [3]) obu izbom Ciała prawodawczego i złożyła je tegoż dnia w archiwum państwowym. Dlatego te wzory noszą nazwę metra archiwowego i kilograma archiwowego. Te wzory [5]) winny być używane tylko w przypadkach szczególnéj ważności [6]).

Z obliczeń pomiarów niektórych południków, jakie następnie były dokonane [7]),

---

[1]) Nowsze badania wykazały, że woda jest najgęstszą przy 4°,08C.

[2]) Lefèvre-Gineau, porównywając ciężar kilograma ż funtem, nazywanym „la pile-de Charlesmagne" (wzorem z początku wieku XIV, starannie zachowanym), znalazł, że *kg* = 18827, 15 ziarna („grain, poids de marc"), których ten funt zawiérał 9216. Stopa („pied du roi") sześcienna wody dystylowanéj temperatury 4°C. ważyła w próżni tych funtów 70 i 213 ziarna, *kg* archiwowy ma kształt walca, którego wysokość jest równa średnicy podstawy.

[3]) Niezależnie od tego Komisyja poleciła wykonać z równą starannością kilku metrów żelaznych z zakończeniami z mosiądzu, równych metrowi archiwowemu przy temperaturze lodu topniejącego, oraz kilka kilogramów z mosiądzu, ważących w próżni tyleż, co kilogram archiwowy—mających służyć do sprawdzania miar do użycia rozpowszechnianych.

[4]) Wszystkie zaś rękopismy oryginalne złożył Delambre, po wydrukowaniu dzieła, o którym niżéj, w obserwatoryjum paryskim.

[5]) W r. 1806 metr i kilogram platynowe, porównane z archiwowymi (wraz ze wszystkimi przyrządami, przy wszelkich robotach używanymi) złożono w obserwatoryjum paryskim, aby umożliwić poza archiwum sprawdzanie naukowe miar.

[6]) Wszystkie dane, obliczenia, raporty i t. d. są zestawione w dziele Delambre'a *Base du systéme métrique décimal* (3 tomy, 1806—1810), z którego tu korzystałem.

[7]) Z pomiarów południków, różnymi czasy dokonanych, uważają się za *najważniéjsze* pomiary: południka w Peruwii, o którym poprzednio była mowa; południka francuskiego od Dunkierki do Montjony, a daléj (częścią przez Méchain) do Formentery przez Biot i Arago, tak iż południka tego. dług. gieogr. 20°0'0", wymierzono (1792 — 1806) część od 51°2'8",50 do 38°39'56",11 szer. g.; południka Indyi Wschodnich, dł. 95°20'0", przez (1802—1843) Lampton'a i Everest'a część od 8°9'32",30 do 20°30'48",89 sz, południka Rosyi, dł. 44°23'14", przez (1820—1853) Struve'go, Handsten'a, Selan-

wypada [1]), że średnia [2]) długość ćwierci południka jest 10 000 205 metrów [3]). — Właściwie więc nie należy metra uważać za jednę-dziesięciomilijonową część ćwiartki południka, ale jako długość, która, według najnowszych obliczeń, mieści się w ćwierci średnika południka ziemskiego 10 000 205 razy.

W latach 1870, 1872 i 1875 odbywały się w Paryżu narady delegatów wielu państw w celu utworzenia instytucyi, czuwającéj nad zachowaniem oryginałów metra i kilograma i wyrabiającéj dokładnie ich kopije. Wskutek powziętych uchwał powstał w r. 1875 w Paryżu, spólnie przez różne państwa utrzymywany, stały Komitet międzynarodowy wag i miar...

4. Różnorakie miary, używane w Polsce [4]), usiłowano ujednostajnić na sejmie w r. 1565. Konstytucya tego sejmu łokieć miary krakowskiéj na cały kraj stanowi. Co do korca, który był najrozmaitszéj (wielce od siebie różnéj) objętości, kazano tymczasowo we wszystkich województwach Korony, wraz z Mazowszem i Rusią, trzymać się miary, jakiéj główne miasto każdego województwa używa; co do trunków jednak polecono, iż one mają być w całéj Koronie kwartą krakowską mierzone, a 4 kwarty mają iść na garniec, garncy zaś 72 na beczkę [5]). Funt, czyli dwie grzywny, ma zawierać 32 łuty, albo 48 skojców [6]). Inna zaś była grzywna, używana w Koronie, a inna na Litwie [7]); funtów 32 mają tworzyć kamień, a 5 kamieni centnar

---

der'a i Tenner'a część od 70°40′11″,8 do 45°20′2″, 3 sz. (przewodniczącym oddziału, wymierzającego część od 52° do 46°, był Adam Prażmowski); południka pruskiego, dł. 38°9′40″, przez (1831—1834) Bessel'a i Bayer'a część od 54°13′11³,466 do 55°43′40″,446.

[1]) Według Listing'a artykułu w *Astronomische Nachrichten*, r. 1878, N. 2228.

[2]) Południki nie są równe sobie; równik ziemski nie jest kołem, lecz elipsą, której spłaszczenie jest znacznie mniejsze od spłaszczenia elips różnych południków. Wogóle kształt ziemi nie może być uważany za bryłę foremną; szczególny kształt, ziemi właściwy, nazwano gieojdą.

[3]) Listing obrachowywa bryłę (elipsojdę obrotową) o kołowym równiku i (równych sobie) eliptycznych południkach, mającą tę samę objętość, co ziemia. W téj bryle spłaszczenie południka wypada $\frac{1}{288{,}4800}$; połowa średnicy równika 6 377 377 *m*; połowa osi ziemskiéj 6 355 270 *m*; długość ćwierci południka 10 000 205 *m*; długość ćwierci równika 10 017 560 *m*; promień kuli, mającéj objętość równą objętości ziemi, 6 370 000 *m*; długość wahadła sekundowego pod 45° sz. g. 0,9935721 *m*; długość mili geograficznéj $\left(\frac{1}{5400}\right.$ obwodu równika $\left.\right)$ 7420,415 *m*.

[4]) Przy opracowywaniu tego ustępu miałem pod ręką: Czackiego (1800—1801) *O litewskich i polskich prawach* (wydanie z l. 1848—1844); *Volumina legum*, t. VII; W. A. Maciejowskiego *Historya dawnych polskich miar i wag w zarysie (Ekonomista*, r 1868); J. Kołobrzega-Kolberga *Porównanie miar i wag*... (wydania 2-gie, 1838); artykuł Pauker'a w *Jahrbuch*'u Schumacher'a z r. 1836, i t. d.

[5]) A 24 garnce na baryłę.—Konstytucya sejmu w r. 1598 pozwoliła województwu krakowskiemu mieć beczki do piwa o 62 garncach.

[6]) Skociec oznaczał także aż do początku wieku XVI dwa grosze.

[7]) Za Kruse'm (1784) i Gerhardt'em (1791 podaje Czacki grzywnę koronną=4198

(= 160 funtom). Nawoływano również na tym sejmie o ujednostajnienie różnych wielkością łanów (od r. 1374 bowiém płacono po 2 „grosze" z łanu) oraz o określenie innych miar gruntu, jak: włóka, śrebie, ślad — lecz tego nie załatwiono wtedy. — W Litwie miary były jednostajniejsze. Długo jednak nie była określona, używana od najdawniejszych czasów, miara objętości beczką zwana. Drugi (1564) a wyraźniéj trzeci (1588) statuty litewskie stanowią, iż beczka powinna miéć miarę cztérech korcy krakowskich [1]). — Uchwały, powzięte na sejmie r. 1565, miały być wprowadzone w ten sposób: wszystkie miary i wagi, na sejmie wycechowane, dano pod dozór wojewodom, a każdy z nich zjechawszy zaraz po sejmie do głównego miasta swego województwa, winien był je oddać urzędowi starościńskiemu z nakazem, aby były na ratuszu każdego miasta i miasteczka chowane i wydawane tym, którzyby podobne sprawić sobie zechcieli; kopije, uznane za sprawiedliwe, burmistrz powinien ocechować i do użytku oddać interesantowi. — Postanowienia te jednak, osobliwie w Koronie, nie były wykonywane, a z czasem powiększyły ilość używanych przedtym miar. Były więc najrozmaitsze łokcie [2]) i stopy [3]), znacznie bardzo różniące się od siebie korce używane w różnych miejscowościach [4]), przeróżne miary powierzchni, oraz rozmaite wagi. Wogóle, miary „nietylko co powiat, ale co miasteczko różniły się" [5]).

Dopiéro wskutek postanowienia sejmu w r. 1764 na wniosek Komisyi skarbu koronnego uporządkowano *miary w Koronie* „cum provinciis annexis". — Łokieć, który był zachowany na ratuszu warszawskim, jako równy krakowskiemu[6]),

---

assom holenderskim, a litewską (równą królewieckiéj), za Kruse'm, = 4076 a. h. (Grzywna holenderska = 5120 a. h. = 246,0829 grama.)

[1]) Toż samo stwierdza uchwała sejmowa r. 1613.

[2]) «Łokieć lwowski, ile z różnych ułamków regiestrów za Zygmunta Augusta, Stefana Batorego i Zygmunta III widzieć można, miał $1^1/_4$ łokcia krakowskiego. Rozumiem, że arszyn, miara tatarska, któréj Rusini używali, będąc miarą w handlu tego rodzaju, dał egzystencyją temu lwowskiemu łokciowi.» (Cz.)

[3]) Niezawsze 2 stopy, używane w pewnéj miejscowości, stanowiły łokieć tamże.

[4]) Tak np. w r. 1660 stwierdzono, że korzec pilecki ma półtora korca krakowskiego, że korczyk olsztyński ma korczyków krakowskich (po 14 garncy) trzy i t. d. Według dokumentów z r. 1569, korcy 4 oświecimskich = 5 krakowskim, ćwiertnia poznańska dzieliła się na 4 wiertele po 18 garncy (dotąd w kaliskim liczą zboże na „wiertele" po 16 garncy); kościańska ćwiertnia miała 2 toruńskie. I t. d. — Łaszt oddawna na Mazowszu ma 30 korcy, czyli 60 półkorcy (korczyków), jednak w *Arytm. dla sz. nar.* i wydanym również przez Komisją Edukacyjną *Elementarzu dla szkół parafialnych narodowych* (1785) podano: „łaszt zawiéra w sobie korcy warszawskich 27".

[5]) „Nie naszego tylko kraju ta była wada." (Cz.) — O różnorakich u nas miarach można częściowe powziąć pojęcie z dzieła Czackiego i tablic Kolberga. Tu przytaczam tylko ważniejsze.

[6]) W tablicach Kolberga łokieć wolnego miasta Krakowa = 0,616969 *m* a stopa = 0,356421 *m*, ł. zaś lwowski = 2 stopom=0,593931*m*=Obecnie w Galicyi przyjmuje się (używane przed wprowadzeniem w r. 1876 systematu metrycznego): ł. krak.=0,616399 *m*, st. krak.=0,298011 *m*, ł. lw.=0,594272 *m*, st. lw.=0,296799 *m*, nadto arszyn (we Lwowie)=0,817058 *m*, (według tablicy w *Arytm.* Bączalskiego, wydanéj we Lwowie w r. 1875). Od czasu zaś wprowadzenia systematu metrycznego w Galicyi przyjmuje się w handlu łokieć = 0,6 *m*.

przyjęto za normalny [1]), z podziałem: sążeń = 3 łokciom, ł. = 2 stopom; stopa = 12 calom; cal = 12 linijom, linija = 12 punktom. Długość tego łokcia przedstawia 264 linij [2]) stopy paryskiej (= 0,595539 metra). — Jako korzec obowiązujący ogłoszono korzec warszawski, czyli mazowiecki z podziałem na 4 ćwierci, albo 32 garnce (ale korczyk gdański = 16 garncom), a garniec = 4 kwartom — 16 kwaterkom. Do płynów zaś beczka = $14^2/_5$ konwi = 72 garcom [3]), z dalszym podziałem garnca na kwarty i kwaterki. Ten garniec (koronny) obejmuje 190 cali sześciennych paryskich [jest więc kwarta [4]) koronna = 0,942228 litra] — Za funt dla Korony przyjęty został funt wrocławski; podziały: centnar = 5 kamieniom, kamień = 32 funtom; funt = 2 grzywnom = 32 łutom, a nadto funt okrętowy, szyfunt („szafunt") = 13 kamieniom. Funt koronny miał przedstawiać ciężar 8442 assów holenderskich; garniec wody dystylowanéj, przy 10°R. i przy $27^3/_4$ cała par. ciążenia atmosfery, ma ważyć 9,3055 tych funtów, czyli łokieć sz. wody 480 funtów. [Poszukiwania Eitelwein'a okazały, że funt wrocławski, a więc i koronny [5]), = 405,228 grama.] — Sejm polecił rozesłać po kraju nacechowane wzory, a nadto wiarogodne egzemplarze złożyć tak na ratuszu warszawskim, jak i w archiwum skarbowym.

Miary dla Litwy ustanowiono ostatecznie, na wniosek Komisyi skarbowéj litewskiéj, na sejmie r. 1766. — Łokieć pozostał dawny, ogólnie na Litwie używany od wieku XIII, doskonale równy dwu stopom paryskim, czyli 288 linijom [6]) par. (= 0,549679 *m*).—Jako podstawę miar objętości, bardzo dobrze określono garniec (mały) litewski, który w kształcie walcowym miéć powinien wewnętrznie $7^3/_8$ cala litewskich (czyli paryskich) głębokości, a $4^7/_8$ cala w średnicy; garniec = 4 kwartom = 8 półkwartówkom, Do zboża

---

[1]) „Nie wzruszając miary prętowéj starodawnéj co do włók". — Należy laskę mierniczą, czyli wierzbcę, uważać jako początkowo równą 15 łokciom chełmińskim starym, o którym niżéj.

[2]) „Komisyja edukacyjna, potwierdzając dzieła klasyczne o gieometryi wydane, zdała się uprawnić mniemanie, że stopa miała $1308^1/_2$ linij dziesiątkowych (— t. j. dziesiątych części linii—) stopy paryskiéj, a tak łokieć miałby 2615 (sic) linij dziesiątkowych... Łokieć, który w magistracie miasta Warszawy zachowany został i który komisyja skarbowa koronna w 1764 r. wzięła za prawidło, składał się z linij (sic) 2640; inne łokcie były $2^1/_2$ dziesiątkowymi (sic) linijami mniejsze, lecz to brano za omyłkę". (Cz.) Prawdopodobnie wyraz dziesiątkowe jest w tym zdaniu przestawiony: powinnoby być „z linij dziesiątkowych 2640: inne łokcie były $2^1/_2$ linijami mniejsze".

[3]) Wprawdzie to postanowienie sejmowe mówi wyraźnie o wzorach kłody, miary kłodowéj, ale ich niczym nie określa. A nawet Czacki wyraźnie mówi, że nie wié, jakie to były miary. — Używany antał (antałek) jest czwartą częścią téj beczki, a więc zawiéra 18 garncy, — Dojnica, używana na Ukranie i Litwie, miewała od 8 garncy do 2 korcy. — Koniuszka = 2 garncom.

[4]) Kwarta krak. = 0,960953 *l*, a lw. = 0,96132 *l* (*Ar.* B.)

[5]) Funt krak. = 405,493 *g*, a lw. = 420,045 *g*. (*Ar.* B.)

[6]) Zatym łokieć litewski = $\frac{12}{11}$ łokcia koronnego.

i wogóle ciał sypkich przyjęty następujący podział beczka = 6 ćwierciom = 8 ośminom = 16 szesnastkom = 144 garncom (małym) [1]) do płynów zaś beczka dzieli się na 72 garnce cechowe (czyli duże, t. j. ma także 144 garnce małe); czasza do miodów ma 6 garncy cechowych czyli 12 małych. [Garniec więc mały (szynkowy) zwykle później wprost garncem litewskim nazywany, jako objętość 142,32426 cala sz. par.,=2,843199 litra [2]).]—Funt litewski został określony, jako cztéry-piąte funta berlińskiego- Centnar ma 5 kamieni, kamień 40 funtów, funt 32 łuty (jednak funt rzeźniczy na mocy zwyczaju miał 50 łutów). [Ponieważ funt berliński = 468,53588 grama, więc funt litewski [3]) = 374,8287 g.]

Co do miar powierzchni gruntów [4]), istniało wprawdzie w ustawie ekonomicznéj r. 1557 opisanie [5]) włóki, czyli [6]) łanu. Z tego opisania wypada, że sznur = 75 łokciom = 10 prętom, mórg [7]) = 3 sznurkom kw. = 300 prętów kw., włóka=20 morgom.—Przytoczonymi wyżéj postanowieniami sejmowymi nie ujęto później powierzchni gruntów w oznaczone miary. Używano więc wciąż najróżnorodniejszych miar. Czacki z urzędu obrachowywał niektóre z używanych miar gruntowych i złożył odpowiednią tablicę. Rezultaty jego obliczenia z protokółów referendaryi koronnéj przeszły do różnych dzieł, Zauważyć tu należy, że przyjętą na Mazowszu w r. 1576 włókę chełmińską (jéj podział: włóka = 30 morgom; mórg = 300 prętom kw.; pręt kw. = 100 pręcikom kw.; pręcik kw = 100 ławkom kw., przy pręcie równym $7^1/_2$ łokciom, tak iż włóka = 506 250 łokciom kw,) z czasem wymie-

---

[1]) Na łaszt królewiecki szło beczek litewskich 8 i ćwierci 3 a na łaszt rygski (który miał 45 purów rygskich) beczek 8 i ośmina. — Pur żmujdzki, używany dotąd na Litwie i na Białorusi, = 24 garncom lit., tak iż beczka litewska = 6 purom żm. Używany zaś dawniéj w niektórych okolicach na Białorusi pur białyniecki (od: „Białynicze“) = 71 gar. lit., tak iż beczka lit. = 2 p. b. i 2 garncom. — Z używanych przedtym na Polesiu i Podlasiu szanków, szanek dawny=48 gar. lit., a nowy = 24 gar. lit. Obecnie na Polesiu będące w użyciu szanki są równe 32 gar. „rządowym“, a 4 szanki idą na beczkę; że zaś tamte przyjmują 8 g. „rząd.“ jako równe 9 g. „komisyjnym“, zatym ta beczka odpowiada litewskiéj.

[2]) Jeden więc garniec litewski=3 kwartom koronnym, będąc nieznacznie od nich mniejszy. Dlatego przyjmuje się 4 gar. lit.=3 gar. kor., a więc beczkę litewską równą 3 korcom koronnym i 12 garncom kor.

[3]) Zatym funt koronny=1,056493 funta litewskiego.

[4]) Zestawienie krytyczne, wiadomości o najdawniejszych u nas takich miarach i o ich powstaniu podaje Dr. Franciszek Piekosiński w pracy: *O łanach w Polsce wieków średnich.* (*Rozprawy* wydziału histor.-filozof. ak. um. w Krakowie tom XXI r. 1887)

[5]) „To jest uroczysty i prawny przepis pomiaru: z zapomnieniem ustawy ekonomicznéj, zapomniano o prawdziwych pomiaru prawidłach“. (Cz.)

[6]) „Łan i włóka niczym się od siebie nie różnią, tylko nazwiskiem“. (Zaborowskiego *Jeometrya praktyczna*, r. 1786.)—„Włóki było zarobne pole, łany zaś do zarobienia były przeznaczone. (Cz.)

[7]) „Murgi seu jutrzyny“, „morgi sive jutrzyny“ (Długosz, *Liber beneficiorum* III). Początkowo mórg oznaczał obszar, który można zorać w ciągu dnia, od rana, do „jutra“.

rzano, uważając za podstawę łokieć warszawski (późniejszy koronny), a nie chełmiński [7]), a mimoto utrzymano dla niéj nazwę włóki chełmińskiéj; dodano tylko podział morga na 3 sznury kwadratowe. Owóż, przy pomocy tych miar, mających za podstawę łokieć koronny, a nazywanych chełmińskimi, a niekiedy chełmińsko-polskimi, z obliczeń Czackiego wypada, że z używanych miar:

łan frankoński większy	= 1 włóce	20 morg.	1 sznur.	kw.	38 pręt.	kw.				
„ „ mniejszy	= 1 „	10 „	1	„	10	„	40 pręcik.	kw.		
„ teutoński [2]) inaczéj niemiecki	= 1 „	13 „			60	„				
„ kmiecy większy	=	21 „	1	„	51	„	20	„		
„ „ mniejszy	=	6 „	2	„	48	„				
„ rewizorski [3])	= 3 włókom									

Z tablic Kolberga wynika, że inne w Polsce używane miary można przez takież, tak zwane chełmińskie [4]), miary tak wyrazić [4]):

włóka chełmińska stara	=	28 morgom			26 pręt.	kw.		
„ „ nowa	=	28 „	2	sz. kw.	91 „		15 pręck.	kw.
„ litewska [6])	= włóce	5 „	2	„	10 „		74 „	
mórg magdeburski (180 prętów [7]) kw.	=		1	„	27 „		98 „	
włóka magdeburska (30 morgów mag.)	=	12 „	2	„	39 „		44 „	
mórg (Joch) wiedeński (1600 sążni w [8]) kw.)	=		2	„	88 „		51 „	

5. Na zalety układu metrycznego miar zwrócono u nas bardzo wcześnie uwagę. Już w r. 1802 Aleksander Sapieha wydał: *Tablice stosunku no-*

---

[1]) Łokieć chełmiński stary = 225,44 linii par., ł. cheł. nowy = 259,43 l. p. (gdy ł. warsz., jak widzieliśmy, = 264 ł. p.)

[2]) W województwie sieradzkim, według dekretów starościńskich z lat 1762 i 1778, śrebie równało się łanowi teutońskiemu.

[2]) Przy rewizyi wójtostw. Łan ten pisarze sądowi nazywali łanem chełmińskim co z czasem przez niebaczność sądy powtarzały (Cz.) — Bywały zwyczajem uświęcone inne jeszcze miary. Tak np. w okolicach Żarnowca kieliszek pola był 128-ą częścią łanu (Cz.)

Staje łanu frankońskiego jest długością $217^1/_2$ łokcia kor.; staje łanu kmiecego większego = 84 ł. k., mniejszego = 100 ł. k. (Związek staja z łanem opisuje Czacki.)

[3]) Jedna taka włóka równa się w miarach nowopolskich 1 włóce, 2 morgom, 20 prętom, kw. i 49,9596 pręcika kw.

[4]) Opuszczając ułamki pręcika kwadratowego.

[5]) Miała taki sam podział jak chełmińska z dodaniem sznura kw. — 100 prętom kw. (Więc wł. lit.—także 506 250 ł. lit. kw.) Włóka litewska osadna — 33 morgom litewskim.

[7]) Pręt téj miary — 12 stóp reńskich. Stopa reńska (czyli pruska r. 1816) — 139,13 l. dar. — 0,3138535 metra.

Takich 120 prętów kw. tworzyło używany u nas w niektórych dzielnicach mórg reński polny, zaś 160 tych prętów kw. liczono na mórg reński leśny, choć w tym ostatnim przyjmowano niekiedy za podstawę pręt liniowy = 16 stopom reńskim.

[8]) Sążeń wiedeński—840,76 l. par. Przyjmuje się sąż. w.—1,890484 *m*.

wych miar i wag francuskich z litewskiemi i polskiemi miarami i wagami; później Aleksander Chodkiewicz w r. 1811 ogłosił: *Tablice stosunku dawnych miar i wag francuskich i koronno-litewsko-polskich z miarami i wagami nowémi a przyjętemi we Francyi* [1]).

Zmiany polityczne w końcu XVIII i na początku XIX wieku. przeistaczały miary koronne coraz na inne, wskutek wprowadzenia w niektórych częściach kraju ówczesnych miar pruskich i austryjackich. Stało się to powodem nowego zamieszania w użycia miar w księstwie warszawskim i późniejszym królestwie polskim.

Z inicyjatywy i przy ciągłym spółudziale Staszica, deputacyja Towarzystwa przyjaciół nauk w Warszawie [2]), wyznaczona w r. 1816, zajęła się uporządkowaniem miar. Myśl związania miar z miarami układu metrycznego wywołała obmyślenie nowego systematu. Na bezpośrednie wprowadzenie układu metrycznego nie odważono się wtedy, z uwagi na trudności, jakieby to wobec zakorzenionych zwyczajów nastręczało. Ówcześnie zresztą w żadnym państwie o tym nie myślano [3]).—Postanowiła więc deputacyja zatrzymać miejscowe nazwy, podziały i mniéjwięcéj tę samę wielkość jednostek, zmieniając je tylko otyle, aby one dały się wyrazić całkowicie i dogodnie przez miary systematu metrycznego. Mianowicie: określono łokieć jako długość 576 milimetrów, kwartę jako równą litrowi, a funt jako równy 405 504 miligramom [4]). —

---

[1]) W obu tych pracach wyrachowania są oparte na przytoczonym wyżéj dziele Czackiego.

[2]) Deputacyją składali: kasztelan A. Chodkiewicz (prezydujący), profesorowie królewsko-warszawskiego uniwersytetu: J. Celiński, A. Dąbrowski, J. Hoffman, M. Kado, A. Kitajewski, K. Szaniawski oraz rektor szkół pijarskich J. Bystrzycki. (Protokółów obrad deputacyi, mimo usilnych starań, odnaléść nie mogłem.)

[3]) Nawet we Francyi w r. 1812 pozwolono czasowo używać miar zbliżonych nazwami i mniéjwięcéj wymiarami do dawniejszych; te miary przejściowe były określone jako pewne części jednostek metrycznych, a wzory wszystkie winny były mieć odpowiednie napisy. Z owych czasów datuje się dotąd używany we Francyi funt («la livre»), równy połowie kilograma (us. 1).

[4]) Z zestawienia tych miar z miarami z lat 1764 i 1766 wypada:

łokieć n.-p. = 0,967191 ł. kor. = 0,886592 ł. lit. (= 255,33846 linii par.)
garniec n.-p. = 1,061314 g. kor. = 1,416830 g. lit.
funt n.-p. = 1,000680 f. kor. = 1,081840 f. lit.

Widzimy więc, że z miar poprzednich (koronnych uległy największéj stosunkowo zmianie miary do wymierzania zboża i cieczy, a starano się o największą zgodność co do funta.

Ustanowiono nadto miary drożne: mila = 8 stajom milowym, przyjmując staje milowe = 1852 łok.+1 c. + 6,46 linii. Chciano długość staja milowego uczynić równą długości wersty ruskiéj, iżby mila była równą 8 werstom. Wskutek niedokładnego wówczas wyrachowania stosunku miary ruskiéj do metra, staje to jest nieco dłuższe od wersty. Z przyczyny zaś, że urzędy pocztowe liczyły w Królestwie na milę werst 7, co się powoli upowszechniło, mila prawna została zupełnie zaniedbaną.

Dawniéj mila nie była u nas żadnym (ile wiém) postanowieniem prawnym określona, Czacki w swych wyrachowaniach rozległości kraju i jego części liczy mil 20 na stopień i przyjmuje, że mila = 9328 łokciom koronnym. Kolberg w swych tablicach wyznacza, że: „Mil używano dwojakich w Polsce: gieograficznych, czyli większych, których idzie 15 na 1 stopień, i mniejszych, których liczono 20 na 1 stopień.“ „Mil litewskich szło 12,44 na stopień gieograficzny“, ale nie objaśnia na czym oparł tę danę co do mil litewskich.

Projekt ten wskutek postanowienia Rady administracyjnéj z d. 13 czerwca r. 1818 został zatwierdzony, a miary te stały się obowiązującymi w Królestwie od d. 1 stycznia r. 1819. — Te miary, dla odróżnienia od dawniejszych, nazywają miarami nowopolskimi [1]).

Miary nowopolskie.

Miary długości czyli miary linijowe.

Sążeń = 3 łokciom; łokieć = 2 stopom = 4 ćwierciom; stopa = 12 calom; cal = 12 linijom; linija = 2 milimetrom.

Miary miernicze: sznur = 10 prętom = 75 łokciom; pręt = 10 pręcikom; pręcik [2]) = 10 ławkom. (Jest więc pręt równy 15 stopom.)

Miary powierzchni.

Sążeń kwadratowy, łokieć kw.; stopa kw.; cal kw.; linija kw.; milimetr kw.

Miary większych obszarów gruntu: włóka = 30 morgom; mórg = 3 sznurom kw. = 300 prętom kw. [3]): pręt. kw. = 100 pręcikom kw.; pręcik kw. = 100 ławkom kw.

Miary objętości.

Sążeń sześcienny, łokieć sz.; stopa sz.; cal sz.; linija sz.; milimetr sz.

Miary do ciał sypkich: korzec = 4 ćwierciom; ćwierć = 8 garncom garniec = 4 kwartom (kwarta równa litrowi).

Miary do płynów: garniec = 4 kwartom; kwarta = 4 kwaterkom; kwaterka = 2 półkwaterkom. Beczka = 25 garncom [4]).

Miary ciężaru czyli wagi.

Cetnar = 4 kamieniom [5]); kamień = 25 funtom; funt = 32 łutom; łut = 12 672 miligramom.

---

[1]) Ten układ miar przedstawia piérwsze poza Francyą wprowadzenie zasad systematu metrycznego.

[2]) Pręcik, albo «stopa gieometryczna», = 432 *mm.*

[3]) Mórg taki (300-prętowy, przy stopie n.-p. jako podstawie) nazywają teraz chełmińskim, albo niekiedy nowochełmińskim. Przy robocie polnéj na wymiar przyjmuje się za mórg powierzchnią 200 prętów kw.; taki mórg 200-prętowy nazywają często morgiem magdeburskim.

[4]) Postanowienie późniejsze Komisyi rząd. spraw wewnętrznych. Więc beczka np. = *hl.* —Liczą także na oksefty po 60 garncy, na stągwie po 50 garncy.

[5]) Przy tranzakcyjach na niektóre towary, kamienie mają zwyczajem uświęconą inną ilość funtów. Tak np. kamień mydła, świec, wosku ma 32 funty, a 4 takie kamienie przedstawiają centnar wełny = 128 funtom. Kamień siana ma 24 funty, a 5 takich kamieni stanowią cetnar siana = 120 funtom.—Używana niekiedy miara oko = 3 funtom.

Właściwie ustanowiono taki podział funta: funt = 12 uncyjom; uncyja = 2 łutom; łut = 4 drachmom; drachma = 3 skrupułom; skrupuł = 24 granom; gran = $5^1/_2$ granikom; granik = 8 miligranikom. Jednak w ogólnym handlu uncyje, drachmy, skrupuły, grany i graniki nie przyjęły się.

Jako funt aptekarski utrzymywał się wciąż dawny funt norymberski $\left(= \frac{23}{15}\right.$ grzywny kolońskiéj = 358 510,6 miligrama = 28 łutom + 1 drachmie + 11 granom + 42,626 *mg* wagi n.-p.$\left.\right)$, z podziałem: funt = 12 uncyjom; uncya = 8 drachmom; drachma = 3 skrupułom; skrupuł = 20 granom.

Według postanowienia z d. 1 grudnia r. 1815 dla mennicy, jako waga złota i srebra przepisana została grzywna kolońska (4864,677... assów hol.). któréj ciężar = 233,8123 grana, czyli 0,576596 łunta n.-p., albo 18 łutom + 1 drachmie + 2 skrupułom + 9,92 grana wagi n.-p., z podziałem grzywna = 16 łutom [1]), łut = 18 granom (menniczym).

Przy wyrobach jubilerskich używa się oddawna karatu angielskiego = 0,20528 grama [2]). Karat dzieli się na 12 granów karatowych.

6. W d. 14 marca r. 1848 Rada administracyjna Królestwa postanowiła, że stosownie do ukazu z d. 1 lutego tegoż roku „we wszystkich czynnościach tak rządowych jak i prywatnych w królestwie polskim, poczynając od d. 1 maja r. 1849, mają być używane miary i wagi w Rosyi istniejące". „Wszakże przy rozgraniczeniach i wogólności przy pomiarach gruntów, winny być na planach i regiestrach pomiarowych wymierzane przestrzenie, obok miar rosyjskich, oznaczane zarazem i na miary miejscowe, dotąd używane. jako konieczne do rostrzygnięcia zachodzić mogących sporów." [3]).

Miary russkie są związane z długością stopy angielskiéj [4]), która została przyjęta na miarę russką za panowania Piotra I. Odpowiedniego ukazu nie

---

[1]) Zupełnie czyste srebro nazywano 16-łutowym, albo 16-éj próby.

[2]) Zupełnie czyste złoto nazywają 24-karatowym.

[3]) Artykuł 5 tego postanowienia R. ad.

[4]) Aktem parlamentu z r. 1824 uznano długość sztaby metalicznéj, wyrobionéj w r. 1760 przez Bird'a (i złożonéj przez ówczesną komisyją parlamentarną do rewizyi miar i wag w archiwum parlamentu), przy 62° Fahrenheit'a (czyli $13^0{}^1/_3$R., albo $16^0{}^2/_3$C.) za typ yarda dla całego państwa. Na mocy tegoż aktu, wrazie zatracenia lub uszkodzenia tego typu, należało za yard przyjąć długość 36 cali, których 39,1393 ma przedstawić długość wahadła, bijącego sekundy w próżni u poziomu morza, pod szerokością gieograficzną Londynu, przy 62°F. Po zniszczeniu jednak tego wzoru w czasie pożaru parlamentu w r. 1826, nie przystąpiono do wyznaczenia, według wskazań tego aktu, nowego yarda normalnego, lecz od r. 1836 zaczęto zbiérać w państwie całym długości niezaprzeczalne różnych przedmiotów, a z nich z wielkim prawdopodobieństwem odtworzono yard zatracony, który przez postanowienie parlamentu z r. 1855 został uznany za normalny. Nie podano jednak wskazówek, jak postąpić wrazie zatracenia lub uszkodzenia tego nowego wzoru, przedstawiającego obecnie wielkość prawną yarda, tak, iż określeniem yarda jest teraz wyłącznie długość owéj sztaby z r. 1855. (Yard = 3 stopom.)

Ogólnie dotąd (od r. 1819) przyjmuje się, iż przy temperaturze $16^0{}^2/_3$C. wzorów angielskich, a 0°C. wzorów metrycznych:

odnaleziono, lecz wiadomym jest, iż sażeń, według tego postanowienia została określona jako długość 7 takich stóp, a więc arszyn, jako długość 28 cali angielskich. Ukaz 11 (23) października r. 1835 [1]) uregulował układ miar russkich.

Według tego ukazu: zasadą miary russkiéj liniowéj jest sażeń równa 7 spółczesnym stopom angielskim z podziałem na 3 arszyny po 28 cali, czyli 16 werszków; zasadniczą jednostką wag russkich jest wzór funta, przedstawiający ciężar 25,019 cali sześciennych [2]) wody dystylowanéj w próżni przy $13^{01}/_{3}$R., zupełnie równy funtowi pozłacanemu mennicy petersburskiéj, zrobionemu w r. 1747; funt aptekarski jest $^{7}/_{8}$ funta russkiego; dla ciał ciekłych wiadro obejmuje w próżni 30 funtów wody dystylowanéj, przy $13^{01}/_{3}$R., czyli przedstawia objętość 750,57 cala sz., dla ciał zaś sypkich czetwieryk obejmuje w takichże warunkach 64 funty wody, czyli przedstawia objętość 1601,22 cala sz.; sażeń i funt, jako główne zasady miar i wag, dla trwałości, należy zrobić z platyny i zachowywać oddzielnie we właściwym miejscu [3]).

Miary russkie.

Miary długości czyli miary linijowe

Sażeń = 3 arszynom; arszyn = 16 werszkom.

Sażeń = 7 stopom; stopa = 12 calom; cal = 10 linijom. (Stopa rus. ma prawie 305 milimetrów [4]).

Miara drożna: wersta = 500 sażeniom. Na mile przyjmuje się 7 werst.

Miary powierzchni.

Sażeń kwadratowa; arszyn kw.; werszek kw.; stopa kw.; cal kw.; linija kw.

Miary większych obszarów gruntu: diesiatyna = 2400 sażeniom kw.; wersta kw.

Miary objętości.

Sażeń sześcienna; arszyn sz.; werszek sz.; stopa sz.; cal sz.; linija sz.

---

metr = 39,37079 c. ang.; stopa ang. = 0,3047944 *m*.

Everett (zob. wyżej str. 128) przyjmuje za Clarke'm (1866):

Metr = 39,370432 c. ang.; st. ang. = 0,304797 *m*; yard = 0,914392 *m*.

[Tenże: mila ang. (lądowa) = 1609,33 *m*; morska = 1852,30 *m*; pound avoirdupois = 453,59265 *g*; ton, czyli beczka ang. = 1016,05 *kg*.]

[1]) *Полное собраніе законовъ русской имперіи*, zbiór drugi, t. X, N. 8459.

[2]) Jestto liczba przybliżona, zamiast 25,01893 c. sz., znalezionéj przez Kupffer'a prowadzącego prace przygotowawcze do tego ukazu. (Skutkiem tego czetwieryk powinienby obejmować 1601,21152 c. sz. ros.)

[3]) Wnosząc z wzmiankowanego wyżéj postanowienia R. ad. (art. 3), sażeń jest zachowana w twierdzy petersburskiéj.

[4]) Stopa ros. jest większa od st. n.-p. prawie o 17 mm.

Miary do ciał sypkich: czetwiert = 2 ośminom = 8 czetwierykom; czetwieryk = 8 garncom [1]). (Czetwieryk ma nieco więcéj niż 1601 cali sz. ros., oraz nieco więcéj niż 26 litrów).

Miary do płynów. Beczka = 40 wiadrom; wiadro = 8 sztofom = 10 krużkom; krużka = 10 czarkom. (Wiadro ma nieco więcéj niż 750 i pół c. sz. rus., jak również nieco więcéj niż 12 i ćwierć litra.)

Drew sażeń ma na długość i wysokość sażeń, na szerokość zaś najczęściéj 12 werszków [2]), a niekiedy 8 lub 10 werszków.

Miary ciężaru, czyli wagi.

Berkowiec = 10 pudem; pud = 40 funtom; funt = 32 łutom; łut = 3 zołotnikom; zołotnik = 96 dolom. [Funt rus. przedstawia ciężar nieco większy od 25-u cali sz. rus. wody dystylowanéj, oraz stanowi prawie tyle, co 409 i pół grama [3]); 64 funty wody wchodzą w czetwieryk, a w wiadro wchodzi wody 30 funtów.]

Wagi aptekarskie: funt aptekarski (przedstawiający ciężar 28 łutów rus.) ma 12 uncyj; uncyja = 8 drachmom; drachma = 4 skrupułom; skrupuł = 20 granom.

Związek miar ruskich z metrycznemi wynika z tego, że przy $13^{01}/_{3}$R. wzorów ruskich, a 0°R. wzorów metrycznych

stopa rus. = 0,3047934 *m*,

czyli, że

m = 39,37079 cala rus.

Jest więc [4])

arszyn = 0,7111870 *m*; wersta = 1,066780 *km*;
dziesiatyna = 1,0924997 *ha*;
czetwiert = 2,0990175 *hl*; wiadro = 12,298931 *l*;
funt rus. = 0,409497 *kl*.

Związek miar russkich z nowopolskimi urzędownie określają *Tablice zamiany miar i wag russkich na polskie i nawzajem, w Komitecie miar i wag ułożone, a na mocy artykułu 7-go postanowienia Rady administracyjnéj Królestwa z dnia 2/14 Marcu 1848 roku przez Kommissyę rządową spraw wewnętrznych i duchownych dla powszechnego użytku wydane* [5]). Według tych tablic,

---

[1]) Garniec ros. obejmuje 3 kwarty i niewieleco więcéj, niż kwaterkę n.-p.

[2]) Wtedy więc cztéry takie sażenie drew utworzą sażeń sześcienną.

[3]) Funt russki jest cięższy od funta n.-p. prawie o 4 gramy.

[4]) Петрушевскій и Еремѣевъ, *Сравнительныя таблицы десятичныхъ и русскихъ мѣръ* (1868). Te właśnie tablice są obecnie powszechnie używane przy obliczeniach odpowiednich.

[5]) R. 1849. W tablicach tych niéma objaśnienia, na jakiéj podstawie były oparte wyliczenia, które doprowadziły do tak wielu cyfr dziesiętnych...

stopa n.-p. = 0,9448989600 st. ros.; st. ros. = 1,0583142138 st. n.-p.
sążeń=0,8099133943 sażeni; sażeń = 1,23469991961 sążnia; (takiż związek łokcia i arszyna)
wersta=617 sążni+2 stopy+1 cal+2,4 linii n.-p.;
pręt=2,0247834857 sażeni; sażeń=0,4938799665 pręta;
morg=0,5124685201 diesiatyny=1229 sażeń kw.+45 st. kw.+42 c. kw.+91,36 linii k. r.;
diesiatyna=1,9513393701 morga=1 morgowi+285 pr. kw.+40 pręc. kw.+18,11 ławki k.;
sążeń sz.=0,5312705522 sażeni sz.; sażeń sz=1,8822801224 sążnia sz.;
garniec n.-p.=1,2196110769 garnca ros.=3,2797340690 kwarty n.-p.;
czetwiert=1,8448504138 korca=1 korcowi+2 ćwierciom+4 gar. +1 kwar.+3,6 kwaterki;
korzec=4,8784443078 czetwierykа=4 czetwierykom+7,03 garnca ros.
garniec n.-p.=0,3252304330 wiadra; wiadro = 3,0747430087 garnca n.-p.
funt n.-p.=0,9902137997 funta r.; funt ros. = 1,0098329164 funta n.-p.

---

9. WYRAŻANIE LICZBY WIELORAKIÉJ JAKO LICZBY MIANOWNÉJ PROSTÉJ I ODWROTNIE.

1. Jeżeli mamy liczbę wieloraką (§ 1, us. 10), np. 15 łok. + 1 st.+ +8 cali, więc wyrażoną w jednostkach: łokieć, stopa, cal, a chcemy ją wyrazić w najdrobniejszéj z tych jednostek, t. j. w calach [1]), to wypadnie nam rozumować w sposób następujący. Ponieważ łok. ma 2 st., więc 15 ł. miéć będzie 15 *razy więcéj*, niż dwie stopy trzeba zatym *liczbę mianowaną* 2 st. pomnożyć przez liczbę oderwaną 15; otrzymamy liczbę mianowaną 30 st. (wyrażoną przy pomocy téj saméj jednostki, co mnożna, (§ 6, us. 5). Zamiast więc 15-u łok. mamy 30 st., a że w danéj liczbie wielorakiéj mamy prócz tego 1 st., przeto, dadawszy do 30 st. tę 1 st., otrzymamy 31 st. Ponieważ st. ma 12 c., więc 31 st. ma 31 *razy więcéj*, niż 12 cali; dlatego trzeba 12 c. pomnożyć przez *liczbę oderwaną* 31. Do otrzymanych zaś w iloczynie 372 c. należy jeszcze dodać 8 c.; otrzymamy 380 c.

```
  2 st.
×15
 30 st.
×1 st.
 31 st.

 12 c.
×31
 12
 36
372 c.
 +8 c.
380 c.
```

Odp. 15 ł. + 1 st. + 8 c. = 380 c.

Podobnie rozumować będziemy wrazie, gdy np. 2 morgi + 240 pr. kw. + 85 st. kw. mamy wyrazić w st. kw. Rachunek zaś tak przedstawimy:

---

[1]) Mówi się także: z a m i e n i ć 15 ł. + 1 st. + c. na cale (ale nie: zamienić liczbę i t. d.

[O przedstawieniu liczby mianowanéj prostéj w jednostkach drobniejszych, niż te, które wchodzą w dane wyrażenie téj liczby, mówiliśmy już poprzednio w § 6, us. 27.]

300 pr. kw.	225 st. kw.
×2	× 840
600 pr. kw.	900
+240 pr. kw.	1800
840 pr. kw.	189000 st. kw.
	+ 85 st. kw.
	189085 st. kw.

Odp. 2 m. + 240 pr. kw. + 85 st. kw. = 189 085 st. kw.

2. Jeżeli mamy liczbę, wyrażoną w jednostkach układu metrycznego, np.

$$3\ km + 8\ m + 6\ dm + 5\ cm$$

przedstawić w cm., to albo postępować będziemy w ten sposób:
3 *km* = 1000 *m* × 3 = 3000 *m*; 3000 *m* + 8 *m* = 3008 *m*;
3008 *m* = 10 *dm* × 3008 = 30080 *dm*; 30080 *dm* + 6 *dm* = 30086 *dm*;
30086 *dm* = 10 *cm* × 30086=300860 *cm*; 300860 *cm*+5 *cm*=300865 *cm*
albotéż, zważywszy, że *km* = 1000 *m* = 100 000 *cm*, powiemy krócéj że 3 *km* to 3 setki tysięcy *cm*, 8 *m* to 8 setek *cm*, 6 *dm*, to 6 dziesiątków *cm*, i miéć będziemy

$$3\ km+8\ m+6\ dm+5\ cm = 300\,000\ cm+800\ cm+60\ cm + +5\ cm$$
$$= 300\,865\ cm.$$

Podobnież, jeżeli chcemy np. 3 m+86 dm^3+250 cm^3 wyrazić w cm^3, to, zważywszy, że m^3=1000 dm^3, a dm^3=1000 cm^3, tak iż m^3=1000 000 cm^3, mamy

$$3\ m^3+86\ dm^3+250\ cm = 3\,000\,000\ cm^3+86\,000\ cm^3+250\ cm^3$$
$$= 3\,086\,250\ cm^3.$$

3. Jeżeli mamy liczbę mianowaną prostą, t. j. wyrażoną przy pomocy jednéj jednostki, i taką, że w niéj jest tych jednostek więcéj, niż ich się mieści w jednorodnéj jednostce większéj, to możemy dla wyrażenia danéj liczby mianowanéj prostéj użyć téj większéj jednostki. Powstaje wtedy często [1]) liczba wieloraka. Tak np. gdy mamy 3378 cali n.-p., to w téj liczbie jest więcéj cali, niż ich jest w stopie; możemy więc dla wyrażenia téj liczby użyć stopy. Ponieważ stopa ma 12 c., więc w liczbie 3378 c. *tyle stóp ile razy* 12 c., mieści się w 3378-u c. Należy więc podzielić 3378 c. przez 12 c. Otrzymany w ilorazie (§ 7, us. 7) *liczbę*

[1]) Mówimy „często“, bo wyrażając niekiedy liczbę mianowaną prostą, np. 20 kwart, przy pomocy jednorodnéj jednostki większéj, jak tu garnca, miéć będziemy liczbę mianowaną prostą, a nie wieloraką, jak tu: 5 garncy.

3378 c.	12 c.	*oderwaną* 281, która nam wskazuje, ile razy 12 c.
—24	281	mieści się w 3378 c. Ale powiedzieliśmy, że, „będzie tyle stóp, ile razy 12 c. mieści się w 3378 c.”; znalazłszy więc, że „mieści się 281 razy” widzimy, że „jest 281 st.” (Otrzymana więc bezpośrednio z dzielenia *liczba oderwana* 281 *odpowiada liczbie mianowanéj* 281 st.) W liczbie więc 3373 c. jest 281 st.; lecz nadto zostaje (w reszcie dzielenia) 6 c.; zatym, możemy daną liczbę mianowaną prostą 3378 c. wyrazić, jako 281 st.+6 c., t. j. jako liczbę wieloraką. — Ponieważ jednak 281 st. jest więcéj niż 2 st., które tworzą już jednostkę jednorodną większą, łokieć, możemy więc jeszcze liczbę 281 st. wyrazić przy pomocy téj jednostki, t. j. łokcia. Łok. ma 2 st., więc w 281 st. będzie tyle łokci, ile razy 2 st. mieszczą się w 281 st.
97	281 st.	
—96		
18		
—12		
6		

281 st.	2 st.	Dzieląc więc 281 st. przez 2 st., otrzymamy w ilorazie liczbę oderwaną 140, która odpowiada liczbie mianowanéj 140 ł. Że zaś ponad te łokcie jest jeszcze w téj liczbie 1 st., więc 281 st. = 140 ł.+1 st.—Ponieważ 140 ł. jest więcéj niż 3 ł., które stanowią jednorodną jednostkę większą, sążeń:
. . .	140	
1 st.	140 ł.	

140 ł.	3 ł.	więc możemy znowu 140 ł. wyrazić przy pomocy sążnia. W 140 ł. będzie tyle sążni ile razy 3 łok. mieszcza się w 140 ł.; mieszczą się 46 razy, więc sążni jest 46; a gdy nam zostało nadto 2 ł., więc 140 ł. = 46 sąż.+2 ł.
. . .	46	
2 ł.	46 sąż.	

Odp. 3378 c. n.-p. = 46 sąż. + 2 ł.+1 st. +6 c. [1]).

Podobnież rozumując wrazie, gdy mamy np. 3 147 000 cali sz. rus., przedstawimy rachunek w ten sposób:

3147000 c. sz.	1728 c. sz.	1821 st. sz.	343 st. sz.
. . . . .	1821	1715	5
312 c. sz.	1821 st. sz.	106 st. sz.	5 saż sz.

Odp. 3 147 000 c. sz. rus. = 5 saż. sz. + 106 st. sz. + 352 c. sz.

4. Jeżeli chcemy liczbę mianowaną prostą, wyrażoną przy pomocy jednostki układu metrycznego, np. 28 342 021 *mg*, wyrazić w większych jednostkach: *g* i *kg*, to również ponieważ *g* = 1000 *mg*, to w liczbie 28 342 021 *mg* będzie tyle *g*, ile razy 1000 *mg* mieści się w 28 342 021 *mg*; w mieści się (§ 7, 3s. 20) 28 342 razy, a nadto zostaje 21 *mg*; w danéj więc liczbie jest 28 342 *g*+21 *mg*. Gdy zaś *kg* ma 1000 *g*, to w 28 342 *g* będzie tyle *kg*, ile razy 1000 *g* mieści się w 28 342 *g*; w liczbie 28 342 *g* 1000 *g* mieści się 28 razy, a nadto zostaje 42 *g*; jest więc

---

[1]) W naszej liczbie łatwiéj sobie wyrobimy pojęcie, gdy ją przedstawimy w postaci: 46 sąż. + 2 ł. + 1 st. + 6 c., niż wrazie, gdy mamy ją daną w postaci: 3378 c. W miarach zaś układu metrycznego jest to prawie obojętnym.

w niéj 28 *kg*+342 *g*. Możemy więc powiedzieć, że 28 342 021 *mg* = 28 *kg*+342 *g*+21 *mg*. — Możemy tu także inaczéj rozumować. Ponieważ *kg* = 1000 *g*, a *g* = 1000 *mg*, a tymsamym *kg* = 1 000 000 *mg*, więc w liczbie 28 342 021 *mg* tyle jest *kg*, ile jest milijonów *mg*, a nadto tyle *g*, ile w pozostałéj liczbie jest tysięcy *mg*, przyczym będzie jeszcze tyle *mg*, ile w danéj liczbie ich pozostanie, po oddzieleniu (wszystkich) tysięcy *mg*. Gdy więc w danéj liczbie jest 27 milijonów *mg*, a nadto 342 tysięcy *mg* i prócz tego 21 *mg*, to

$$28\,342\,021\ mg = 28\ kg + 342\ g + 21\ mg.$$

§ 10. DODAWANIE I ODEJMOWANIE LICZB WIELORAKICH.

DODAWANIE.

1. Gdy mamy dodać do siebie liczby wielorakie, np.

a) 3 dnie [1])+18 godzin + 50 minut+45 sekund; *b)* 4 d.+19 g. + + 54 m.; *c)* 7 d. + 15 *g*. + 24 s. i *d)* 6 d.+4 g.+44 m.+8 s., to należy nam tu znaléść liczbę, któraby zawiérała w sobie wszystkie części składników. Ta suma będzie, wogóle mówiąc, wyrażona przy pomocy jednostek: dzień, godzina, minuta, sekunda — będzie liczbą wieloraką. Ponieważ w jéj wyrażenie wejdą dnie, więc w tym wyrażeniu, obok dni, ilość godzin nie może być 24, ani większa; podobnie, ilość minut w tym wyrażeniu sumy nie może być 60, ani większą. Ilość dni w sumie otrzymamy z dodania dni składników, ilość godzin w sumie otrzymamy z dodania godzin składników, i t. d.; należy więc oddzielnie wykonać częściowe dodawania dni, godzin, minut i sekund składników, i dlatego składniki dane tak pod sobą podpiszemy, aby dnie były pod dniami i t. d. Wrazie, gdy z takiego dodawania częściowego (godzin, minut, sekund) wypadnie nam tych jednostek więcéj, niż ich się mieści w większéj jednostce dniu, godzinie, minucie), to otrzymaną w sumie częściowéj liczbę mianowaną prostą wyrazić wypadnie jako liczbę wieloraką (§ 9, us. 3) przy pomocy téj właśnie jednostki większéj. Ponieważ część téj (częściowéj) sumy, wyrażona przy pomocy jednostki większéj, np. dnie, otrzymane z dodania godzin, nie mogą w ostatecznéj sumie oddzielnie być zaznaczone, więc wypadnie je dodać do ilości dni, otrzymanych z dodania dni składników. Aby więc odrazu, w ostatecznéj sumie wypisać np. ilość dni i nie potrzebować téj liczby zmieniać wskutek tego, że z dodania godzin

[1]) Właściwie; doby.

możemy otrzymać dnie, należy uskutecznić dodawanie godzin przed dodawaniem dni; podobnie dodawanie minut przed dodawaniem godzin, oraz dodawanie sekund przed dodawaniem minut. Widzimy więc, że wogóle częściowe dodawania należy wykonywać, poczynając od części składników wyrażonych przy pomocy najmniejszéj z jednostek. Dodając więc sekundy do siebie, otrzymamy 77 s.; nie podpisując téj liczby pod dodanymi częściami składników, gdyż ta liczba sekund oczywiście nie jest mniejszą od 1 minuty, na stronie znajdujemy jéj wyrażenie, jako liczby wielorakiéj, przy pomocy jednostek: minuta i sekunda. Otrzymawszy 1 m.+ +17 s., podpisujemy 17 s. pod sekundami składników, a 1 m. dodajemy wraz z minutami składników, i t. d.; w ten sposób wprost pod kréską, oddzielającą liczby dane od szukanéj, podpisujemy odrazu ostateczne wyrażenie sumy.

3 d.	+ 18 g.	+ 50 m.	+ 45 s.
4 d. [1])	+ 19 g.	+ 54 m.	
7 d.	+ 15 g.		+ 24 s.
6 d.	+ 4 g.	+ 44 m.	+ 8 s.
22 d.	+ 10 g.	+ 29 m.	+ 17 s.

77 s.	60 s.	149 m.	60 m.	58 g.	24 g.
− 60	1	− 120	2	− 48	2
17 s.	1	29 m.	2 g.	10 g.	2 d.

2. Podobnie:

2 km^2 + 46 hektometrów kw. +	920 m^2	
3 km^2 + 88 hektometrów kw. +	380 m^2	(hektomet. kw. = 10 000 m^2).
10 km^2 + 92 hektometrów kw. +	325 m^2	
17 km^2 + 26 hektometrów kw. +	1625 m^2	

Moglibyśmy także każdy ze składników wyrazić w m^2 (§ 9, us. 4) wtedy przedstawilibyśmy to dodawanie w ten sposób:

2460920 m^2
3880380 m^2
10920325 m^2
17261625 m^2

a tę liczbę przedstawilibyśmy jako liczbę wieloraką (§ 9, us. 4) przy pomocy tych samych jednostek, które wchodzą do zadania, t. j. km^2 hektometrów i m^2

17 261 625 m^2 = 17 km^2 + 26 hektometrów kw. + 1625 m^2

Weźmy jeszcze dodawanie:

14 kg +	82 g +	45 cg +	6 mg
12 kg +	43 g +	15 cg +	9 mg
4 kg		+ 82 cg +	5 mg
30 kg +	126 g +	44 cg	

20 mg = 2 cg
144 cg = 1 g + 44 cg

[1]) Zamiast ponownie wypisywać d., g., m., s. (i podobnie w innych zadaniach) stawić można znaczki: „ albo — (kreski).

Widzimy z tego, że przy dodawaniu liczb wielorakich, wyrażonych w układzie metrycznym, postępuje się podobnie, jak przy dodawaniu liczb oderwanych. Ponieważ jednostka większa ma jednostek mniejszych 10, 100,..., więc możemy odrazu w wyrażeniu sumy pod dodawanymi kolumnami cyfr podpisywać odpowiednią cyfrę. (Tak np. dodając tu centygramy, możemy tak mówić: 4, 9, 14; piszę 4; 9, 10, 14; piszę 4; setka zaś centygramów stanowi gram; a daléj: 4, 6; piszę 6; 4, 12; piszę 2; *kg* ma tysiąc *g*, więc obok 26 *g* piszę także i 1 setkę gramów).

Wyrażając zaś wszystkie składniki w miligramach, możemy tak wykonać to działanie:

$$\begin{array}{r} 14082456\ mg \\ 12043159\ mg \\ 4000825\ mg \\ \hline 30126440\ mg = 30\ kg+126\ g+44\ cg \end{array}$$

3. Jeżeli zadanie doprowadza nas do dodawania, a składnik mamy utworzyć z dodanéj „daty" to należy tę datę przedstawić jako czas upłyniony.

Np. Ktoś wyjechał z pewnego miéjsca 4 maja r. 1880 o godzinie 3-éj minut 45 po południu, a powrócił do niego po upływie 2 lat 10 miesięcy 20 dni 13 godzin 30 minut; kiedy więc wrócił? — Trzeba tu datę: 4 maja r. 1880 o godzinie 3-éj minut 45 po południu wyrazić jako czas upłyniony. Był rok 1880-y, a więc od narodzenia Chrystusa przeszło lat 1879; był miesiąc maj, piąty w roku, a więc prócz tych lat, skończyło się miesięcy 4; był dzień 4-y piątego miesiąca, a więc przeszło już od końca miesiąca czwartego dni 3; była godzina 3 po południu, a więc w tym dniu od północy przeszło godzin 12+3, t. j. 15 godzin, a nadto minut 45. Możemy więc tę datę tak wyrazić jako czas upłyniony: 1879 l.+4 m.+3 d.+15 g.+45 m. Więc:

$$\begin{array}{r} 1879\ l.+\ 4\ m.+\ 3\ d.+15\ g.+45\ m. \\ +\quad 2\ l.+10\ m.+29\ d.+13\ g.+30\ m. \\ \hline 1882\ l.+\ 3\ m.+\ 2\ d.+\ 5\ g.+15\ m. \end{array}$$

Po częściowym dodaniu dni, 1+29+3=33 dnie, nie możemy odrazu oddzielić dni od miesiąca, bo nie wiemy, któryto będzie miesiąc, wypadły z tych dni, nie wiemy mianowicie, wiele dni on zawiérać będzie. Dlatego, zanotowawszy na stronie 33 dnie, widzimy że z dodania 10 m. i 4 m. otrzymamy 14 m.; czyli rok i 2 m.; tym więc miesiącem, który wypadnie z dodania dni, będzie miesiąc trzeci w roku, marzec, mający dni 31. Z dodania więc dni otrzymamy 1 miesiąc i 2 dnie. Otrzymaną liczbę 1882 l.+3 m.+2 d.+5 g.+15 m. wypadnie wyrazić jako datę; będzie więc rok (bieżący) 1883-ci, miesiąca 4-go, więc kwietnia, dzień 3-ci, o godzinie 5 minut 15 rano. —

Odp. Wrócił do tego miejsca 3-go kwietnia r. 1883-go o godzinie 5-éj minut 15 rano.

Gdybyśmy zamiast 29 dni mieli 27 dni, to z wykonania dodawania częściowego dni otrzymalibyśmy 31 dni, t. j. tyle właśnie dni, ile ich jest w przypadającym tu z dodania dni miesiącu marcu; tak iż w otrzymanéj sumie nie byłoby dni. Zamieniając zaś tę sumę na datę, mielibyśmy w niéj: 1-y kwietnia.

Gdybyśmy zaś, mając w tym zadaniu np. 27 dni, mieli jednak zamiast 10-u 9-ć miesięcy, to, zaznaczywszy na stronie, że z dodania dni, otrzymujemy dni 31 i przeszedłszy do częściowego dodawania miesięcy, miéć będziemy 4 m.+9 m. = 13 m. = 1 r.+1 m. Tym więc miesiącem, który wypadnie z dodania częściowego dni, będzie miesiąc drugi w roku, luty, który miéć może albo 28, albo 29 dni. Wskazówkę tego, którą z tych dwu liczb mamy tu uwzględnić, dostarczy nam dopiéro dodanie lat. 1+2+1879 = 1882 lata, a więc będzie to miesiąc luty roku 1883-go, zwyczajnego, i miéć będzie 28 dni. W tym przeto przypadku dni 31 = 1 m.+3 dniom; w sumie będziemy mieli 2 m.+3 dnie, a w dacie: 4-ty marca.

ODEJMOWANIE.

4. Jeżeli mamy np. od 10 sąż kw.+5 łok. kw.+2 st. kw.+46 cali kw. odjąć 4 sąż. kw.+4 ł. kw.+3 st. kw.+82 cale kw., to odejmowanie to należy uskutecznić przy pomocy odejmowań częściowych, t. j. sążni kw. od sążni kw., łokci kw. od ł. kw. i t. d. Aby zaś te odejmowania częściowe można było wykonać, potrzeba, aby w każdym z nich odjemna nie była mniejszą od odpowiedniego odjemnika. Należy więc daną odjemną tak przedstawić, t. j. tak rozłożyć na części, aby każda część odjemnéj nie była mniejsza od odpowiedniéj części odjemnika. Gdybyśmy uprzednio ten rozkład odjemnéj wykonali i nadpisali go nad odjemną, to moglibyśmy odejmowania częściowe wykonywać w jakimkolwiek porządku. Ponieważ jednak chcemy ten rozkład odjemnéj uskuteczniać częściowo, tylko w miarę potrzeby, a niezmieniać już tego, co raz napiszemy w reszcie, więc zaczynamy z prawéj strony, t. j. od odejmowania najmniejszych jednostek. — 82 c. kw. jest więcéj niż 46 c. kw. Więc 2 st. kw. rozkładam na 1 st. kw., którą zostawiam, i 1 st. kwad., którą wyrażam jako 144 c. kwad.; 144 c. kw. + 46 c. kw. = 190 c. kwad.; odejmę

10 sąż. kw.	+5 ł. kw.	+2 st. kw.	+ 46 c. kw.
— 4 sąż. kw.	+4 ł. kw.	+3 st. kw.	+ 82 c. kw.
6 sąż. kw.		+2 st kw.	+108 c. kw.

więc 82 c. kwad. od 190 c. kw. [1]); pozostanie 108 c. kw., które podpisuję pod kréską pod c. kwadratowymi. 3 st. kw. jest większe od 1 st. kw.; rozkładam więc 5 ł. kw.; na 4 ł. kw., które zostawiam, i 1 ł. kw., który wyrażam jako 4 st. kw., 4 st. kw.+1 st. kw. = 5 st. kw.; odejmując 3 st. kw. od 5 st. kw. otrzymamy 2 st. kw., które piszę pod stopami kwadratowymi. Mam teraz odjąć 4 ł. kw. od 4 ł. kw.; nie będzie więc w reszcie łokci kwadratowych. 4 sąż. kw. od 10 sąż. kw. jest 6 sąż. kw., które podpisuję pod sąż. kw. — Odp. 6 sąż kw.+2 st. kw.+108 c. kw.

5. Wrazie, gdy mamy np. od 30 *kg*, 26 *g* i 446 *mg* odjąć 15 *kg*, 68 *g* i 684 *g*,

$$\begin{array}{r} 30\ kg + 26\ g + 446\ mg \\ \underline{15\ kg + 68\ g + 684\ mg} \\ 14\ kg + 957\ g + 762\ mg \end{array}$$

to, z uwagi, że w układzie metrycznym każda jednostka większa ma jednostek mniejszych 10, albo 100, albo i t. d., t. j. wogóle liczbę przedstawioną przez jedność z zerami, możemy przy wykonywaniu częściowych odejmowań odrazu stawić cyfry pod kolumnami cyfr odejmowanych. Tak odejmując tu *mg*, mam 4 od 6-u 2, które zaraz mogę napisać (bo ta cyfra już się nie zmieni) pod kréską; podobnie daléj: 8 od 14-stu 6 (piszę je); 6 od 13-stu 7 (piszę); użyty tu 1 tysiąc *mg* został wzięty z gramów odjemnéj przez zamienienie 1 *g* na *mg* (*g* ma 1000 *mg*); mam więc w odjemnéj już tylko 25 *g*. Odejmując daléj, mam 8 od 15-u 7 (piszę); 6 od 11-u 5 (piszę); użyta tu 1 setka *g* została wzięta z kilogramów, przez zamienienie 1 *kg* na *g*; ale *gk* ma 1000 *g*, t. j. 10 setek; zostało więc z nich jeszcze 9 setek *g*, które napiszę przed 5 dziesiątkami. Odejmując nakoniec 15 *kg* od 29 *mg*, miéć będziemy w reszcie 14 *kg*. — Odp. 14 *kg*+957 *g*+762 *mg*.

Moglibyśmy tu łatwo wyrazić odjemną i odjemnik jako liczby mianowane proste wyrażone w jednostce najmniejszéj, *mg*, po wykonaniu zaś odejmowania należałoby resztę wyrazić jako liczbę wieloraką przy pomocy jednostek wchodzących w zadanie. Byłoby więc:

$$\begin{array}{r} 30026446\ mg \\ -15068684\ mg \\ \hline 14957762\ mg = 14\ kg + 957\ g + 762\ mg. \end{array}$$

6. Jeżeli zadanie nas doprowadza do odejmowania, a odjemną, lub odjemnik mamy utworzyć z podanéj daty, to należy tę datę wyrazić jako czas upłyniony.

Np. Ktoś, po niebytności w pewnym miejscu przez 2 lata+9 miesięcy+27 dni+13 godzin+30 minut, powrócił 6 marca r. 1884 o godzi-

[1]) Wrazie, gdyby były większe liczby (np. przy miarach sześciennych), przestrzegając czystości w wykonaniu rachunków, zamiast nadpisywać, jakby tu np. nad 46 liczbę 190, lepiéj pisać na stronie częściowe takie odejmowanie, jak tu 82 c. kw, od 190 c. kw.

nie 5 minut 15 rano; kiedy więc z tego miejsca wyjechał. — Zamieniając wchodzącą tu datę na czas upłyniony, otrzymamy 1883 l.+2 m.+5 d.+ +5 g.+15 m.; wypadnie więc wykonać odejmowanie:

1883 l.+2 m.+ 5 d.+ 5 g.+15 m.
— 2 l.+9 m.+27 d.+13 g.+30 m.
1880 l.+4 m.+ 6 d.+15 g.+45 m.

Otrzymawszy w reszcie 45 m., a następnie 15 g., wypada nam tu odjąć 27 d. od 4 d. Rozkładam więc 2 m. na 1 m., który zostawiam, i 1 miesiąc, który zamieniam na dnie. Ten miesiąc jest drugi w roku, luty; miéć on może albo 28, albo 29 dni. Ponieważ to jest luty roku 1884-go (przestępnego), więc ma 29 dni; 29 d.+4 d.=33 d.; 33 d.—27 d.=6 d., które piszę w reszcie. Następnie otrzymamy 4 m. i 1880 l. Wypadłą resztę trzeba jeszcze wyrazić jako datę. — Odp. Wyjechał z tego miejsca 7 maja r. 1881 o godz. 3-éj minut 45 po południu.

Weźmy zadanie, doprowadzające nas do odejmowania, w którym tak odjemną, jak i odjemnik mamy utworzyć z podanych dat. Np. Ktoś wyjechał z pewnego miejsca 7 maja r. 1881 o godzinie 3-éj minut 45 po południu, a wrócił 6 marca r. 1884 o godz. 5-éj minut 14 rano; ile trwała jego nieobecność w tym miejscu?

Wyraziwszy te daty, jako czas upłyniony od początku naszéj ery, miéć będziemy odejmowanie:

1881 l.+2 m.+ 5 d.+ 5 g.+15 m.
— 1880 l.+4 m.× 6 d.+15 g.+45 m.
2 l.+9 m.+27 d.+13 g.+30 m.

Gdy tu przystępujemy do częściowego odejmowania dni, wypada nam jeden miesiąc, drugi w roku, więc luty r. 1884-go, zamienić na dnie; ma on 29 d.; 29 d.+4 d.=33 d.; 33 d.—6 d.=27 d. — Odp. Jego nieobecność w tym miejscu trwała 2 l.+9 m. + 27 d.+ +13 g.+30 m.

Możemy w takich zadaniach przy wyrażaniu obu dat, jako czasu upłynionego, nie używać jednostki miesiąca, ale po latach wystawić wprost ilość wszystkich dni upłynionych od początku roku bieżącego. Tak np., w powyższym zadaniu od początku r. 1881 (zwyczajnego) do 7 maja przeszło dni 31+28+31+30+6=126 dni; od początku zaś r. 1884 (przestępnego) do 6 marca upłynęło dni 31+29+5=65 dni.

1883 l.+ 65 d.+ 5 g.+15 m.
— 1880 l.+126 d.+15 g.+45 m.
2 l.+303 d.+13 g.+30 m.

Tu przy częściowym odejmowaniu dni wypadnie 1883 l. rozłożyć na 1882 l. i 1 rok; ten rok (1883-i) ma dni 365; 365 d.+64 d.=429 dni; 429 d.—186 d.=303 d.—Gdybyśmy się tak przedstawioną odpowiedzią: 2 l.+303 d.+13 g.+30 m. nie zadowalali, a chcieli z tych 303 dni oddzielić miesiące, to należałoby przyjąć tu pod uwagę, że téj liczbie 303 dnie, miesiące liczą się ponad 2 lata od chwili wyjazdu, t. j. że je li-

czyć należy od 7 maja r. 1883-ego; wchodzą więc tu miesiące: maj [1]) (31 dni), czerwiec (30 dni) i t. d. [2]). W każdym razie liczba 303, jako znacznie większa od 270, obejmuje 9 miesięcy. Suma zaś dni tych 9-u miesięcy będzie tu: 31+30+31+31+30+31+30+31+31 = 276 dni; 303 dnie — 276 d. = 27 d. W warunkach więc naszego zadania [3]) 303 dnie = 9 m. + 27 dni.

Wogóle w zadaniach tak na dodawanie, jak i na odejmowanie, w które wchodzą daty, należy być bardzo ostrożnym [4]).

---

§ 11. MNOŻENIE I DZIELENIE LICZB WIELORAKICH.

MNOŻENIE.

1. Postępowanie przy mnożeniu liczb wielorakich bezpośrednio wynika z tego, cośmy mówili o dodawaniu liczb wielorakich (§ 10, 1), bo mnożenie jestto skrócone dodawanie jednakowych składników. Np.

3 mor. + 186 pr. kw. + 64 st. kw.		
3 mor. + 186 pr. kw. + 64 st. kw.	3 mor. + 186 pr. kw. + 64 st. kw.	
3 mor. + 186 pr. kw. + 64 st. kw.	× 4	
3 mor. + 186 pr. kw. + 64 st. kw.	14 mor. + 145 pr. kw. + 31 st. kw.	
14 mor. + 145 pr. kw. + 31 st. kw.		

256 st. kw.	225 st. kw.	745 pr. kw.	300 pr. kw.
225	1	600	2
31 st. kw.	1 pr. kw.	145 pr. kw.	2 m.

Z tego naprzód widzimy, że mnożnik, jako oznaczający, ile razy mnożna ma być wzięta jako składnik, jest zawsze liczbą oderwaną. Jeżeli np. to mnożenie wypadło nam z zadania: „Ktoś sprzedał cztery równe place; w każdym było po 3 morgi, 186 pr. kw. i 64 st. kw.; ile razem sprzedał?" — to do tego mnożenia doszliśmy zapomocą takiego rozumowania; kiedy jeden sprzedany plac obejmował 3 morgi + 186 pr. kw. +

---

[1]) Właściwie: od 7 maja do 7 czerwca; od 7 czerwca do 7 lipca, i t. d., ale możemy się wprost wyrażać: maj, czerwiec i t. d., bo tu idzie tylko o ostatni dzień miesiąca.

[2]) Gdyby był luty (albo raczéj miesiąc od pewnego dnia lutego do tegoż dnia marca), to trzebaby zważać na to, jaki rok bieżący odpowiada odjemnéj.

[3]) W innych warunkach mogłoby 303 dni, przy 9 miesiącach, przedstawić inną ilość dni (28 d., 29 d., a nawet 30 d.).

[4]) Niewłaściwym jest obchodzenie pozornych trudności przy wykonywaniu podobnych zadań przez przyjmowanie w nich, iż każdy miesiąc ma dni 30. Starannym wyjaśnieniem można przecież trudności pokonać. Błędnym zaś rezultatem zadawalać się nie należy.

+64 st. kw., to 4 takie place obejmowały *4 razy* więcéj; trzeba więc 3 morgi+186 pr. kw.+64 st. kw. pomnożyć przez liczbę oderwaną 4.

Mnożenie zaś samo, podobnie jak dodawanie (i dla tych samych powodów), uskuteczniamy, poczynając od najmniejszych jednostek. Mnożymy więc 64 st. kw.×4; otrzymamy 256 ss. kw.; ponieważ zaś większa jednostka, pr. kw., ma 225 st. kw., więc należy liczbę mianowaną prostą 256 st. kw. przedstawić jako liczbę wieloraką przy pomocy jednostek pręta kw. i stopy kw. (§ 9, 1); otrzymujemy 1 pr. kw.+31 st. kw.; 31 st. kw. podpisujemy pod stopami kw. mnożnéj, a 1 pr. kw. dodajemy do iloczynu powstałego z pomnożenia prętów kw. mnożnéj przez mnożnik. I t. d.

2. Moglibyśmy to działanie wykonać inaczéj, mianowicie: liczbę wieloraką 3 m.+186 pr. kw.+64 st. kw. wyrazić jako liczbę mianowaną prostą, t. j. wyrazić w st. kw.; tę ilość stóp kw. pomnożyć przez liczbę oderwaną 4, a otrzymaną w iloczynie liczbę mianowaną prostą (st. kw.) wyrazić znowu jako liczbę wieloraką:

300 pr. kw.	244414 st. kw.	977656 st. kw.	225 st. kw.
×3	× 4 st. kw.	776	4345
900 pr. kw.	977656 st. kw.	1015	4345 pr. kw.
+186 pr. kw.		1156	
1086 pr. kw.		31 st. kw.	

225 st. kw.	4345 pr. kw.	300 pr. kw.
×1086	1345	14
1350	145 pr. kw.	14 morgów.
1800		
225		
244350 st. kw.		
+ 64 st. kw.		
244414 st. kw.		

Odp. 14 morgów + 145 pr. kw. + 31 st. kw.

Z tego widzimy, iż ten sposób postępowania jest znacznie dłuższy od poprzednio podanego, w którym nadto z mniejszymi liczbami mamy do czynienia.

3. Niedogodności te znikają jednak, gdy mamy do czynienia z liczbami danymi w układzie metrycznym; wtedy bowiém tak wyrażanie liczby wielorakiéj jako mianowanéj prostéj, jak i postępowanie odwrotne odbywają się bardzo prędko. Np. Łut n.-p. waży tyleż, co 12 *g*+672 *mg*. wiele w centnarze (stufuntowym) jest *kg*, g i t. d. — Tu należy przedewszystkim znaléść, ile centnar ma łutów. Ponieważ c. = 100 fun., a f. = 32 ł., więc c. = 32 ł.×100 = 3200 ł. A gdy ł. = 12 *g*+572 *mg* zatym, aby znaléść wyrażenie c. w wagach metrycznych, należy 12 *g*+ +672 *mg*, czyli 12672 *mg* pomnożyć przez liczbę oderwaną 3200, i

12672 *mg*
× 3200
25344
38016
40550400 *mg* = 40 *kg* + 550 *g* + 400 *mg*.

4. W powyższym przykładzie widzieliśmy, że należy koniecznie mnożnik odnieść do tego pojęcia, któremu odpowiada mnożna: trzeba było centnar wyrazić w łutach, bo mnożna odpowiadała łutowi.

Podobnież wypadnie postąpić, gdy będziemy mieli np. zadanie:

Ktoś kazał równo obsiać żytem pole, mające 5 włók + 16 morgów obszaru, i osobiście sprawdził, że na obsianie morga wyszło: 1 korzec + 2 ćwierci + 3 garnce; ile potrzeba żyta na obsianie całego pola? — Potrzeba żyta tyle *razy* więcéj niż 1 k. + 2 ć. + 3 g., ile *razy* obszar 5 w. + 16 m. jest większy od obszaru morga. Należy więc liczbę wieloraką 5 w. + + 16 m. wyrazić w morgach; otrzymamy 160 morgów. Potrzeba zatym żyta 160 *razy* więcéj niż 1 k. + 2 ć. + 3 g., t. j. tę liczbę wieloraką trzeba pomnożyć przez liczbę oderwaną 160. Rachunek tak się przedstawi:

30 m.
× 5
150 m.
× 16 m.
166 m.

1 k. + 2 ć. + 3 g.
× 166
264 k. + 2 ć. + 2 g.

498 g. | 8 g.
... | 62
2 g. 62 ć.

332 ć.
+ 62 ć.
394 ć. | 4 ć.
... | 98
2 ć. 98 k.

166 k.
+ 98 k.
264 k.

DZIELENIE.

5. W dzieleniu, jako w działaniu odwrotnym mnożeniu dwu czynników, dzielna odpowiada iloczynowi, dzielnik zaś jednemu z czynników, t. j., albo mnożnéj, albo mnożnikowi (§ 6, us. 5). Skutkiem więc tego, w dzieleniu liczb wielorakich będą dwa przypadki, zależnie od tego, czy dzielnik jest liczbą wieloraką [1]), czytéż liczbą oderwaną.

Tak np., jeżeli: Posiadacz placu, mającego obszaru 14 morgów + + 145 pr. kw. + 31 st. kw., podzielił go na równe części tak, iż każda część obejmowała 3 m. + 186 pr. kw. + 64 st. kw.; na ile części on ten plac podzielił? — to powiemy, iż podzielił na tyle części, ile *razy* 14 m. + 145

[1]) Wogóle: mianowaną. (Por. § 7, us. 7, 8.)

p. kw.+31 st. kw. jest większe od 3 m.+186 p. kw.+64 st. kw. Dzielenie więc będzie miało na celu oznaczenie ile razy dzielna jest większa od dzielnika. Otrzymana zaś liczba oderwana (odpowiadająca w mnożeniu mnożnikowi) przedstawi ilość sprzedanych placów.

Jeżelibyśmy zaś mieli zadanie: Posiadacz placu, mającego obszaru 14 morgów + 145 pr. kw + 31 st. kw., sprzedając, podzielił go na cztéry równe place; jak wielki był każdy ze sprzedanych placów? — to tu, oczywiście, w dzieleniu idzie nam o to. aby liczbę wieloraką 14 m. +145 pr. kw. + 31 st. kw., + 31 st. kw. rozłożyć na cztéry równe części i wyznaczyć, jak wielka jest każda z tych części. Otrzymana w ilorazie liczba wieloraka — wogóle mówiąc, mianowana — przedstawi nam właśnie, jak wielką jest jedna taka część.

Osobno rozważymy te dwa przypadki.

6. Gdy dzielna jest liczbą wieloraką, a dzielnik liczbą wieloraką lub mianowaną prostą (wogóle: liczbą mianowaną), to, mając się dowiedzieć, ile razy dzielnik mieści się w dzielnéj, czyli wymierzyć dzielną dzielnikiem, najdogodniéj możemy to uskutecznić, wyrażając dzielną i dzielnik jako liczby mianowane proste w téj saméj jednostce — a więc w najdrobniejszéj z jednostek, wchodzących w wyrażenia liczb danych [1]). Dzielenie więc to sprowadzamy do dzielenia dwu liczb mianowanych prostych, wyrażonych przy pomocy téj saméj jednostki (§ 7, us. 7).

Np. Ile z 78 cent. + 75 f. ołowiu zrobić można kul ważących po 2 f. + 6 ł,? — Kul zrobić można tyle, ile razy ciężar 78 c. + 75 f. jest większy od ciężaru 2 f. + 6 ł., t. j., ile razy 2 f. + 6 ł. pomieści się w 78 c.+75 f. Aby więc ostatni ciężar wymierzyć ciężarem 2-u f.+6-u ł., wyrazimy tak dzielną, jak i dzielnik jako liczby mianowane proste przy pomocy najdrobniejszéj z wchodzących tu jednostek, t. j. łuta.

100 f.	32 ł.	252000 ł.	70 ł.
78	×2		3600
7800 f.	64 ł.		3600 kul.
+75 f.	×6 ł.		
7875 f.	70 ł.		

32 ł.
×7875
252000 ł.

---

[1]) Inne postępowanie wymagałoby rozumowania wielce drobiazgowego, prowadziłoby często do nader złożonych rachunków i pociągaćby za sobą mogło potrzebę zmieniania cyfr wyznaczanych w ilorazie.

Oczywiście, że, gdy mamy do czynienia z liczbami systematu metrycznego, postępujemy taksamo. Np. Na ile placów można podzielić km^2, jeżeli w każdym placu ma być 62 a+50 m^2

$km^2 = 1\,000\,000\ m^2$; $62\ a + 50\ m^2 = 6250\ m^1$

$1\,000\,000\ m^2$	$6250\ m^2$
. . . . .	16
0	16 placów

7. Gdy dzielna jest liczbą wieloraką, a dzielnik liczbą oderwaną, to moglibyśmy podobnież, wyraziwszy dzielną jako liczbę mianowaną prostą, sprowadzić działanie do dzielenia mianowanéj prostéj przez oderwaną, otrzymaną zaś w ilorazie liczbę mianowaną prostą (wyrażoną przy pomocy téj saméj jednostki, co dzielna) przedstawić jako liczbę wieloraką.

Tak mianowicie postępujemy zwykle przy dzieleniu liczb, wyrażonych w systemacie metrycznym. Np. Jeżeli 2 q+12 kg+500 g prochu użyto do 68 wystrzałów działowych, to ile średnio użyto prochu na jeden wystrzał? Należy 2 q + 12 kg + 500 g rozłożyć na 68 równych części i oznaczyć jak wielką jest jedna taka część.

$2\ q + 12\ kg + 500\ g = 212500\ g$

212500 g.	68
. . . . .	3125 g = 3 kg + 125 g.
0	

Postępujemy więc wtedy odwrotnie niż przy mnożeniu liczb wielorakich w us. 2 i 3.

Mając jednak wykonać dzielenie liczby wielorakiéj, wyrażonéj nie w systemacie metrycznym, możemy odrazu w ilorazie wyznaczyć szukaną liczbę wieloraką przez postępowanie odwrotne temu, któregośmy używali przy mnożeniu liczb wielorakich w us. 1 i 4, t. j., naprzód wyznaczymy część ilorazu wyrażoną przy pomocy największéj jednostki; pozostałą resztę dzielnéj wyrazimy w mniejszéj (następującéj) jednostce i wyznaczymy odpowiadającą część ilorazu, i t. d.

Np. Plac, mający obszaru 14 morgów + 145 pr. kw. + 31 st. kw., sprzedany został w cztérech równych częściach; jak wielki był każdy ze sprzedanych placów?

14 m. + 145 pr. kw. + 31 st. kw. | 4
− 12 | 3 m. + 186 pr. kw. + 64 st. kw.
2 m. = 600 pr. kw.
+ 145 pr. kw.
745 pr. kw.
34
25
1 pr. kw. = 225 st. kw.
+ 31 st. kw.
256 st. kw.
16
0

Tu dzieląc 14 m. przez liczbę oderwaną 4, otrzymujemy w ilorazie 3 m. wraz z tym, co wypadnie z podzielenia 2-u morgów przez 4. Ale, gdy mórg = 300 pr. kw., to z podzielenia 2 m. przez 4 otrzymamy tyleż, co z podzielenia 300 pr. kw. × 2 = 600 pr. kw. przez 4. Że zaś, prócz otrzymać się stąd mających pr. kw. w ilorazie, otrzymamy jeszcze pręty kw. z podzielenia 145 pr. kw. dzielnéj przez 4, więc w ilorazie pręty kwadratowe otrzymamy z podzielenia 600 pr. kw. + 145 p. k. = 745 pr. kw. I t. d.

(Wrazie, gdyby w dzielnéj nie było 31 st. kw., ale np. 34 st. kw., to wyznaczywszy w ilorazie 64 st. kw., mielibyśmy jeszcze 3 st. kw. do podzielenia przez 4, czyli 144 cale kw. × 3, t. j. 432 c. kw. przez 4, coby nam dało jeszcze w ilorazie 108 cali kw. — W takich zadaniach, wrazie, gdy, po wyznaczeniu części ilorazu, wyrażonéj w najdrobniejszéj jednostce dzielnéj, zostaje jeszcze reszta, należy, jeżeli można, wyrażać resztę przy pomocy jeszcze drobniejszych jednostek, dla wyznaczenia odpowiednich części w ilorazie).

ROZDZIAŁ V.

PODZIELNOŚĆ LICZB.

§ 12. DZIELNIK I WIELOKROTNOŚĆ LICZBY DANÉJ. LICZBY PIERWSZE.

1. Jeżeli liczba dana [1]) dzieli się przez pewną drugą bez reszty, to, jak wiemy (§ 7, us. 11), nazywamy ja podzielną przez tę drugą liczbę; np. 24 jest podzielne przez 6. Liczba zaś, która dzieli liczbę daną bez reszty, nazywa się dzielnikiem liczby danéj. W powyższym przykładzie liczba dana 24 ma np. dzielnik 6, dzielnik 8 i t. d. A zatym

Dzielnikiem liczby danéj nazywamy liczbę, przez którą liczba dana jest podzielna.

Oczywiście, że dzielnik jakiéjkolwiek liczby nie może być od niéj większy.

Dzielnik liczby danéj jest téż jéj czynnikiem. Daną bowiém liczbę możemy przedstawić jako iloczyn tego dzielnika przez liczbę, wypadłą z podzielenia liczby danéj przez ten właśnie dzielnik (§ 7, us. 3, 11); tak np. $24 = 6 \times 4$. Dlatego wyrażenia: „czynnik liczby danéj", „dzielnik liczby danéj" są jednoznaczne.

2. Liczbę, przez którą należy pomnożyć dzielnik liczby danéj, aby jako iloczyn otrzymać właśnie liczbę daną, nazywać będziemy dzielnikiem dopełniającym ów dzielnik, albo dzielnikiem dopełniającym liczbę daną. Jeżeli więc 6 jest dzielnikiem 24-ch, to 4 jest dzielnikiem dopełniającym ów dzielnik, bo $6 . 4 = 24$. Oczywiście, dzielnik dopełniający jest ilorazem z podzielenia liczby danéj przez odpowiedni dzielnik, a nadto sam jest dzielnikiem [2]) liczby danéj, gdyż jest jéj czynnikiem.

Każdy dzielnik liczby danéj ma odpowiedni dzielnik dopełniający. Np. liczba 24 ma dzielniki 6, 8, 4, 1 i t. d.; odpowiadające im dzielniki dopełniające są 4, 3, 6, 24 i t. d.

---

[1]) W tym rozdziale przez „liczbę" należy rozumieć zawsze liczbę całkowitą.

[2]) Euklides, *Elemento*, księga VII, podanie 40.

3. Jeżeli mamy pewną liczbę daną, np. 6, to liczba, przez tę daną liczbę podzielna, jak np. 24, nazywa się jéj liczbą wielokrotną, albo jéj wielokrotnością, bo można tę liczbę utworzyć, kilkakrotnie [1]) biorąc liczbę daną jako składnik. Tak np. $24 = 6+6+6+6$.

Wielokrotnością liczby danéj nazywamy liczbę, podzielną przez liczbę daną, albo [2]), *wielokrotnością liczby danéj nazywamy liczbę, która może być wyrażona jako suma składników równych liczbie danéj*, albo jeszcze (§ 8, us. 3), *wielokrotnością liczby danéj nazywamy liczbę, która powstaje z danéj, wskutek pomnożenia jéj przez jakąś liczbę* [3]).

Gdy więc np. 6 jest dzielnikiem 24-ch, to nawzajem, 24 jest wielokrotnością 6-u.

Ponieważ, mnożąc liczbę daną przez jakąkolwiek liczbę, otrzymujemy wielokrotność liczby danéj, a liczb (przez które mnożyć możemy liczbę daną) jest nieskończenie wiele (§ 1, us. 6) więc *jest nieskończenie wiele wielokrotności liczby danéj.*

Każda liczba jest dzielnikiem i wielokrotnością saméj siebie; tak np. 24 jest dzielnikiem 24-ch i wielokrotnością 24-ch, bo $24 = 24 . 1$ (§ 6, us. 3). — Każda liczba ma dzielniki: liczbę 1 i samę siebie.

4. Jeżeli, zaznaczywszy, że liczba dana, np. 24 ma dzielnik 6, zauważymy następnie, że znowu ten dzielnik, t. j. liczba 6, ma dzielnik 3, to, gdy dzielnikiem, dopełniającym dzielnik 6 liczby 24, jest 4, a dzielnikiem, dopełniającym dzielnik 3 liczby 6, jest 2, mamy:

$$24 = 6 . 4, \qquad \text{gdzie } 6 = 3 . 2,$$

czyli (§ 6, us. 7, 10)

$$27 = (3 . 2) . 4 = 3 . (2 . 4) = 3 . 8,$$

t. j. 3 jest téż dzielnikiem liczby danéj 24. A więc: *dzielnik dzielnika liczby danéj jest téż dzielnikiem liczby danéj*, albo, zauważywszy, że liczba 24 jest wielokrotnością 6-u, — *dzielnik liczby danéj jest dzielnikiem wielokrotności téj liczby.*

5. Każdą liczbę można przedstawić jako iloczyn dwu różnych czynników, np. $24 = 4 . 6$; $7 = 7 . 1$; $35 = 5 . 7$; $37 = 1 . 37, \ldots$, a więc: *każda liczba ma conajmniéj dwa dzielniki.*

Liczba może miéć jednak więcéj dzielników, np. 24 ma osiem dzielników: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24; liczba 81 ma dzielników pięć: 1, 3, 9, 27, 81. Jednak liczby np. 7, 37, 11, 23 i t. d. mają każda tylko dwa dzielniki: jedność i samę siebie. Takie liczby nazywamy liczbami piérw-

---

[1]) Kilkunastokrotnie, ...

[2]) W szczególnym przypadku wielokrotność liczby danéj może być jéj równa.

[3]) (Całkowitą).

szymi. Liczby zaś, które mają dzielników więcéj, jak np. 24, 81, 35 i t. d., nazywamy liczbami złożonymi.

Liczbą piérwszą nazywamy liczbę, podzielną tylko przez jedność i przez samę siebie.

Liczba podzielna przez inną jeszcze liczbę, prócz jedności i saméj siebie, nazywa się liczbą złożoną.

Liczbę 1 zalicza się do liczb piérwszych.

Liczby podzielne przez 2 nazywają się parzystymi; liczby przez 2 niepodzielne nazywają się nieparzystymi [1]).

Wszystkie liczby piérwsze, z wyjątkiem 2-u, są nieparzyste.

6. *Każda liczba* (zaczynając od 2) *ma conajmniéj jeden dzielnik, będący liczbą piérwszą* [2]) *różną od 1.*

Jeżeli dana liczba jest piérwsza, to oczywiście, tym dzielnikiem jest ona sama.

Jeżeli dana liczba jest złożona, to ma dzielnik różny (większy) od 1, a za razem różny (mniejszy) od niéj saméj. Jeżeli ten dzielnik jest liczbą piérwszą — to już własność o którą idzie byłaby okazaną. Jeżeli zaś ten dzielnik jest liczbą złożoną, to ma on znów dzielnik, mniejszy od siebie, a większy od 1, który jest téż (us. 4) dzielnikiem liczby danéj Jeżeli ten dzielnik jest liczbą pierwszą, własność powyższa byłaby okazana; jeżeli zaś jest liczbą złożoną, to ma znów dzielnik, mniejszy od siebie, a większy od 1, który, jako dzielnik dzielnika liczby danéj, jest jéj dzielnikiem. Jeżeli ten dzielnik jest liczbą piérwszą i t. d. Postępując w ten sposób, otrzymujemy zawsze dzielniki liczby danéj wciąż zmniejszające się, ale zawsze większe od 1; ilość tych zmniejszających się dzielników jest ograniczona (gdyż i liczba dana jest ograniczona). Jest więc w tym ciągu dzielników dzielnik ostatni. Gdyby on był liczbą złożoną, to miałby znów dzielnik od siebie mniejszy, a większy od jedności; nie byłby więc ostatnim. Ostatni przeto z tych dzielników liczby danéj jest liczbą piérwszą.

7. Gdyby szereg liczb piérwszych,

$$1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, \ldots,$$

był ograniczony, to niech np. 19 będzie największą liczbą piérwszą, o któréj

---

[1]) Euklides, ks. VII, definicye 6, 7.

[Każda liczba nieparzysta jest sumą cztérech kwadratów, z których dwa są sobie równe, np. $67 = 5^2+5^2+4^2+1^2 = 8^2+1^2+1^2+1^2 = 7^2+3^2+3^2+0^2 = 7^2+4^2+1^2+1^2$; $5 = 2^2+1^2+0^2+0^2$, a wogóle: aby utworzyć jakąkolwiek liczbę, potrzeba, conajwięcéj, cztérech kwadratów, np. $10 = 3^2+1^2$; $16 = 2^2+2^2+2^2+2^2$.]

[Z rozkładu bezpośredniego wielu liczb parzystych na dwa składniki (nie ma zaś dotąd na to dowodu matematycznego) wypada, że każda liczba parzysta jest sumą dwu liczb piérwszych, np. $16 = 13+3$; $18 = 13+5$; w skutek tego każda liczba nieparzysta jest sumą trzech liczb piérwszych, z których jedną jest 1.]

[2]) Euklides, ks. VII, podanie 33; „każda liczba złożona jest podzielna przez pewną liczbę piérwszą“; pod 34: „każda liczba jest albo piérwsza, albo podzielna przez liczbę piérwszą“. Przytoczone wyżéj dowodzenie jest parafrazą euklidesowego.

istnieniu jesteśmy przekonani. — Utwórzmy iloczyn wszystkich, przy tym przypuszczeniu, liczb piérwszych, i do tego iloczynu dodajemy 1. Ta liczba

$$1 . 2 . 3 . 5 . 7 . 11 . 17 . 19 + 1$$

nie będzie podzielna ani przez 19, ani przez żadną różną od 1 liczbę piérwszą, mniejszą od 10, gdyż, dzieląc przez którąkolwiek z nich, zawsze otrzymamy resztę dzielnéj: 1. A gdy nasza liczba, jak każda, ma dzielnik, będący liczbą piérwszą (us. 6), to tym dzielnikiem może być tylko liczba piérwsza, [1]) większa od 19. Istnieje więc, wbrew przypuszczeniu, liczba pierwsza, większa od 19. Podobnie możemy dowieść, że istnieje zawsze liczba piérwsza, większa od jakkolwiek wielkiéj oznaczonéj liczby piérwszéj [2]). A więc

Liczb piérwszych jest nieskończenie wiele.

8. Gdy chcemy się dowiedzieć, czy dana liczba jest piérwsza, czy złożona, to dosyć jest dowiadywać się, czy jest ona podzielna tylko przez liczby piérwsze. Gdy bowiem pewna liczba ma, jako dzielnik, liczbę zło-

---

[1]) Wprawdzie początkowe takie liczby $1.2+1$, $1.2.3+1$, i t. d. są piérwsze, lecz już $1.2.3.5.7.11.13+1 = 30031 = 59\,509$.

[2]) Euklides, ks IX, pod. 20: „ilość liczb piérwszych jest większa od jakiéjkolwiek danéj ich ilości". Takaż zasada dowodzenia. —

Gdy jakąkolwiek liczbę dzielimy np. przez liczbę 4, to jako resztę dzielenia otrzymać możemy (§ 7, us. 11) albo 1, albo 2, albo 3, albo 0. Gdy więc iloraz niezupełny oznaczymy dla ogólności literą np. a, to jakąkolwiek liczbę (dzielną) można zawsze przedstawić (§ 7, us. 11, 3) zapomocą jednego z 4-ch wzorów

$$4.a+1, \quad 4.a+2, \quad 4.a+3, \quad 4.a.$$

Wtedy wszystkie liczby możemy rozdzielić na 4 k l a s y, odpowiadające tym wzorom. Każdy z tych wzorów obejmuje klasę liczb, napisanych w odpowiednim poziomym wierszu tablicy

$$\left.\begin{array}{l} 1, \ 5, \ 9, \ 13, \ 17, \ 21, \ 25, \ \ldots \\ 2, \ 6, \ 10, \ 14, \ 18, \ 22, \ 26, \ \ldots \\ 3, \ 7, \ 11, \ 15, \ 19, \ 23, \ 27, \ \ldots \\ 4, \ 8, \ 12, \ 16, \ 20, \ 24, \ 28, \ \ldots \end{array}\right\}$$

(obejmującéj wszystkie liczby). Wszystkie te klasy (a więc i wszystkie liczby) można też wyrazić jednym wzorem ogólnym

$$4.a + b,$$

jeżeli się umówimy aby litera b przybiérać mogła wartości 0, 1, 2, 3. — Taksamo jakąkolwiek liczbę można przedstawić zapomocą wzoru

$$10.a + b,$$

w którym więc b może mieć wartości $0, 1, 2, \ldots, 9$; wtedy wszystkie liczby można rozdzielić na 10 klas; oddzielną klasę utworzą liczby, dające przy dzieleniu przez 10 tę samę resztę, t. j. odpowiadające téj saméj wartości b. — Również np. liczby parzyste są postaci $2.a$, liczby nieparzyste postaci $2.a+1$. — Podobnie jak powyżéj według liczb 4, 10, 2, możemy wszystkie liczby dzielić na klasy według jakiejkolwiek liczby, tak iż, gdy przez m oznaczymy pewną dowolnie wybraną liczbę, wszystkie liczby możemy przedstawić zapomocą wzoru

$$m.a+b,$$

w którym więc b otrzymywać może wartości $0, 1, 2, \ldots, m-2, m-1$, a liczby, odpowiadające téj saméj wartości b, utworzą oddzielną klasę. —

[Lejeune-Dirichlet dowiódł, że jeżeli liczby m i b są piérwsze względem siebie (§ 14, us. 2), to istnieje nieskończenie wiele liczb piérwszych, należących do klasy $m.a+b$.]

[Każda liczba piérwsza postaci $4.a+1$ jest samą dwu kwadratów; np. $13 = 4.3+1 = 3^2+2^2$. $109 = 4.27+1 = 10^2+3^2$. Każda liczba piérwsza postaci $8.a+3$ jest sumą trzech kwadratów; np. $67 = 8.8+3 = 7^2+3^2+3^2$.]

żoną, to jest także podzielna przez liczby piérwsze, będące dzielnikami owego dzielnika złożonego; tak np. liczba 37 ma dzielnik 12, ale $12 = 4.3 = 2.6$; gdy więc 12 jest dzielnikiem 36-u, to liczby 2 i 3, dzielniki liczby 12, są też dzielnikami liczby 36. Jeżeli więc znaleźliśmy, że liczba np. 847 nie jest podzielna przez 4, 6, 8, 10, 12 i t. d. (bo była by wtedy podzielna przez 2); podobnie, dowiedziawszy się następnie, że ta liczba 847 nie jest podzielna przez 3, nie mamy czego próbować, czy jest podzielna przez 9, 15, 21, 27 i t. d.

Gdy więc, dla oznaczenia, czy dana liczba jest piérwsza, czy złożona, będziemy badać, czy ona jest podzielna przez liczby piérwsze, to prowadzić możemy owo poszukiwanie, zaczynając od liczb piérwszych mniejszych, aby przez to zachować w tym poszukiwaniu pewien ład, a nadto często ułatwić [1]) je sobie. Mając więc daną liczbę, dowiadywać się będziemy naprzód, czy ma ona dzielnik 2. Jeżeli przez 2 dzieli się bez reszty, to oczywista już, że jest liczbą złożoną. Jeżeli nie, to należy zbadać, czy jest podzielna przez 3. Jeżeli nie, to należy oznaczyć, czy jest podzielna przez 5. Jeżeli i przez 5 nie, to czy przez 7, i t. d.

Gdy liczba dana miała jakiś dzielnik, to mogłaby być przedstawiona jako iloczyn tego dzielnika przez dzielnik dopełniający (us. 2). Wiemy zaś, że, jeżeli w iloczynie dwu czynników jeden czynnik powiększamy, to drugi się zmniejsza (§ 7, us. 13). Gdy więc, dzieląc liczbę daną kolejno przez liczby piérwsze 2, 3, 5, 7, 11;..., i znajdując, że ona przez żadnę z tych liczb nie jest podzielna, dojdziemy do takiéj liczby piérwszéj, iż z podzielenia danéj liczby przez tę liczbę piérwszą otrzymujemy w ilorazie liczbę od niéj (t. j. od dzielnika tego dzielenia) mniejszą, to już możemy zaniechać dalszego poszukiwania. Gdyby bowiém dana liczba była podzielną przez ową liczbę piérwszą, lub przez inną, od niéj większą, to dzielnikiem dopełniającym byłaby liczba, od owéj liczby piérwszéj mniejsza. A więc liczba dana miałaby dzielnik (us. 2) mniejszy od owéj liczby piérwszéj, a przecież z poszukiwania dotychczasowego już wiemy, że to być nie może. A zatym:

Jeżeli, mając daną liczbę, badamy pokolei, czy ona jest podzielną przez każdą z liczb piérwszych 2, 3, 5, 7, 11, ..., i jeżeli znajdujemy, że ona przez żadnę z tych liczb nie jest podzielna, a postępowanie to doprowadziliśmy do tego, że w pewnym dzieleniu liczby danéj przez którąś z tych

---

[1]) Gdy bowiém mamy np. liczbę 303 i, nie zbadawszy, czy ona jest podzielna przez 3, próbować będziemy, czy jest podzielna przez większe liczby pierwsze, np. przez 5, 7, 11, 13, 17 i t. d., to poszukiwania te byłyby dość mozolne, a całkiem niepotrzebne, bo $303 = 3.101$, a 101 jest liczba piérwsza, więc tymsamym liczba nasza nie jest podzielna przez żadną z liczb między 3 i 101.

liczb piérwszych wypadła nam już w ilorazie liczba mniejsza od dzielnika, to dana liczba jest liczbą piérwszą [1]).

Tak np., chcemy zbadać, czy 101 jest liczbą piérwszą,

101	2	101	3	101	5	101	7	101	11
...	50	...	33	...	20	...	14	....	9 (mn. niż dz-k);
1		2		1		3		2	

liczba więc 101 jest piérwszą.

9. Aby utworzyć tablicę początkowych liczb piérwszych, możemy postąpić w taki sposób. W szeregu liczb naturalnych 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23 i t. d. przekréślmy co drugą liczbę, zostawiając jednak 2; pozbędziemy się w ten sposób wszystkich liczb (4, 6, 8, 10 i t. d.), podzielnych przez 2. Obok 2 jest liczba nieprzekréślona 3; zostawiając ją, przekréślmy każdą z liczb, zajmujących daléj cotrzecie miejsce, która jeszcze nie była przekréślona, jako już podzielna przez 2. Obok 3 piérwsza nieprzekréślona jest 5; zostawiając ją, przekréślmy każdą z liczb, zajmujących daléj copiąte miejsce, która jeszcze przekréślona nie była. Obok 5 piérwsza nieprzekréślona liczba jest 7 [2]); zostawiając ją, przekréślmy i t. d. Pozostaną więc nieprzekréślonymi liczby, które przez żadnę liczbę mniejszą od siebie, prócz 1, nie są podzielne, t. j. liczby podzielne tylko przez jedność i przez samę siebie, czyli liczby piérwsze.

Jeżeli tu, zamiast przekréślać (lub zmazywać) różne liczby z szeregu liczb naturalnych, będziemy w miejscach, przez nie zajętych, wywiercać otwory, to w ten sposób otrzymamy tak zwane sito Eratostenesa.

Jeżeli np. przekréśliwszy już w ten sposób codrugą, cotrzecią, copiątą, cosiódmą i cojedenastą liczbę, zatrzymaliśmy się, to wszystkie pozostałe liczby, mniejsze od liczby $13.13 = 169$ są piérwszymi, bo jakakolwiek z tych nieprzekréślonych liczb, a więc niepodzielna przez 2, 3, 5, 7, 11. np. 167 nie może się dzielić przez większą liczbę piérwszą (t. j. przez 13, lub większą), bo gdy 167 jest liczbą mniejszą od 169, a $169 : 13 = 13$, to, dzieląc 167 przez 13, otrzymamy liczbę mniejszą od 13, jak również, gdybyśmy 167 dzielili przez liczbę większą od 13. Jeżeliby więc liczba 167 była podzielną przez 13 lub przez większą liczbę, to byłaby podzielną przez różną od 1 liczbę piérwszą,

---

[1]) Wychodzi to na to samo co: *jeżeli liczba dana nie jest podzielną przez żadnę z liczb piérwszych, mniejszych od takiéj liczby, któréj kwadrat* (§ 6, us. 38) *jest od danéj liczby większy, to dana liczba jest piérwsza.* Np. liczba 211 jest mniejsza od $25^2 = 225$ i nie jest podzielna przez liczby piérwsze, mniejsze od 15, t. j. przez liczby 2, 3, 5, 7, 11 i 13; jest więc liczbą piérwszą.

[2]) Zostawiamy 3, 5, 7, ..., gdyż one są liczbami piérwszymi, jako niepodzielne przez żadnę, prócz jedności, z liczb mniejszych (poprzedzających).

mniejszą od 13 (us. 8), t. j. przez jednę z liczb 2, 3, 5, 7, 11, bo być nie może. Zatym: *jeżeli, tworząc sito Eratostenesa, przekreśliliśmy w szeregu liczb naturalnych liczby podzielne przez kilka początkowych liczb piérwszych, to wszystkie nieprzekreślone liczby, mniejsze od kwadratu następującéj liczby pierwszéj, są liczbami piérwszymi.*

Widzieliśmy (us. 8), jak wielu niekiedy potrzeba wyliczeń, aby się przekonać, czy dana dość wielka liczba, jest piérwsza, czytéż złożona. Dlatego od dawnych czasów układano tablice liczb piérwszych. Najwięcéj rozpowszechnioną jest tablica Burckhardt'a, obejmująca wszystkie liczby piérwsze, mniejsze od 3 036 000, a także najmniejsze dzielniki liczb złożonych [1]).

Podajemy tu tablicę liczb piérwszych, mniéjszych od 1500.

1	89	223	359	503	659	827	997	1163	1321
2	97	227	367	509	661	829	1009	1171	1327
3	101	229	373	521	673	839	1013	1181	1361
5	103	233	379	523	677	853	1019	1187	1367
7	107	239	383	541	683	857	1021	1193	1373
11	109	241	389	547	691	859	1031	1201	1381
13	113	251	397	557	701	863	1033	1213	1399
17	127	257	401	563	709	877	1039	1217	1409
19	131	263	409	569	719	881	1049	1223	1423
23	137	269	419	571	727	883	1051	1229	1427
29	139	271	421	577	733	887	1061	1231	1429
31	149	277	431	587	739	907	1063	1237	1433
37	151	281	433	593	743	911	1069	1249	1439
41	157	283	439	599	751	919	1087	1259	1447
43	163	293	443	601	757	929	1091	1277	1451
47	167	307	449	607	761	937	1093	1279	1453
53	173	311	457	613	769	941	1097	1283	1459
59	179	313	461	617	773	947	1103	1289	1471
61	181	317	463	619	787	953	1109	1291	1481
67	191	331	467	631	797	967	1117	1297	1483
71	193	337	479	641	809	971	1123	1301	1487
73	197	347	487	643	811	977	1129	1303	1489
79	199	349	491	647	821	983	1151	1307	1493
83	211	353	499	653	823	991	1153	1319	1499

[1]) *Table des diviseurs* i t. d., Paryż, 1817.

Zamiast w takiéj tablicy wypisywać wszystkie liczby, jedne pod drugim (oczywiście ograniczamy się liczbami nieparzystymi), możemy jedności (1, 3, 5, 7, 9) liczby nadpisać u góry w jednym wiérszu poziomym, a dziesiątki z lewéj strony tablicy w kolumnie pionowéj. Zyskuje się tym sposobem wiele na objętości tablicy. Wtedy liczbie np. 45 odpowiada w tablicy miejsce, należące do tego wiérsza poziomego, w którym na początku postawiono 4 (dziesiątki), a zarazem do tego wiérsza pionowego, w którym u góry oznaczone są 5 (jedności). Na tym właśnie miejscu znajdujemy liczbę 3, t. j. najmniejszy, nie licząc 1, dzielnik liczby 45.

	1	3	5	7	9
	.	.	.	.	3
1	.	.	3	.	.
2	3	.	5	3	.
3	.	3	5	.	3
4	.	.	3	.	7
5	3	.	5	3	.

i t. d.

Jest więc 26 liczb piérwszych mniejszych od 100, 169 mniejszych od 1000, 240 mniejszych od 1500 i t. d. [1]).

§ 13. CECHY PODZIELNOŚCI.

1. Jeżeli mamy danych kilka liczb, np. 15, 30, 20, z których każda ma ten sam dzielnik 5, czyli kilka takich liczb, z których każda jest wielokrotnością (§ 12, us. 3) 5-u, to każda z danych liczb może być przedstawiona jako suma składników 5. A więc i suma tych liczb, 15+30+20, jest téż sumą składników 5, czyli liczbą wielokrotną 5-u, a zatym liczbą mającą także dzielnik 5. Widzimy więc, że [2])

Dzielnik każdéj z kilku liczb jest dzielnikiem sumy, czyli: *suma kilku wielokrotności pewnéj liczby jest wielokrotnością téj liczby* [3]).

2. Podobnie, gdy mamy dwie liczby, np. 35 i 21, z których każda ma dzielnik 7, czyli jest wielokrotnością 7-u, to, gdy od piérwszéj $35=7+7+7+7+7$ odejmiemy drugą $21=7+7+7$, (z uwagi, że od składników 7 odejmując składniki 7, miéć będziemy w reszcie składniki 7) otrzymamy $35-21=7+7$, liczbę wielokrotną 7-u czyli podzielną przez 7. Zatym:

Dzielnik każdéj z dwu liczb jest dzielnikiem ich różnicy, czyli: *różnica dwu wielokrotności pewnéj liczby jest wielokrotnością téj liczby.*

Stąd wypada, że *dzielnik sumy dwu składników i jednego z tych składników jest dzielnikiem drugiego składnika* [4]). Gdy np. $60=36+24$, to liczba 12, będąca dzielnikiem (sumy) 60 i (jednego składnika) 36,

---

Na miejscu, odpowiadającym liczbie np. 37, znajdujemy kropkę, wskazującą, iż liczba 37 jest piérwsza. — Liczbie np. 243 odpowie miejsce tego poziomego wiérsza, w którym na początku pozostawiono 24, i tego pionowego, w którym u góry jest 3.

[1]) Jest 1230 liczb mniejszych od 10000; 9592 mniejszych od 100000; 78493 mniejszych od 1 000 000.

[Jeżeli literą a oznaczymy jakąkolwiek liczbę większą od 3, to między liczbami a i $2a-2$ jest, conajmniéj, jedna liczba piérwsza (twierdzenie Bertrand'a).]

[Prawo następstwa liczb piérwszych jest nieznane. Wielomian o jednéj zmiennéj nie może, przy różnych wartościach na zmienną, przedstawiać samych tylko liczb piérwszych (Legendre); np. jeżeli wielomian $a+bx-cx^2$ przy $x=a$ przedstawia liczbę piérwszą p, to liczba, którą ten wielomian przedstawia przy $x=\alpha+py$, gdzie y ma jakąkolwiek wartość całkowitą, t. j. liczba $a+b\alpha+c\alpha^2+bpy+2\alpha cpy+cpcy^2=p+p\,(by+2\alpha cy+cpy^2)$, jest przez p podzielna, a więc nie jest liczbą piérwszą; taksamo z wielomianem stopnia wyższego.]

[2]) Euklides, ks. V, pod 1: «jeżeli każdą z kilku liczb jest takąż wielokrotnością odpowiedniéj z kilku innych (w takiejże ilości) liczb, to suma piérwszych jest takąż wielokrotnością sumy drugich».

[3]) Stąd wprost wypada własność, wypowiedziana w § 12, us. 4-ym, bo gdy 24 jest wielokrotnością 6-u a 3 jest dzielnikiem 6-u, to dzielnik każdego ze składników sumy $6+6+6+6$ jest dzielnikiem sumy (wielokrotności) 24-ch.

[4]) Euklides, ks. 5, pod. 5.

jest też dzielnikiem ich różnicy 60 — 36 = 24, t. j. drugiego składnika sumy — 24-ch.

3. *Jeżeli liczba dana jest wyrażona jako suma dwu składników, z których jeden jest podzielny przez pewną liczbę, a drugi nie, to i dana liczba nie jest przez nią podzielna, a wtedy reszta z podzielenia liczby danej jest taż sama, co reszta z podzielenia tego właśnie niepodzielnego jéj składnika.* Jeżeli np. 86 = 60 + 26, gdzie 60 jest podzielne przez 12, a 26 nie, to i 86 nie jest podzielone przez 12. Suma bowiém liczb 60 = 12 + + 12 + 12 + 12 + 12 i 26 = 12 + 12 + 2 nie da się wyrazić jako suma składników 12, gdyż prócz nich wejdzie w nią jeszcze składnik 2, który był resztą z podzielenia 26 : 12, a jest także resztą z podzielenia 86 : 12, gdyż 86 = (12 + 12 + 12 + 12 + 12) + (12 + 12 + 2) = 12.7 + 2.

4. Gdy potrzeba dowiedzieć się, czy dana liczba jest przez pewną liczbę podzielna, albo, jeżeli jest niepodzielna, jaka po uskutecznieniu dzielenia, wypadnie reszta, to *w niektórych przypadkach* możemy znaleść odpowiedź prościéj, niż przez bezpośrednie dzielenie tych liczb. Odpowiednie ku temu wskazówki, oparte na tylkoco dowiedzionych własnościach, nazywają się cechami podzielności liczby danéj przez pewne liczby [1]).

5. Gdy mamy liczbę daną, np. 3347, podzielić przez 2, to łatwo zauważymy, że, ponieważ każdy dziesiątek jest podzielny przez 2, przeto i 334 dziesiątki liczby danéj (t. j. część jéj 3340) są podzielne przez 2 (us. 1), tak, że gdy naszę liczbę przedstawimy jako sumę

$$3347 = 3340 + 7$$

to piérwszy jéj składnik jest przez 2 podzielny. Stosownie więc do tego, czy drugi składnik (7) jest podzielny przez 2, czytéż nie, będzie także (us. 1, 3) ich suma, t. j. liczba dana, przez 2 podzielna lub niepodzielna, a w ostatnim razie reszta z podzielenia liczby danéj przez 2 będzie taż sama co reszta z podzielenia tego drugiego składnika przez 2. Tym zaś drugim składnikiem jest liczba, przedstawiona przez ostatnią cyfrę (licząc od strony lewéj) danéj liczby. Powiemy więc wogóle:

Reszta z podzielenia liczby przez 2 jest taż sama, co z podzielenia liczby, przedstawionéj przez ostatnią jéj cyfrę.

Z tabliczki zaś mnożenia wiemy, że z liczb jednocyfrowych podzielne są przez 2 liczby 2, 4, 6, 8. Nadto, dana liczba jest oczywiście podzielną przez 2, gdy ostatnia jéj cyfra nie przedstawia żadnéj liczby, t. j. gdy ostatnia cyfra jest zerem, np. liczba 3340 (gdyż wtedy jest ona sumą samych tylko 10-ów, podzielnych przez 2 (us. 1). Widzimy więc, że można powiedzieć:

[1]) Warunki podzielności przez 6, 12, 15 i t. d. w § 15, us. 11 (a także w § 14, us. 18).

Liczba jest podzielna przez 2, gdy się kończy na 0, albo 2, albo 4, albo 6, albo 8.

Liczby podzielne przez 2, nazywają się, jak wiemy (§ 12, us. 5), parzystymi. Liczby 2, 4, 6, 8 są parzyste. Powiedzieć więc jeszcze możemy, że [1]).

Liczba jest parzystą, gdy się kończy na 0, lub gdy ostatnia jéj cyfra przedstawia liczbę parzystą.

Ponieważ 10 jest podzielne przez 5, więc taksamo rozkładając liczbę daną na dziesiątki i pozostałą część, a następnie podobnie rozumując, znajdziemy, że:

Reszta z podzielenia liczby przez 5 jest taż sama, co reszta z podzielenia liczby, przedstawionéj przez jéj ostatnią cyfrę.

Liczba dzieli się przez 5 bez reszty, gdy jéj ostatnią cyfrą jest 0 albo 5.

6. Gdy chcemy znaleść cechę podzielności przez 4, to nie możemy już liczby np. 3347, tak rozkładać na dwa składniki, jak poprzednio, bo 10 nie jest podzielne przez 4 (niezawsze więc dziesiątki liczby będą przez 4 podzielne). Lecz zważmy, że 100 ma dzielnik 4; możemy więc naszę liczbę tak rozłożyć na składniki: na setki i na pozostałą część,

$$3347 = 3300 + 47.$$

Ponieważ każda setka jest podzielna przez 4, więc i 33 setki, t. j. piérwszy składnik 3300, są podzielne przez 4. Drugi zaś składnik (47) jest liczbą, przedstawioną przez dwie ostatnie cyfry liczby danéj. A więc:

Reszta z podzielenia liczby przez 4 jest taż sama, co reszta z podzielenia liczby przedstawionéj przez dwie jéj ostatnie cyfry.

Liczba jest podzielna przez 4, jeżeli liczba, którą przedstawiają ostatnie jéj dwie cyfry, jest podzielna przez 4, lub jeżeli jest zakończona na dwa zera [2]).

Ponieważ nadto 100 jest podzielne również przez 25, a więc:

Reszta z podzielenia liczby przez 25 jest taż sama, co reszta z podzielenia liczby, przedstawionéj przez dwie ostatnie jéj cyfry.

Liczba dzieli się przez 25, gdy się kończy na dwa zéra, lub gdy dwie jéj ostatnie cyfry przedstawiają liczbę 25, albo 50, albo 75.

7. Liczba 8, przez którą 100 nie jest podzielne, jest dzielnikiem liczby 1000; więc gdy liczbę 1213597 rozłożymy na tysiące i pozostałą część:

---

[1]) Albo: liczba jest parzystą, gdy się kończy na 0, 2, 4, 6, 8. (Ale nie można mówić: liczba jest podzielna przez 2, gdy jest parzystą).

[2]) B nie: jeżeli ostatnie dwie jéj cyfry są podzielne przez 4.

$$1213597 = 1213000 + 597,$$

to piérwszy składnik jest podzielny przez 8. A zatym:

Reszta z podzielenia liczby przez 8, jest taż sama, co reszta z podzielenia liczby przedstawionéj przez trzy ostatnie jéj cyfry.

Liczba jest podzielna przez 8, jeżeli trzy jéj ostatnie cyfry przedstawiają liczbę podzielną przez 8. Np. liczba 82301738 nie jest podzielna przez 8, bo liczba 738 nie jest podzielna przez 8.

Podobnie dla liczby 125, która jest także dzielnikiem [1]) liczby 1000.

8. Można warunek podzielności przez 8 inaczéj jeszcze, dogodniéj wyrazić. Parzysta ilość setek (jako suma liczb 200, us. 1) jest podzielna przez 8, nieparzysta zaś ilość setek daje resztę 4 (bo $100 = 8.12 + 4$, a każda nieparzysta ilość setek może być rozłożoną na parzystą ilość setek + 100, a więc da zawsze tęż samą resztę, co 100; us. 3). Gdy więc mamy liczbę o parzystych setkach, np. 520672, to w sumie

$$520672 = 530600 + 72$$

piérwszy składnik jést podzielny przez 8; gdy zaś mamy liczbę o nieparzystych setkach, np. 215728, to ją możemy tak przedstawić (§ 5, us. 8):

$$215728 = 215700 + 28 = (215700 - 4) + (28 + 4),$$

a tu piérwszy składnik: $215700 - 4$ jest również podzielny przez 8.

Liczba jest podzielna przez 8 wrazie, gdy ilość jéj setek jest parzysta, jeżeli dwie jéj ostatnie cyfry przedstawiają liczbę podzielną przez 8; wrazie zaś, gdy ilość jéj setek jest nieparzysta,— jeżeli dwie ostatnie jéj cyfry przedstawiają liczbę, która, powiększona o 4, staje się podzielną przez 8.

9. Ponieważ ani 10, ani 100, ani 1000 i t. d., t. j. wogóle liczba, przedstawiona przez jedność z zerami, nie jest podzielna przez 3, więc nie możemy korzystać z rozkładów, podobnych powyższym (us. 5, 6, 7), dla wyprowadzenia cechy podzielności przez 3. Ale, przekonywając się właśnie o tym, t. j. dzieląc 10, 100, 1000 i t. d. przez 3,

$$10 = 3.3 + 1,\ 100 = 3.33 + 1,\ 1000 = 3.333 + 1, \ldots,$$

spostrzegamy, że te liczby 10, 100, 1000 i t. d. mogą być rozłożone na dwa składniki: jeden wielokrotny 3 ch (jak 3.3; 3.33; ...), a drugi 1, t. j.

$$10 = 9 + 1,\ 100 = 99 + 1,\ 1000 = 999 + 1, \ldots$$

Jeżeli więc chcemy znaléść cechę podzielności przez 3, to powin-

---

[1]) Liczba np. 50 jest téż dzielnikiem liczby 1000, ale cecha podzielności przez nią zależy tylko od dwu ostatnich cyfr liczby, gdyż 50 jest już dzielnikiem liczby 100.

winniśmy z tego właśnie skorzystać. Jeżeli mamy np. liczbę 2456 to, jak wiemy (§ 6, us. 22), możemy ją tak przedstawić:

$$2456 = 2 \cdot 1000 + 4 \cdot 100 + 5 \cdot 10 + 6.$$

Ponieważ $10 = 9 + 1$ i, aby sumę kilku liczb pomnożyć przez pewną liczbę, można wszystkie jéj składniki pomnożyć przez tę liczbę (§ 6, us. 14), więc $5 \cdot 10 = 5 \cdot 9 + 5 \cdot 1 = 5 \cdot 9 + 5$; podobnież, gdy $100 = 99 + 1$, to $100 \cdot 4 = 99 \cdot 4 + 4$, i gdy $1000 = 999 + 1$, to $2 \cdot 1000 = 2 \cdot 999 + 2$, a zatym

$$2456 = 2 \cdot 999 + 2 + 4 \cdot 99 + 4 + 5 \cdot 9 + 5 + 6.$$

Suma nie zależy od porządku składników (§ 4, us. 7), więc

$$2456 = 2 \cdot 999 + 4 \cdot 99 + 5 \cdot 9 + 2 + 4 + 5 + 6$$

Dodawanie może być uskutecznione przy pomocy częściowych dodawań składników (§ 4, us. 9); możemy zatym oddzielnie, jako jednę liczbę, uważać sumę $2 \cdot 999 + 4 \cdot 99 + 5 \cdot 9$, a oddzielnie, jako drugą, sumę $2 + 4 + 5 + 6$:

$$2456 = (2 \cdot 999 + 4 \cdot 99 + 5 \cdot 9) + (2 + 4 + 5 + 6).$$

Nasza liczba jest teraz rozłożona na dwa składniki, z których piérwszy jako suma wielokrotności liczby 3, jest téż (us. 1) wielokrotnością 3-ch, zatym (us. 3) podzielność liczby danéj przez 3 zależy od podzielności drugiego składnika: $2 + 4 + 5 + 6$ przez 3. Składnik zaś ten jest utworzony przez sumę liczb, przedstawionych przez oddzielne cyfry liczby danéj; tę sumę nazywamy: sumą cyfr [1]) danéj liczby. A więc:

Reszta z podzielenia liczby przez 3 jest taż sama, co reszta z podzielenia sumy jéj cyfr.

Liczba jest podzielna przez 3, jeżeli suma jéj cyfr jest podzielna przez 3.

10. Ponieważ:

$$10 = 9 + 1,\ 100 = 99 + 1,\ 1000 = 999 + 1,\ 10000 = 9999 + 1, \ldots,$$

a składniki 9, 99, 999 i t. d. są wielokrotnościami 9-u, więc, rozumując podobnie, jak w ustępie poprzedzającym, znajdziemy, że:

Reszta z podzielenia liczby przez 9 jest taż sama, co reszta z podzielenia sumy jéj cyfr.

Liczba jest podzielna przez 9, jeżeli suma jéj cyfr jest podzielna przez 9.

11. Przerabiając powyższe wyprowadzenie cechy podzielności przez 3 i 9 na różnych liczbach, łatwo nam się nasunąć może pod uwagę, że 99 jest wielokrotnością 11-u, że choć 999 nie jest podzielne przez 11, ale znów 9999 jest wielokrotnością 11-u i t. d. Może więc na zasadzie téj

---

[1]) Niczym nie daje się usprawiedliwić zastępowanie u niektórych nowszych naszych podręcznikach tego utartego terminu przez przetłomaczony żywcem z niemieckiego: «suma poprzeczna» (Quersumme) liczby danéj.

własności, że każdą z liczb 100, 10 000, 1 000 000,... można rozłożyć na część wielokrotną 11-u i 1, dałoby się oprzéć wyprowadzenie cechy podzielności przez 11? Rzeczywiście, daną liczbę, np. 2 819 091, możemy rozłożyć na setki, dziesiątki tysięcy, milijony (setki milijonów, i t. d.) i pozostałą część,

$$2819091 = 2 \cdot 1000000 + 81 \cdot 10000 + 90 \cdot 100 + 91,$$

albo

$$2819091 = 2 \cdot 999999 + 2 + 81 \cdot 9999 + 81 + 90 \cdot 99 + 90 + 91$$
$$= (2 \cdot 999999 + 81 \cdot 9999 + 90 \cdot 99) + (2 + 81 + 90 + 91),$$

skąd widzimy, że:

Reszta z podzielenia liczby danéj przez 11 jest taż sama, co reszta z podzielenia sumy oddzielnych liczb, stanowiących w liczbie danéj licząc od strony prawéj, grupy dwucyfrowe.

Liczba jest podzielna przez 11, jeżeli podzieliwszy ją od strony prawéj na grupy dwucyfrowe, otrzymamy jako sumę liczb, stanowiących te grupy, liczbę podzielną przez 11.

12. Tę cechę podzielności przez 11 oparliśmy [1]) na tym, że liczby 100, 10 000, 1 000 000 i t. d., po podzieleniu przez 11, dają wszystkie resztę 1. Dzieląc zaś liczby 1 000, 100 000, 10 000 000 i t. p. przez 11, dostrzeżemy, że one dają wszystkie tę samę resztę: 10. Jeżelibyśmy więc do tych liczb (a także i do liczby 10) dodali po 1, to otrzymalibyśmy wielokrotność 11-u. Aby jednak liczb tych nie zmienić, dodajemy [2]) do nich i odejmujemy (§ 5, us. 8) po 1:

$10 = 10 + 1 - 1 = 11 - 1$; $1000 = 1001 - 1$; $100000 = 100001 - 1$

i t. d. Gdy więc mamy daną np. liczbę 92829, to, przedstawimy ją tak

$$92829 = 9 \cdot 10000 + 2 \cdot 1000 + 8 \cdot 100 + 2 \cdot 10 + 9$$

i zważywszy, że (§ 6, us. 14, 15)

$9.10000 = 9.9999 + 9$; $2.1000 = 2.1001 - 2$; $8.100 = 9.99 + 8$; $2.10 = 2.11 - 2$,

miéć będziemy

$$92829 = 9 \cdot 9999 + 9 + 2 \cdot 1001 - 2 + 8 \cdot 99 + 8 + 2 \cdot 11 - 2 + 9$$
$$= (9 \cdot 9999 + 2 \cdot 1001 + 8 \cdot 99 + 2 \cdot 11) + 9 - 2 + 8 - 2 + 9$$

Ponieważ liczba, ujęta w nawias, jest wielokrotnością 11-u i do niéj dodajemy liczby 9, 8, 9, t. j. sumę 9+8+9, czyli sumę cyfr, znajdujących się w liczbie danéj na miejscach nieparzystych (licząc zawsze od

---

[1]) Ponieważ 999, 999 999,... są liczbami podzielnymi przez 37, więc podobnie podzielność liczby przez 37 zależy od podzielności sumy liczb, stanowiących grupy trzycyfrowe liczby danéj (licząc zawsze od strony prawéj).

[2]) Korzystając z dopełnienia reszty (§ 7, us. 24), możnaby wprost powiedzieć: dzieląc 10, 1000, 100 000 i t. d. przez 11, wprowadźmy dopełnienia reszt; wtedy każda z tych liczb rozłoży się na część wielokrotną 11-u i dopełnienie reszty 10-u, t. j. 1, którą od części wielokrotnéj 11-u należy odjąć.

strony prawéj), a odejmujemy liczby 2 i 2, t. j. sumę 2+2, czyli sumę cyfr, znajdujących się na miejscach parzystych, więc możemy powiedzieć, że

Liczba jakakolwiek może być wyrażona przez wielokrotnością 11-u, powiększoną o sumę cyfr, znajdujących sie w niéj na miejscach nieparzystych, a zmniejszona o sumę cyfr, znajdujących się na miejscach parzystych.

Ponieważ liczba nasza

92829 = wielokrotności 11-u + (9+8+9) — (2+2),

zatym podzielność jéj przez 11 zależy od podzielności téj jéj części, która jest przedstawiona przez różnicę (9+8+9) — (2+2). Jeżelibyśmy jednak mieli np. liczbę 908492, to odpowiedniego odejmowania (2+4) — (9+8+9) wykonaćby nie można (§ 5, us. 4, 11). Zawszeby jednak było

908492 = wielokrotności 11-u + (2+4) — (9+8+9).

W tym przypadku [1]) wypadnie postąpić tak, jak wogóle przy wykonywaniu odejmowania (§ 5, us. 11), t. j. oddzielimy z tego, co jest przedstawione przez „wielokrotności 11-u" taką (najmniejszą) wielokrotność 11-u, aby już ona, wraz z sumą 2+4, była niemniejsza od sumy 9+8+9. Tu należy oddzielić 2 . 11 (pozostanie zawsze : wielokrotność 11-u ; us. 2). Mamy więc

908491 = wielokrotności 11-u + (2+4+2.11) — (9+8+9).

Podzielność zatym naszéj liczby przez 11 zależy od podzielności różnicy 2+4+2.11) — (9+8+9). Widzimy więc, że:

Reszta z podzielenia liczby danéj przez 11 jest taż sama, co reszta z podzielenia różnicy, wypadłéj z odjęcia od sumy cyfr, znajdujących się w liczbie danéj na miejscach nieparzystych, sumy cyfr na miejscach parzystych, przyczym wrazie, gdy piérwsza z tych sum jest mniejsza od dru-

---

[1]) Jeżeli liczbę daną nazwiemy N, część zaś jéj, która tu jest oznaczoną przez: »wielokrotność 11» nazwiemy m, zaś sumę cyfr na miejscach nieparzystych nazwiemy n a sumę cyfr na miejscach parzystych p to mamy tu:

$$N = m + (n - p)$$

W przypadku kiedy $n \angle p$, możemy tę równość napisać:

$$N = m - (p - n)$$

Jeżeliby liczba $p - n$ była przez 11 podzielna, to przez 11, jako przez dzielniki tak liczby m jak i liczbę $p - n$, byłaby podzielna różnica tych liczb (us. 2) t. j. liczba N. Moglibyśmy więc tak dla przypadku $n > p$ jak i dla przypadku $n < p$ wypowiedzieć ogólne prawidło: *liczba jest podzielna przez 11 kiedy albo $n - p$. albo $p - n$ jest liczbą podzielną przez 11.* Ale w przypadku $n < p$, niebyłaby różna od zera, reszta z podzielenia $p - n$ przez 11, równa reszcie z podzielenia N przez 11; weszła z podzielenia N przez 11 jest wtedy dopełnieniem do 11 reszty z podzielenia $p - n$ przez 11; tak n. p. w powyższym przykładzie $n = p$, $p = 26$, $n - p = 20$, reszta z podzielenia $p - n$ przez 11 jest 9, reszta z podzielenia 908 492 przez 11 jest liczba: 11 — 9 = 2.

giéj, należy ją powiększyć o taką wielokrotność 11-u, aby stała się nie mniejszą od drugiéj.

Liczba jest podzielna prez 11, jeżeli różnica, otrzymana z odjęcia od sumy cyfr, zajmujących w niéj miejsca nieparzyste (lub od téj sumy, powiększonéj o pewną wielokrotność 11-u), sumy cyfr, znajdujących się w téj liczbie na miejcach parzystych, jest 0 albo liczba podzielna przez 11.

13. Podobnie rzecz się ma z podzielnością przez 7 — trzeba tylko wziąć pod uwagę grupy trzycyfrowe. Jakoż $1000 = 7 \cdot 142 + 6$, albo, wprowadzając dopełnienie reszty (§ 7, us. 24), $1000 = 7 \cdot 143 - 1 = 1001 - 1$; następnie $1\,000\,000 = 7.242\,857 + 1 = 999\,999 + 1$; $1\,000\,000\,000 = 7.142857\ 42 + 6 = 7.142857143 - 1 = 1\,000\,000\,001 - 1$ i t. d., t. j. 1 z 3-a, 9-u, 15-u i t. d. zerami daje dopełnienie reszty 1, zaś 1 z 6-u, 12-u i t. d. zerami daje resztę 1. Jeżeli więc mamy np. liczbę 23 056 784 921, to

$$23056784921 = 23.1000000000 + 56.1000000 + 784.1000 + 921$$
$$= 23.1000000001 - 23 + 56.999999 + 56 + 784.1001 - 784 + 921$$
$$= \text{wielokrotności 7-u} + (56 + 921) - (23 + 784).$$

Zauważmy, że taksamo rzecz się ma z podzielnością przez 13, albowiém $1000 = 13.76 + 12$; $1000000 = 13.76923 + 1$ i t. d., tak iż np.

$$23056784921 = \text{wielokrotności 13-u} + (56 + 921) - (23 + 784).$$

Liczba jest podzielna przez 7 lub 13, jeżeli podzieliwszy ją od strony prawej na grupy [1] *trzycyfrowe i oddzielnie dodawszy liczby tworzące piérwszą (z prawéj strony), trzecią i t. d. grupy, a oddzielnie liczby tworzące drugą, czwartą i t. d. grupy, otrzymany jako różnicę między piérwszą (powiększoną, jeżeli potrzeba, o pewną wielokrotność orpowiednio 7-u lub 13-u) i drugą z tych sum, 0, albo liczbę podzielną odpowiednio 7 lub 13* [2]).

14. Powyższe cechy podzielności przez 3 i 9, przez 11, przez 37, przez 7 i 13, można, przy pomocy wiadomości z algiebry, tak wprost uzasadnić.

Gdy mamy np. liczbę 723456, to możemy ją tak przedstawić (§ 6, us. 34):

$$723456 = 7 \cdot 10^5 + 2.10^4 + 3.10^3 + 4.10^2 + 5.10 + 6$$
$$= 7 \cdot (10^5 - 1) + 2.(10^4 - 1) + 3.(10^3 - 1) + 4.(10^2 - 1) + 5.(10 - 1) +$$
$$+ 7 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6.$$

Każdy z dwumianów $10^5 - 1$, $10^4 - 1$ i t. d. jest podzielny przez $10 - 1 = 9$ i przez 3, dzielnik 9-u (§ 12, us. 5), a więc podzielność przez te liczby zależy od sumy $7 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6$ i t. d. (us. 9, 10).

Podobnież

$$723456 = 7.(10^5 + 1) + 2.(10^4 - 1) + 3.(10^2 + 1) + 4.(10^2 - 1) + 5.(10 + 1) -$$
$$- 7 + 2 - 3 + 4 - 5 + 6,$$

---

[1]) Albo: *jeżeli podzieliwszy na grupy sześciocyfrowe, otrzymamy, jako sumę liczb, stanowiących te grupy, liczbę podzielną odpowiednio przez 7 lub 13* (por. us. 11).

[2]) Również *reszta z podzielenia* i t. d.

a tu każdy z wypisanych dwumianów jest podzielny przez $10+1=11$, więc i t. d. (us. 12).

Również

$$9723456 = 9.10^6+72.10^4+34.10^2+56$$
$$= 9.(10^6-1)+72.(10^4-1)+34.(10^2-1)+9+72+34+56,$$

a każdy z tych dwumianów jest podzielny przez $10^2-1=99$ i przez dzielnik 99-u, t. j. przez 11; więc i t. d. (us. 11).

Taksamo

$$3046784901 = 3.10^9+56.10^6+784.10^3+901$$
$$= 3.(10^9-1)+56.(10^6-1)+784.(10^3-1)+3+56+784+901.$$

Każdy z tych dwumianów jest podzielny przez $10^3-1=999$, a zatym i przez dzielnik téj liczby, t. j. przez 37; więc i t. d. (us. 11, odsyłacz).

Jeszcze:

$$23056784901 = 23.(10^9+1)+56.(10^6-1)+784.10^3+1)-3+56-784+901;$$

to dwumiany są podzielne przez $10^3+1=1001$, a zatym i przez dzielniki téj liczby 7 i 13 (oraz przez 11); więc i t. d. (us. 13).

15. Przy pomocy własności (niżéj: § 14, us. 13): gdy liczbę, mającą pewien dzielnik, podzielimy przez liczbę piérwszą względem tego dzielnika, to iloraz otrzymany jest przez ów dzielnik także podzielny — możemy otrzymać inną jeszcze cechę podzielności przez 7. Przedstawmy liczbę w postaci (§ 12, us. 8, odsyłacz) $10.a+b$. Odejmijmy od niéj liczbę wielokrotną 7-u, przez co warunek podzielności przez 7 się nie zmieni (us. 2, 3); odejmijmy mianowicie $21.b$. Pozostanie w reszcie $10.a-20b$, co gdy podzielimy przez 10, liczbę piérwszą względem 7-u, otrzymamy $a-2.b$. A więc *liczba* $10.a+b$ *jest podzielna przez 7, pod warunkiem, aby* $a-2.b$ *było podzielne przez 7.* Np. liczba 33292 jest podzielna przez 7, jeżeli liczba $3329-2.2=3325$ jest podzielna przez 7; to znowu zależy od podzielności liczby $332-2.5=322$ przez 7, i t. d. Zatym, *chcąc zbadać, czy liczba dana jest podzielna przez 7, należy od ilości jéj dziesiątków odjąć podwojone jedności, z otrzymaną resztą taksamo postąpić i t. d., a stosownie do tego, czy tą drogą dojdziemy do liczby podzielnéj, czytéż do niepodzielnej przez 7, liczba dana będzie również podzielna, lub nie, przez 7.*

33292
−4
3325
−10
322
−4
28

W sposób podobny można udowodnić analogiczne cechy podzielności przez inne liczby (piérwsze względem 10-u), wychodząc z postaci danéj liczby $10.a+b$. Mianowicie:

Dla 3-ch i 9-u warunek: $a+b$ (do $10.a+b$ dodając $9.b$ i dzieląc sumę przez 10) [1].

Dla 11-u warunek: $a-b$ (od $10.a+b$ odejmując $11.b$ i dzieląc resztę przez 10)[2].

---

[1] Ta cecha wychodzi na jedno z podaną w us. 9 i 10.

[2] Ta cecha wychodzi na jedno z podaną w us. 12.

Dla 13-u warunek: $a+4b$ (do $10.a+b$ dodając $3.13.b = 39.b$ i dzieląc sumę przez 10).

Dla 17-u warunek: $a-5.b$ (od $10.a+b$ odejmując $3.17.b = 51.b$ i dzieląc resztę przez 10).

Dla 19-u warunek: $a+2.b$ (do $10.a+b$ dodając $19.b$ i dzieląc sumę przez 10)

Dla 23-ch warunek: $a+7.b$ (do $10.a+b$ dodając $3.23.b = 69.b$ i dzieląc sumę przez 10).

Dla 29-u warunek: $a+3.b$ (do $10.a+b$ dodając $29.b$ i dzieląc sumę przez 10). I t. d. [1]).

17. Należy jeszcze rozważyc, w jaki sposób rozkład liczby według potęg 10-u (§ 6, us. 40) mógłby dostarczyć cech podzielności przez różne liczby.

Dla ogólności, oddzielne cyfry liczby danéj, którą nazwijmy L, oznaczmy literami c ze znaczkami (wskaźnikami) liczebnymi, oznaczającymi miejsce (licząc od strony prawéj) przez nie zajmowane, tak, iż np. c_3 oznaczy cyfrę na trzecim miejscu, a c_n cyfrę na n-ym miejscu. Weźmy wogóle liczby n-cyfrową. Jak wiemy (§ 7, us. 28)

$$L = c_n\, c_n - 1 \ldots c_3\, c_2\, c_1 = c.10^{n-1} + \ldots + c_1 . 10^3 + c_3 . 10^2 + c_2 . 10^1 + c^1.10^0$$

albo (§ 7, us. 27: § 4, us. 7)

$$L = c_1 + c_2.10 + c_3.10^2 + c_4.10^3 \ldots + c_n.10^n - 1.$$

Szukając cechy podzielności przez liczbę, którą nazwijmy d, podzielmy przez nią obie strony téj równości. W sumie po prawéj, dzieląc każdy ze składników (§ 18, us. 3) przez d, dzielny w nim przez d, (poczynając od drugiego składnika) czynnik (§ 7, us. 13; § 21, us. 7), przedstawiający potęgę 11-u; otzymamy wtedy warunek podzielności niezależny od cyfr danéj liczby, o co nam właśnie idzie. Będzie więc

$$\frac{L}{d} = \frac{c_1}{d} + c_2.\frac{11}{d} + c_3.\frac{11^2}{d} + c_4.\frac{11^3}{d} + \ldots + c_n.\frac{11^{n-1}}{d}$$

Całkowitą część ilorazu z dzielenia k-cyfrowej liczby, przedstawionéj przez 1 z zerami przez d, t. j. z dzielenia $71^k - 1$: d, nazwijmy i, a resztę dzielenia r_k; wtedy (oczywiście $i_1 = 1$, $r_1 = 1$)

$$\frac{L}{d} = \frac{c_1}{d} + c_2.\left(i_2 + \frac{r_2}{d}\right) + c_3.\left(i_3 + \frac{r_3}{d}\right) + \ldots + c_n.\left(i_n + \frac{r_n}{d}\right)$$

$$= c_2.i_2 + c_3 . i_3 . + c_4 . i_4 + \ldots + c_n . i_n + \frac{c_1 + c_2 . r_2 + c_3 . r_3 + \ldots + c_n . r_n}{d}$$

Ponieważ suma $c_2.i_2 + c_3.i_3 + \ldots c_n.i_n$ jest liczbą całkowitą, więc liczba L będzie przez d podzielna pod warunkiem, żeby (us. 3) suma $c_1 + c_2.r_2 + c_3.r_3 + \ldots + c_n.r_n$ była przez d podzielna. Należy więc przedewszystkim dla każdéj

---

[1]) Te cechy podzielności ogłoszone są już w *Montferrier'go Encyklopédie mathématique.* (Paryż, t. II, r. 1857, str. 96).

liczby d wyznaczyć liczby $r_3, r_3, r_4, \ldots$, t. j. reszty z dzielenia $11, 11^2, 11^3, \ldots$ przez d, a wtedy łatwo już będzie odkryć warunek podzielności przez d.

$d = 2$. Wtedy $r_2 = r_3 = r_4 = \ldots = 1$; więc warunek podzielności przez 2 wypada z $\frac{c_1}{2}$ (us. 5).

$d = 3$. Wtedy $r_2 = r_3 = r_4 = \ldots = 1$; więc warunek podzielności przez 3 wypada z $\frac{c_1 + c_2 + c_3 + \ldots}{3}$ (us. 9).

$d = 4$. Wtedy $r_2 = 2$, $r_3 = r_4 = \ldots = 0$; mamy więc warunek $\frac{c_1 + 2c_2}{4}$, t. j. aby suma piérwszéj cyfry i dwa razy wziętéj drugiéj była podzielna przez 4. (Jeżeli do téj sumy dodamy liczbę podzielną przez 4, mianowicie $8 \cdot c_2$, to przedstawimy ten warunek inaczej: $\frac{c_1 + 10 \cdot c_2}{4} = \frac{c_2 c_1}{4}$, us. 6.)

$d = 5$. Warunek $\frac{c_1}{5}$ (us. 5).

$d = 6$ [1]). Wtedy: $r_2 = r_3 = r_4 = \ldots = 4$, a warunek $\frac{c_1 + 4c_2 + 4c_3 + \ldots}{6}$

$d = 7$. Wtedy $r_1 = 1$, $r_2 = 3$, $r_3 = 2$, $r_4 = 6$, $r_5 = 4$, $r_6 = 5$, $r_7 = 1$, $r_8 = 3$, i t. d.; reszty więc te, powtarzając się, tworzą peryjod 1, 3, 2, 6, 4, 5. Należy więc cyfry 1-ą, 7-ą, 13 i t. d. zostawić bez zmiany, 2-gą, 8-ą, 14-tą i t. d. pomnożyć przez 3 i t. d., a jeżeli ta suma $c_1 + 3 \cdot c_2 + 2 \cdot c_3 + 6 \cdot c_4 + 4 \cdot c_5 + 5 \cdot c_6 + c_7 + 3 \cdot c_8 + \ldots$ jest podzielna przez 7, to i dana liczba jest podzielna przez 7. Wprowadzając dopełnienia reszt (§ 7, us. 24) liczb 6, 4, 5, moglibyśmy powiedzieć, że warunkiem jest podzielność sumy $c_1 + 3 \cdot c_3 + 2 \cdot c_3 - c_4 - 3 \cdot c_5 - 2 \cdot c_6 + c_7 + 3 \cdot c_8 + \ldots$; poszukiwanie wtedy nieco się uproszcza, ale zawsze złożonym być nie przestaje [2]).

$d = 8$. Wtedy $r_2 = 2$, $r_3 = 4$, $r_4 = r_5 = \ldots = 0$. Warunek $\frac{c_1 + 2 \cdot c_2 + 4 \cdot c_3}{8}$. (Jeżeli dodamy liczbę podzielną przez 8, mianowicie $8 \cdot c_2 + 96 \cdot c_3$, to ten warunek przedstawimy inaczéj, mianowicie: $\frac{c_1 + 10 \cdot c_2 + 100 \cdot c_3}{8} = \frac{c_3\, c_2\, c_1}{8}$, us. 7).

$d = 9$; $r_2 = r_3 = \ldots = 1$; warunek $\frac{c_1 + c_2 + \ldots}{9}$ (us. 10).

$d = 10$; $r_2 = r_3 = \ldots = 9$; warunek $c_1 = 0$.

$d = 11$; $r_1 = 1$, $r_2 = 10$, $r_3 = 1$, $r_4 = 10$ i t. d.; warunek $\frac{c_1 + 10 \cdot c_2 + c_3 + 10 \cdot c_4 + c_5 + 10 \cdot c_6 + \ldots}{11} = \frac{c_2\, c_1 + c_4\, c_3 + c_6\, c_5 + \ldots}{11}$ (us. 11),

---

[1]) Co do warunku podzielności przez 6, 12 i t. d., patrz niżéj w § 14, us. 18.

[2]) I tu dodając i odejmując odpowiednie wielokrotności 7-u, doszlibyśmy do cech podanych w us. 13.

$d = 12$; $r_1 = 1, = 10$; $r_3 = r_4 = \ldots = 4$, a więc

$$\frac{c_1 + 10 . c_2 + 4 . c_3 + 4 . c_4 + 4 . c_5 + \ldots}{12}$$

I t. d.

PRÓBY MNOŻENIA I DZIELENIA PRZEŁ 9.

17. Dowiedziemy iż ogólnie:

Reszta, otrzymana z podzielenia iloczynu dwu [1]) *czynników przez pewną liczbę, jest taż sama, co reszta, wypadła z podzielenia przez nią iloczynu reszt, otrzymanych z podzielenia obu czynników oddzielnie przez tęż liczbę.*

Dowiedziemy, że np. reszta, otrzymana z podzielenia iloczynu 88 . 35 (t. j. liczby 3080) przez 12, jest taż sama, co reszta wypadła z podzielenia iloczynu reszty z dzielenia 88 : 12 przez resztę z dzielenia 35 : 12. Wiemy (§ 6, us. 14), że

$$88 . 35 = (12 . 7 + 4) . 35 = 12 . 7 . 35 + 4 . 35$$

i że (us. 3) reszta z podzielenia liczby 88 . 35 przez 12 jest taż sama, co reszta z podzielenia liczby 4 . 35 przez 12. Lecz znów $4 . 35 = 4 . (12 . 2 + 11) = 4 . 12 . 2 + 4 . 11$, więc

$$88 . 35 = (12 . 7 . 35 + 12 . 4 . 2) + 4 . 11,$$

i znów (us. 3) reszta z podzielenia iloczynu 88 . 35 przez 12 jest równa reszcie z podzielenia iloczynu 4 . 11 przez 12, t. j. iloczynu reszty z podzielenia czynnika 88 przez 12 i reszty z podzielenia czynnika 35 przez 12.

Jeżeli więc chcemy, opiérając się na tym twierdzeniu, przy pomocy dzielenia przez 9, sprawdzić mnożenie wypisane, to tak postąpić możemy: $8 + 8 = 16$, więc reszta z podzielenia 88 : 9 (us. 10) jest 7; $3 + 5 = 8$, reszta z podzielenia 35 : 9 jest 8; iloczyn reszt $7 . 8 = 56$; $5 + 6 = 11$; więc reszta z podzielenia (iloczynu reszt) 56 : 9 jest 2. Szukamy teraz reszty z dzielenia znalezionego iloczynu (3080) przez 9; $3 + 8 = 11$; z dzielenia 11 : 9 otrzymujemy resztę 2, tę samę, co z dzielenia iloczynu reszt przez 9. Możemy więc z pewnym prawdopodobieństwem wnosić, że to mnożenie jest dobrze wykonane. Oczywiście, ta próba nie wykryje omyłki w iloczynie (nadmiaru lub niedomiaru) o wielokrotność 9-u (us. 3), jak również nie wykryje tego, że np. jedna cyfra jest za wielka o tyle jedności, o ile druga jest za mała.

88	7
× 35	8
440	2
264	
3080	2

Aby sprawdzić dzielenie przy pomocy dzielenia przez 9, odejmujemy resztę dzielenia od dzielnéj; otrzymana liczba jest iloczynem dzielnika przez iloraz; więc reszta otrzymana z jéj podzielenia przez 9 jest taż sama, co

[1]) Lub ilukolwiek.

17040690	567
.....	30054
.....	
72	
17040618	

reszta iloczynu reszt wypadłych z podzielenia dzielnika przez 9 i z podzielenia ilorazu przez 9. Tu $5+6+7=18$; reszta 0; jakakolwiek więc będzie reszta z podzielenia ilorazu, będzie iloczyn 567 . 30054 wielokrotnością 9-u; więc i reszta z podzielenia 17040618 powinno być 0. Jakoż $1+7+4+6+1+8=27$. Możemy więc z pewnym prawdopodobieństwem wnosić, że to dzielenie jest dobrze wykonane.

Podobnie możnaby wykonywać próbę mnożenia lub dzielenia przez 11 (us. 11, 12), lecz to, jak i dzielenie przez pewne inne liczby (np. przez 7 i t. d.) nie byłoby tak dogodne w zastosowaniu, jak dzielenie przez 9.

Teoretycznie możnaby podobne próby wykonywać zapomocą dzielenia przez jakiekolwiek liczby. Lecz dzielenie przez 2, 5, 10 mogłoby wykryć tylko błąd w ostatniéj cyfrze; przez 4, 25, 100 tylko w dwu ostatnich cyfrach; przez 3 byłoby mniéj korzystne niż przez 9, bo nie wykrywałoby nadmiarów lub niedomiarów wielokrotnych 3-ch, które wrazie, gdy nie są wielokrotnościami 9-u, mogłyby być wykryte próbą przez 9.

---

§ 14. SPÓLNY DZIELNIK KILKU LICZB. NAJWIĘKSZY SPÓLNY DZIELNIK KILKU LICZB. DWIE LICZBY PIĘRWSZE WZGLĘDEM SIEBIE.

1. *Liczba, przez którą jednocześnie jest podzielna każda z danych liczb, nazywa się spólnym dzielnikiem tych liczb danych.* Np. liczby 36, 84, 672 i 120 są wszystkie podzielne przez 1, 2, 3, 4, 6, 12; każda więc z liczb 1, 2, 3 4, 6, 12 jest spólnym dzielnikiem liczb 36, 84, 672 i 120.

Jeden z tych spólnych dzielników liczb danych jest największy; nazywa się go największym spólnym dzielnikiem liczb danych. Tak np. 12 jest największym spólnym dzielnikiem liczb 36, 84, 672 i 120.

Największym spólnym dzielnikiem kilku liczb danych nazywamy największą ze wszystkich liczb, przez które jednocześnie jest podzielna każda z liczb danych.

Nadal, przez skrócenie, zamiast: największy spólny dzielnik, pisać często będziemy: nsd.

2. *Dwie liczby, nie mające żadnego spólnego dzielnika, prócz jedności, nazywają się liczbami piérwszymi względem siebie.* Np. liczby 24 i 35, z których piérwsza ma dzielniki: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 24, a druga: 1, 5, 7, 35, nie mają żadnego spólnego dzielnika, prócz 1-ci. Możemy więc jeszcze powiedzieć, że dwie liczby piérwsze względem siebie mają nsd. 1.

3. *Jeżeli dwie liczby nie są piérwszymi względem siebie, to mają conajmniéj, jeden spólny dzielnik, będący liczbą piérwszą, różną od jedności.* Jeżeli bowiém spólny ich dzielnik, różny od 1, nie jest liczbą piérwszą, to jest on sam podzielny przez liczbę piérwszą (§ 12, us 6), która więc (§ 12, us. 4) jest dzielnikiem tak jednéj, jak i drugiéj z danych liczb, czyli jest ich spólnym dzielnikiem.

4. a. *Dwie liczby piérwsze, są piérwsze względem siebie,* np. 7 i 37, bo każda z nich ma tylko dzielnik 1 i samę siebie, a one są od siebie różne — żadnego przeto spólnego dzielnika, prócz 1, mieć nie mogą.

b. *Liczba piérwsza i liczba, przez tamtę niepodzielna, są piérwsze względem siebie* [1]); np. 11 i 56, bo jeżeli liczba 56 jest niepodzielna przez liczbę piérwszą 11, która ma tylko dzielniki 1 i 11, to liczby 11 i 56 nie mogą mieć żadnego spólnego dzielnika, prócz 1.

5. *Jeżeli z dwu liczb jedna jest przez drugą podzielna, to mniejsza jest największym spólnym dzielnikiem tych dwu liczb* [2]). Np. z dwu liczb 8 i 56 druga jest podzielna przez piérwszą, a więc 8 jest dzielnikiem 8-u i 56-u, t. j. jest ich spólnym dzielnikiem, i jest nadto nsd.-em tych liczb 8 i 56, gdyż 8 przez liczbę większą od 8-u nie jest podzielne.

6. Dowiedliśmy (§ 13, us. 2), że dzielnik sumy dwu składników i jednego ze składników jest dzielnikiem drugiego składnika. Jeżeli więc, mając dwie liczby, np. 132 i 36, podzielimy piérwszą przez drugą, to

$$132 = 36 . 3 + 24$$

i każdy spólny dzielnik liczb 132 i 36, a więc i (§ 12, us. 4) wielokrotności 36-u, t. j. liczby 36 . 3, jako dzielnik sumy dwu składników (132) i jednego składnika (36 . 3), jest dzielnikiem drugiego składnika, 24-ch, reszty z dzielenia 132 : 36. Możemy więc powiedzieć, że każdy spólny dzielnik liczb 132 i 36, jako dzielnik 24-ch, jest też spólnym dzielnikiem liczb 36 i 24.

Nawzajem, każdy spólny dzielnik dwu liczb 36 i 24, jako dzielnik każdego ze składników 36 . 3 i 24, jest dzielnikiem ich sumy (§ 13, us. 1), t. j. liczby 132, a tymsamym jest spólnym dzielnikiem liczb 132 i 36.

Gdy więc każdy spólny dzielnik liczb 132 i 36 jest spólnym dzielnikiem liczb 36 i 24 i nawzajem, każdy spólny dzielnik liczb 36 i 24 jest spólnym dzielnikiem liczb 132 i 36, to *wszystkie spólne dzielniki liczb 132 i 36 są tymiż samymi, co wszystkie spólne dzielniki liczb* 36 *i* 24, a zatym i nsd. liczb 132 i 36 jest jednocześnie nsd.-em liczb 36 i 24. Powiemy więc:

---

[1]) Euklides, ks. VII, pod. 31.

[2]) Euklides, ks. VII, pod. 2, przypadek 1-y zadania: znaléść nsd. (miarę) dwu liczb, które nie są piérwszymi względem siebie.

Jeżeli z dwu liczb jedna nie jest przez drugą podzielna, to one mają ten sam największy spólny dzielnik, co mniejsza z tych liczb i reszta z podzielenia większéj z nich przez mniejszą.

7. Chciejmy odnaléść nsd. dwu liczb, np. 945 i 360. Szukany nsd. jest zarazem (us. 4) nsd.-em liczby 360 i reszty z dzielenia $945 : 360$; $945 = 2 . 360 + 225$. Zamiast więc szukać nsd.-a liczb 945 i 360, możemy szukać nsd.-a liczb 360 i (téj reszty) 225. Lecz znowu, dzieląc 360 przez 225, otrzymamy $360 = 1 . 225 + 135$. Zamiast więc szukać nsd.-a liczb 360 i 225, możemy szukać nsd.-a liczb 225 i 135. I t. d. Ponieważ tu wciąż coraz mniejsze otrzymujemy liczby (§ 7, us. 11), więc ilość takich dzieleń jest ograniczona [1]). Dojdziemy nakoniec do reszty 0, t. j. do takich dwu liczb, z których jedna jest przez drugą podzielna, a więc (us. 5) ich nsd-em będzie mniejsza z nich, t. j. dzielnik ostatniego dzielenia. Ten więc dzielnik ostatniego dzielenia, jako nsd. dwu liczb, mających ten sam nsd., co każde dwie poprzednio dzielone przez siebie liczby, jest téż nsd.-em liczb danych [2]).

Przedstawimy tu rachunek poszukiwania nsd.-a *a)* liczb 945 i 360, *b)* liczb 35 i 1136.

a)

			945	360	
			720	2	
		360	225		
		225	1		
	225	135			
	135	1			
135	90				
90	1				
90	45	nsd.			
90	2				
0					

b)

			1136	35	
			105	32	
			86		
			70		
		35	16		
		32	2		
	16	3			
	15	5			
5	1	nsd.			
5	5				
0					

---

[1]) Ilość dzieleń, które należy uskutecznić przy poszukiwaniu nsd.-a dwu liczb, jest nie większa od 5 razy wziętéj ilości cyfr mniejszéj z liczb danych (L a m é w protokółach akademii nauk w Paryżu, 1844).

Szereg liczb, w którym początkowymi są liczby 1, 2, a każda następująca jest sumą dwu poprzedzających, t. j. szereg

1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, ...,

posiada tę własność iż, przy poszukiwaniu nsd.-a dwu liczb, z których mniejsza nie jest większa od pewnéj liczby tego szeregu, ilość dzieleń nie jest większa od ilości dzieleń, potrzebnych dla odnalezienia nsd.-a owéj właśnie liczby z tego szeregu i liczby następującéj po niéj w tymże szeregu. Np., niewięcéj potrzeba dzieleń dla odnalezienia nsd.-a liczb 945 i 360, niż dla liczb 377 i 610

Niewięcéj zaś potrzeba dzieleń dla odnalezienia nsd.-a dwu liczb tego szeregu, ile wskazuje miejsce zajęte w tym szeregu przez mniejszą z tych liczb. Np., dla odszukania nsd.-a tak liczb 144 i 89, jak i np. 1597 i 89, potrzeba niewięcéj niż 10-u dzieleń, bo 89 jest w tym szeregu na 10-ym miejscu.

[2]) Euklides, ks. VII, pod. 2, przyp. 2.

W piérwszym przykładzie poszukiwanie nsd.-a liczb 945 i 360 sprowadzało się kolejno do poszukiwania (us. 6) nsd.-a liczb 360 i 225, liczb 225 i 135, liczb 135 i 90, liczb 90 i 45, z których już piérwsza była podzielna przez drugą; więc mniejsza z nich, t. j. 45 (dzielnik ostatniego dzielenia), jest nsd.-em każdéj pary dzielonych tu przez siebie liczb, a więc i liczb danych 945 i 360. W drugim zaś przykładzie otrzymaliśmy tą samą drogą, jako nsd. liczb 1136 i 35, liczbę 1; więc (us. 2) te liczby dane są piérwsze względem siebie [1]). Powiemy więc:

Aby odnaléść największy spólny dzielnik dwu liczb, należy liczbę większą podzielić przez mniejszą, mniejszą przez resztę piérwszą, resztę piérwszą przez resztę drugą i t. d., dopóki nie wypadnie reszta 0; wtedy ostatni dzielnik jest poszukiwanym największym spólnym dzielnikiem dwu liczb danych.

Ponieważ, jak wiemy, w tym poszukiwaniu nsd.-a pewnych dwu danych liczb, dwie którekolwiek dzielone przez siebie liczby mają ten sam nsd., co dane dwie liczby, więc jeżeli, prowadząc to poszukiwanie, dojdziemy do dzielenia przez siebie liczb, o których wiemy, że są piérwsze względem siebie, to nie mamy co działania daléj prowadzić, gdyż wtedy i dane liczby są piérwsze względem siebie. Tak np., poszukując powyżéj nsd.-a liczb 1136 i 35 doszliśmy do dzielenia liczb 16 i 3, z których ostatnia jest piérwsza, a poprzednia nie jest przez nią podzielna (us. 4); możemy więc zaprzestać dalszego rachunku, gdyż już widoczna, że także liczby 1136 i 35 są piérwsze względem siebie.

8. Poszukując w ten sposób nsd.-a różnych liczb, łatwo możemy dostrzéc, że do powiedzianego w ustępie 4-ym możemy teraz dodać:

c. *Dwie liczby po sobie następujące w szeregu liczb naturalnych są piérwszymi względem siebie* (gdyż ich nsd. jest jednocześnie nsd.-em mniejszéj z tych liczb i reszty 1; jest on więc 1). Np. 25 i 24, albo 38 i 39.

d. *Dwie liczby nieparzyste, po sobie następujące w szeregu liczb naturalnych są piérwsze względem siebie* (gdyż ich nsd. jest nsd.-em mniejszéj z tych liczb i reszty 2, przez którą tamta, jako nieparzysta, jest niepodzielna (us. 4, b.) Np. 25 i 27, albo 117 119.

9. Na zasadzie dowiedzionego w us. 6, wiemy, że wszystkie spólne dzielniki liczb 945 i 360 (us. 7) są téż same, co liczb 360 i 225, jak również też same, co liczb 225 i 135, co liczb 135 i 90, co nakoniec liczb 90 i 45. Lecz 90 jest wielokrotnością 45, więc dzielniki liczb 90 i 45,

[1]) Euklides, ks. VII, pod. 1.

a więc i liczb 945 i 360, są dzielnikami liczby 45, nsd.-a liczb 945 i 360. A zatym [1]),

Spólne dzielniki dwu liczb są też same, co dzielniki ich największego spólnego dzielnika.

10. Mamy znaléść nsd. kilku liczb, np. cztérech liczb

945, 360, 60 i 95.

Ponieważ każdy spólny dzielnik tych cztérech liczb jest spólnym dzielnikiem dwu liczb: 945 i 360, a zarazem (us. 9) dzielnikiem nsd.-a tych dwu liczb, t. j. (jakeśmy znaleźli us. 7) liczby 45, więc każdy spólny dzielnik wypisanych cztérech liczb jest spólnym dzielnikiem trzech liczb

45, 60, 95.

Nawzajem, każdy spólny dzielnik tych trzech liczb, jako dzielnik 45-u, jest też dzielnikiem liczb 945 i 360, wielokrotności 45-u (§ 12, us. 4), czyli: jest spólnym dzielnikiem początkowo danych cztérech liczb. Z tego wypada, że wszystkie spólne dzielniki liczb 945, 360, 60 i 95 są tymiż samymi, co wszystkie spólne dzielniki liczb 45, 60 i 95, a zatym i nsd. liczb 945, 360, 60 i 95 jest ten sam, co nsd. liczb 45, 60 i 95. — Podobnie rozumując, znajdziemy, że znowu nsd. liczb 45, 60 i 95 jest nsd.-em liczb 15 (nsd.-a 45-u i 60-u) i 95. Największy zaś spólny dzielnik liczb 15 i 95 jest 5. Więc 5 jest nsd.-em liczb 945, 360, 60 i 95. — Możemy więc powiedzieć:

Aby wyznaczyć największy spólny dzielnik trzech lub więcéj liczb danych, należy, odnalazszy go dla dwu [2]) *z danych liczb, poszukiwać następnie największego spólnego dzielnika dwu liczb, z których jedną jest znaleziony już największy spólny dzielnik dwu danych liczb, a drugą trzecia* [3]) *z danych liczb, i t. d.* [4]).

11. Wiemy (§ 7, us. 14), że gdy dzielną i dzielnik albo jednocześnie pomnożymy, albo jednocześnie podzielimy przez tę samę liczbę, to reszta dzielenia będzie przez tęż liczbę odpowiednio albo pomnożona, albo podzielona. Jeżeli więc, odnalazszy (us. 7) nsd. dwu danych liczb, pomnożymy je obie przez tęż samę liczbę i ponownie poszukiwać będziemy największego spólnego dzielnika tak zmienionych liczb, to wszystkie kolejne reszty będą przez tęż samę liczbę pomnożone, a tymsamym będzie przez nią pomnożony poprzedni nsd., jako jedna z tych reszt. Również, jeżelibyśmy obie dane liczby podzielili przez tę samę liczbę, to wszystkie kolejne reszty będą przez tę liczbę podzielone i, jako nsd., otrzymalibyśmy nsd. liczb danych, przez tę samę liczbę podzielony. A więc:

---

[1]) Euklides, ks. VII. pod. 2, wniosek.
[2]) Którychkolwiek.
[3]) Którakolwiek z pozostałych.
[4]) Euklides, ks. 7, pod. 3.

Jeżeli dwie liczby albo jednocześnie pomnożymy albo jednocześnie podzielimy przez pewną liczbę, to skutkiem tego największy ich spólny dzielnik będzie przez tęż liczbę odpowiednio pomnożony, albo podzielony.

12. Z tego bezpośrednio wypada, że

Gdy dwie liczby podzielimy przez ich największy spólny dzielnik, to otrzymamy liczby piérwsze względem siebie, gdyż, skutkiem tego, ich nsd. stanie się 1-ścią. Tak np., liczby 108 i 48 mają nsd. 12; gdy liczby 108 i 48 podzielimy przez ten nsd. 12, to jednocześnie ich nsd. dzielimy przez siebie i, jako nsd. nowych liczb, otrzymujemy 1; jakoż, 9 i 4 są liczbami piérwszymi względem siebie.

13. *Jeżeli iloczyn dwu czynników jest podzielny przez liczbę piérwszą względem jednego czynnika, to czynnik pozostały jest przez tę liczbę podzielny* [1]). Jeżeli np. iloczyn 44 . 105 jest podzielny przez liczbę 35, piérwszą względem czynnika 44, to należy dowiéść, że drugi czynnik 105 jest podzielny przez 35. Ponieważ 44 i 35 są liczby piérwsze względem siebie, przeto ich nsd. jest 1. Jeżeli więc te liczby pomnożymy przez 105, to (us. 11) nsd. liczb 44 . 105 i 35 . 105 jest $1 \times 105 = 105$. Iloczyn 44 . 105, według założenia, jest podzielny przez 35; iloczyn 35 . 105, jako wielokrotność 35-u jest podzielny przez 35, a więc (us. 9) i ich nsd., t. j. liczba 105, jest podzielna przez 35.

Z tego wypada, że (§ 7, us. 13):

$$(44 . 105) : 35 = 44 . (105 : 35),$$

t. j. iloraz z podzielenia liczby 44 . 105 przez 35, liczbę piérwszą względem jéj dzielnika 44, posiada dzielnik 44. Czyli: *gdy liczbę, mającą pewien dzielnik, podzielimy przez liczbę piérwszą względem tego dzielnika, to iloraz otrzymany jest przez ów dzielnik także podzielny.*

14. *Jeżeli iloczyn kilku czynników jest podzielny przez liczbę piérwszą, to przynajmniej jeden z jego czynników jest przez tę liczbę podzielny* [2]).

Jeżeli mamy iloczyn dwu czynników, np. 44 . 105, podzielny przez liczbę piérwszą 7, to wrazie, gdyby przez tę liczbę był podzielny piérwszy czynnik iloczynu, prawdziwość naszego twierdzenia byłaby oczywistą. Wrazie zaś, gdy, jak tu, czynnik 44 nie jest podzielny przez 7, to (us. 4, b.) liczby 7 i 44 są piérwszymi względem siebie, a skutkiem tego (us. 13) drugi czynnik 105 jest podzielny przez 7.

Gdybyśmy mieli iloczyn kilku czynników, np. 44 . 25 . 72 . 105 podzielny przez liczbę piérwszą 7, to uważając ten iloczyn jako iloczyn dwu czynników: 44 i liczby 25 . 72 . 105, na zasadzie powyższego widzimy, że ponieważ 44 nie jest podzielne przez 7, drugi czynnik 25 . 72 . 105 jest podzielny przez 7. Gdy zaś ten iloczyn 25 . 72 . 105 dwu czynników: 25 i liczby 72 . 105 jest po-

---

[1]) Euklides, ks. VII, pod. 25: liczba, która jest dzielnikiem jednéj z dwu liczb piérwszych względem siebie, jest piérwszą względem drugiéj z tych liczb.

[2]) Euklides, ks. VIII, pod. 32.

dzielny przez 7, a czynnik jego piérwszy nie jest podzielny przez 7, to drugi czynnik 72 . 105, jest podzielny przez 7. I t. d.

15. Z powyższego wypada:

a. *Gdy liczba piérwsza jest dzielnikiem potęgi pewnéj liczby, to jest dzielnikiem téj liczby* [1]), gdyż jeżeli np. 5 jest dzielnikiem 25^3, to jest (§ 6, us. 38) dzielnikiem iloczynu 25 . 25 . 25, a więc (us. 14) dzieli czynnik tego iloczynu, t. j. liczbę 25.

b. *Gdy dwie liczby są piérwsze względem siebie, to i jakiekolwiek ich potęgi są także liczbami pierwszymi względem siebie*[2]). Np. 8 i 21 są liczbami piérwszymi względem siebie; należy okazać, że np. 8^9 i 21^{12} są téż piérwszymi względem siebie. Gdyby bowiém liczby 8^9 i 21^{12} nie były piérwszymi względem siebie, to miałyby (us. 3) spólny dzielnik, będący liczbą piérwszą, który będąc dzielnikiem 8^9, byłby, według a., dzielnikiem 8, a będąc dzielnikiem 21^{12}, byłby dzielnikiem 21, czyli byłby spólnym dzielnikiem liczb 8 i 21, co być nie może.

16. *Liczba piérwsza względem każdéj z kilku liczb jest piérwsza względem ich iloczynu* [3]). Gdyby bowiém np. liczba 25, piérwsza względem każdéj z liczb: 24, 36, 48, 56, nie była piérwszą względem ich iloczynu 24, 36, 48, 56, to ten iloczyn i liczba 25 miałyby (us. 3) spólny dzielnik będący liczbą piérwszą, która byłaby (us. 14) dzielnikiem jednego z czynników iloczynu, a więc ten czynnik i liczba 25 nie byłyby liczbami piérwszymi względem siebie.

17. *Liczba podzielna przez dwie liczby piérwsze względem siebie, lub przez kilka liczb, z których każde dwie są piérwsze względem siebie, jest podzielną przez ich iloczyn.*

Np. Liczba 1800 jest podzielna przez liczby 4, 5, 9, z których tak liczby 4 i 5, jak liczby 5 i 9, jakotéż liczby 4 i 9 są, oddzielnie uważane, dwiema liczbami piérwszymi względem siebie; chcemy dowieść, że liczba 1800 jest podzielna przez iloczyn 4 . 5 . 9 = 180.

Ponieważ 1800 jest podzielne przez 4, więc (§ 12, us. 2) 1800 = 4.450. Gdy 1800 jest podzielne przez 5, to i iloczyn 4 . 450 jest podzielny przez 5; że zaś czynnik 4 jest piérwszy względem 5, to (us. 13) czynnik 450 jest podzielny przez 5 i 450 = 5 . 90, a więc 1800 = 4 . 5 . 90. Gdy znowu 1800 jest podzielne przez 9, to i iloczyn 4 . 5 . 90 jest podzielny przez 9; że zaś 9 jest liczbą piérwszą tak względem 4 jak i względem 5, więc jest liczbą piérwszą względem (us. 16) iloczynu 4 . 5, tak iż, uważając iloczyn 4 . 5 . 90 jako iloczyn dwu czynników: jednego 4 . 5, drugiego 90, widzimy, że ten iloczyn jest podzielny przez liczbę 9, piérwszą względem czynnika 4 . 5, skutkiem

---

[1]) Na mocy tego, można uogólnić to, co powiedziano w ustępie 8 d., dowodząc, że: *Dwie liczby nieparzyste, których różnica jest potęgą liczby 2, są piérwsze względem siebie*; np. 25 i 33, 27 i 91, i t. d.

[2]) Euklides, ks. VII, pod. 27, 29.

[3]) Euklides, ks. VII, pod. 26.

czego (us. 13) drugi jego czynnik 90 jest podzielny przez 9. Zatym, wyrażając 90 jako iloczyn 9-u przez dzielnik dopełniający, mamy $90 = 9 . 10$, a tymsamym $1800 = 4 . 5 . 9 . 10 = (4 . 5 . 9) . 10$, z czego widoczna, że liczba 1800 jest podzielną przez iloczyn $4 . 5 . 9 = 180$.

8. Z powyższego wypada bezpośrednio [1]).

Jeżeli liczba jest podzielna przez 2 i przez 3, to jest podzielna przez 6.
Jeżeli liczba jest podzielna przez 3 i przez 4, to jest podzielna przez 12.
Jeżeli liczba jest podzielna przez 3 i przez 5, to jest podzielna przez 15.
Jeżeli liczba jest podzielna przez 3 i przez 8, to jest podzielna przez 24.
I t. d. [2]).

---

§ 15. ROZKŁAD LICZBY NA CZYNNIKI PIERWSZE. WSZYSTKIE DZIELNIKI LICZBY. SPÓLNA WIELOKROTNOŚĆ KILKU LICZB. NAJMNIEJSZA SPÓLNA WIELOKROTNOŚĆ KILKU LICZB.

1. Jeżeli pewna liczba jest złożona, t. j. ma dzielnik różny od saméj siebie i od 1, to możemy ją wyrazić jako iloczyn dwu czynników różnych od 1: tego dzielnika i dzielnika dopełniającego (§ 12, us. 2). Jeżeli następnie jeden z czynników tego iloczynu (lub oba) nie jest liczbą piérwszą, to możemy go znów w tym iloczynie zastąpić przez iloczyn dwu czynników różnych od 1. I t. d. Postępowanie to będziemy mogli prowadzić dotąd, dopóki wszystkie czynniki iloczynu, przedstawiając ego daną liczbę, nie będą już wyłącznie liczbami piérwszymi. Tak np.

$$450 = 10 . 45 = 2 . 5 . 45 = 2 . 5 . 5 . 9 = 2 . 5 . 5 . 3 . 3.$$

Takie wyrażenie liczby danéj przez iloczyn czynników, będących wyłącznie liczbami piérwszymi, nazywa się rozkładem liczby na czynniki piérwsze.

Rozłożyć liczbę na czynniki piérwsze jestto znaléść takie liczby piérwsze, których iloczyn przedstawia liczbę daną.

Zwykle te czynniki piérwsze wypisuje się w rozkładzie w porządku liczb rosnących; więc $450 = 2 . 3 . 3 . 5 . 5$.

---

[1]) Te cechy wyprowadzone są także niżej w § 15, us. 11.

[2]) Wyprowadzony w § 13, us. 16 warunek podzielności przez 6 jest sumą tam podanych warunków podzielności przez 2 i 3. We wzór ogólny $\left(\text{ostatni na } \frac{L}{d}\right)$ wprowadźmy dopełnienia reszt, t. j. wszystkie i powiększmy o 1; wtedy dla $d = 6$ dopełnieniem reszty będzie

$$c_1+c_2+c_3+\ldots - \frac{c_1+4 . c_2+4 . c_3+\ldots}{6} = \frac{5 . c_1+2 . c_2+2 . c_3+\ldots}{6} =$$

$$= \frac{3 . c_1+2 . c_1+2 . c_2+2 . c_3+\ldots}{6} = \frac{c_1}{2} + \frac{c_1+c_2+c_3+\ldots}{3}$$

Podobnie z warunkiem (tamże) podzielności przez 12, i t. d.

2. *Każda liczba, która nie jest piérwsza, jest iloczynem liczb piérwszych.*

Jak wiemy (§ 12, us. 6), każda liczba, jeżeli nie jest piérwsza, ma dzielnik, będący liczbą piérwszą różną od 1. Jeżeli zatym liczbę daną wyrazimy jako iloczyn tego dzielnika przez dzielnik dopełniający (§ 12, us. 2), to, wrazie gdy ten dzielnik dopełniający jest liczbą piérwszą, prawdziwość twierdzenia jest tymsamym okazana. Jeżeli zaś jest on liczbą złożoną, to w tym iloczynie możemy go zastąpić znowu przez iloczyn: jego dzielnika, będącego liczbą piérwszą różną od 1, przez odpowiedni jego dzielnik dopełniający. Jeżeli ten ostatni nie jest liczbą piérwszą, to jeszcze zastąpimy go przez iloczyn i t. d. Ponieważ każdy z tych dzielników dopełniających jest dzielnikiem poprzedniego, mniejszym od niego, a większym od jedności, więc ciąg tych dzielników jest ograniczony. Ostatni z tych dzielników nie jest liczbą złożoną, bo inaczéj możnaby go znowu wyrazić przez iloczyn liczby piérwszéj, różnéj od 1, i dzielnika dopełniającego, więc nie byłby ostatnim. Zatym ostatni z tych dzielników dopełniających jest téż liczbą piérwszą. A że wszystkie pozostałe czynniki iloczynu, przedstawiającego liczbę daną, są liczbami piérwszymi, więc zawsze liczbę złożoną możemy wyrazić jako iloczyn czynników, będących liczbami piérwszymi.

3. *Jeden jest tylko możliwy rozkład liczby na czynniki piérwsze.*

Przypuśćmy, że, jako rozkład liczby danéj na czynniki piérwsze, otrzymaliśmy $2\times5\times5\times7\times31$ i że innym jakimś sposobem jesteśmy w stanie otrzymać jeszcze odmienny od powyższego rozkład téjże saméj liczby danéj na czynniki piérwsze. Czynnik 2 piérwszego iloczynu, jako dzielnik liczby danéj, dzieli także drugi iloczyn, przedstawiający tę samę liczbę; że zaś 2 jest liczbą piérwszą i drugi iloczyn jest przez nią podzielny, więc przez 2 jest podzielny (§ 14, us. 14) przynajmniéj jeden z jego czynników. Gdy zaś te czynniki są liczbami piérwszymi, a liczba piérwsza, prócz 1, jest podzielna tylko przez samę siebie, więc podzielny przez 2 czynnik drugiego iloczynu jest właśnie liczbą 2. Podobnież okażemy, że z pozostałych czynników (tworzących pewien iloczyn) piérwszego rozkładu czynnik 5 ma sobie równy czynnik 5 w drugim rozkładzie, że znowu z pozostałych czynników piérwszego rozkładu czynnik 5 ma sobie równy między pozostałymi czynnikami drugiego rozkładu czynnik 5 i t. d. Więc dwa te iloczyny czynników piérwszych, przedstawiające tę samę liczbę, są utworzone przez te same czynniki, wchodzące do owych iloczynów tę samę ilość razy.

Z tego także wypada, że rozkład liczby na czynniki piérwsze nie zależy od sposobu, jakim go otrzymujemy.

4. Gdy chcemy rozłożyć na czynniki piérwsze liczbę np. 17 050, to będziemy naprzód poszukiwali mniejszych jéj czynników piérwszych. Korzystając bowiém z cech podzielności (§ 13), możemy łatwo dostrzéc czynniki mniejsze, a nadto, miéć wtedy będziemy dzielenia przez mniejsze

liczby, co jest dla nas ważne z tego względu, iż chcemy (jeżeli można) odrazu wypisywać dzielniki dopełniające (us. 1), t. j. ilorazy tych dzieleń. Tak, z uwagi, że nasza liczba kończy się na 0, wnosimy, że jest podzielna przez 2. Dzielenie wypiszemy tak (§ 7, us. 20):

17050 | 2
8525

Więc $17050 = 2.8525$. Należy czynnik 8525 (jeżeli on jest złożony) zastąpić przez iloczyn czynników piérwszych. Liczba 8525 kończy się na 5, więc jest niepodzielna przez 2; suma jéj cyfr jest $8+5+2+5=20$, więc ta liczba nie jest podzielna przez 3; kończy się na 5, więc jest podzielna przez 5. Dzielmy więc przez 5:

8525 | 5
1705

Zatym $8525 = 5.1705$, skutkiem czego $17050 = 2.5.1705$. W tym znów wyrażeniu należy liczbę 1705 zastąpić przez iloczyn liczb piérwszych. Ona nie może już być podzielna ani przez 2, ani przez 3, bo poprzednia liczba 8525, jéj wielokrotność, (§ 12, us. 4) nie była przez te liczby podzielna, Próbujemy więc daléj, poczynając od 5. Jest przez 5 podzielna. Więc: i $1705 = 5.341$, a tymsamym $17050 = 2.5.5.341$. Chcąc

1705 | 5
341

liczbę 341 zastąpić przez iloczyn liczb piérwszych, zaczynamy od badania jéj podzielności przez 5. Przez 5 jest niepodzielna, bo się kończy na 1. Dzielimy [1]) 341 przez 7 (na stronie); otrzymujemy resztę 5, więc ta liczba nie jest podzielną przez 7. Przez 11; tu $41+3=44$ (albo: $1+3=5$; $4-4=0$), więc nasza liczba jest podzielna przez 11. Dzielimy:

341 | 11
31

więc $341 = 11.31$ i $17050 = 2.5.5.11.31$. Otrzymana liczba 31 jest piérwsza (bo jest mniejsza od 6.6 i nie jest podzielna przez 2, 3, 5; § 12. us. 8). Ostatnie zatym wyrażenie liczby jest jéj rozkładem na czynniki piérwsze.

Przyglądając się temu postępowaniu, łatwo dostrzeżemy, że możemy je łącznie tak przedstawić:

17050 | 2
8825 | 5
1705 | 5
341 | 11
31

$17050 = 2.5.5.11.31.$

Aby liczbę rozłożyć na czynniki piérwsze, należy naprzód znaléść tę najmniejszą z liczb piérwszych, przez którą dana liczba jest podzielna; uskutecznić dzielenie przez tę liczbę i, jeżeli ten iloraz nie jest liczbą pierw-

---

[1]) Albo (§ 13, us. 15): $34 - 2.1 = 32$ jest niepodzielne przez 7, więc i liczba 341 jest niepodzielna przez 7.

szą, znowu znaléść najmniejszą z liczb piérwszych, przez którą on jest podzielny; wykonawszy to dzielenie, jeżeli nowy iloraz nie jest liczbą piérwszą, należy jeszcze znaleść najmniejszą liczbę piérwszą, przez którą on jest podzielny, i t. d.. dopóki nie otrzymamy ilorazu będącego liczbą piérwszą. Iloczyn wszystkich tych dzielników i ostatniego ilorazu przedstawia rozkład na czynniki piérwsze liczby danéj.

Jeżeli dostrzegamy, że liczba jest iloczynem dwu lub więcéj liczb znanych, to można postępowanie uprościć, rozkładając każdą z tych liczb oddzielnie, a iloczyn wszystkich ich czynników (us. 1) przedstawi [1]) rozkład danej liczby na czynniki piérwsze. Tak np. powyższa liczba $17\,050 = 1705 . 10$,

$10 = 2 . 5$; $1705 \mid 5$

$341 \mid 11$

31 $\qquad 17\,050 = 2 . 5 . 5 . 11 . 31.$

Podobnie np. $99\,900 = 9 . 111 . 100$

$9 = 3 . 3$; $111 \mid 3$ $\qquad 100 = 2 . 5 . 2 . 5$,

37 $\qquad i\ 99\,900 = 2 . 2 . 3 . 3 . 3 . 5 . 5 . 37.$

Wprowadzając potęgi (§ 6, us. 38), możemy każdy czynnik raz tylko wypisać z właściwym wykładnikiem. Wtedy:

$$17\,050 = 2 , 5^2 . 11 . 31 ; \quad 99\,900 = 2^2 . 3^3 . 5^2 . 37.$$

5. Chcemy znaléść wszystkie dzielniki pewnéj liczby.

Rozłóżmy ją na czynniki piérwsze.

Dzielniki piérwsze liczby danéj są czynnikami tego rozkładu. Gdy bowiém liczba dana jest podzielna przez liczbę piérwszą, to można ją wyrazić jako iloczyn téj liczby piérwszéj przez dzielnik dopełniający, który który znowu rozkładając taksamo daléj (us. 1), otrzymamy nasz [1]) rozkład liczby danéj na czynniki piérwsze. Do tego przeto rozkładu wchodzi ów dzielnik piérwszy liczby danéj.

Co się tyczy dzielników złożonych liczby danéj, to naprzód, różne czynniki piérwsze, wchodzące do rozkładu takiego dzielnika na czynniki piérwsze, jako dzielniki dzielnika liczby danéj (§ 12, us. 4), są dzielnikami (piérwszymi) liczby danéj; a więc znajdują się pośród czynników rozkładu liczby danéj. — Każdy zaś z tych różnych czynników piérwszych dzielnika wchodzi do rozkładu liczby danéj conajmniéj tyle razy, ile do rozkładu dzielnika. Jeżeli np. dzielnik liczby danéj w swym rozkładzie ma czynnik piérwszy 3 dwa razy, t. j. $3 . 3$, to ten dzielnik może być wyrażony jako iloczyn liczby $3 . 3 = 9$ przez pewną liczbę (§ 12, us. 1); liczba więc 9 jest dzielnikiem dzielnika liczby danéj, a zatym jest (§ 12. us. 4) dzielnikiem liczby danéj. Przeto i liczba dana może być wyrażona jako

[1]) Us. 3.

iloczyn 9 przez pewien dzielnik dopełniający. Gdy zaś w tym wyrażeniu liczby danéj liczbę 9 zastąpimy przez 3.3, a dzielnik dopełniający przez jego rozkład na czynniki piérwsze (us. 1), to otrzymamy rozkład naszej liczby na czynniki piérwsze [1]), pośród których są, conajmniéj, dwa czynniki 3. Gdy więc wszystkie czynniki piérwsze, na które może być rozłożony jakikolwiek dzielnik złożony liczby danéj, znajdują się pośród czynników rozkładu liczby danéj, to, aby otrzymać jéj dzielniki złożone, należy z czynników jéj rozkładu utworzyć różne (wszystkie możliwe) iloczyny, biorąc te czynniki po dwa, po trzy i t. d. — A więc,

Aby mieć wszystkie dzielniki liczby danéj, należy, rozłożywszy ją na czynniki piérwsze, a) *wybrać z nich wszystkie różne,* b) *utworzyć z nich wszystkie różne iloczyny, biorąc te czynniki po dwa, po trzy i t. d., oraz* c) *dołączyć dzielnik 1* (na który rozkład liczby danéj na czynniki piérwsze bezpośrednio nie naprowadza).

Gdy więc chcemy wypisać wszystkie dzielniki liczby np. 540, to możemy postąpić w następujący sposób. Rozłożywszy daną liczbę na czynniki piérwsze

$$540 = 2.2.3.3.3.5$$

i napisawszy dzielnik: 1,

weźmiemy, jako dzielniki, różne czynniki piérwsze rozkładu: 2, 3, 5,

i każdy dzielnik wciąż mnożyć będziemy przez wszystkie inne czynniki rozkładu, nie mniejsze od największego z czynników już wchodzących do owego dzielnika; otrzymamy w ten sposób, jako dzielniki, wszystkie różne iloczyny, do których wejdą:

- po dwa czynniki rozkładu: 2.2, 2.3, 2.5, 3.3, 3.5,
- po trzy czynniki rozkładu: 2.2.3, 2.2.5, 2.3.3, 2.3.5, 3.3.3, 3.3.5,
- po cztéry czynniki rozkładu: 2.2.3.3, 2.2.3.5, 2.3.3.3, 2.3.3.5, 3.3.3.5,
- po pięć czynników rozkładu: 2.2.3.3.3 2.2.3.3.5, 2.3.3.3.5,
- po sześć czynników rozkładu: 2.2.3.3.3.5.

Uskuteczniwszy zaś wskazane mnożenia, otrzymujemy wszystkie dzielniki liczby danéj: 1, 2, 3, 5, 4, 6, 10, 9, ..., 270, 540.

6. Możemy inaczéj tak otrzymać te dzielniki. Mamy

$$540 = 2^2.3^3.5.$$

Uwzględniając naprzód 1 i tylko czynniki 2, mamy dzielniki

$$1,\ 2,\ 2^2;$$

[1]) Us. 3.

Uwzględniając następnie czynniki 3, miéć będziemy dzielniki: naprzód, tylko-co wypisane (albo, inaczéj mówiąc, otrzymane z tylkoco wypisanych przez pomnożenie ich przez 1), a następnie, z nich powstałe przez pomnożenie ich oddzielnie przez 3, oddzielnie przez 3^2 i oddzielnie przez 3^3. Uwzględniając jeszcze czynnik 5, miéć będziemy dzielniki: naprzód, wszystkie dotąd otrzymane (czyli: otrzymane z dotąd wypisanych przez pomnożenie ich przez 1), a następnie, powstałe z tamtych przez pomnożenie ich przez 5. Otrzymujemy więc w ten sposób dzielniki:

$$\begin{array}{rrr} 1\ , & 2\ , & 2^2, \\ 3\ , & 2\ .\ 3\ , & 2^2.\ 3\ , \\ 3^2, & 2\ .\ 3^2, & 2^2.\ 3^2, \\ 3^3, & 2\ .\ 3^3, & 2^2.\ 3^3, \\ 5\ , & 2\ .\ 5\ , & 2^2.\ 5\ , \\ 3\ .\ 5\ , & 2\ .\ 3\ .\ 3\ , & 2^2.\ 3\ .\ 5\ , \\ 3^2.\ 5\ , & 2\ .\ 3^2.\ 5\ , & 2^2.\ 3^2.\ 5\ , \\ 3^3.\ 5\ . & 2\ .\ 3^3.\ 5\ , & 2^2.\ 3^3.\ 5\ . \end{array}$$

Z tego widzimy, że wszystkie dzielniki naszéj liczby mogą być przedstawione przez składniki [1]) sumy, wypadłéj z mnożenia (§ 6, us. 16)

$$(1 + 2 + 2^2).(1 + 3 + 3^2 + 3^3).(1 + 5),$$

gdy każdy składnik piérwszéj sumy pomnożymy przez każdy drugiéj, a każdy składnik sumy tych iloczynów częściowych przez każdy składnik trzeciéj sumy (i t. d., gdyby było więcéj sum).

Dzielników tych będzie tyle, ile otrzymamy z pomnożenia przez siebie powiększonych o jedność wykładników wszystkich (różnych) czynników rozkładu. Tu np. mamy dzielników

$$(2 + 1).(3 + 1).(1 + 1) = 24,$$

Sumę ich przedstawia oczywiście iloczyn [2])

$$(1 + 2 + 2^2).(1 + 3 + 3^2 + 3^3).(1 + 5) = 1680.$$

Jeżeli liczba równa się sumie wszystkich swoich dzielników, mniejszych od niéj saméj [3]), to nazywa się liczbą doskonałą [4]). Początkowe liczby doskonałe są następujące:

---

[1]) Czyli, wyrażając się, jak w algiebrze, — przez oddzielne wyrazy tego iloczynu.

[2]) Każda z sum, wchodzących jako czynnik do tego iloczynu, może być wyrażona jako iloraz z podzielenia różnicy jednakowych potęg dwu liczb, przez różnicę piérwszych potęg tychże liczb. Gdy więc wogóle, w przypuszczeniu, że a, b, c, są różnymi od siebie liczbami piérwszymi, mamy np. liczbę

$$a^m\ .\ b^n\ ,\ c^p\ ,$$

to suma jéj

$$(m+1)\ .\ (n+1)\ .\ (p+1)$$

dzielników jest

$$(1 + a + a^2 + \ldots + a^m).(1 + b + b^2 + \ldots + b^n).(1 + c + c^2 + \ldots + c^p) =$$

$$= \frac{a^{m+1} - 1}{a - 1} \cdot \frac{b^{n+1} - 1}{b - 1} \cdot \frac{c^{p+1} - 1}{c - 1}\ .$$

[3]) T. j. z wyłączeniem dzielnika równego liczbie danéj.

[4]) Euklides, ks. VII, def. 22.

$6 = 2 \cdot 3$, $(1+2)\cdot(1+3) - 6 = 1+2+3 = 6$;

$28 = 2^2 \cdot 7$, $(1+2+2^2)\cdot(1+7) - 28 = 1+2+4+7+14 = 28$;

$496 = 2^4 \cdot 31$, $(1+2+2^2+2^3+2^4)\cdot(1+31) - 496 =$

$= 1+2+4+8+16+31+62+124+248 = 496$.

Wszystkie dotąd znane liczby doskonale dadzą się przedstawić zapomocą wzoru

$$(2^m - 1)\cdot 2^{m-1}$$

przy założeniu, że $2^m - 1$ jest liczbą piérwszą. Łatwo dowieść, że liczba, którą ten wzór przedstawia, jest doskonałą [1]).

Ponieważ $2^m - 1$ jest liczbą piérwszą [2]), zatym suma wszystkich dzielników liczby, przedstawionéj przez wzór powyższy, jest [3])

$$(1 + [2^m - 1])\cdot(1 + 2 + 2^2 + \ldots + 2^{m-1}) = 2^m \cdot (2^m - 1),$$

a odejmując od niéj dzielnik, równy liczbie danéj, otrzymamy

$$2^m \cdot (2^m - 1) - (2^m - 1)\cdot 2^{m-1} = (2^m - 1)\cdot 2^{m-1},$$

czego należało dowieść. Liczbami więc doskonałymi [4]) są:
$(2^2-1)\cdot 2 = 6$; $(2^3-1)\cdot 2^2 = 28$; $2^5-1)\cdot 2^4 = 496$; $(2^7-1)\cdot 2^6 = 8128$ i t. d.

Jeżeli suma wszystkich dzielników jednéj liczby, od niéj mniejszych, równa się drugiéj liczbie, i nawzajem, to takie dwie liczby [5]) nazywają się liczbami zaprzyjaźnionymi [6]). Np.

$220 = 2^2 \cdot 5 \cdot 11$; $(1+2+2^2)\cdot(1+5)\cdot(1+11) - 220 = 284$, a

$284 = 2^2 \cdot 71$; $(1+2+2^2)\cdot(1+71) - 284 = 220$;

zatym liczby 220 i 284 są [7]) parą liczb zaprzyjaźnionych. Inną parę tworzą liczby [8])

17 296 i 18 416,

inną jeszcze liczby [9])

9 363 584 i 9 437 056

i t. d.

---

[1]) Euklides już dowiódł téj własności, którą wysłowił (ks. IX, pod 36) w ten sposób: biorąc tyle, od 1 zacząwszy, liczb, powstających jedna z drugiéj w skutek podwojenia, żeby ich suma stała się liczbą piérwszą, miéć będziemy, jako iloczyn téj sumy przez ostatnią z owych liczb, liczbę doskonałą.

[2]) Ma więc dzielniki: 1 i $2^m - 1$.

[3]) Mnożąc różnicę $2 - 1$ (to jest 1) przez liczbę, przedstawioną przez sumę $1 + 2 \ldots + 2^{m-1}$ (§ 6, us. 15, 14), otrzymamy $1 + 2 + \ldots + 2^{m-1} = 2^m - 1$.

[4]) Badaniem własności liczb doskonałych zajmował się u nas w wieku XVII Jan Brożek (Broscius). Zob. wstęp historyczny.

[5]) Możnaby je tak określić: dwie liczby takie, iż suma wszystkich (bez wyłączenia żadnego) dzielników każdéj z nich odzielnie jest równa sumie obu tych liczb, tworzą parę liczb zaprzyjaźnionych.

[6]) Piérwszy na nie miał zwrócić uwagę Pitagoras.

[7]) Ta tylko para była znana starożytnym.

[8]) Tę parę ogłosił Brożek w roku 1652.

[9]) Tę parę ogłosił Schooten w roku 1656.

7. Liczba jest wielokrotnością każdego ze swych dzielników (§ 12, us. 3); tak np. liczba 540 jest wielokrotnością każdego ze swych dzielników, np. 90, 60, 270. Inaczéj możemy powiedzieć, że liczba 640 jest spólną wielokrotnością liczb 90, 60, 270.

Spólną wielokrotnością kilku liczb danych nazywamy liczbę, podzielną przez każdą z liczb danych.

Dla jakichkolwiek liczb danych istnieje nieskończenie wiele spólnych wielokrotności, gdyż mnożąc którąkolwiek ich wielokrotność przez jakąkolwiek liczbę (§ 12, us. 3). otrzymamy również wielokrotność liczb danych (§ 12, us. 4). Jedna atoli z nich wszystkich jest najmniejszą spólną wielokrotnością liczb danych.

Najmniejszą spólną wielokrotnością kilku liczb danych nazywamy najmniejszą z liczb podzielnych jednocześnie przez każdą z liczb danych.

Nadal, przez skrócenie, zamiast: najmniejsza spólna wielokrotność, pisać często będziemy: nsw.

8. Jeżeli mamy znaléść nsw. — np. liczb 7056, 1620, 119 070, to możemy, rozłożywszy je na czynniki piérwsze,

$$7056 = 2.2.2.2.3.3.7.7,$$
$$1620 = 2.2.3.3.3.3.5,$$
$$119\,070 = 2.3.3.3.3\ 3.5.7.7,$$

tak rozumować. Ponieważ każda z liczb danych jest dzielnikiem liczby szukanéj, więc (us. 5) wszystkie czynniki piérwsze każdéj liczby wchodzą do rozkładu na czynniki piérwsze liczby szukanéj. Tak np., czynników 2 wchodzi do rozkładu piérwszéj liczby cztéry, drugiéj dwa, trzeciéj jeden, więc do rozkładu liczby szukanéj wejdą cztéry czynniki 2, bo gdyby ich było mniéj, to nie możnaby z czynników jéj rozkładu utworzyć iloczynu, któryby przedstawiał jéj dzielnik 7056. Podobnież dostrzeżemy, że do rozkladu liczby szukanéj wejdzie pięć czynników 3, jeden czynnik 5 i dwa czynniki 7. Z czynników tego iloczynu

$$2.2.2.2.3.3.3.3.3.5.7.7 = 952\,560$$

można utworzyć częściowe iloczyny, które przedstawią (us. 5) liczby dane 7056, 1620, 119 070; więc ten iloczyn przedstawia spólną wielokrotność liczb danych. Przedstawia on nadto nsw. — liczb danych, gdyż opuszczenie w nim choćby jednego któregokolwiek czynnika nie dozwoliłoby na utworzenie z pozostałych czynników jednéj lub więcéj liczb danych. (Tak np., gdybyśmy opuścili czynnik 2. nie moglibyśmy z pozostałych utworzyć iloczynu równego liczbie 7056; gdybyśmy zaś opuścili czynnik 5, nie utworzylibyśmy z pozostałych ani liczby 1620, anitéż 119 070.) Możemy więc powiedzieć:

Aby odnaléść najmniejszą spólną wielokrotność kilku liczb danych, można, rozłożywszy je na czynniki piérwsze, każdy z czynników wziąć

tyle razy, ile razy on najwięcéj wchodzi do któregokolwiek z tych rozkładów, a iloczyn tych czynników przedstawi najmniejszą spólną wielokrotność liczb danych.

(Wykonywając mnożenie wybranych czynników, należy zaczynać od większych; § 6, us. 31.)

Gdybyśmy mieli znaléść nsw., np. liczb

7056, 810, 1620 119 070, 11 907, 90,

to, z uwagi, że liczby 810 i 90 są dzielnikami liczby 1620, a liczba 11 907 jest dzielnikiem liczby 119 070, możemy przy odszukiwaniu nsw.-ści nie zważać na te liczby 810, 90, 11 907, gdyż 810 i 90, jako dzielniki liczby 1620, a 11 907, jako dzielnik liczby 119 070, są dzielnikami (§ 12, us. 4) spólnéj wielokrokrotności liczb 1620 i 119 070, a więc odn aleziona nsw liczb 7056, 1620 i 119 070 jest téż nsw.-ścią wszystkich danych tu sześciu liczb.

9. Jeżeli tak przedstawimy te rozkłady:

$$7056 = 2^4 . 3^2 . 7^2,$$
$$1620 = 2^3 . 3^4 . 5,$$
$$119\,070 = 2 . 3^5 . 5 . 7^2,$$

to nsw. $= 2^4 . 3^5 . 5 . 7^2$. A więc *aby znaléść najmniejszą spólną wielokrotność kilku liczb można, rozłożywszy je na czynniki piérwsze, wziąć iloczyn wszystkich różnych czynników, wchodzących do owych rozkładów, nadając każdemu wykładnik największy z tych, które ów czynnik w tych rozkładach posiadał.*

10. *Gdy dwie liczby są piérwsze względem siebie, to ich iloczyn jest ich najmniejszą spólną wielokrotnością* [1]), gdyż te liczby nie mają spólnego dzielnika prócz jedności; czynniki więc piérwsze, na które może się rozłożyć jedna z tych liczb, są wszystkie różne od czynników rozkładu drugiéj, a więc wszystkie czynniki tak jednéj, jak i drugiéj z nich wejdą do rozkładu nsw.-ści. Np.

$$28 = 2 . 2 . 7; \quad 45 = 3 . 3 . 5;$$
$$\text{nsw.} = 2 . 2 . 3 . 3 . 5 . 7 = (2 . 2 . 7) . (3 . 3 . 5) = 28 . 45.$$

Podobnież, *gdy liczby dane są takie, że każde dwie z nich są piérwsze względem siebie, to ich iloczyn jest ich najmniejszą spólną wielokrotnością.* Wszystkie bowiém czynniki rozkładu któréjkolwiek z danych liczb są różne od czynników rozkładu każdéj z pozostałych. Tak więc:

nsw. 35, 8, 27, 121 jest $35 . 8 . 27 . 121$.

Opiérając się na dowiedzionym w § 14, us. 16, łatwo możemy ten przypadek sprowadzić do poprzedniego. Nsw. liczb 35 i 8, jako liczb piérwszych względem siebie, jest $35 . 8$. Ten iloczyn $35 . 8$, liczb piérwszych względem

---

[1]) Euklides, ks. VII, pod. 36 przyp. 1.

27, jest liczbą piérwszą względem 27; zaś nsw. pwu liczb 35.8 i 27, jako liczb piérwszych względem siebie, jest 35.8.27, i t. d.

11. Wszystkie spólne wielokrotności liczb danych powstać mogą z ich nsw.-ści wskutek pomnożenia téj ostatniéj przez pewne liczby. W rozkładzie bowiém jakiéjkolwiek spólnéj wielokrotności na czynniki piérwsze znajdują się wszystkie czynniki piérwsze rozkładu nsw.-ści (gdyż, wbraku któregokolwiek, owa liczba nie byłaby wielokrotnością jednéj lub kilku liczb danych: us. 8). Innymi słowy: spólne wielokrotności liczb danych są wielokrotnościami najmniejszéj spólnéj wielokrotności tych liczb. Albo jeszcze: *liczby podzielne przez kilka liczb są podzielne przez ich najmniejszą spólną wielokrotność* [1]). A więc np.

Liczby podzielne jednocześnie przez 2 i 3 są podzielne przez 6.

Liczby podzielne jednocześnie przez 4 i 3 są podzielne przez 12.

Liczby podzielne jednocześnie przez 3 i 5 są podzielne przez 15.

Liczby podzielne jednocześnie przez 2, 3 i 7 są podzielne przez 42 I t. d. [2]).

12. Ponieważ różne od 1 dzielniki liczby są (us. 5) albo oddzielnymi czynnikami rozkładu liczby na czynniki piérwsze, albo iloczynami tych czynników, przeto różne od jedności spólne czynniki kilku liczb są albo oddzielnymi czynnikami wchodzącymi jednocześnie do wszystkich rozkładów tych liczb, albo iloczynami takich czynników. A więc największy spólny dzielnik kilku liczb jest iloczynem wszystkich czynników, jednocześnie znajdujących się we wszystkich rozkładach liczb danych na czynniki piérwsze. Tak np., gdy

$$3150 = 2.3.3.5.5.7,$$
$$1800 = 2.2.2.3.3.5.5,$$
$$4950 = 2.3.3.5.5.11,$$

to nsd. $= 2.3.3.5.5 = 450$.

Aby znaléść największy spólny dzielnik kilku liczb, można, rozłożywszy je na czynniki piérwsze, wziąć iloczyn wszystkich czynników, wchodzących jednocześnie do każdego z tych rozkładów.

Jeżeli zaś te rozkłady tak przedstawimy:

$3150 = 2.3^2.5^2.7$; $1800 = 2^3.2^2.5^2$; $4950 = 2.3^2.5^2.11$,

to nsd. $= 2.3^2.5^2$, t. j., *aby znaléść największy spólny dzielnik kilku liczb, można, rozłożywszy je na czynniki piérwsze, wziąć iloczyn różnych czynników, spólnych wszystkim rozkładom, nadając każdemu czynnikowi wykładnik najmniejszy z tych, które on w tych rozkładach posiadał.*

---

[1]) Euklides, ks. VII, pod 37 (por. także ks. X, pod. 14).

[2]) Liczby podzielne przez 6 i 4 są podzielne przez 12; liczby podzielne przez 4 i 8 są podzielne przez 8, i t. d.

13. Najmniejsza spólna wielokrotność dwu liczb: $1800 = 450 . 4$ i $4950 = 450 . 11$, jest (§ 7, us. 9)

$2.2.2.3.3.5.5.11 = 450 . 4 . 11 = (450 . 4 . 450 . 11) : 450 = (1800 . 4950) : 450$,

t. j. *najmniejsza spólna wielokrotność dwu liczb równa się ich iloczynowi, podzielonemu przez największy spólny dzielnik tych liczb* [1]).

Mając więc nsd. dwu liczb, można, dla znalezienia ich nsw-ści, pomnożyć jednę z tych liczb przez dzielnik drugiéj, dopełniający nsd. [2]).

Gdy mamy kilka liczb danych, to [3]), znalazszy w ten sposób nsw. dwu liczb, znajdziemy ją dla liczby tylkoco otrzymanéj i dla trzeciéj z liczb danych, i t. d.

Jeżeli więc tu nsd. odnajdywać będziemy zapomocą kolejnego dzielenia (§ 14, us. 7), to, według powyższych wskazań, mamy możność wyznaczenia nsw.-ści kilku liczb danych, bez rozkładania ich na czynniki piérwsze.

---

1) Możnaby tego wprost dowieść ogólnie przed wprowadzeniem rozkładu na czynniki piérwsze, opiérając się na prawdach dowiedzionych w § 14 w sposób podobny do użytego w § 14 us. 6 (t. j. dowodząc, że wszystkie spólne wielokrotności liczb 1800 i 4950 są wielokrotnościami liczby 450, 4, 11, i nawzajem). Szczególnym tego przypadkiem przedstawi się własność dowiedziona tu w us. 10.

2) Euklides, ks. VII, pod. 36, przyp. 2.

3) Podobnie, jak w § 14, us. 10.

ROZDZIAŁ VI.

LICZBY UŁAMKOWE.


§ 16. UZUPEŁNIENIE NAUKI O DZIELENIU LICZB CAŁKOWITYCH, CZYLI: O POWSTAWANIU UŁAMKA.

1. a. Pewna osoba kupiła 23 łokcie taśmy i zapłaciła za nie 4 złote; za ile łokci zapłaciła jeden złoty?


Ponieważ [1]) za 4 złote kupiła 23 łokcie, więc za jeden złoty kupiła 4 razy mniéj niż 23 ł., t. j. 4-ą część 23-ch łokci; trzeba więc 23 ł. zmniejszyć 4 razy, czyli (§ 7, us. 7, 8) 23 ł. rozłożyć na 4 części równe i wyznaczyć jednę taką część. Wykonajmy to dzielenie:

$$\begin{array}{r|l} 23\text{ ł.} & 4 \\ \hline -20 & 5\text{ ł.} \\ \hline 3 & \end{array}$$


Ta osoba zatym (§ 7, us. 10, 11) za jeden złoty kupiła 5 łokci wraz z tym [2]), co wypadnie, gdy jeszcze 3 ł. : 4, t. j. gdy 3 łokcie rozłożymy na 4 części równe i weźmiemy jednę taką część. Jeżeli łokieć przedstawimy tu kréską




to trzy łokcie będą



Podzielmy je na 4 części równe



i weźmy jednę taką część




Owóż, tak wielka właśnie długość, wzięta razem z 5-ciu łokciami, (któreto 5 łokci są ilorazem niezupełnym) przedstawi nam iloraz zupełny, t. j. będzie rozwiązaniem naszego zadania.


---

[1]) „Na początku téj części ostrzec mi przychodzi Nauczycielów, aby szczególną na to baczność mieli, żeby ich uczniowie, nie napamięć i za samymi tylko regułami idąc, uczyli się rachunku na liczbach łamanych, ale przy każdym przykładzie, im podanym, zastanawiali się i uważali, jakby im sam rozum do tego, a nie innego sposobu rachowania prowadził, choćby żadnych prawideł na to nie było, które zapewne nie skądinąd się wzięły, tylko z pilnego uważania i rostrząsania natury każdego w szczególności działania". *Arytm. dla sz. nar.*, str. 106.


[2]) Gdyby uczeń chciał pozostałą część ilorazu wyrazić tu w calach, to można zwrócić jego uwagę, że tu nie o to idzie, i stwierdzić to zamianą tego zadania na inne, w którymby dzielnik był np. 5. „Choćby ten łokieć kto chciał obrócić na stopy, ćwierci, lub jakiekolwiek inné mniejsze części, na które łokieć zwykł się dzielić, nie natrafiłby jednak na liczbę części łokcia oznaczającą, którąby liczba 5 zupełnie i bez reszty dzieliła". *Arytm. dla sz. nar.*, str. 107.

Jak tę długość, którą trzeba brać razem z 5-u łokciami dla przedstawienia ilorazu zupełnego, wyrazić bezpośrednio zapomocą naszéj jednostki, łokcia?

Zważmy, że jeżeli nasz łokieć 

podzielimy na 4 części równe 

to (ponieważ na 4 części teraz dzielimy *jeden* łokieć, a poprzednio dzieliliśmy *trzy* łokcie) każda taka czwarta część łokcia jest *trzy razy mniejsza*, niż czwarta część 3-ch łokci; aby więc mieć tyleż, co poprzednio, trzeba już wziąć nie jednę, ale *trzy* części czwarte [1]) łokcia:



Widzimy więc, że wypadek z podzielenia 3 ł.:4 możemy wyrazić, jako 3 czwarte części łokcia. Zwykle mówi się krócéj: trzy-czwarte łokcia. — Dzieląc liczby przez siebie, otrzymujemy liczbę, iloraz. Więc i trzy-czwarte łokcia jest liczbą, a mianowicie: trzy-czwarte łokcia jest liczbą mianowaną, a trzy czwarte — liczbą oderwaną.

Liczba taka nazywa się u ł a m k i e m.

Jak napisać tę liczbę trzy-czwarte? — Co tu mamy? 4-te części. Ile ich jest? 3. — Widzimy więc, że mamy tu części jedności, które się nazywają: 4-te; podobnie, mogłyby być i inne części jedności, które się nazywać będą: 5-te, 6-te, 11-te i t. d. Pisząc zatym naszę liczbę: trzy-czwarte, musimy nazwę tych części wyraźnie zaznaczyć. W przedstawieniu więc piśmiennym liczby: trzy-czwarte, wejdzie liczba 4, jako wskazanie nazwy, miana, tych części; tę liczbę nazywamy m i a n o w n i k i e m ułamka. Części tych jest tu 3. Ta liczba 3, jako wynik odbytego policzenia czwartych części jedności, nazywa się l i c z n i k i e m ułamka i również wejść winna do piśmiennego przedstawienia naszéj liczby trzy-czwarte, gdyż mogłaby być inna liczba, np. dwie-czwarte. Ułamek tak się pisze: nad mianownikiem piszemy licznik, oddzieliwszy je od siebie poziomą [2]) kréską. Zatym: trzy-czwarte napiszemy: $\frac{3}{4}$

Gdy zaś mamy przeczytać napisany ułamek, to, wymówiwszy liczbę znajdującą się w liczniku (jeżeli odpowiedni liczebnik główny odmienia


---

[1]) Wrazie potrzeby można to jeszcze dostępniéj przedstawić, układając zadania odpowiednie, np. z 3-ch łokci wstążki zrobiono 4 jednakowe kokardki; jak, mając łokieć wstążki, odciąć tyle, ile potrzeba na jednę taką kokardkę? albo: 4-éj robotnicy, mają wieczorem oprócz wynagrodzenia pieniężnego, otrzymać razem 3 bochenki chleba; jeden robotnik ukończył swą robotę w południe i chce odejść; dają mu zapłatę pieniężną, lecz chleb jeszcze nieupieczony — jest jednak bochenek dawniejszego chleba; czy można i jak z tego bochenka wydzielić robotnikowi odchodzącemu jego porcyą chleba? i t. d.

[2]) Pisze się także często kréskę pochyłą od prawéj ku lewéj, kładąc licznik z lewéj u góry, a mianownik z prawéj u dołu, jak np. $^3/_4$. Niedogodne to jest jednak przy większych rachunkach z ułamkami.

się przez rodzaje) w rodzaju żeńskim (gdyż domyśla się wyrazu: część, lub: części), wypowiadamy mianownik jako liczebnik porządkowy, zgadzając go z wymówionym już licznikiem. Jednak $\frac{1}{2}$ czyta się także pół, a $\frac{1}{4}$ ćwierć.

Wracając do naszego zadania, widzimy, że choć inne jest postępowanie przy dzieleniu 3 łokci przez 4, niż przy odnajdywaniu $\frac{3}{4}$ łokcia,



to jednak wypadek jest ten sam. Dlatego możemy powiedzieć, że z rozłożenia 3 ł. na 4 części równe otrzymujemy, jako jednę taką część, $\frac{3}{4}$ łokcia,

$$3 \text{ ł.} : 4 = \frac{3}{4} \text{ ł.},$$

a tymsamym, że z rozłożenia 23 ł. na 4 części równe otrzymujemy, jako jednę taką część, $5 \text{ ł.} + \frac{3}{4} \text{ ł.}$ Zwykle nie pisze się tu znaku +, ale wprost: $5\frac{3}{4}$ ł. (a mówi się: pięć i trzy-czwarte łokcia),

$$23 \text{ ł.} : 4 = 5\frac{3}{4} \text{ ł.}$$


Odpowiedź. Ta osoba za złoty kupiła $5\frac{3}{4}$ łokcia taśmy.

b) Pewna osoba kupiła 23 łokcie taśmy, płacąc złoty za 4 łokcie; ile złotych zapłaciła za wszystkie 23 łokcie taśmy?

Ponieważ za 4 ł. płaciła złoty, więc za 23 ł. zapłaciła tyle złotych, ile razy 4 ł. mieści się w 23 ł. Trzeba zatym 23 ł. podzielić przez 4 ł., a otrzymana liczba oderwana odpowié ilości złotych (§ 7, us. 7, 10).

23 ł.	4 ł.
−20	5
3 ł.	

Dowiedzieliśmy się, że 4 ł. mieści się w 23 ł. więcéj niż 5 razy, a mniéj niż 6 razy. 5 jest ilorazem niezupełnym, gdyż jeszcze potrzeba 3 ł.: 4 ł. Zapłaciła zatym 5 złotych i prócz tego tyle, ile się należy za 3 ł., gdy się płaci złoty za 4 ł. Ponieważ jeden złoty należy się za 4 ł., więc za 3 ł. należy się mniéj niż jeden złoty. Należéć się będzie taka część złotego, jaką częścią 4-ch łokci jest 3 łokcie. Aby zaś znaléść, jaką częścią 4-ch ł. jest 3 ł., trzeba za jednostkę, którą mamy wymierzyć 3 łokcie, przyjąć 4 łokcie. Mając więc łokieć ├──────┤ nakreślimy liniją, przedstawiającą 4 łokcie, t. j. naszę jednostkę



Wtedy możemy 3 ł. uważać jako powstałe z téj linii (jednostki), wskutek podzielenia jéj na 4 części równe i oddzielenia 3-ch takich części. Więc 3 ł. przedstawiają $\frac{3}{4}$ téj linii, t. j. 3 ł. stanowią $\frac{3}{4}$ części 4-ch łokci (jednostki). A zatym, wymierzając 3 łokcie 4-ma łokciami, otrzymujemy (§ 1, us. 1) liczbę $\frac{3}{4}$. Widzimy przeto, że

$$3 \text{ ł.} : 4 \text{ ł.} = \frac{3}{4}.$$

Liczba $\frac{3}{4}$ jest liczbą oderwaną (§ 7, us. 7) — jest to więc $\frac{3}{4}$ *jedności.* Skutkiem tego

$$23 \text{ ł.} : 4 \text{ ł.} = 5\ \frac{3}{4}.$$

Jeżeli mówimy, że zapomocą dzielenia 23 ł. : 4 ł. dowiadujemy się, ile razy 4 ł. mieści się w 23 ł., to wypadnie powiedzieć: mieści się $5\ \frac{3}{4}$ raza [1]). Ponieważ zaś powiedzieliśmy, że ta osoba zapłaciła tyle złotych, ile razy 4 ł. mieści się w 23 ł.; mieści się $5\frac{3}{4}$ raza, a więc:

Odpowiedź. Ta osoba zapłaciła za kupione 23 łokcie taśmy $5\frac{3}{4}$ złotego [2]).

Oczywista już teraz, że gdy mamy dzielenie liczb oderwanych w przypadku, gdy dzielna nie jest podzielną (§ 7, us. 11) przez dzielnik, np. 23:4, to (objaśniając czyto jak pod a., czytéż jak pod b.) otrzymamy

$$23 : 4 = 5\frac{3}{4}.$$

Widzimy więc, że, wskutek wprowadzenia ułamków, jesteśmy w stanie w każdym przypadku wyznaczyć dokładnie iloraz z podzielenia dwu jakichkolwiek liczb całkowitych.

2. Wyrażenia, używane w arytmetyce, powstały przy wykonywaniu zadań najprostszych, to jest takich, w których liczby tak dane, jak i wypadające z uskutecznionych działań, były całkowite. Dlatego ma miejsce niekiedy niezgodność znaczenia pewnego wyrażenia w arytmetyce ze znaczeniem jego w zwykłym użyciu, a mianowicie, znaczenie, w jakim się je stosuje w arytmetyce, jest często obszerniejsze. Chociaż więc w powszednim użyciu wyraz „razy" stosuje się tylko do liczb całkowitych, to jednak powszechnie przyjęto, iż się go używa i wtedy, gdy

---

[1]) Mówią niekiedy niewłaściwie: $5\frac{3}{4}$ razy (chociaż: $5\frac{3}{4}$ złotego, a nie: złotych). Wszakże nie można powiedzieć półtora razy?; nie można więc uniknąć używania formy raza.

[2]) Podobnie, gdy mamy np. 12 łutów wymierzyć ciężarem funta, czyli ciężarem 32 łutów, to otrzymamy taką część funta, jaką częścią 32-u łutów jest 12 łutów. Otrzymamy liczbę oderwaną $\frac{12}{32}$, czyli $\frac{3}{8}$. A więc 12 łutów jest $\frac{3}{8}$ funta (§ 1, us. 3).

wypadnie, jak np. w powyższym zadaniu, powiedzieć: 4 łokcie mieści się w 23 łokciach $5\frac{3}{4}$ raza.

3. Gdy dzielimy dwie liczby oderwane przez siebie, to zawsze, choćby dzielna nie była podzielną przez dzielnik, otrzymany iloraz. Jeżeli zaś zadanie pewne doprowadza nas do dzielenia, to niezawsze ułamek w ilorazie przedstawia wprost zrozumiałą [1]) odpowiedź na pytanie; nieraz nawet ten ułamek może wskazywać, że zadanie jest niemożliwe do rozwiązania, a niekiedy, że ono jest tylko niejasno postawione.

Weźmy np. znane zadanie o kołach zębatych. Wiadomo, że jeżeli zęby dwu kół zębatych o siebie się zaczepiają, to wczasie ruchu koło, mające zębów więcéj (a więc większe), tyle razy wolniéj się obraca od drugiego, ile razy ilość jego zębów jest większa od ilości zębów koła mniejszego. Zadanie: ktoś, mając koło zębate o 100 zębach, poleca dorobić dla połączenia z nim drugie koło, któreby obracało się dokładnie 8 razy prędzéj; ile ono ma miéć zębów? Ponieważ to koło ma się obracać 8 razy prędzéj, więc ma miéć 8 razy mniéj zębów. 100 z. : $8 = 12\frac{1}{2}$ z. Ten ułamek wskazuje, że zadanie jest niemożliwe.

Weźmy teraz takie zadanie: Piotr i Paweł strzelali do tarczy i dali razem 10 strzałów; wiemy, że po jednym strzale Piotra Paweł daje zawsze dwa strzały; ile razy strzelał Piotr? Tu wypadłoby rozumować w ten sposób. Ponieważ 1 strzał Piotra przypada na 2 strzały Pawła, t. j. z trzech razem przez obu danych strzałów jeden jest Piotra, więc Piotr strzelił tyle razy, ile razy 10 strzałów ich obu jest większe od 3 strzałów, również przez obu danych. 10 s. : 3 s. $= 3\frac{1}{3}$ t. j. Piotr dał $3\frac{1}{3}$ strzałów, co niéma sensu. Zadanie jednak jest możliwe — nie jest ono tylko należycie wysłowione, t. j. niedomówiono w nim, jak oni zaczynali strzelać. Jeżeliby np. dodać: Paweł zaczynał i po dwu jego strzałach Piotr dał swój piérwszy strzał, albo: Paweł zaczynał i po jednym jego strzale Piot dał swój piérwszy strzał, to 10-y strzał należał do Pawła, a Piotr strzelał (10 — 1) s. : 3 . s. $= 3$ razy; jeżeliby zaś było powiedziane: zaczynał Piotr, to 10-y strzał należał do Piotra i Piotr strzelał $[(10 - 1)$ s. : 3 s.$] + 1 = 4$ razy.

Dzielenia zaś liczb oderwanych, odpowiadające tak piérwszemu zadaniu, niemożliwemu, jak i drugiemu, niedość jasno wysłowionemu, prowadzą zawsze do dokładnych i zrozumiałych wypadków liczebnych,

$$100 : 8 = 12\frac{1}{2}, \qquad 10 : 3 = 3\frac{1}{3},$$

chociaż otrzymane ułamki wskazują, że te ilorazy nie odpowiadają pojęciom rzeczywistym, do których się one w owych zadaniach odnoszą.

---

[1]) Np. ułamki osób w rachunkach statystycznych.

§ 17. O LICZBACH UŁAMKOWYCH WOGÓLE.

OKREŚLENIE UŁAMKA.

1. Widzieliśmy (§ 16, us. 1), że ułamek $\frac{3}{4}$ powstał z jedności, wskutek rozłożenia jéj na 4 równe części, i zebrania 3-ch takich części. Podobnie, $\frac{5}{8}$ powstało z rozłożenia jedności na 8 równych części i wzięcia 5-u takich części, $\frac{1}{7}$ (jedna-siódma) powstała z rozłożenia jedności na 7 równych części i wzięcia jednéj z nich i t. d. Powiemy więc ogólnie [1]):

Ułamkiem nazywamy jednę lub więcéj razem wziętych części, otrzymanych z rozłożenia jedności na części równe. Mianownik ułamka wskazuje, na ile równych części jedność została rozłożoną, a licznik — ile takich części wzięto.

2. W przeciwstawieniu ułamkom, jedność i liczby będące skupieniem samych tylko jedności, np. 5, 24, nazywamy liczbami całkowitymi (§ 1, us. 5).

Liczbę taką, jak np. $5\frac{3}{4}$, t. j. przedstawiającą skupienie jedności i jéj części powstałych z jedności wskutek rozłożenia jéj na części równe, nazywamy całkowitą z ułamkiem.

Tak ułamek, jak i całkowitą z ułamkiem nazywamy wogóle liczbą ułamkową.

W arytmetyce [2]) *mamy do czynienia z liczbami całkowitymi i ułamkowymi.*

UŁAMKI NIEWŁAŚCIWE.

3. Oczywiście, że jeżeli jedność rozłożymy np. na 5 części równych i weźmiemy tych piątych części pięć, t. j. $\frac{5}{5}$, to otrzymamy znowu naszę jedność; jest $1 = \frac{5}{5}$. Podobnie $1 = \frac{7}{7}$ i t. d. A więc *jedność możemy przedstawiać w postaci ułamka, którego licznik jest równy mianownikowi.*

Taksamo liczbę np. 3 możemy przedstawić, jako 3 razy po 5 piątych jedności, czyli 15 piątych, $\frac{15}{5}$, albo np. jako $\frac{21}{7}$ i t. d. Z tego widzimy, że gdy chcemy liczbę 3 przedstawić w postaci ułamka z pe-

---

[1]) Częścią jedności jest wszelka liczba mniejsza od jedności. lecz gdy mówimy np. 7-ma część jedności, to rozumiemy część jedności, którą otrzymujemy, rozkładając jedność na 7 *równych* części. W arytmetyce przez „ułamek“ rozumieć należy tylko taką część jedności, którą z téj jedności otrzymać można przez rozłożenie jéj na części równe i, mówiąc wogóle, przez skupienie razem pewnéj ilości tych części — a nie np., część jedności z tąż jednością niespółmierną. — Już Euklides (ks. VII, def. 3 i 4) tak pojmował ułamek.

[2]) § 1, us. 8.

wnym mianownikiem, to należy za licznik wziąć liczbę 3 razy większą od mianownika, $3 = \frac{5 \cdot 3}{5} = \frac{15}{5}$, $3 = \frac{7 \cdot 3}{7} = \frac{21}{7}$ i t. d., t. j. *całkowitą można przedstawić w postaci ułamka z dowolnym mianownikiem, biorąc za jego licznik iloczyn mianownika przez tę całkowitę.*

Gdy mamy całkowitą z ułamkiem, np. $5\frac{3}{4}$, to, wyrażając całkowitą także w 4-ch częściach jedności, miéć ich będziemy $4 . 5 = 20$; zamiast więc mówić: 5 i $\frac{3}{4}$, możemy powiedzieć: dwadzieścia-czwartych i trzy-czwarte. Mamy więc tu 4-e części, a tych 4-ych części mamy 20 i 3, czyli 23; a więc

$$5\frac{3}{4} = \frac{4 \cdot 5 + 3}{4} = \frac{23}{4}.$$

Wyraziliśmy tu całkowitą z ułamkiem w postaci ułamka, mającego za mianownik mianownik ułamka danego; nazywa się to włączeniem całkowitéj z ułamkiem w ułamek. A więc, *aby całkowitą z ułamkiem włączyć w ułamek, należy za mianownik ułamka wziąć mianownik ułamka danego, a za licznik sumę iloczynu mianownika przez całkowitą i licznika ułamka danego.*

Przywykliśmy pojmować, że „ułamek" czegoś jest od tego „czegoś" mniejszy. Dlatego liczbę nie mniejszą od jedności (t. j. jedność, lub liczbę od jedności większą), wyrażoną w postaci ułamka, nazywamy ułamkiem niewłaściwym. W przeciwstawieniu temu, ułamek mniejszy od jedności nazywamy ułamkiem właściwym. Więc np. liczby $\frac{4}{7}$, $\frac{1}{8}$ i t. d. są ułamkami właściwymi, gdy tymczasem liczby $\frac{7}{7}$, $\frac{128}{5}$, $\frac{44}{11}$ i t. d. są ułamkami niewłaściwymi.

Ułamek niewłaściwy ma licznik niemniejszy od mianownika.

Widoczna, że ułamek niewłaściwy, przedstawiający czyto całkowitą z ułamkiem, czytéż całkowitą, jest liczbą ułamkową (us. 2); możemy więc wogóle powiedzieć, że: *liczbą ułamkową nazywamy liczbę wyrażoną w częściach otrzymanych z rozłożenia jedności na części równe.* Liczba np. 4 jest całkowitą; dopóki jednak rozważamy ją w postaci np. $\frac{44}{11}$, dopóty jest ona liczbą ułamkową, gdyż jest wyrażona przy pomocy 11-ych części jedności.

Gdy mówimy „całkowita z ułamkiem", to przez ułamek rozumiemy wtedy zawsze ułamek właściwy.

4. Gdy mamy ułamek niewłaściwy, to oczywiście, możemy go wyrazić czyto jako całkowitą, czytéż jako całkowitą z ułamkiem. Tak gdy mamy np. $\frac{49}{11}$, to tu z 49-u jedenastych, każde 11-cie przedstawiają

1; będzie więc tyle jedności, ile razy z 49-u jedenastych można oddzielić po 11 jedenastych, t. j. jaką (całkowitą) ilość razy mieści 11 w 49-u. Trzeba więc 49:11; otrzymany iloraz niezupełny 4 wskazuje, ile w ułamku niewłaściwym $\frac{49}{11}$ jest jedności. Te 4 jedności stanowią 44 jedenastych; pozostaje więc jeszcze 5 jedenastych $\frac{5}{11}$. Zatym.

$$\frac{49}{11}; \qquad \begin{array}{r|l} 49 & 11 \\ \hline -44 & 4 \\ \hline 5 & \end{array} \qquad \frac{49}{11} = 4\frac{5}{11}.$$

Jeżeli zaś mamy np. $\frac{44}{11}$, to podobnie, dzieląc 44:11, otrzymujemy 4. a tu te 4 jednośćci stanowią właśnie 44 jedenastych, zatym $\frac{44}{11} = 4$ Takie wyrażanie ułamka niewłaściwego jako całkowitéj lub jako całkowitéj z ułamkiem nazywa się wyciąganiem całkowitéj z ułamka niewłaściwego. Powiemy więc ogólnie: *aby z ułamka niewłaściwego wyciągnąć całkowitą, należy jego licznik podzielić przez mianownik; iloraz niezupełny przedstawia całkowitą, a reszta dzielnéj jest licznikiem ułamka o tym samym mianowniku, co mianownik ułamka danego.* Jeżeli licznik danego ułamka niewłaściwego jest podzielny przez mianownik, to iloraz jest całkowitą, którą przedstawiał dany ułamek niewłaściwy.

Zwykle, otrzymawszy wskutek wykonanych działań ułamek niewłaściwy, wyciągamy z niego całkowitą, gdyż przez to wyraźniéj pojmiemy wielkość téj liczby.

UŁAMEK JAKO WSKAZANE DZIELENIE.

5. Zupełnie w ten sam sposób jak w § 16, us. 1, moglibyśmy tu wprost dowieść, że jakiekolwiek dzielenie dwu liczb doprowadza nas do rezultatu, który możemy przedstawić zapomocą ułamka, mającego dzielnik jako mianownik, a dzielną jako licznik.

Tak np., wypadek z dzielenia 49:5, w tym razie, gdy nam idzie o to, aby wyznaczyć 5-ą część liczby 49, t. j. gdy mamy liczbę 49 rozłożyć na 5 części równych i wyznaczyć jednę taką część, jest ten sam, co wtedy, gdy tylko 1 rozłożymy na 5 równych części, lecz za to weźmiemy takich części 49. (§ 16, us. 1 a.) Więc tu $49:5 = \frac{49}{5}$.

Podobnie, chcieć przez dzielenie 49:5 dowiedzieć się, ile razy 5 mieści się w 49-u, wychodzi na to samo, co chcieć wymierzyć liczbę 49 liczbą 5, t. j. wyznaczyć ile w liczbie 49 jest jednostek równych liczbie 5 i ile prócz tego jest 5-ych części téj jednostki (§ 16, us. 1, b.) I tu więc $49:5 = \frac{49}{5}$.

Dlatego, aby oznaczyć, że mamy np. liczbę 49 podzielić przez 5, można przedstawiać to albo (§ 7, us. 4):

$$49 : 5,$$



albotéż

$$\frac{49}{5}.$$

Zauważymy tu jeszcze, że gdy mamy dzielenie liczb mianowanych, np. 49 zł.: 5, to podobnie możemy je przedstawić tak: $\frac{49 \text{ zł.}}{5}$; albo, z uwagi, że otrzymamy tu wypadek mianowany (§ 7, us. 7), t. j., że otrzymamy złote, których będzie $\frac{49}{5}$, możemy także tak napisać: $\frac{49}{5}$ zł. Taksamo dzielenie 49 zł.: 5 zł możemy przedstawić $\frac{49 \text{ zł.}}{5 \text{ zł.}}$, albo, z uwagi że tu otrzymamy liczbę oderwaną, wprost: $\frac{49}{5}$.

Z tego wszystkiego wypada, że *na ułamek możemy patrzéć, jako na wskazane dzielenie, w którym dzielną jest licznik, dzielnikiem mianownik, a ilorazem wartość ułamka* (t. j. liczba, którą jest ten ułamek).

MNOŻENIE LUB DZIELENIE LICZNIKA LUB MIANOWNIKA PRZEZ LICZBĘ CAŁKOWITĄ.

6. Ponieważ mianownik ułamka oznacza, na ile części równych jedność została podzielona, więc wrazie, gdy, nie zmieniając licznika, mianownik powiększamy, powiększa się ilość części, na które jedność jest podzielona, a tymsamym, oddzielne części stają się mniejsze. Że zaś tych części bierzemy tyleż, co poprzednio (bo licznika nie zmieniamy), więc wartość ułamka staje się mniejszą — i tyle razy mniejszą, ile razy mianownik stał się większym. Tak np., gdy, mając pewną jedność, wyznaczymy ułamek $\frac{3}{4}$ , a następnie tylko jego mianownik powiększymy np. 2 razy, to ułamek $\frac{3}{8}$ , będzie od poprzedniego 2 razy mniejszy. Również np. od ułamka $\frac{3}{4}$ ułamek $\frac{3}{4 \cdot 5} = \frac{3}{20}$ jest 5 razy mniejszy. A więc;

a. *Jeżeli nie zmieniając licznika ułamka, powiększamy jego mianownik pewną ilość razy, to wskutek tego wartość ułamka tyleż razy się zmniejsza.*

Podobnie znajdziemy, że jeżeli w danym ułamku tylko jego mianownik zmniejszymy, wówczas części jedności staną się większe; a więc, biorąc ich tyléż, ile ich było w danym ułamku, otrzymujemy ułamek, którego wartość jest od poprzedniego większa — i większa tyleż razy, ile

razy części jedności stały się większe, t. j. ile razy zmniejszyliśmy mianownik. Zatym od ułamka $\frac{3}{20}$ ułamek $\frac{3}{20:5}=\frac{3}{4}$ jest 5 razy większy, t. j.

b. *Jeżeli, nie zmieniając licznika ułamka, zmniejszamy jego mianownik pewną ilość razy, to wskutek tego wartość ułamka tyleż razy się powiększa.*

Jeżeli mianownika ułamka nie zmieniamy, a jego licznik powiększamy, to oczywiście ilość takich samych części ułamka staje się większą i wartość ułamka powiększa się tyle razy, ile razy więcéj mamy teraz takich części, t. j. ile razy powiększamy licznik. Np. od ułamka $\frac{3}{17}$ ułamek $\frac{3\cdot 5}{17}$ jest 5 razy większy. A więc:

c. *Jeżeli nie zmieniając mianownika ułamka, powiększamy jego licznik pewną ilość razy, to wskutek tego wartość ułamka tyleż razy się powiększa.*

Taksamo objaśnić możemy, że np. od ułamka $\frac{8}{15}$ ułamek $\frac{8:4}{14}=\frac{2}{15}$ jest 4 razy mniejszy, t. j.

d. *Jeżeli nie zmieniając mianownika ułamka, zmniejszamy jego licznik pewną ilość razy, to wskutek tego wartość ułamka tyleż razy się zmniejsza.*

Zestawiając z sobą własności a i c., widzimy, że jeżeli jednocześnie licznik i mianownik ułamka powiększymy jednakową ilość razy, to wartość ułamka tyle razy się powiększy wskutek powiększenia licznika, ile razy się powiększy wskutek powiększenia mianownika, a więc zmianie nie ulegnie. Np. $\frac{3}{4}=\frac{3:2}{4\cdot 2}=\frac{6}{8}$. Podobnie z zestawienia własności b. i d. wypadnie, że np. $\frac{15}{35}=\frac{15:5}{35\cdot 5}=\frac{3}{7}$. A zatym:

e. *Jeżeli licznik i mianownik ułamka albo jednocześnie powiększamy, albo jednocześnie zmniejszamy jednakową ilość razy, to wartość ułamka się nie zmienia.*

7. Ponieważ możemy ułamek uważać jako wskazane dzielenie (us. 5), więc w powyższych (us. 6) własnościach możemy, zamiast:

licznika, mianownika, wartości ułamka,

rozumiéć odpowiednio:

dzielną, dzielnik, iloraz.

Zauważymy jednak, że te własności wyprowadziliśmy tu (us. 6) dla wszelkich ułamków; możemy je zatym odnieść do przypadku, gdy dzielna (licznik) nie jest podzielną przez dzielnik (mianownik), a nawet gdy jest od niego mniejsza, wyrażając wtedy iloraz zupełny tego dzielenia (§ 16, us. 1; § 17, us. 4) odpowiednio przez całkowitą z ułamkiem, lub przez ułamek właściwy. Z tego wypada, że własności, wypowiedziane

w us. 15-ym § 7-go, są własnościami ogólnymi [1]), choć tam moglibyśmy je wprowadzić tylko dla przypadku, gdy dzielna była podzielna przez dzielnik [2]).

RÓŻNE POSTACI UŁAMKA.

8. Wiemy, że wartość ułamka się nie zmienia, gdy jego licznik i mianownik mnożymy przez tę samę liczbę. Jeżeli więc mamy ułamek np. $\frac{36}{48}$, to, mnożąc licznik i mianownik jednocześnie kolejno przez 2, 3, 4, 5 i t. d., otrzymujemy ułamki

$$\frac{72}{96}, \frac{108}{144}, \frac{144}{192}, \frac{180}{240} \text{ i t. d.}$$

Wszystkie nieskończenie wiele ułamków, któreby można w ten sposób otrzymać, posiadają tę samę wartość, przedstawiają tę samę liczbę. Są to więc różne p o s t a c i téj saméj liczby, tego samego ułamka. Tę samę jednak liczbę, którą przedstawiliśmy tu w postaciach $\frac{36}{48}$, $\frac{72}{96}$ i t. d., można jeszcze inaczéj przedstawić. Wszakże możemy licznik i mianownik ułamka $\frac{36}{48}$ dzielić przez tę samę liczbę, mianowicie przez ich spólne dzielniki 2, 3, 4, 6, 12; otrzymamy więc jeszcze postaci téj saméj liczby

$$\frac{18}{24}, \frac{12}{16}, \frac{9}{12}, \frac{6}{8}, \frac{3}{4}.$$

I tak jednak nie wyczerpaliśmy jeszcze wszystkich postaci téj liczby, bo np. powyżéj otrzymaną postać $\frac{18}{24}$, mnożąc jéj licznik i mianownik przez liczby 3, 5, 7, 11, 13, 15 i t. d., otrzymamy znowu odmienne postaci téj saméj liczby. mianowicie

$$\frac{54}{72}, \frac{90}{120}, \frac{126}{168} \text{ i t. d. I t. d.}$$

Pośród wszystkich tak wypisanych powyżéj postaci naszéj liczby, jako téż tych, którebyśmy jeszcze wypisać mogli, jedna tylko postać, mianowicie: $\frac{3}{4}$, posiada tę własność, iż jéj licznik i mianownik, są liczbami piérwszymi względem siebie, licznik i mianownik którejkolwiek innéj postaci, nie są liczbami piérwszymi względem siebie.

9. Gdy licznik i mianownik ułamka podzielimy przez ich spólny dzielnik, to otrzymamy w ten sposób inną postać ułamka, wyrażoną przy

---

[1]) Zawsze jednak, gdy tu (us. 6, 7) mówimy o zmniejszaniu pewną ilość razy (dzieleniu przez pewną liczbę), czyto dzielnéj (licznika) czytéż dzielnika (mianownika), przyjmujemy pod uwagę tylko przypadek, kiedy odpowiednie dzielenie uskutecznia się bez reszty Ogólniéj w § 20, us. 6, 7.

[2]) Z tego bezpośrednio wypada, że własności us. 6-go nie mogą być uważane jako prosty wynik z wyprowadzonych w nauce o dzieleniu liczb całkowitych własności us. 15-go w § 7-ym, gdyż są ogólniejsze. Często jednak na to nie zważają.

pomocy liczb mniejszych, a więc prostszą. Tak np., dzieląc licznik i mianownik ułamka $\frac{90}{120}$ przez ich spólny dzielnik, np. 10, otrzymamy postać prostszą $\frac{9}{12}$. Takie postępowanie, prowadzące do zastąpienia danéj postaci ułamka przez inną, wyrażoną przy pomocy liczb mniejszych, nazywa się skracaniem ułamka, *albo uproszczeniem ułamka;* zatym *skrócić ułamek jestto wyrazić go w innéj postaci zapomocą liczb mniejszych.* I mówi się: skracając ułamek $\frac{90}{120}$ przez 10 możemy go zastąpić przez $\frac{9}{12}$.

Skróciwszy ułamek $\frac{90}{120}$ przez 10 otrzymaliśmy $\frac{9}{12}$. Lecz i w tym ułamku licznik i mianownik mają jeszcze spólny dzielnik 3; możemy go więc jeszcze skrócić przez 3; otrzymamy $\frac{3}{4}$. Tej postaci nie możemy już zastąpić prostszą, bo licznik i mianownik są liczbami piérwszymi względem siebie. Ta więc postać nie może być już daléj skracaną — jest postacią nieskracalną. Oczywiście, z ułamka danego $\frac{90}{120}$ moglibyśmy wprost otrzymać postać jego nieskracalną, podzieliwszy jego licznik i mianownik przez ich największy spólny dzielnik 30 (§ 14, us. 12).

Ponieważ postać nieskracalna ułamka jest jego najprostszą postacią, więc, jeżeli tylko niéma wyraźnéj potrzeby przedstawiania go w pewnéj szczególnéj postaci, zawsze powinniśmy go doprowadzić do postaci nieskracalnéj i w takiéj go w rachunkach podawać. Tak np. jeżeli po rozwiązaniu jakiegoś zadania w ostatecznym wypadku otrzymujemy ułamek, to zawsze powinniśmy go przedstawić w postaci nieskracalnéj.

Aby ułamek skrócić, należy odnaléść spólny dzielnik licznika i mianownika i przezeń je podzielić. Pomocnymi nam w tym są cechy podzielności (§ 13; § 15, us. 11).

Aby dany ułamek wyrazić w postaci nieskracalnéj, należy dla licznika i mianownika odnaléść największy spólny dzielnik i przezeń je podzielić. Można to niekiedy osiągnąć, korzystając z cech podzielności i stopniowo skracając ułamek. Np.

$$\frac{630}{840}=\frac{63}{84}=\frac{21}{28}=\frac{3}{4}; \quad \frac{396}{352}=\frac{99}{88}=\frac{9}{8}.$$

W niektórych jednak razach koniecznie trzeba się uciéc do odszukania nsd.-a licznika i mianownika (przez kolejne dzielenie; § 14, us. 7). Tak np., gdy mamy ułamek $\frac{50803}{106636}$, to znane cechy podzielności nie dają nam wskazówki, czy licznik i mianownik mają spólny dzielnik, czytéż są liczbami piérwszymi względem siebie, a tymsamym, czy ten ułamek jest już w postaci nieskracalnéj. Aby stanowczo na to odpowiedzieć, trzeba po-

szukiwać nsd.-a. Jakoż, znajdziemy, że jest nim liczba 503, przez którą skróciwszy, otrzymamy postać nieskracalną $\frac{101}{212}$.

Jeżeli mamy np. ułamek $\frac{12}{3}$, to, skróciwszy go przez 3, miéć będziedziemy $\frac{12}{3}=\frac{4}{1}=4$ (us. 3), t. j. gdy wskutek działań wykonywanych wypada nam ułamek o mianowniku 1, to możemy licznik tego ułamku napisać jako całkowitą. Z tego jeszcze wypada, że, nawzajem, *zawsze możemy uważać całkowitą jako ułamek o mianowniku równym jedności.*

10. Zastanówmy się teraz nanowo nad otrzymywanymi w us. 8-m różnymi postaciami ułamka $\frac{36}{48}$. Nieskracalną postacią tego ułamka jest postać $\frac{3}{4}$, otrzymana wskutek podzielenia licznika i mianownika przez nsd. 12. Nawzajem więc, postać $\frac{36}{48}$ powstaje z postaci $\frac{3}{4}$ przez pomnożenie jéj licznika i mianownika przez 12. Wszystkie zatym postaci, które powstały z postaci $\frac{36}{48}$ przez pomnożenie licznika i mianownika kolejno przez 2, 3, 4, 5 i t. d., powstają z postaci nieskracalnéj wskutek pomnożenia jéj licznika i mianownika przez 12 . 2, 12 . 3, 12 . 4 i t. d.—Postać $\frac{18}{24}$ powstała z postaci $\frac{36}{48}$ wskutek skrócenia przez 2, dzielnik liczby 12 (§ 14, us. 9); powstaje więc ona z postaci $\frac{3}{4}$ przez pomnożenie jéj licznika i mianownika przez dzielnik liczby 12, dopełniający dzielnik 2 t. j. przez 6. Te zatym postaci, które powstają z postaci $\frac{18}{24}$ przez pomnożenie jéj licznika i mianownika przez liczby 3, 5, 7, 11, 15 i t. d., powstają z postaci nieskracalnéj $\frac{3}{4}$ przez pomnożenie jéj licznika i mianownika przez 6 . 3, 6 . 5, 6 . 7, 6 . 11, 6 . 15 i t. d. — I t. d. — Widzimy więc, że *każda postać ułamka powstaje z jego postaci nieskracalnéj wskutek pomnożenia jéj licznika i mianownika przez tęż samę liczbę.*

Należy dla ścisłości udowodnić, że jakiekolwiek są dane dwie postaci tego samego ułamka, to, dzieląc licznik i mianownik każdéj z tych postaci przez ich nsd., otrzymujemy tę samę postać nieskracalną. Innymi słowy: należy udowodnić, że *jeżeli dwa ułamki w postaciach nieskracalnych są równe, to ich liczniki, jak również ich mianowniki są tymiż samymi liczbami.* Jakoż, przypuśćmy, że ułamek w postaci nieskracalnéj np. $\frac{5}{8}$ jest równy innemu ułamkowi w postaci nieskracalnéj $\frac{l}{m}$. Przyjmujemy więc, że tak liczby 5 i 8, jak i liczby (całkowite l i m są piérwsze względem siebie i że $\frac{l}{m}=\frac{5}{8}$. Te ułamki są równe, t. j.

przedstawiają tę samę liczbę; gdy zatym każdy z nich powiększymy m razy, to otrzymamy również dwa wyrażenia pewnéj téj saméj liczby, a więc równe:

$$l = \frac{5 \cdot m}{8}.$$

Ponieważ liczba l jest całkowitą, więc iloczyn $5 \cdot m$ jest podzielny przez 8. Gdy zaś 8 jest liczbą piérwszą względem czynnika 5, zatym czynnik pozostały, m, jest podzielny przez 8 (§ 14, us. 13). Jeżeli przeto dzielnik liczby m, dopełniający jéj dzielnik 8, nazwiemy n, to

$$m = 8 \cdot n \quad \text{i} \quad l = \frac{5 \cdot 8 \cdot n}{8} = 5 \cdot n,$$

t. j. liczby l i m mają spólny dzielnik n. Ponieważ zaś przyjęliśmy, że liczby l i m są piérwsze względem siebie, zatym ich spólny dzielnik $n = 1$, wskutek czego

$$m = 8 \quad \text{i} \quad l = 5$$

— istnieje więc jedna tylko postać nieskracalna ułamka.

Ponieważ każda postać ułamka powstaje z jego postaci nieskracalnéj wskutek pomnożenia jéj licznika i mianownika przez odpowiednią tę samę liczbę, a licznik i mianownik mnożyć możemy przez jakiekolwiek liczby, zatym ogólnie:

Różne postaci ułamka powstają z jego postaci nieskracalnéj wskutek jednoczesnego pomnożenia jéj licznika i mianownika przez oddzielne liczby 1, 2, 3, 4, 5, 6 i t. d., t. j. przez oddzielne liczby z szeregu liczb naturalnych. Że zaś ten szereg liczb jest nieograniczony, zatym: *istnieje nieskończenie wiele postaci każdego ułamka.*

11. Ponieważ każda postać ułamka powstaje z postaci nieskracalnéj wskutek pomnożenia jéj licznika i mianownika przez tę samę liczbę, zatym możemy powiedzieć, że licznik i mianownik jakiéjkolwiek postaci ułamka są „równokrotne" odpowiednio licznika i mianownika jego postaci nieskracalnéj. Tak np. $\frac{12}{15} = \frac{4 \cdot 3}{5 \cdot 3} = \frac{4+4+4}{5+5+5}$.

Gdy więc, mając np. dane dwie postaci tegoż ułamka, np. $\frac{20}{25}$ i $\frac{12}{15}$, utworzymy ułamek, którego licznikiem jest suma liczników tych postaci, a mianownikiem suma ich mianowników, $\frac{20+12}{25+15}$, lub ułamek, którego licznikiem jest różnica ich liczników, a mianownikiem różnica ich mianowników, $\frac{20-12}{25-15}$, to oczywiście licznik i mianownik każdego z takich ułamków są również równokrotnymi odpowiednio licznika i mianownika nieskracalnéj postaci $\frac{4}{5}$ tegoż ułamka. A więc: takie ułamki są także postaciami tegoż samego ułamka, co dane postaci. Możemy go tak wyrazić: jeżeli np.

$$\frac{20}{25}=\frac{12}{15},$$

to

$$\frac{20+12}{25+15}=\frac{20}{25}=\frac{12}{15} \quad \text{i} \quad \frac{20-12}{25-15}=\frac{20}{25}=\frac{12}{15}.$$

12. Jeżeli licznik i mianownik ułamka (właściwego) podzielimy przez licznik, to w liczniku otrzymamy 1, w mianowniku zaś całkowitą z ułamkiem. Dzieląc np. licznik i mianownik ułamka $\frac{35}{1136}$ przez 35, otrzymamy w liczniku 1, a w mianowniku $32\frac{16}{35}$, czyli $32+\frac{16}{35}$. Mamy więc

$$\frac{35}{1136}=\frac{1}{32+\frac{16}{35}}.$$

Jeżeli postąpimy taksamo z ułamkiem $\frac{16}{35}$, to otrzymamy

$$\frac{16}{35}=\frac{1}{2+\frac{3}{16}},$$

co pisząc w wyrażeniu poprzednim, zamiast $\frac{16}{35}$, miéć będziemy

$$\frac{35}{1136}=\frac{1}{2+\frac{1}{2+\frac{3}{16}}}.$$

Postępując daléj podobnie, mamy jeszcze $\frac{3}{16}=\frac{1}{5+\frac{1}{3}}$, a tymsamym

$$\frac{35}{1136}=\frac{1}{32+\frac{1}{2+\frac{1}{5+\frac{1}{3}}}}.$$

Taka, jak powyższa postać ułamka nazywa się u ł a m k i e m c i ą g ł y m i mówimy, żeśmy ułamek $\frac{35}{1136}$ „rozwinęli na ułamek ciągły". — Widzimy, że tu, dla otrzymania ułamka ciągłego, przedstawiającego ułamek $\frac{35}{1136}$, należało podzielić 1136 przez 35, następnie 35 przez resztę poprzedniego dzielenia 16, a późniéj 16 przez resztę poprzedzającego dzielenia 3, t. j. postępować tak, jak przy wyszukiwaniu największego spólnego dzielnika liczb 1136 i 35 [por. § 14, us. 7, *b.*], a stopniowo w ten sposób otrzymywane ilorazy niezupełne 32, 2, 5, 3 wypisywać jako części całkowite mianowników kolejnych.

Badanie własności ułamków ciągłych, tak podobnych powyższemu, jak i ogólniejszych, wchodzi w zakres algiebry [1]).

---

1) W § 20, us. 5 będzie tylko wzmianka najelementarniejsza o zadaniu odwrotnym powyższemu, t. j. o tym, jak, mając podobny ułamek ciągły, otrzymać ułamek, którego rozwinięciem jest ten ułamek ciągły.

SPROWADZANIE UŁAMKÓW DO SPÓLNEGO MIANOWNIKA.

13. Mając danych kilka ułamków, np. $\frac{5}{12}, \frac{9}{16}, \frac{11}{18}$, , zważmy, że piérwsza z tych liczb jest wyrażona w 12-ych, druga w 16-ch, trzecia w 18-ych częściach jedności. Jeżelibyśmy zaś chcieli wyrazić wszystkie te liczby w jednakowych częściach jedności, to należałoby naszym ułamkom nadać takie postaci, aby ich mianowniki były tą samą liczbą; mianownik bowiém wskazuje, na ile — a więc i na jakie — części jedność została podzieloną. Nazywa się to sprowadzaniem ułamków do spólnego mianownika. Zatym

Sprowadzić ułamki do spólnego mianownika jestto wyrazić je w postaciach, mających tęż samę liczbę w mianowniku.

Zwykle każdy z ułamków, które mamy sprowadzić do spólnego mianownika, mamy dany w postaci nieskracalnéj; jeżeli zaś nie, to wyrażamy go w niéj uprzednio. Jakakolwiek zresztą jest postać każdego z danych ułamków, to możemy z niéj wyprowadzić inne, mnożąc jéj licznik i mianownik przez też same liczby. Aby więc dane ułamki wyrazić w postaciach, mających tę samę liczbę w mianowniku, należy licznik i mianownik każdego z danych ułamków pomnożyć przez tak dobraną liczbę, iżby mianowniki otrzymanych stąd postaci wszystkich ułamków były tą samą liczbą. Ten zatym spólny mianownik, jako powstający z każdego z mianowników, wskutek pomnożenia go przez pewną liczbę (a więc przezeń podzielny), jest spólną wielokrotnością (§ 15, us. 7) mianowników ułamków danych. Tak np., aby ułamki $\frac{5}{12}, \frac{9}{16}, \frac{11}{18}$ sprowadzić do spólnego mianownika, należy naprzód wyznaczyć spólną wielokrotność mianowników 12, 16, 18. Moglibyśmy zadanie nasze rozwiązać, biorąc jakąkolwiek spólną ich wielokrotności—możemy jednak *najprościéj* [1]) je rozwiązać, biorąc najmniejszą spólną wielokrotność mianowników. Znajdziemy, jako nsw. (§ 15, us. 8) mianowników 12, 16, 18 liczbę 144; ta więc liczba bę-

---

[Wprawdzie ułamki ciągłe skończone (jako wyrażenia skończone ułamków zwyczajnych) mają cechy, kwalifikujące je do tego, aby ich własności były roztrząsane w arytmetyce; jednak, z uwagi, że ważność teoryi ułamków ciągłych polega na zasto.owaniu jéj wyników do liczb niewymiernych, a tymsamym nieliczne możliwe zastosowania jéj do rozwinięć ułamków zwyczajnych, są zgoła podrzędne; jak również z uwagi, że przy wykładzie w arytmetyce własności nłamków ciągłych najważniejszej, określającéj prawo tworzenia stopniowego ułamków zbliżonych (reduktów), udowodnić nie można — słusznie czynią rozmaici poważni autorowie, wyłączając z zakresu arytmetyki jakiekolwiek badanie własności ułamków ciągłych.]

[1]) Dlategoto właśnie wyrażamy uprzednio każdy z danych ułamków w postaci nieskracalnéj.

dzie spólnym mianownikiem. Należy zatym dane ułamki $\frac{5}{12}$, $\frac{9}{16}$, $\frac{11}{18}$ wyrazić w postaciach, mających za mianownik liczbę 144, czyli licznik i mianownik każdego z tych ułamków pomnożyć przez taką liczbę, iżby w mianowniku znalazła się liczba 144, a więc np. licznik i mianownik ułamka $\frac{9}{16}$ pomnożyć przez dzielnik liczby 144, dopełniający jéj dzielnik 16 (t. j. przez iloraz z podzielenia mianownika spólnego przez mianownik ułamka). A więc:

$$\frac{5}{12}, \frac{9}{16}, \frac{11}{18};$$
$$12 = 2.2.3$$
$$16 = 2.2.2.2$$
$$18 = 2.3.3$$
$$2.2.2.2.3.3 = 144;$$

$$144 : 12 = 12, \quad \frac{5}{12} = \frac{5 \cdot 12}{144} = \frac{60}{144};$$
$$144 : 16 = 9, \quad \frac{9}{16} = \frac{9 \cdot 9}{144} = \frac{81}{144};$$
$$144 : 18 = 8, \quad \frac{11}{18} = \frac{11 \cdot 8}{144} = \frac{88}{144}.$$

Aby dane ułamki sprowadzić do spólnego mianownika, (wyraziwszy je w postaciach nieskracalnych) odnajdujemy najmniejszą spólną wielokrotność ich mianowników, którą przyjmujemy za mianownik każdego ułamka, a za jego licznik bierzemy iloczyn poprzedniego licznika przez iloraz z podzielenia spólnego mianownika przez mianownik poprzedni tego ułamka.

W przypadku, gdy mianowniki ułamków danych są takimi liczbami, iż każda jest piérwsza względem każdéj z pozostałych, to ich nsw.-ą jest ich iloczyn (§ 15, us. 10), a tymsamym licznikiem postaci danego ułamka, mającéj tę spólną wielokrotność za mianownik, będzie iloczyn jego licznika i mianowników wszystkich ułamków pozostałych. Np.

$$\frac{3}{8}, \frac{4}{9}, \frac{6}{7}, \frac{9}{25};$$

nsw. liczb 8, 9, 7, 25 jest $8.9.7.25 = 12600$; zatym:

$$\frac{3}{8} = \frac{3 \cdot 9 \cdot 7 \cdot 25}{12600} = \frac{4725}{12600}, \quad \frac{4}{9} = \frac{4 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 25}{12600} = \frac{5600}{12600} \text{ i t. d.}$$

Podobnie, sprowadzając np. $\frac{3}{8}$ i $\frac{4}{9}$ do spólnego mianownika, otrzymamy

$$\frac{3}{8} = \frac{3 \cdot 9}{72} = \frac{27}{72}, \quad \frac{4}{9} = \frac{4 \cdot 8}{72} = \frac{32}{72}.$$

PORÓWNYWANIE WARTOŚCI UŁAMKÓW.

14. Wypada nam niekiedy oznaczyć, który z dwu danych ułamków jest większy, t. j. dwa dane u ł a m k i z s o b ą p o r ó w n a ć.

a. Jeżeli dane dwa ułamki mają jednakowe mianowniki, to oczywiście ten z nich jest większy, w którym większą jest ilość tych samych części jedności, to jest którego licznik jest większy. Tak np. z ułamków $\frac{5}{9}$ i $\frac{7}{9}$ drugi jest większy. Na oznaczenie, że jedna liczba jest większa od drugiéj używamy znaku $>$, pisząc liczbę większą po stronie rozwartości tego znaku. Napiszemy więc $\frac{7}{9} > \frac{5}{9}$, co czytamy: $\frac{7}{9}$ większa od $\frac{5}{9}$; albo-téż napiszemy: $\frac{5}{9} < \frac{7}{9}$, co przeczytamy: $\frac{5}{9}$ mniejsza od $\frac{7}{9}$.

b. Jeżeli dane dwa ułamki mają jednakowe liczniki, to, oczywiście, ten z nich jest większy, który przedstawia tę samę ilość większych części jedności; części zaś jedności są tym większe, im na mniéj części jedność została podzieloną, czyli im mianownik ułamka jest mniejszy. Z dwu więc np. ułamków $\frac{5}{8}$ i $\frac{5}{11}$ jest $\frac{5}{8} > \frac{5}{11}$.

c. Jeżeli zaś mamy dane dwa ułamki o różnych tak licznikach, jak i mianownikach, to, aby wyznaczyć, który z nich jest większy, sprowadzamy je do spólnego mianownika [1]), a tymsamym ten przypadek do przypadku a. Tak np. $\frac{5}{12}$ i $\frac{7}{15}$; tu $\frac{5}{12} = \frac{25}{60}$, $\frac{7}{15} = \frac{28}{60}$, a więc $\frac{28}{60} > \frac{25}{60}$, czyli $\frac{7}{15} > \frac{5}{12}$. Jeżeliby tu zaś z dwu liczb jedna była ułamkiem niewłaściwym a druga ułamkiem właściwym, to piérwsza oczywiście jest większą. Tak np. $\frac{9}{8} > \frac{356}{378}$.

Gdy, mając kilka ułamków, chcemy je uporządkować według ich wielkości, zaczynając np. od największego, a ułamki te nie mają (wszystkie) ani jednakowego mianownika, ani jednakowego licznika, to należy je uprzednio sprowadzić do spólnego mianownika. Trzeba to zrobić nawet w przypadku, kiedy mamy dane np. takie ułamki: $\frac{7}{12}$, $\frac{7}{15}$, $\frac{8}{15}$, $\frac{8}{13}$, gdyż tu nie widać, który z dwu nłamków $\frac{8}{15}$ i $\frac{7}{12}$, który z dwu ułamków $\frac{7}{12}$ i $\frac{8}{13}$, jak również, który z dwu ułamków $\frac{7}{15}$ i $\frac{8}{13}$ jest większy. Sprowadziwszy je tedy do spólnego mianownika, mamy

---

[1]) Niekiedy dogodniéj sprowadzić je do spólnego licznika, co się odbywa podobnie jak sprowadzanie do spólnego mianownika. Np.

$\frac{4}{237}$ i $\frac{6}{355}$; $\frac{4}{237} = \frac{12}{237.3} = \frac{12}{711}$; $\frac{6}{355} = \frac{12}{355.2} = \frac{12}{710}$, więc $\frac{4}{237} < \frac{6}{355}$.

$$\frac{7}{12}=\frac{455}{780},\quad \frac{7}{15}=\frac{364}{780},\quad \frac{8}{15}=\frac{416}{780},\quad \frac{8}{13}=\frac{480}{780};$$

więc $\frac{8}{13}>\frac{7}{12}>\frac{8}{15}>\frac{7}{15}$.

15. Jeżeli, mając dwa ułamki nierówne, np. $\frac{3}{4}$ i $\frac{5}{7}$, utworzymy ułamek, którego licznik jest sumą liczników ułamków danych, a mianownik sumą ich mianowników, $\frac{3+5}{4+7}$, to jaką jest wartość tego ułamka względem watości ułamków danych?

Porównajmy ułamek $\frac{3+5}{4+7}$ z ułamkiem $\frac{3}{4}$. Według powyższego (c), należy te ułamki sprowadzić do spólnego mianownika. Czyniąc to, mamy

$$\frac{3+5}{4+7}=\frac{(3+5)\cdot 4}{(4+7)\cdot 4}=\frac{3\cdot 4+5\cdot 4}{(4+7)\cdot 4},\quad \frac{3}{4}=\frac{3\cdot(4+7)}{(4+7)\cdot 4}=\frac{3\cdot 4+3\cdot 7}{(4+7)\cdot 4}.$$

Ponieważ $3\cdot 7>5\cdot 4$, więc i $3\cdot 4+3\cdot 7>3\cdot 4+5\cdot 4$, skutkiem czego (a.) $\frac{3}{4}>\frac{3+5}{4+7}$. Porównywając podobnie ułamek $\frac{3+5}{4+7}$ z ułamkiem $\frac{5}{7}$ znajdziemy, że $\frac{3+5}{4+7}>\frac{5}{7}$. Jest więc

$$\frac{3}{4}>\frac{3+5}{4+7}>\frac{5}{7},$$

t. j. wartość ułamka $\frac{3+5}{4+7}$ jest pośrednią między wartościami ułamków danych $\frac{3}{4}$ i $\frac{5}{7}$. (Por. us. 11.)

Jeżeli mamy kilka ułamków, np. $\frac{7}{12}, \frac{7}{15}, \frac{8}{15}, \frac{8}{13}$, i uporządkujemy je, zaczynając np. od największego, więc (us. 14): $\frac{8}{13}>\frac{7}{12}>\frac{8}{15}>\frac{7}{15}$, to, na mocy powyższego, wypada nam, iż $\frac{8}{13}>\frac{8+7}{13+12}>\frac{7}{12}$; a że $\frac{7}{12}>\frac{8}{15}$, więc także

$$\frac{8}{13}>\frac{8+7}{13+12}>\frac{8}{15}.$$

Biorąc zaś dwa ostatnie ułamki, t. j. $\frac{8+7}{13+12}$ i $\frac{8}{15}$, mamy znowu

$\frac{8+7}{13+12}>\frac{8+7+8}{13+12+15}>\frac{8}{15}$, a że $\frac{8}{13}>\frac{8+7}{13+12}$ i $\frac{8}{15}>\frac{7}{15}$, więc mamy także

$$\frac{8}{13}>\frac{8+7+8}{13\times 12+15}>\frac{7}{15}.$$

Biorąc znowu dwa ostatnie z tych ułamków i podobnie z nimi postępując, znajdziemy, że

$$\frac{8}{13}>\frac{8+7+8+7}{13+12+15+15}>\frac{7}{15}.$$

A zatym: *gdy, mając danych dwa lub więcéj ułamków, utworzymy ułamek, którego licznik jest sumą liczników ułamków danych, a mianownik jest sumą ich mianowników,*

to ten ułamek jest większy od najmniejszego, a mniejszy od największego z ułamków danych.

DODANIE DO WYRAZÓW UŁAMKA LUB ODJĘCIE OD NICH TÉJ SAMÉJ LICZBY.

16. Zastosujmy własność udowodnioną w us. 15-ym do przypadku, kiedy z dwu ułamków jeden jest jednością, przedstawioną w postaci ułamka (us. 3). Weźmy np, $\frac{8}{13}$ i $1 = \frac{6}{6}$ i jeszcze np. $\frac{13}{8}$ i $1 = \frac{6}{6}$; według powyższe go miéć będziemy:

$$1 > \frac{8+6}{13+6} > \frac{8}{13} \quad \text{i} \quad \frac{13}{8} > \frac{13+6}{8+6} > 1$$

Z tego zaś, iż

$$\frac{8+6}{13+6} > \frac{8}{13} \quad \text{i} \quad \frac{13+6}{8+6} < \frac{13}{8},$$

Widzimy, że *jeżeli jednocześnie do licznika i do mianownika ułamka właściwego dodamy tę samę liczbę, to wartość ułamka się powiększy, i jeżeli jednocześnie do licznika i do mianownika ułamka niewłaściwego, większego od jedności, dodamy tę samę liczbę, to wartość ułamka się zmniejszy.*

Zamiast 8 + 6 i 13 + 6 pisząc odpowiednio 14 i 19, a wskutek tego (§ 5, us. 6) zamiast 8 i 13 pisząc odpowiednio 14 — 6 i 19 — 6, miéć będziemy zamiast poprzedniego:

$$\frac{14}{19} > \frac{14-6}{19-6} \quad \text{i} \quad \frac{19}{14} < \frac{19-6}{14-6}$$

t. j. *jeżeli jednocześnie od licznika i mianownika ułamka właściwego odejmiemy tę samę liczbę, to wartość ułamka się zmniejszy, i jeżeli jednocześnie od licznika i mianownika ułamka niewłaściwego większego od jedności odejmiemy tę samę liczbę, to wartość ułamka się powiększy.*

---

§ 18. DODAWANIE I ODEJMOWANIE LICZB UŁAMKOWYCH.

OKREŚLENIE DODAWANIA.

1. Jak wiemy (§ 4, us. 5), dodawanie liczb całkowitych jest działaniem, zapomocą którego odnajdujemy jednę liczbę, zwaną sumą, która jest skupieniem wszystkich jedności składników. Gdy zaś pośród danych liczb są liczby ułamkowe, to podobnie, działanie, doprowadzające nas do jednéj liczby, będącéj skupieniem wszystkich danych liczb, a więc skupieniem wszystkich części liczb danych (czyli wogóle mówiąc: jedności i części jedności tych składników), nazwiemy także dodawaniem, a owę liczbę — ich sumą. Powiemy więc teraz ogólnie:

Dodawanie jestto działanie, zapomocą którego, mając dwie lub więcéj liczb danych, zwanych składnikami, odnajdujemy liczbę, zwaną sumą, która jest skupieniem jedności i części jedności składników.

DODAWANIE UŁAMKÓW.

2. Weźmy np. zadanie: dodać do siebie ułamki: $\frac{3}{5}$, $\frac{4}{15}$ i $\frac{5}{12}$,

$$\frac{3}{5} + \frac{4}{15} + \frac{5}{12}.$$

Idzie tu o odnalezienie jednéj liczby, sumy, któraby była skupieniem wszystkich części składników, t. j. trzech-*piątych*, cztérech-*piętnastych* i pięciu-*dwunastych*. Ta zaś (jedna) liczba szukana będzie wyrażona w pewnych *jednakowych* częściach jedności, którychto części pewna ilość przedstawi piérwszy, inna drugi, a pozostała trzeci składnik. Z tego wypada, że suma może być wyrażona w takich pewnych częściach jedności, w jakich może być téż wyrażony każdy ze składników. Innymi słowy: mianownikiem sumy będzie spólny mianownik składników. Należy więc dane ułamki sprowadzić do spólnego mianownika (§ 17, us. 13). Tu (najmniejszym) spólnym mianownikiem jest mianownik 60; mamy więc:

$$\frac{3}{5} + \frac{4}{15} + \frac{5}{12} = \frac{36}{60} + \frac{16}{60} + \frac{25}{60}.$$

Skupiając teraz 36-sześćdziesiątych, 16-sześćdziesiątych i 25-sześćdziesiątych w jednę liczbę, otrzymamy oczywiście sześćdziesiąte części, których będzie $36 + 16 + 25$, a więc

$$\frac{3}{5} + \frac{4}{15} + \frac{5}{12} = \frac{36}{60} + \frac{16}{60} + \frac{25}{60} = \frac{36+16+25}{60} = \frac{77}{60} = 1\frac{17}{60}.$$

Podobnie np.

$$\frac{3}{5} + \frac{4}{15} + \frac{5}{12} + \frac{1}{120} = \frac{72}{120} + \frac{32}{120} + \frac{50}{120} + \frac{1}{120} = \frac{72+32+50+1}{120} = \frac{155}{120} =$$

$$= 1\frac{35}{120} = 1\frac{7}{24}.$$

Oczywiście, że, gdyby dane do dodania ułamki posiadały już jednakowe mianowniki, postępowanie z nimi byłoby prostsze. Tak np.

$$\frac{3}{32} + \frac{5}{32} + \frac{15}{32} + \frac{1}{32} = \frac{3+5+15+1}{32} = \frac{24}{32} = \frac{3}{4}.$$

Aby dodać do siebie dane ułamki, należy, wrazie, gdy ich mianowniki są różne, sprowadzić je do ogólnego mianownika, a liczniki tych postaci dodać do siebie; otrzymana stąd liczba jest licznikiem sumy, mianownikiem zaś jéj tenże sam mianownik spólny.

Taksamo postępowalibyśmy, gdyby dane ułamki były niewłaściwe. Zwykle jednak z ułamków niewłaściwych, przed przystąpieniem do ich dodawania, wyciągamy całkowite, tak iż rzecz sprowadza się do przypadku, gdy między składnikami są całkowite z ułamkami, (o czym w us. 7).

WŁASNOŚCI SUMY.

3. Wiemy z powyższego, że np. $\frac{35}{32}+\frac{5}{32}+\frac{147}{32}+\frac{64}{32}=\frac{35+5+147+64}{32}$

Z tego zaś wypada, iż nawzajem

$$\frac{35+5+147+64}{32}=\frac{35}{32}+\frac{5}{32}+\frac{147}{32}+\frac{64}{32}.$$

A jeżeli na każdy z tych ułamków (w liczniku piérwszego mamy liczbę wyrażoną przez sumę) będziemy patrzéć jako na wskazane dzielenie (§ 17, us. 5), to możemy to także inaczéj tak napisać:

$$(35+5+147+64):32=(35:32)+(5:32)+(147:32)+(64:32),$$

t. j. [1]) *aby sumę podzielić przez pewną liczbę, można wszystkie składniki podzielić przez tę liczbę* (por. § 6, us. 14).

4. Dowiedziemy, że suma nie zależy od porządku składników (por. § 4, us. 7), i w tym także przypadku, gdy składniki są liczbami ułamkowymi, weźmy sumę $\frac{3}{5}+5\frac{13}{15}+1\frac{5}{6}+4$.

Włączając całkowite z ułamkami w ułamki (§ 17, us. 3), sprowadzając ułamki do spólnego mianownika, wyrażając całkowitą w postaci ułamka z tymże spólnym mianownikiem i korzystając z tego, cośmy uzasadnili w ustępie 2-im, mamy kolejno

$$\begin{aligned}\frac{3}{5}+5\frac{13}{15}+1\frac{5}{6}+4&=\frac{3}{5}+\frac{88}{15}+\frac{11}{6}+4\\&=\frac{18}{30}+\frac{176}{30}+\frac{55}{30}+4\\&=\frac{18}{30}+\frac{176}{30}+\frac{55}{30}+\frac{120}{30}\\&=\frac{18+176+55+120}{30}\end{aligned}$$

Otrzymaliśmy tu w liczniku sumę $18+176+55+120$. W téj sumie liczb całkowitych możemy zmienić dowolnie porządek składników (§ 4, us. 7). Pisząc więc tę sumę np. tak: $120+176+18+55$, mamy

$$\frac{3}{5}+5\frac{13}{15}+1\frac{5}{6}+4=\frac{120+176+18+55}{30},$$

albo (us. 3)

$$\frac{3}{5}+5\frac{13}{15}+1\frac{5}{6}+4=\frac{120}{30}+\frac{176}{30}+\frac{18}{30}+\frac{55}{30},$$

skąd nakoniec, po wyciągnięciu całkowitych (§ 17, us. 4) i skróceniu ułamków, mamy

$$\frac{3}{5}+5\frac{13}{15}+1\frac{5}{6}+4=4+5\frac{13}{15}+\frac{3}{5}+1\frac{5}{6}.$$

---

[1]) Téj własności możnaby dowieść inaczéj w nauce o liczbach całkowitych, ale tylko dla przypadku, gdy każdy ze składników sumy jest przez ową liczbę podzielny.

Widzimy więc, że wogóle, jakimikolwiek są składniki, czy liczbami całkowitymi, czytéż liczbami ułamkowymi, *ich suma nie zależy od porządku składników.* —

5. Wiemy, że w powyższéj sumie $5\frac{13}{15}$ i $1\frac{5}{6}$ są skróceniami, zastępującymi $5+\frac{13}{15}$ i $1+\frac{5}{6}$, tak iż

$$\frac{3}{5}+5\frac{13}{15}+1\frac{5}{6}+4=\frac{3}{5}+5+\frac{13}{15}+1+\frac{5}{6}+4,$$

albo po sprowadzeniu ułamków do spólnego mianownika 30 i wyrażeniu całkowitych w postaci ułamków z tymże mianownikiem 30,

$$\frac{3}{5}+5\frac{13}{15}+1\frac{5}{6}+4=\frac{18}{30}+\frac{150}{30}+\frac{26}{30}+\frac{30}{30}+\frac{25}{30}+\frac{120}{30},$$

czyli (us. 2)

$$\frac{3}{5}+5\frac{13}{15}+1\frac{5}{6}+4=\frac{18+150+26+30+25+120}{30}.$$

Ponieważ wskazane w liczniku dodawanie składników (całkowitych) możemy uskutecznić przy pomocy dodawań częściowych którychkolwiek składników, wziętych w jakimkolwiek porządku (§ 4, us. 9), zatym

$18+150+26+30+25+120=(150+30+120)+(18+26+25)$,

wskutek czego

$$\frac{3}{5}+5\frac{13}{15}+1\frac{5}{6}+4=\frac{(150+30+120)+(18+26+25)}{30},$$

lub (us. 3)

$$\frac{3}{5}+5\frac{13}{15}+1\frac{5}{6}+4=\frac{150+30+120}{30}+\frac{18+26+25}{30}$$
$$=\left(\frac{150}{30}+\frac{30}{30}+\frac{120}{30}\right)+\left(\frac{18}{30}+\frac{26}{30}+\frac{25}{30}\right),$$

albo nakoniec, wyciągając całkowite i skracając ułamki,

$$\frac{3}{5}+5\frac{13}{15}+1\frac{5}{6}+4=(5+1+4)+\left(\frac{3}{5}+\frac{13}{15}+\frac{5}{6}\right),$$

t. j. *gdy w dodawaniu, które mamy wykonać, są wogóle mówiąc, całkowite z ułamkami, to możemy dodawać do siebie, oddzielnie całkowite, a oddzielnie ułamki, a suma liczb, otrzymanych z tych dwu dodawań częściowych, przedstawi sumę danych składników.*

6. Z tego, że własność „suma nie zależy od porządku składników" odnosi się tak do liczb całkowitych, jak jak i do liczb ułamkowych (us. 4), wypada także, że to wszystko, o czym mówiliśmy w § 4-ym, us. 8, 9 i 10, stosuje się nietylko do liczb całkowitych, ale i do liczb ułamkowych, jak o tym podobnie przeprowadzając rozumowanie na przykładach liczebnych [1]), łatwo przekonać się można.

---

[1]) Dla ogólności dobrze jest wybierać przykłady, w które wchodzą tak liczby całkowite, jak i ułamkowe. Oszczędzając miejsca, nie przeprowadzamy tu tego: droga wskazana w us. 5-ym i 6-ym.

DODAWANIE CAŁKOWITYCH Z UŁAMKAMI.

7. Weźmy przypadek gdy składniki są wogóle mówiąc całkowite z ułamkami, np.

$$\frac{3}{5} + 5\,\frac{13}{15} + 1\,\frac{5}{6} + 4.$$

Idzie nam tu o to, aby znaléść liczbę, która jest skupieniem jedności i części jedności składników, zatym sama z siebie nasuwa się tu potrzeba skupienia z sobą oddzielnie jedności, a oddzielnie części jedności składników, a więc należy dodać do siebie oddzielnie całkowite i oddzielnie ułamki.

Ponieważ w naszym zadaniu $\frac{3}{5} + 5\,\frac{13}{15} + 1\,\frac{5}{6} + 4$ idzie nam o wyznaczenie liczby, którąby była skupieniem jedności, więc 5-u, 1-néj i 4-ch jedności, i części jedności, więc $\frac{3}{5}$, $\frac{13}{15}$ i $\frac{5}{6}$, zatym należy wykonać oddzielnie dodawanie tych całkowitych i oddzielnie dodawanie tych ułamków, a dwie te sumy częściowe, razem wzięte, dadzą szukaną sumę składników. Mamy więc

$$\frac{3}{5} + 5\,\frac{13}{15} + 1\,\frac{5}{6} + 4 = (5+1+4) + \left(\frac{3}{5} + \frac{13}{15} + \frac{5}{6}\right)$$
$$= 10 + \frac{18+26+25}{30} = 10 + \frac{69}{30} = 10 + 2\,\frac{3}{10}$$
$$= (10+2) + \frac{3}{10} = 12\,\frac{3}{10}.$$

Widzimy z tego, że, aby nie zmieniać już raz otrzymanéj sumy z dodania całkowitych, praktyczniéj będzie zacząć od dodawania ułamków (które zwykle piśmiennie wykonywamy na stronie); jeżeli zaś z tego dodawania otrzymamy ułamek niewłaściwy, to wyciągniemy zaraz z niego całkowitą i dodawać ją będziemy wraz z całkowitymi składników, a do otrzymanéj stąd liczby przypiszemy pozostały ułamek (właściwy) częściowéj sumy ułamków. A więc, mając dane powyższe zadanie, postąpimy w ten sposób:

$\frac{3}{5} + 5\,\frac{13}{15} + 1\,\frac{5}{6} + 4^* = 12\,\frac{3}{10}$.

$\frac{3}{5} + \frac{13}{15} + \frac{5}{6} = \frac{18+26+25}{30} = 2\,\frac{9}{30} = 2\,\frac{3}{10}$;

* oznacza, że to, co jest po gwiazdce, piszemy dopiéro po ukończeniu rozumowania, które nas do tego doprowadziło.

a następnie wykonywamy odrazu (§ 4, us. 15): $2+5+1+4=12$ i piszemy tam, gdzie *, $=12\,\frac{3}{10}$. Powiemy więc ogólnie:

Aby wykonać dodawanie danych liczb ułamkowych, oddzielnie dodajemy naprzód do siebie ułamki, z téj częściowéj sumy, jeżeli ona jest ułamkiem niewłaściwym, wyciągamy całkowitą, którą dodajemy następnie wraz

z całkowitymi składników: otrzymana stąd liczba całkowita, wraz z ułamkiem właściwym, otrzymanym poprzednio w częściowej sumie ułamków, przedstawi sumę liczb danych.

Podobnie np.

$$\begin{array}{r} 3542\ \frac{7}{8} \\ 2561\ \frac{1}{2} \\ 379\ \frac{5}{6} \\ \hline 6484\ \frac{5}{24}. \end{array} \qquad \frac{7}{8}+\frac{1}{2}+\frac{5}{6}=\frac{21+12+20}{24}=\frac{53}{24}=2\frac{5}{24};$$

OKREŚLENIE ODEJMOWANIA.

8. Odejmowanie, jako działanie odwrotne dodawaniu dwu składników, ma na celu z danych: sumy dwu składników i jednego z tych składników wyznaczenie drugiego składnika téj sumy. To zadanie istnieć może niezależnie od tego, czy składniki są liczbami całkowitymi, czytéż ułamkowymi. Podane więc w us. 3-m § 5-go określenie odejmowania jest ogólne. Zatym wogóle:

Odejmowanie jestto działanie, w którym, mając dane dwie liczby, odjemną i odjemnik, poszukujemy liczby, zwanéj resztą, po któréj dodaniu do odjemnika otrzymujemy odjemną.

Odjemna jest nie mniejsza od odjemnika (§ 5, us. 4 i 11).

ODEJMOWANIE LICZB UŁAMKOWYCH.

9. Ponieważ odjemna jest sumą odjemnika i reszty, więc, jeżeli od ułamka mamy odjąć ułamek, to odjemną możemy uważać (us. 2), jako skupienie równych części jedności, którychto części pewna ilość jest przedstawiona przez odjemnik, a pozostała przez resztę szukaną. Szukana więc reszta może być wyrażona w takich częściach jedności, w jakich można wyrazić odjemną i odjemnik, a przeto za mianownik reszty możemy wziąć spólny mianownik odjemnéj i odjemnika. Gdy więc mamy np.

$$\frac{5}{6}-\frac{5}{9},$$

to należy te ułamki sprowadzić do spólnego mianownika, co uskuteczniając, mamy

$$\frac{5}{6}-\frac{5}{9}=\frac{15}{18}-\frac{10}{18}.$$

Odejmując zaś od piętnastu-*osiemnastych*, dziesięć-*osiemnastych*, otrzymamy oczywiście *osiemnaste* części, których będzie $15-10$; więc

$$\frac{5}{6}-\frac{5}{9}=\frac{15}{18}-\frac{10}{18}=\frac{15-10}{18}=\frac{5}{18}.$$

Oczywiście, że gdyby dane do odjęcia ułamki posiadały już jednakowe mianowniki, to postępowanie z nimi byłoby prostsze. Tak np.

$$\frac{11}{12}-\frac{7}{12}=\frac{11-7}{12}=\frac{4}{12}=\frac{1}{3}.$$

Aby odjąć od siebie dwa dane ułamki, należy, wrazie gdy ich mianowniki są różne, sprowadzić je do spólnego mianownika, a liczniki tych postaci odjąć od siebie; otrzymana stąd liczba jest licznikiem reszty, mianownikiem zaś jéj tenże sam mianownik spólny.

10. a. Jeżeli od całkowitéj z ułamkiem mamy odjąć całkowitą z ułamkiem, to, podobnie jak w dodawaniu, zastąpimy to odejmowanie przez odejmowania częściowe: osobno wykonamy odejmowanie ułamków, osobno całkowitych, a suma tych reszt częściowych przedstawi resztę liczb danych. Aby jednak te odejmowania częściowe można było uskutecznić, potrzeba, aby w każdym odjemna była nie mniejszą od odjemnika. Całkowita odjemnéj nie może być mniejsza od całkowitéj odjemnika, gdyż inaczéj dana odjemna byłaby mniejszą od danego odjemnika, co być nie może. Ale zdarzyć się może, że ułamek odjemnéj jest mniejszy (§ 17, us. 14) od ułamka odjemnika.

Weźmy np.

$$8\frac{5}{6}-3\frac{5}{9}.$$

tu $\frac{5}{6}>\frac{5}{9}$, więc, gdy $\frac{5}{6}-\frac{5}{9}=\frac{15-10}{18}=\frac{5}{18}$, a $8-3=5$, mamy $8\frac{5}{6}-3\frac{5}{9}=5\frac{5}{18}$. Piśmiennie ten rachunek tak przedstawimy:

$$8\frac{5}{6}-3\frac{5}{9}*=5\frac{5}{18}.$$

$$\frac{5}{5}-\frac{5}{9}=\frac{15-10}{18}=\frac{5}{18};$$

* oznacza, że to, co jest po gwiazdce, piszemy dopiéro po ukończeniu rozumowania, które nas do tego doprowadziło.

a następnie, wykonawszy wprost odejmowanie całkowitych $(8-3=5)$, piszemy tam, gdzie $*, =5\frac{5}{18}$.

Jeżeli jednak mamy zadanie

$$8\frac{5}{9}-3\frac{5}{6},$$

to tu nie możemy od $\frac{5}{9}$ odjąć $\frac{5}{6}$; należy więc odjemną tak rozłożyć na części, iżby w odjemnéj znalazł się ułamek większy od ułamka odjemnika. Łatwo się przekonać, iż będzie najdogodniéj, gdy z całkowitych odjemnéj oddzielimy jedność i tę jedność wraz z ułamkiem odjemnéj włączymy (§ 17, us. 3) w ułamek: $8\frac{5}{9}=7+1\frac{5}{9}=7+\frac{14}{9}$ wtedy, wykonywając częściowe odejmowanie ułamków,

$$\frac{14}{9} - \frac{5}{6} = \frac{28-15}{18} = \frac{13}{18},$$

otrzymujemy ułamek właściwy [1]), który dopisując do reszty z częściowego odejmowania całkowitych: $7-3=4$, otrzymujemy, jako różnicę liczb danych: $4\frac{13}{18}$. Postępowanie to piśmiennie tak przedstawimy:

$8\frac{5}{9} - 3\frac{5}{6} * = 4\frac{13}{18}$.

$\frac{5}{9} - \frac{5}{6} = \frac{10-15}{18}$;

$1\frac{5}{9} - \frac{5}{6} = \frac{28-15}{18} = \frac{13}{18}$;

* oznacza tu i daléj toż samo, co poprzednio.

a następnie wykonawszy wprost odejmowanie całkowitych $(7-3=4)$, piszemy tam, gdzie $*, = 4\frac{13}{18}$.

b. Od całkowitéj z ułamkiem odjąć ułamek (rozumiemy tu, oczywiście ułamek właściwy), np. (rozumowanie takież jak w poprzednim przypadku)

$5\frac{3}{8} - \frac{3}{5} * = 4\frac{31}{40}$.

$1\frac{3}{8} - \frac{3}{5} = \frac{55-24}{40} = \frac{31}{40}$;

$5\frac{3}{5} - \frac{3}{8} * = 5\frac{9}{40}$.

$\frac{3}{5} - \frac{3}{8} = \frac{24-15}{40} = \frac{9}{40}$;

Jeżeli w tym lub poprzednim przypadku w odjemnéj i w odjemniku mamy jednakowe ułamki, np. $8\frac{5}{9} - 3\frac{5}{9}$, to reszta, jako liczba, po któréj dodaniu do odjemnika otrzymać mamy odjemną, zawiérającą ułamek $\frac{5}{9}$, który jest już w odjemniku, będzie właściwie liczbą, którą tylko trzeba dodać do całkowitéj odjemnika, aby otrzymać całkowitą odjemnéj, to jest reszta będzie liczbą całkowitą. Jakoż, $8\frac{5}{9} - 3\frac{5}{9}$; podobnie np. $5\frac{3}{8} - \frac{3}{8} = 5$. Możemy więc powiedzieć; jeżeli ułamki odjemnéj i odjemnika są jednakowe, to reszta jest całkowita.

c. Od całkowitéj odjąć całkowitą z ułamkiem, np.

$$8 - 3\frac{4}{7}.$$

Mamy tu znaléść resztę, t. j. taką liczbę, iż dodając ją do $3\frac{4}{7}$ otrzymalibyśmy 8; w reszcie więc będzie ułamek, który razem z $\frac{4}{7}$ stanowić będzie 1-ść, a ta 1-ść wraz z całkowitymi odjemnika i reszty wyda 8.

---

[1]) Ta reszta + ułamek odjemnika = 1 + ułamek (dany) odjemnéj. Ponieważ ułamek odjemnika jest większy od ułamka odjemnéj, więc ta reszta jest mniejsza od jedności.

Należy więc z 8-u jedności odjemnéj oddzielić jednę, od niéj odjąć $\frac{4}{7}$, a ułamek, jaki stąd otrzymamy, dopisać do reszty, wypadłéj z odejmowania 7 — 3. Aby zaś od 1 odjąć $\frac{4}{7}$, przedstawimy 1 w postaci ułamka (§ 17, us. 3) z tymże mianpwnikiem 7. A więc

$$8 - 3\frac{4}{7} * = 4\frac{3}{7}.$$

$$1 - \frac{4}{7} = \frac{7-4}{7} = \frac{3}{7};$$

d. Od całkowitéj odjąć ułamek (rozumowanie takież, jak w poprzednim przypadku), np.

$$9 - \frac{7}{16} * = 8\frac{9}{16}.$$

$$1 - \frac{7}{16} = \frac{16-7}{16} = \frac{9}{16};$$

e. Gdy zaś mamy od całkowitéj z ułamkiem odjąć całkowitą, np. $8\frac{3}{5} - 5$, to mamy tu znaléść liczbę, która dodana do 5 daje $8\frac{3}{5}$, w liczbę więc szukaną wejdzie ułamek $\frac{3}{5}$, obok tego, co wypadnie z odejmowania całkowitych, a więc

$$8\frac{3}{5} - 5 = 3\frac{3}{5}.$$

Zbiérając to wszystko, powiemy ogólnie:

Aby wykonać odejmowanie dwu danych liczb ułamkowych, odejmujemy od siebie oddzielnie ułamki i oddzielnie całkowite, a resztę z częściowego odejmowania ułamków przypisujemy do reszty z częściowego odejmowania całkowitych. Jeżeli jednak ułamek odjemnéj był mniejszy od ułamka odjemnika, to uprzednio całkowitą odjemnéj zmniejszamy o jedność, którą z ułamkiem odjemnéj włączamy w ułamek; jeżeliby zaś odjemna była liczbą całkowitą, to podobnie zmniejszamy uprzednio tę całkowitą o jedność, którą przedstawiamy w postaci ułamka z takim mianownikiem, jaki ma ułamek odjemnika.

WŁASNOŚCI RÓŻNICY.

11. Z tego, że np. $\frac{24}{7} - \frac{5}{7} = \frac{24-5}{7}$, wypada nawzajem

$$\frac{24-5}{7} = \frac{24}{7} - \frac{5}{7},$$

czyli (§ 17, us. 5)

$$(24 - 5) : 7 = (24 : 7) - (5 : 7),$$

t. j. aby różnicę dwu liczb podzielić przez pewną liczbę, można odjemną i odjemnik podzielić przez tę liczbę (por. § 6, us. 15).

12. Można łatwo okazać, że własności sumy i reszty, wyprowadzone w § 5, us. 8 i 9, (podobnie jak własności, o których mowa wyżéj w us. 6) mają miejsce również i dla liczb ułamkowych.

---

§ 19. MNOŻENIE LICZB UŁAMKOWYCH.

OKREŚLENIE MNOŻENIA.

1. Gdy mamy pomnożyć przez siebie dwie liczby całkowite, np. 8×3, to, jak wiemy (§ 6, us. 3), aby otrzymać iloczyn, możemy mnożną wziąć jako składnik tyle razy, ile jedności jest w mnożniku. Jeżeli jednak chcemy na liczbach ułamkowych uskutecznić działanie, odpowiadające mnożeniu liczb całkowitych, natenczas, w przypadku, gdy mnożnik jest liczbą ułamkową, np. gdy chcemy pomnożyć 8 przez $\frac{3}{4}$,

$$8 \times \frac{3}{4},$$

nie może być mowy o tym, abyśmy mieli 8 wziąć $\frac{3}{4}$ raza jako składnik. Wypowiedziane przeto w ten sposób, jak powyżéj, powstawanie iloczynu z mnożnéj nie może się stosować do tego przypadku.

Aby więc pojąć, jakie znaczenie mieć powinno: $8 \times \frac{3}{4}$ zgodnie z tym, co oznacza: 8×3, należy nam jeszcze raz się zastanowić nad mnożeniem liczb całkowitych i tak wysłowić się o powstawaniu iloczynu z mnożnéj, aby to mogło się także odnosić do przypadku, gdy mnożnik jest liczbą ułamkową.

Powiedzieliśmy, że w mnożeniu liczb całkowitych, np. 8×3, otrzymujemy iloczyn z mnożnéj, biorąc ją jako składnik tyle razy, ile w mnożniku jest jedności. Aby zaś wyraźnie zaznaczyć, ile w mnożniku jest jedności, należy (§ 4, us. 5) mnożnik przedstawić jako sumę jedności, więc $3 = 1 + 1 + 1$. A gdy „mnożenie jestto działanie, zapomocą którego, mając dane dwie liczby, mnożną i mnożnik, odnajdujemy liczbę, zwaną iloczynem, którą otrzymalibyśmy z mnożnéj, biorąc ją jako składnik tyle razy, ile jest jedności w mnożniku", przeto możemy powiedzieć:

ponieważ mnożnik $3 = 1 + 1 + 1$,
więc iloczyn $= 8 + 8 + 8 = 24$.

Przyglądając się temu, widzimy, że dla utworzenia mnożnika z jedności, trzeba było *jedność wziąć jako składnik trzy razy*, i taksamo, dla utworzenia iloczynu z mnożnéj, trzeba *mnożną wziąć jako składnik trzy razy*; możemy więc powiedzieć, że „iloczyn powstaje z mnożnéj w taki sam spo-

sób, w jaki mnożnik powstał z jedności". Tak się wyrażając o powstawaniu iloczynu z mnożnéj, w niczym nie naruszamy naszego pojęcia o mnożeniu: toż samo, co poprzednio, innymi tylko słowy teraz wyrażamy.

Moglibyśmy nawet tak się wyrażać o powstawaniu iloczynu z mnożnéj odrazu, t. j. wtedy, gdyśmy zaczynali mówić o mnożeniu liczb całkowitych. Nie robiliśmy zaś tak poprzednio tylko z tego powodu, że w mnożeniu liczb całkowitych powstawanie iloczynu z mnożnéj w taki sposób w jaki mnożnik powstał z jedności, wychodzi na jedno z tym, że iloczyn otrzymujemy z mnożnéj, biorąc ją jako składnik tyle razy, ile jedności jest w mnożniku; ten zaś ostatni sposób wyrażania się był dosadniejszy i, w każdym razie, przy początku nauki łatwiéj zrozumiały.

To, że „iloczyn tak powstaje z mnożnéj jak mnożnik powstał z jedności" możemy odnieść i do przypadku, gdy mnożnik jest liczbą ułamkową. Tak np., gdy mamy $8 \times \frac{3}{4}$, to, ponieważ mnożnik $\frac{3}{4}$ powstał *z jedności* w taki sposób (§ 16, us. 1), iż 1 zmniejszyliśmy 4 razy i to, co stąd wypadło, t. j. $\frac{1}{4}$, wzięliśmy 3 razy jako składnik, aby podobnie utworzyć iloczyn z *mnożnéj*, należy mnożną 8 zmniejszyć 4 razy, a otrzymawszy wskutek tego 2, wziąć to 2 jako składnik 3 razy; będziemy więc mieli $2 + 2 + 2 = 6$; jest zatym $8 \times \frac{3}{4} = 5$.

Możemy więc powiedzieć ogólnie:

Mnożenie jestto działanie, zapomocą którego, mając dwie liczby, mnożną i mnożnik, odnajdujemy liczbę, zwaną iloczynem, którą możemy otrzymać z mnożnéj w taki sam sposób, w jaki mnożnik powstaje z jedności [1]).

2. Rzecz prosta, że początkowo uskuteczniano mnożenie na liczbach całkowitych; późniéj dopiéro mnożono przez siebie liczby ułamkowe. Tym się objaśnia nazwa tego działania: „mnożenie", jednoznaczna z powiększaniem. Bzeczywiście, gdy liczbę daną mnożymy przez 2, 3, i t. d. (wogóle, przez liczbę większą od 1), to otrzymujemy liczbę większą od danéj. Gdy zaś, jak wyżéj *mnożyliśmy* np. liczbę 8 przez $\frac{3}{4}$ (przez ułamek mniejszy od 1), to otrzymaliśmy liczbę 6, *mniejszą* od mnożnéj 8 którąśmy pomnożyli przez $\frac{3}{4}$. Okazuje to, iż działanie dobrze już znane, uskuteczniane na liczbach całkowitych i słusznie wtedy zwane mno-

---

[1]) Tu „powstawanie mnożnika z jedności" rozumieć należy zgodnie z podanym określeniami liczby całkowitej (§ 1, us. 5) lub ułamkowej (§ 17, us. 1). Możnaby co prawda ogólniéj to pojmować, przypuszczając, iż możemy na jedności uskuteczniać jakiekolwiek cztery tak zwane arytmetyczne działania: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie; o tym że nie można tu pojmować np. podnoszenia do potęgi i wyciągania pierwiastka będzie mowa w *Algiebrze*.

żeniem, stosowano później także i w tym przypadku, gdy mnożnik był wogóle ułamkowy, choćby mniejszy od jedności, pozostawiając dlań zawsze nazwę: „mnożenie" i używając słowa: „mnożę" nawet wtedy, gdy wskutek tego działania, (przy mnożniku mniejszym od 1) w rzeczywistości liczba się zmniejszała.

Dlatego w arytmetyce wyrazy: „mnożę", „mnożenie" mają niekiedy znaczenie niezgodne z ich zwykłym rozumowaniem; wskutek tego „mnożyć" niezawsze znaczy: powiększyć (por. us. 9).

MNOŻENIE LICZB UŁAMKOWYCH.

3. Wiemy, że całkowitą z ułamkiem możemy włączyć w ułamek (§ 17, us. 2), a całkowitą przedstawić w postaci ułamka o mianowniku równym 1 (§ 17, us. 9), więc zadanie np. $2\frac{3}{5}\times\frac{3}{4}$ możemy sprowadzić do do zadania $\frac{13}{5}\times\frac{3}{4}$ podobnie zadanie np. $\frac{8}{11}\times 6$ do zadania $\frac{8}{11}\times\frac{6}{1}$. Mnożenie więc jakichkolwiek liczb ułamkowych może być zawsze sprowadzone do mnożenia ułamka przez ułamek.

Aby jednak wprost przeprowadzić rozumowanie także wtedy, kiedy, czyto mnożna, czytéż mnożnik są liczbami całkowitymi, oddzielnie rozważymy mogące się tu zdarzyć przypadki [1]).

a. Pomnożyć ułamek przez całkowitą, np. $\frac{5}{7}\times 4$. Otrzymaliśmy mnożnik 4 z jedności, biorąc ją 4 razy jako składnik, $4 = 1+1+1+1$; więc iloczyn powstanie z mnożnéj $\frac{5}{7}$, gdy weźmiemy ją jako składnik 4 razy; $\frac{5}{7}+\frac{5}{7}+\frac{5}{7}+\frac{5}{7}=\frac{5+5+5+5}{7}$ (§ 18, us. 2). Tu w liczniku mamy 5 wziąć 4 razy jako składnik, a to dodawanie jednakowych składników możemy zastąpić (§ 6, us. 2) przez mnożenie 5×4, a więc nasz iloczyn jest $\frac{5\times 4}{7}$, t. j.

$$\frac{5}{7}\times 4=\frac{5\times 4}{7}.$$

Aby ułamek pomnożyć przez całkowitą, należy licznik pomnożyć przez całkowitą: otrzymana stąd liczba jest licznikiem iloczynu, mianownikiem zaś mianownik danego ułamka. Mówi się często krócéj: aby ułamek pomnożyć przez całkowitą należy jego licznik przez tę całkowitą pomnożyć.

Wykonywając w naszym przykładzie mnożenie w liczniku, otrzymujemy w iloczynie $\frac{20}{7}=2\frac{6}{7}$. Przeprowadzając to rozumowanie np. na tablicy, dobrze jest jednocześnie jego ślad zaznaczać w ten sposób:

---

1) Zaczniemy od tego, w którym rozumowanie jest najprostsze.

$\frac{5}{7} \times 4^* = \frac{5 \times 4}{7} = \frac{20}{7} = 2\frac{6}{7}$.

* oznacza, iż to, co jest po gwiazdce, piszemy dopiéro po ukończeniu rozumowania, które nas do tego doprowadziło.

mnożnik $4 = 1+1+1+1$

iloczyn $= \frac{5}{7} + \frac{5}{7} + \frac{5}{7} + \frac{5}{7} = \frac{5+5+5+5}{7} = \frac{5 \times 4}{7}$

Taksamo rozumować będziemy, mając do pomnożenia ułamek niewłaściwy przez całkowitą, np. $\frac{17}{3} \times 4$.

b. Pomnożyć całkowitą przez ułamek np. $6 \times \frac{3}{8}$. Tu mnożnik $\frac{3}{8}$ powstał z jedności w taki sposób, iż 1 zmniejszyliśmy 8 razy i otrzymawszy $\frac{1}{8}$ wzięliśmy tę część jedności jako składnik 3 razy $\frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8}$; należy więc w tenże sam sposób utworzyć iloczyn z mnożnéj 6, t. j. mnożną 6 zmniejszyć 8 razy i otrzymaną (§ 16, us. 1; § 17, us. 5) liczbę $\frac{6}{8}$ wziąć jako składnik także 3 razy, $\frac{6}{8} + \frac{6}{8} + \frac{6}{8}$. Lecz to $= \frac{6+6+6}{8}$. W liczniku mamy dodawanie jednakowych składników, $6+6+6$; można je zastąpić przez mnożenie 6×3 Nasz więc iloczyn jest $\frac{6 \times 3}{8}$, t. j.

$$6 \times \frac{3}{8} = \frac{6 \times 3}{8}.$$

Aby całkowitą pomnożyć przez ułamek, należy całkowitą pomnożyć przez licznik; otrzymana stąd liczba jest licznikiem iloczynu, mianownikiem zaś mianownik ułamka danego.

Przeprowadzając to rozumowanie, dobrze jest jednocześnie ślad jego zaznaczać piśmiennie, np. w ten sposób:

$6 \times \frac{3}{8}^* = \frac{6 \times 3}{8} = \frac{18}{8} = 2\frac{1}{4}$.

* oznacza tu i daléj toż samo, co poprzednio.

mnożnik $\frac{3}{8}$. . . . 1 zmn. 8 r.; otrzym. $\frac{1}{8}$; $\frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8}$

iloczyn . . . . 6 zmn. 8 r.; otrzym. $\frac{6}{8}$; $\frac{6}{8} + \frac{6}{8} + \frac{6}{8} = \frac{6+6+6}{8} = \frac{6 \times 3}{8}$

Taksamo rozumować będziemy, gdyby było np. $7 \times \frac{5}{3}$.

c. Pomnożyć ułamek przez ułamek, np. $\frac{4}{5} \times \frac{3}{8}$. Tu mnożnik... (jak wyżéj); należy więc w tenże sam sposób utworzyć iloczyn z mnożnéj $\frac{4}{5}$, t. j. mnożną $\frac{4}{5}$ zmniejszyć 8 razy, co uskutecznimy (§ 17, us. 6, a.) mnożąc przez 8 jéj mianownik $\frac{4}{5 \times 8}$, i wziąć tę liczbę 3 razy jako składnik, $\frac{4}{5 \times 8} + \frac{4}{5 \times 8} + \frac{4}{5 \times 8}$. Lecz to $= \frac{4+4+4}{5 \times 8}$; zastępując zaś w liczniku dodawanie jednakowych składników przez mnożenie, $4+4+4 = 4 \times 3$, otrzymujemy $\frac{4 \times 3}{5 \times 8}$, t. j.

$$\frac{4}{5}\times\frac{3}{8}=\frac{4\times3}{5\times8}.$$

Aby ułamek pomnożyć przez ułamek, należy za licznik iloczynu wziąć iloczyn liczników danych ułamków, a za mianownik iloczyn ich mianowników [1]). Mówi się często krócéj: aby ułamek pomnożyć przez ułamek należy pomnożyć licznik przez licznik, a mianownik przez mianownik.

W ciągu tego rozumowania, możemy jednocześnie ślad jego zaznaczać, pisząc np.

$$\frac{4}{5}\times\frac{3}{8}\ *=\frac{4\times3}{5\times8}=\frac{12}{40}=\frac{3}{10}.$$

mnożnik $\frac{3}{8}$ .... 1 zmn. 8 r.; otrzym. $\frac{1}{8}$; $\frac{1}{8}+\frac{1}{8}+\frac{1}{8}$

iloczyn .... $\frac{4}{5}$ zmn. 8 r.; otrzym. $\frac{4}{5\times8}$; $\frac{4}{5\times8}+\frac{4}{5\times8}+\frac{4}{5\times8}=$

$$=\frac{4+4+4}{5\times8}=\frac{4\times3}{5\times8}$$

Taksamo rozumować będziemy, gdyby było np. $\frac{17}{3}\times\frac{3}{8}$, $\frac{6}{7}\times\frac{5}{3}$, $\frac{5}{1}\times\frac{3}{4}$ i t. d.

d. *Wrazie, gdy albo mnożna, albo mnożnik, albotéż mnożna i mnożnik jednocześnie, są całkowitymi z ułamkami, włączamy je w ułamki, przez co sprowadzamy rzecz do jednego z poprzedzających przypadków* [2]).

4. Jeżeli mamy znaleść iloczyn trzech lub więcej liczb, pośród których są ułamkowe, np.

$$\frac{55}{63}\times\frac{3}{4}\times\frac{14}{15}\times\ 3\ \times\ 12\frac{1}{2}\times\frac{1}{7},$$

czyli, mówiąc wyraźniéj, jeżeli mamy $\frac{55}{63}$ pomnożyć przez $\frac{3}{4}$, otrzymany stąd iloczyn pomnożyć przez $\frac{14}{15}$, a ten iloczyn pomnożyć następnie przez 3 i t. d., to według prawideł, podanych w poprzedzającym ustępie, mamy:

$$\frac{55}{63}\times\frac{3}{4}=\frac{55\times3}{63\times4}$$

$$\frac{55\times3}{63\times4}\times\frac{14}{15}=^{3)}\frac{55\times3\times14}{63\times4\times15}$$

$$\frac{55\times3\times14}{63\times4\times15}\times\ 3=\frac{55\times3\times14\times3}{63\times4\times15}$$

$$\frac{55\times3\times14\times3}{63\times44\times15}\times12\frac{1}{2}=\frac{55\times3\times14\times3}{63\times4\times15}\times\frac{25}{2}=\frac{55\times3\times14\times3\times25}{63\times4\times15\times2}$$

$$\frac{55\times3\times14\times3\times25}{63\times4\times15\times2}\times\frac{1}{7}=^{4)}\frac{55\times3\times14\times3\times25}{63\times4\times15\times2\times7}$$

---

[1]) To prawidło widocznie obejmuje w sobie prawidła a i b, jako przypadki szczególne.

[2]) Por. niżéj us. 7.

[3]) Licznik mnożnéj, t. j. liczbę przedstawioną (§ 6, us. 2) przez iloczyn 55×3, mnożymy przez licznik mnożnika, t. j. przez 3, a mianownik mnożnéj i t. d.

[4]) $55\times3\times14\times3\times25\times1=55\times3\times14\times3\times25$ (§ 6, us. 3).

a więc

$$\frac{55}{63}\times\frac{3}{4}\times\frac{14}{15}\times 3\times 12\frac{1}{2}\times\frac{1}{7}=\frac{55}{63}\times\frac{3}{4}\times\frac{14}{15}\times 3\times\frac{25}{2}\times\frac{1}{7}=$$
$$=\frac{55\times 3\times 14\times 3\times 25}{63\times 4\times 15\times 2\times 7},$$

t. j. *aby znaléść iloczyn kilku czynników pośród których są ułamkowe, należy, włączywszy całkowite z ułamkami* (jeżeli są) *w ułamki, za licznik iloczynu wziąć iloczyn liczników i całkowitych, a za jego mianownik iloczyn mianowników.*

Należałoby następnie wykonać mnożenia, wskazane w liczniku i mianowniku ułamka $\frac{55\times 3\times 14\times 3\times 25}{63\times 4\times 15\times 2\times 7}$, później zaś, jeżeli można, ułamek skrócić, t. j. *liczby przedstawione przez te iloczyny* w liczniku i mianowniku podzielić przez tę samę liczbę. Lecz wiemy, że, aby iloczyn kilku czynników podzielić przez pewną liczbę, możemy jeden z jego czynników przez tę liczbę podzielić (§ 7, us. 13); więc, zamiast naprzód uskuteczniać wskazane mnożenia w liczniku i mianowniku, a dopiéro tak otrzymane liczby dzielić przez ich spólne dzielniki, będzie korzystniéj, gdy, przed wykonaniem tych mnożeń, podzielimy jednocześnie jeden czynnik licznika i jeden mianownika przez ich spólny dzielnik; taksamo postąpimy z drugą, trzecią, i t. d. parą takich czynników, dopóki nie dojdziemy do tego, że każdy czynnik licznika będzie liczbą piérwszą względem każdego czynnika mianownika [1]). Możemy więc tu np. tak postąpić: czynnik licznika 55 i czynnik mianownika 15 podzielimy przez 5, w zmienionych iloczynach czynniki 3 l. i 3 m. podzielimy przez 3, następnie czynniki 14 l. i 7 m. przez 7, czynniki 2 l. i 2 m. przez 2, czynniki 3 l. i 63 m. przez 3,

$$\frac{55\times 3\times 14\times 3\times 25}{63\times 4\times 15\times 2\times 7}=\frac{11\times 3\times 14\times 3\times 25}{63\times 4\times 3\times 2\times 7}=^{2)}\frac{11\times 14\times 3\times 25}{63\times 4\times 2\times 7}=\frac{11\times 2\times 3\times 25}{63\times 4\times 2}=$$
$$=\frac{11\times 3\times 25}{63\times 4}=\frac{11\times 25}{21\times 4}=\frac{275}{84}=3\frac{23}{84}.$$

Zwykle nie wypisujemy tak, jak tu zrobiliśmy, tych postaci ułamka iloczynu, lecz przekréślamy skracane czynniki licznika i mianownika ułamka $\frac{55\times 3\times 14\times 3\times 25}{63\times 4\times 15\times 2\times 7}$, lub częściéj, co na jedno wychodzi, odrazu przekréślamy w iloczynie $\frac{55}{63}\times\frac{3}{4}\times\frac{14}{15}\times 3\times\frac{25}{2}\times\frac{1}{7}$ licznik któregokolwiek ułamka, lub czynnik całkowity, z mianownikiem innego, jak tylko dostrzeżemy, że one mają spólny dzielnik (możemy

---

[1]) Wtedy i ich iloczyny będą liczbami piérwszymi względem siebie (§ 14, us. 16), t. j. uskuteczniwszy mnożenie, otrzymamy nieskracalną postać ułamka przedstawiającego iloczyn liczb danych.

[2]) „Aby iloczyn podzielić przez jeden z jego czynników, należy wziąć iloczyn czynników pozostałych, czyli należy ów czynnik opuścić“ (§ 7, us. 13).

bowiem z téj pary liczb uważać jednę jako czynnik licznika, a drugą jako czynnik mianownika iloczynu), a nad nimi piszemy te liczby, które wypadają po podzieleniu ich przez ten spólny dzielnik [1]). Wypadających w ten sposób jedności nie piszemy; jeżeli jednak wszystkie czynniki licznika iloczynu się skrócą, to należy napisać w liczniku iloczynu 1 (która jest iloczynem jedności wypadłych wskutek częściowych skracań), np. $\frac{6}{55} \times \frac{11}{18} = \frac{6 \times 11}{55 \times 18} = \frac{1}{11 \times 3} = \frac{1}{33}$. Podobnie jeżeli wszystkie czynniki mianownika iloczynu się skrócą, to wypadłoby napisać w mianowniku 1, — lecz wtedy (§ 17, us. 9) otrzymujemy całkowitą, np. $\frac{3}{4} \times 24 \times 1\frac{2}{3} = \frac{3 \times 24 \times 5}{4 \times 3} = \frac{6 \times 5}{1} = 6 \times 5 = 30$.

WŁASNOŚCI ILOCZYNU.

5. Jeżeli w iloczynie dwu lub więcéj czynników, pośród których są ułamkowe, np. w iloczynie $\frac{55}{63} \times \frac{3}{4} \times \frac{14}{15} \times 3 \times 12\frac{1}{2} \times \frac{1}{7}$, przestawimy jakkolwiek czynniki, to wskutek tego w liczniku i mianowniku ułamka $\frac{55 \times 3 \times 14 \times 3 \times 25}{63 \times 4 \times 15 \times 2 \times 7}$, do którego dany iloczyn się sprowadza, zajdzie zmiana porządku czynników. Ponieważ zaś tak iloczyn $55 \times 3 \times 14 \times 3 \times 25$, jak i iloczyn $63 \times 4 \times 15 \times 2 \times 7$ od porządku czynników nie zależy (§ 6, us. 10), więc wszelkie przestawienie czynników danego iloczynu nie zmienia liczby, którą ten iloczyn przedstawia. Widzimy więc, że wogóle:

Iloczyn nie zależy od porządku czynników.

6. Z tego zaś wypada, że własności iloczynu, wypowiedziane w § 6 (druga część ustępu 10, ustęp 12 — 15), są ogólne, t. j. że one stosują się do iloczynów tak liczb całkowitych, jak i ułamkowych.

INNY SPOSÓB MNOŻENIA CAŁKOWITYCH Z UŁAMKAMI.

7. Wróćmy jeszcze do mnożenia dwu czynników, w przypadku, gdy jeden z nich, lub oba są całkowitymi z ułamkami. Na mocy własności, o których mowa wyżéj w ustępach 3 i 5, oraz tego, co wiemy o dodawaniu liczb ułamkowych (§ 18, us. 4, 2, 3, 6), łatwo przeprowadzimy rozumowanie, którego tutaj ślad tylko (oszczędzając miejsca) zaznaczamy.

a. $5\frac{2}{7} \times 3 = 5\frac{2}{7} + 5\frac{2}{7} + 5\frac{2}{7} = 5 + \frac{2}{7} + 5 + \frac{2}{7} + 5 + \frac{2}{7} =$

[1]) Trudności druku nie pozwalają nam tu tego przedstawić.

$$= (5+5+5) + \left(\frac{2}{7}+\frac{2}{7}+\frac{2}{7}\right)$$
$$= 5\times 3 + \frac{2}{7}\times 3.$$

b. $5\frac{2}{7}\times\frac{3}{4} = \frac{37}{7\times4}+\frac{37}{7\times4}+\frac{37}{7\times4} = \frac{35+2}{7\times4}+\frac{35+2}{7\times4}+\frac{35+2}{7\times4}$
$$= \left(\frac{35}{7\times4}+\frac{35}{7\times4}+\frac{35}{7\times4}\right) + \left(\frac{2}{7\times4}+\frac{2}{7\times4}+\frac{2}{7\times4}\right)$$
$$= \left(\frac{5}{4}+\frac{5}{4}+\frac{5}{4}\right) + \frac{2\times3}{7\times4}$$
$$= \frac{5\times3}{4}+\frac{2\times3}{7\times4}, \text{ a to wychodzi na to samo, co}$$
$$= 5\times\frac{3}{4}+\frac{2}{7}\times\frac{3}{4}.$$

c. $5\frac{2}{7}\times 2\frac{3}{4} = 5\frac{2}{7}\times\frac{11}{4} = 5\times\frac{11}{4}+\frac{2}{7}\times\frac{11}{4}$ na mocy *b.*, lecz to (us. 5)
$$= \frac{11}{4}\times 5+\frac{11}{4}\times\frac{2}{7} = 2\frac{3}{4}\times 5+2\frac{3}{4}\times\frac{2}{7}, \text{ co, według a. i b.,}$$
$$= 2\times 5+\frac{3}{4}\times 5+2\times\frac{2}{7}+\frac{3}{4}\times\frac{2}{7}$$
$$= 5\times 2+\frac{2}{7}\times 2+5\times\frac{3}{4}+\frac{2}{7}\times\frac{3}{4}.$$

Powiemy więc wogóle, że *gdy mamy całkowitą z ułamkiem pomnożyć przez całkowitą z ułamkiem, to możemy utworzyć częściowe iloczyny: całkowitéj mnożnéj przez całkowitą mnożnika, ułamka mnożnéj przez całkowitą mnożnika, całkowitéj mnożnéj przez ułamek mnożnika, ułamka mnożnéj przez ułamek mnożnika, i wziąć sumę tych iloczynów.* Bywa to niekiedy dogodne. Np.

$$101\frac{1}{36}\times 360\frac{25}{101}\ ^{1}) = 36360+10+25+\frac{25}{3636} = 36395\frac{25}{3636}.$$

$$101\times 360 = 36360;\ \frac{1}{36}\times 360 = 10;\ 101\times\frac{25}{101} = 25;\ \frac{1}{36}\times\frac{25}{101} = \frac{25}{3636}.$$

UŁAMEK LICZBY.

8. Jeżeli mówimy np. „trzy-czwarte dwudziestu", to mamy tu na myśli liczbę, którą otrzymamy, gdy 20 rozłożymy na 4 części równe i takich części weźmiemy 3. Winniśmy więc tutaj uskutecznić toż samo z liczbą 20, aby otrzymać $\frac{3}{4}$ dwudziestu, co trzeba zrobić z jednością, aby otrzymać $\frac{3}{4}$ jedności (§ 16, us. 1). A więc: $\frac{3}{4}$ liczby 20 taksamo powstaje z 20-u, jak $\frac{3}{4}$ z 1-ści. A więc (us. 1), mówiąc „trzy-czwarte dwudziestu", mamy na myśli liczbę, którą przedstawia iloczyn $20\times\frac{3}{4}$ (mnożna 20,

[1]) § 17, us. 6 c.

mnożnik $\frac{3}{4}$), t. j. liczbę 15. Podobnie np. $\frac{3}{4}$ liczby $2\frac{1}{2}$ jest $2\frac{1}{2}\times\frac{3}{4}=\frac{15}{8}=$ $=1\frac{7}{8}$; $\frac{19}{8}$ liczby $2\frac{2}{3}$ jest $2\frac{2}{3}\times\frac{19}{8}=6\frac{1}{3}$; i t. d.

Ułamek liczby danéj jest liczbą, którą otrzymamy z danéj, gdy ją przez ten ułamek pomnożymy.

Zamiast mówić: $\frac{19}{8}$ liczby $2\frac{2}{3}$, moglibyśmy powiedzieć: $2\frac{3}{8}$ liczby $2\frac{2}{3}$. Zwykle jednak wtedy mówimy albo: $\frac{19}{8}$ liczby $2\frac{2}{3}$ albotéż: 2 (dwie) liczby $2\frac{2}{3}$ i $\frac{3}{8}$ liczby $2\frac{2}{3}$.

Podobnie, jeżeli powiemy np. „dwie-piąte trzech-czwartych dwudziestu", to ponieważ „trzy-czwarte dwudziestu" oznacza liczbę przedstawioną przez iloczyn $20\times\frac{3}{4}$, więc $\frac{2}{5}$ téj liczby jest $\left(20\times\frac{3}{4}\right)\times\frac{2}{5}=$ $=20\times\frac{3}{4}\times\frac{2}{5}$. Zatym przytoczone wyrażenie oznacza liczbę $20\times\frac{3}{4}\times\frac{2}{5}=6$.

9. Jeżeli jakąkolwiek liczbę daną mamy pomnożyć przez ułamek właściwy, np. przez $\frac{5}{6}$, to, na mocy powyższego, możemy powiedzieć, że mamy wziąć $\frac{5}{6}$-ych liczby danéj, a więc nie weźmiemy wszystkich sześciu szóstych części, razem stanowiących tę liczbę, ale tylko 5 z tych części, a więc niecałą liczbę. Wkutek tego, po pomnożeniu, otrzymamy liczbę mniejszą od danéj. Powiemy więc, że (por. us. 2)

Mnożąc jakąkolwiek liczbę przez ułamek właściwy, zmniejszamy ją.

Podobnie znajdziemy, że *mnożąc jakąkolwiek liczbę przez liczbę większą od 1, zwiększamy ją.*

ODWROTNOŚĆ LICZBY.

10. W przypadku szczególnym, miéć będziemy np. $\frac{5}{7}$ liczby $\frac{7}{5}$, co oznacza $\frac{7}{5}\times\frac{5}{7}=1$; podobnie: $\frac{1}{7}$ liczby 7 oznacza $7\times\frac{1}{7}=1$, 9 liczb $\frac{1}{9}$ oznacza $\frac{1}{9}\times9=1$, $\frac{3}{8}$ liczby $2\frac{2}{3}$ oznacza $2\frac{2}{3}\times\frac{3}{8}=\frac{8}{3}\times\frac{3}{8}=1$. Widzimy z tego, że, aby z liczby danéj, wskutek pomnożenia jéj przez pewien czynnik, otrzymać 1, należy za ten czynnik przyjąć liczbę, któréj licznik jest mianownikiem liczby danéj, a mianownik licznikiem liczby danéj (stosuje się to także np. do drugiego przykładu, bo $7=\frac{7}{1}$).

Gdy mówimy $\frac{5}{7}$ liczby $\frac{7}{5}$, to liczba $\frac{7}{5}$ przedstawia części jedności; moglibyśmy więc powiedzieć: „pięć-siódmych siedmiu-piątych jedności jest jedność" (podobnie: jedna-siódma siedmiu jedności jest jedność).

To jest, mając *jedność*, wziąwszy jéj $\frac{7}{5}$-ych części, a tego, cośmy już tak otrzymali, biorąc $\frac{5}{7}$-ych części, dochodzimy znowu do *jedności*. Skutek więc piérwszego działania, dokonanego na jedności, znieśliśmy przez działanie drugie, tak iż znowu mamy jedność. Dlatego każde takie dwie liczby jak $\frac{5}{7}$ i $\frac{7}{5}$, jak $\frac{1}{7}$ i 7, jak 9 i $\frac{1}{9}$, jak $\frac{3}{8}$ i 2 $\frac{2}{3}$, nazywają się jedna odwrotnością drugiéj. Jest więc liczba $\frac{5}{7}$ odwrotnością liczby $\frac{7}{5}$, i nawzajem liczba $\frac{7}{5}$ odwrotnością liczby $\frac{5}{7}$, i t. d.

MNOŻENIE LICZB MIANOWANYCH.

11. W mnożeniu dwu liczb idzie nam o to, aby z mnożnéj otrzymać iloczyn w taki sposób, w jaki mnożnik powstaje z jedności. Inne więc jest znaczenie mnożnéj niż mnożnika. Gdy mnożna jest pewnym, że tak powiemy, przedmiotem, *mnożnik wskazuje na działanie*, które mamy wykonać na mnożnéj. Iloczyn zaś ma ten sam charakter, co mnożna. Tak np. gdy mamy 8 pomnożyć przez $\frac{3}{4}$, to mnożnik $\frac{3}{4}$ wskazuje tylko na działanie, które mamy wykonać na liczbie 8: rozłożyć ją na 4 równe części i takich części wziąć 3. (Por. § 6, us. 6).

Widoczniéj się to przedstawi, gdy weźmiemy mnożenie liczb mianowanych. — Np. Łokieć sukna kosztuje 9 $\frac{2}{3}$ złotego; ile kosztuje $\frac{3}{4}$ łokcia? Ponieważ jeden łokieć kosztuje 9 $\frac{2}{3}$ zł., więc $\frac{3}{4}$ łokcia kosztują trzy-czwarte 9 $\frac{3}{4}$ złotego, t. j. (us. 9) należy [1]) 9 $\frac{2}{3}$ zł. $\times \frac{3}{4} = \frac{29}{3}$ zł. $\times \frac{3}{4} = \frac{29 \cdot 3}{3 \cdot 4}$ zł. $= 7\frac{1}{4}$ zł. W mnożeniu tym mnożnik $\frac{3}{4}$ wskazał nam, co należy zrobić z mnożną, aby otrzymać iloczyn. — Podobnie, gdy mamy np. zadanie: Łokieć sukna kosztuje 9 $\frac{2}{3}$ złotego; ile kosztuje 3 $\frac{3}{4}$ łokcia?, to zauważymy, że gdy jeden łokieć kosztuje 9 $\frac{2}{3}$ zł., to 3 $\frac{3}{4}$ łokcia kosztuje 3 $\frac{3}{4}$ raza (§ 16, us. 2) więcéj, t. j. należy 9 $\frac{2}{3}$ złotego pomnożyć przez 3 $\frac{3}{4}$; 9 $\frac{2}{3}$ zł. $\times$ 3 $\frac{3}{4} = \frac{29}{3}$ zł. $\times \frac{15}{4} = \frac{29 \cdot 15}{3 \cdot 4}$ zł. $= 36\frac{1}{4}$ zł. Z tego jeszcze wyni-

[1]) Pomimo zwrócenia uwagi uczniów na odmienne (us. 2) niekiedy w arytmetyce znaczenie wyrazu „mnożyć“ od zwykłego jego pojmowania, często bardzo uczniowie w rozumowaniu przy rozwiązywaniu zadań mylą się, kiedy wypada wnieść, iż należy czyto pomnożyć czy też podzielić przez ułamek. Dlatego jest rzeczą korzystną, podawszy zadanie prowadzące do mnożenia lub dzielenia przez ułamek, jednocześnie wypowiedzieć zupełnie podobne zadanie, w którymby zamiast owego ułamka była liczba całkowita lub całkowita z ułamkiem, i żądać przeprowadzania rozumowania naprzód na tym ostatnim zadaniu, poczym dopiéro uczeń ma je zastosować do zadania piérwotnego.

ka, że zawsze (por. § 6, us. 6) *w mnożeniu liczb mianowanych mnożnik jest liczbą oderwaną, a iloczyn jest liczbą mianowaną, wyrażoną przy pomocy téj saméj jednostki, co mnożna.*

12. Przerobimy tu kilka zadań na mnożenie liczb mianowanych ułamkowych, podając je jaknajprościéj [1]).

a. $\frac{3}{5}$ godziny wyrazić w minutach. —Godzina ma minut 60, więc $\frac{3}{5}$ godz. jest to samo, co $\frac{3}{5}$-te 60-u minut; trzeba więc 60 m. $\times \frac{3}{5} = \frac{60 \cdot 3}{5}$ m. = = 36 m. Odp. $\frac{3}{5}$ godziny = 36 minutom.

b. $\frac{3}{5}$ doby wyrazić w godzinach. — Rozumując taksamo, mieć będziemy 24 g. $\times \frac{3}{5} = \frac{24 \cdot 3}{5}$ g. $= 14\frac{2}{5}$ g. Odp. $\frac{3}{5}$ doby $= 14\frac{2}{5}$ godziny.

c. $\frac{3}{5}$ doby wyrazić w godzinach i minutach. — Znaleźliśmy już, że $\frac{3}{5}$ doby $= 14\frac{2}{5}$ g.; należy więc jeszcze ułamek godziny wyrazić w minutach; $\frac{2}{5}$ g. = 60 m. $\times \frac{2}{5} = \frac{60 \times 2}{5}$ m. = 24 m. Odp. $\frac{3}{5}$ doby = 14 g. + 24 m.

d. $\frac{3}{7}$ doby wyrazić w godzinach, minutach i sekundach. —

$\frac{3}{7}$ d. $= 24$ g. $\times \frac{3}{7} = \frac{24 \cdot 3}{7}$ g. $= 10\frac{2}{7}$ g.

$\frac{2}{7}$ g. $= 60$ m. $\times \frac{2}{7} = \frac{60 \cdot 2}{7}$ m. $= 17\frac{1}{7}$ m.

$\frac{1}{7}$ m. $= 60$ s. $\times \frac{1}{7} = \frac{60}{7}$ s. $= 8\frac{4}{7}$ s.

Odp. $\frac{3}{7}$ d. $= 10$ g. $+ 17$ m. $+ 8\frac{4}{7}$ s.

e. W 4 morgach $+ 42\frac{2}{3}$ pręta kwadratowego ile jest stóp kw.? — 4 m. $+ 42\frac{2}{3}$ p. k. $= 300$ p. k. $\times 4 + 42\frac{2}{3}$ p. k. $= 1242\frac{2}{3}$ p. k

p. k. $= 225$ s. k.

$1242\frac{2}{3}$ p. k. $= 225$ s. k. $\times 1242\frac{2}{3} = \frac{225 \cdot 3728}{3}$ s. k. = $= (75 \times 3728)$ s. k. $= 279600$ s. k.

Odp. W 4 m. $+ 42\frac{2}{3}$ pr. kw. jest 279600 st. kw.

f. Metr $= 3\frac{17}{36}$ stopy nowopolskiéj; ile w hektarze jest stóp kw.?—

---

[1]) Zwykle w zadaniach przytaczamy różne okoliczności, aby uczeń, wnikając w nie, sam rozumowaniem doszedł do wskazania, jakie mianowicie i na których liczbami należy wykonać działania. Tu zaś idzie nam tylko o to, aby wskazać, jak się uskutecznia samo mnożenie.

$$ha = 10\,000\ m^2 = \frac{125\times125\times10000}{36\times36}\text{ st. k.} = \frac{9765625}{81}\text{ s. k.} = 120563\frac{22}{81}\text{ st. kw.}$$

Odp. W hektarze jest $120\,563\frac{22}{81}$ stopy kw. nowopolskiéj.

g. Znaléść $\frac{3}{5}$ liczby wielorakiéj 18 sąż. + 2 ł. + 8 cali. — Trzeba 18 s. + 2 ł. + 8 c. rozłożyć na 5 równych części i takich części wziąć 3, czyli: daną liczbę podzielić przez 5, a to, co otrzymamy, pomnożyć przez 3.

18 s. + 2 ł. + 18 c. | 5
−15 | 3 s. + 2 ł. + $8\frac{2}{5}$ c.
3 s. = 9 ł.
+ 2 ł.
11 ł. × 3
−10
1 ł. = 24 c. 11 s. + 1 ł. + $1\frac{1}{5}$ c.
+ 18 c.
42 c.
−40 c.
2 c.

$8\frac{2}{5}$ c. × 3 = $\frac{42\,.\,3}{5}$ c. = $25\frac{1}{5}$ c.

$25\frac{1}{5}$ c. = 1 ł. + $1\frac{1}{5}$ c.

Odp. $\frac{3}{5}$ liczby 18 sąż. + 2 ł. + 8 c. jest 11 sąż. + 1 ł. + $\frac{1}{5}$ cala.

h. Gdybyśmy mieli np. te 18 s. + 2 ł. + 8 c. pomnożyć przez $3\frac{2}{5}$, co możemy tak oznaczyć

$$(18\text{ s.} + 2\text{ ł.} + 8\text{ c.}) \times 3\frac{2}{5},$$

to albo $\left(3\frac{2}{5} = \frac{17}{5}\right)$ mnożną podzielilibyśmy przez 5 i otrzymany iloraz pomnożylibyśmy przez 17, albotéż oddzielnie wykonalibyśmy (18 s. + 2 ł. + 8 c.) × 3, a oddzielnie, jak w g.. pomnożylibyśmy téż mnożną przez $\frac{2}{5}$, i wzięli sumę tych iloczynów częściowych.

---

§ 20. DZIELENIE LICZB UŁAMKOWYCH.

OKREŚLENIE DZIELENIA. LICZBA KTÓRÉJ UŁAMEK JEST DANY.

1. Dzielenie, jako działanie odwrotne mnożeniu dwu czynników, ma na celu z danych: z iloczynu dwu czynników i jednego z tych czynników wyznaczenie drugiego czynnika tego iloczynu. To zadanie istnieć może niezależnie od tego, czy czynniki są liczbami całkowitymi, czytéż ułam-

kowymi. Podane więc w us. 3-im § 7-go określenie dzielenia jest ogólne. Zatym wogóle:

Dzielenie jestto działanie, zapomocą którego, mając dwie liczby: dzielną i dzielnik, odnajdujemy liczbę, zwaną ilorazem, taką, iżby iloczyn dzielnika i ilorazu przedstawił dzielną.

Gdy więc mamy $8 : \frac{1}{2}$, to mamy tu znaleść taką liczbę, którą mnożąc przez $\frac{1}{2}$, otrzymamy 8, t. j. taką liczbę, której $\frac{1}{2}$ (połowa) jest liczbą 8. Jeżeli więc $\frac{1}{2}$ liczby szukanéj jest 8, to cała liczba jest 2 razy większa od 8, t. j. szukaną liczbą jest $8 \times 2 = 16$; więc $8 : \frac{1}{2} = 16$.

Zadanie, w którym mając daną pewną część liczby, szukamy téj liczby, np. zadanie:

$\frac{3}{4}$ pewnéj liczby jest 6; jakato jest liczba?,

jako zadanie, w którym, mając jeden z dwu czynników iloczynu i iloczyn (por. § 19, us. 8), szukamy drugiego czynnika, sprowadza się do dzielenia danéj liczby przez liczbę, wskazującą, jaką częścią szukanéj liczby jest ta dana liczba — jak tu np. do dzielenia $6 : \frac{3}{4}$.

2. Ponieważ, jak widzieliśmy (§ 19, us. 2, 9), wyrazy: „mnożę", „mnożenie" mają w arytmetyce niekiedy obszerniejsze znaczenie niż w użyciu zwykłym, więc i ściśle związane z nimi znaczenie wyrazów: „dzielę", „dzielenie" winno również w odpowiednich przypadkach niezgadzać się z pospolitym ich rozumieniem. Rzeczywiście, według zwykłego pojmowania, gdy dzielimy jakiś przedmiot, to go zmniejszamy; tymczasem widzieliśmy tylkoco, że *dzieląc* 8 przez $\frac{1}{2}$ otrzymaliśmy 16, t. j. liczbę *większą* od dzielnéj [1]). A więc: „podzielić" niezawsze znaczy: zmniejszyć (por. us. 4).

To, cośmy wyżéj powiedzieli, odnosi się do tego tylko przypadku (§ 7, us. 6, 7, 8) dzielenia, kiedy dzielnik odpowiada mnożnikowi (§ 19, us. 1, 11). Gdy bowiém dzielnik odpowiada mnożnéj, t. j. gdy nam idzie o to, ile razy dzielnik mieści się w dzielnéj, to wtedy powiemy: liczba 8 jest od liczby $\frac{1}{2}$ większa 16 razy [2]).

---

[1]) Np. możemy podzielić 8 jabłek przez 4, albo przez 16, nie potrzebując dla wykonania działania i okazania ilorazu więcéj jabłek, niż dane. Gdy tymczasem nie możemy, mając tylko 8 jabłek, pokazać tyle jabłek, ile wypada z podzielenia 8 jabł. : $\frac{1}{2}$, t. j. tyle, ile trzeba, aby, po pomnożeniu ich przez $\frac{1}{2}$, otrzymać 8 jabłek.

[2]) Związek z obszerniejszym rozumowaniem wyrazu „mnożę" okazałby się wtedy np. w zadaniu 8 łok. : 16 łok. (O tym była już mowa w § 16, us. 1 b, 2).

DZIELENIE LICZB UŁAMKOWYCH.

3. Włączając całkowitą z ułamkiem w ułamek, a całkowitą przedstawiając w postaci ułamka z mianownikiem 1, moglibyśmy zawsze dzielenie dwu liczb ułamkowych sprowadzić do dzielenia ułamka przez ułamek. Aby jednak wprost przeprowadzić rozumowanie także wtedy, kiedy, czyto dzielna, czytéż dzielnik są liczbami całkowitymi, oddzielnie rozważymy trafić się tu mogące przypadki.

Właściwie w każdym z mogących tu być przypadków należałoby oddzielnie przeprowadzać dwa rozumowania ; raz przyjmując, że dzielnik odpowiada mnożnikowi, drugim razem przyjmując, że on odpowiada mnożnéj. Rozumowanie w drugim przypuszczeniu byłoby zawilsze, niż w piérwszym. Z uwagi więc, że liczba (oderwana), którą jako iloraz otrzymamy (bez względu na to, któremu czynnikowi iloczynu ona odpowiada), zawsze wypadnie ta sama, a tylko znaczenie jéj będzie różne, zależnie od tego, o co nam w tym dzieleniu idzie (por. także § 7, us. 6, 7), zadowalamy się rozumowaniem łatwiejszym [1]), t. j. przeprowadzonym w przypadku, gdy dzielnik odpowiada mnożnikowi.

a. Podzielić ułamek przez całkowitą, np. $\frac{3}{4} : 5$. Mamy tu znaléść liczbę (iloraz), która pomnożona przez dzielnik da dzielną; a więc iloraz pomnożony przez 5 (czyli 5 ilorazów) równa się $\frac{3}{4}$; sam zatym iloraz jest 5 razy mniejszy od $\frac{3}{4}$. Aby przeto otrzymać iloraz, trzeba ułamek $\frac{3}{4}$ zmniejszyć 5 razy, co uskutecznimy (§ 17, us. 6, a.), mnożąc przez 5 jego mianownik, $\frac{3}{4 \times 5}$. Jest więc

$$\frac{3}{4} : 5 = \frac{3}{4 \times 5}.$$

Aby ułamek podzielić przez całkowitą, należy mianownik pomnożyć przez całkowitą; otrzymana liczba jest mianownikiem ilorazu, licznikiem zaś licznik danego ułamka. Mówi się często krócéj: aby ułamek podzielić przez całkowitą należy jego mianownik przez tę całkowitą pomnożyć.

---

[1]) Przeprowadzimy owo rozumowanie na takim np. zadaniu: 8 łok. : $\frac{3}{5}$ łok. Wypadnie nam w ilorazie liczba oderwana, przez którą mnożąc $\frac{3}{5}$ ł., otrzymamy 8 ł. Więc: jeżeli $\frac{3}{5}$ ł. pomnożone przez iloraz = 8 łokciom, to $\frac{1}{5}$ ł. pomnożona przez iloraz = $\frac{8}{3}$ ł., a 1 łokieć pomnożony przez iloraz [czyli: iloraz (liczba oderwana) z dodaniem miana — łokieć (§ 6, us. 3)] = $\frac{8 \cdot 5}{3}$ łokcia; sam zatym iloraz = $\frac{8 \cdot 5}{3}$.

Przeprowadzając to rozumowanie, możemy jednocześnie ślad jego piśmiennie tak zaznaczać:

$\frac{3}{4} : 5 * = \frac{3}{4 \times 5} = \frac{3}{20}$.

5 ilorazów $= \frac{3}{4}$

iloraz $= \frac{3}{4 \times 5}$

* oznacza, że to, co jest po gwiazdce, piszemy dopiéro po ukończeniu rozumowania, które nas do tego doprowadziło.

Taksamo rozumowalibyśmy, gdyby było np. $\frac{23}{7} : 8$, lub np. $\frac{20}{27} : 5$.

Gdy jednak mamy np. $\frac{20}{27} : 5$, to zamiast tego, żeby dla zmniejszeszenia 5 razy ułamka $\frac{20}{27}$, mnożyć przez 5 jego mianownik $\left(\frac{20}{27 \cdot 5}\right)$, możemy (§ 17, us. 6 d.) jego licznik podzielić przez 5, przez co odrazu iloraz otrzymamy w postaci $\frac{20 : 5}{27}$ (do któréj doszlibyśmy z postaci $\frac{20}{27 \cdot 5}$, skracając ją przez 5). Więc: *jeżeli mamy podzielić ułamek przez całkowitą, a licznik ułamka jest przez tę całkowitą podzielny, to dzielimy jego licznik przez tę całkowitą.*

b. Całkowitą podzielić przez ułamek, np. $6 : \frac{5}{8}$. Ponieważ iloraz, pomnożony przez $\frac{5}{8}$, wyda liczbę 6; więc $\frac{5}{8}$ ilorazu jest liczbą 6. Gdy 5-ósmych ilorazu jest liczbą 6, to 1-ósma ilorazu, jako liczba 5 razy mniejsza od 6-u, może być przedstawiona (§ 17, us. 5) przez $\frac{6}{5}$. Jeżeli zaś 8-a część ilorazu jest $\frac{6}{5}$, to sam iloraz jest liczbą 8 razy większą od $\frac{6}{5}$; aby więc mieć iloraz, należy $\frac{6}{5}$ powiększyć 8 razy, t. j. (§ 17, us. 6 c.) licznik tego ułamka przez 8 pomnożyć, $\frac{6 \times 8}{5}$. Jest zatym

$$6 : \frac{5}{8} = \frac{6 \times 8}{5}.$$

Aby całkowitą podzielić przez ułamek, należy całkowitą pomnożyć przez mianownik; otrzymana stąd liczba jest licznikiem ilorazu, mianownikiem zaś licznik ułamka danego.

Ślad tego rozumowania tak zaznaczymy

$6 : \frac{5}{8} * = \frac{6 \times 8}{5} = \frac{48}{5} = 9\frac{3}{5}$.

$\frac{5}{8}$ ilorazu $= 6$

$\frac{1}{8}$ ilorazu $= \frac{6}{5}$

iloraz $= \frac{6 \times 8}{5}$

* oznacza tu i daléj toż samo, co poprzednio.

Taksamo rozumowalibyśmy, gdybyśmy mieli np. $8 : \frac{24}{5}$, lub np. $1 : \frac{3}{7}$.

c. Ułamek podzielić przez ułamek, np. $\frac{3}{4} : \frac{5}{8}$. Tu iloraz, pomnożony przez $\frac{5}{8}$, wyda liczbę $\frac{3}{4}$; więc $\frac{5}{8}$ ilorazu jest liczbą $\frac{3}{4}$. Gdy $\frac{5}{8}$ ilorazu jest liczbą $\frac{3}{4}$, to $\frac{1}{8}$ ilorazu jest liczbą 5 razy mniejszą od $\frac{3}{4}$, więc, aby mieć $\frac{1}{8}$ ilorazu, należy ułamek $\frac{3}{4}$ zmniejszyć 5 razy, t. j. jego mianownik przez 5 pomnożyć, $\frac{3}{4 \times 5}$. Jeżeli zaś $\frac{1}{8}$ ilorazu jest liczbą $\frac{3}{4 \times 5}$, to iloraz jest liczbą 8 razy większą; więc, aby mieć iloraz, należy ułamek $\frac{3}{4 \times 5}$ powiększyć 8 razy, t. j. jego licznik przez 8 pomnożyć, $\frac{3 \times 8}{4 \times 5}$. Jest zatym

$$\frac{3}{4} : \frac{5}{8} = \frac{3 \times 8}{4 \times 5}.$$

Aby ułamek podzielić przez ułamek, należy za licznik ilorazu wziąć iloczyn licznika dzielnéj przez mianownik dzielnika, a za mianownik iloczyn mianownika dzielnéj przez licznik dzielnika.

Ślad tego rozumowania tak zaznaczymy:

$$\frac{3}{4} : \frac{5}{8} * = \frac{3 \times 8}{4 \times 5} = \frac{3 \times 2}{5} = \frac{6}{5} = 1\frac{1}{5}.$$

$\frac{5}{8}$ ilorazu $= \frac{3}{4}$

$\frac{1}{8}$ ilorazu $= \frac{3}{4 \times 5}$

iloraz $= \frac{3 \times 8}{4 \times 5}$

Taksamo rozumowalibyśmy, gdybyśmy mieli np. $\frac{17}{3} : \frac{3}{8}$, $\frac{6}{7} : \frac{5}{3}$, $\frac{5}{1} : \frac{3}{4}$ i t. d.

Na mocy tego prawidła, gdy mamy jaką liczbę napisaną w postaci ułamka podzielić przez ułamek, to odrazu w liczniku owéj liczby piszemy jako czynnik mianownik dzielnika, a w jéj mianowniku piszemy jako czynnik licznik dzielnika. Np.

$$\frac{6 \cdot 3}{5 \cdot 7 \cdot 13} : \frac{11}{9} = \frac{6 \cdot 3 \cdot 9}{5 \cdot 7 \cdot 13 \cdot 11}.$$

Zauważymy jeszcze, że gdy mianowniki dzielnéj i dzielnika są jednakowe, np. $\frac{3}{7} : \frac{4}{7}$, to skracając ułamek, który otrzymać mamy w ilorazie, $\frac{3 \cdot 7}{4 \cdot 7}$ przez 7 (t. j. przez spólny mianownik dzielnéj i dzielnika), możemy odrazu jako iloraz danego tu dzielenia napisać iloraz z podzielenia liczników, t. j.

$$\frac{3}{7} : \frac{4}{7} = \frac{3}{4}.$$

Również znajdziemy, że np.

$$\frac{3}{5} : \frac{3}{7} = \frac{7}{5}.$$

d. *Wrazie, gdy albo dzielna, albo dzielnik, albotéż dzielna i dzielnik jednocześnie są całkowitymi z ułamkami, włączamy je w ułamki,* przez co sprowadzamy rzecz do jednego z poprzedzających przypadków.

4. Rozumowanie, przeprowadzone w poprzedzającym ustępie, możemy zastąpić nieco odmiennym. Mianowicie:

a. $\frac{3}{4} : 5$. Ponieważ 5 ilorazów jest liczbą $\frac{3}{4}$, to iloraz szukany jest piątą częścią $\left(\frac{1}{5}\right)$ liczby $\frac{3}{4}$; lecz $\frac{1}{5}$ liczby $\frac{3}{4}$ (§ 19, us. 8) jest $\frac{3}{4} \times \frac{1}{5}$; więc iloraz z podzielenia $\frac{3}{4}$ przez 5 może być przedstawiony przez iloczyn z pomnożenia $\frac{3}{4}$ (t. j. dzielnéj) przez $\frac{1}{5}$, t. j. przez odwrotność (§ 19, us. 10) liczby 5 (dzielnika). Zaznaczymy to rozumowanie, pisząc

$$\frac{3}{4} : 5 * = \frac{3}{4} \times \frac{1}{5}.$$

$$5 \text{ ilorazów} = \frac{3}{4}$$

$$\text{iloraz} = \frac{1}{5} \text{ liczby } \frac{3}{4} = \frac{3}{4} \times \frac{1}{5}$$

b. $6 : \frac{5}{8}$. Gdy $\frac{5}{8}$ ilorazu jest liczbą 6, to $\frac{1}{8}$ ilorazu jest $\frac{1}{5}$ liczby 6, a iloraz jest: 8 razy $\frac{1}{5}$ liczby 6, czyli: $\frac{8}{5}$ liczby 6, t. j. $6 \times \frac{8}{5}$; może zatym on być przedstawiony przez iloczyn dzielnéj 6 przez odwrotność dzielnika $\frac{5}{8}$. Zaznaczymy to rozumowanie, pisząc

$$6 : \frac{5}{8} * = 6 \times \frac{8}{5}.$$

$$\frac{5}{8} \text{ ilorazu} = 6$$

$$\frac{1}{8} \text{ ilorazu} = \frac{1}{5} \text{ liczby } 6$$

$$\text{iloraz} = \frac{8}{5} \text{ liczby } 6 = 6 \times \frac{8}{5}$$

c. $\frac{3}{4} : \frac{5}{8}$. Gdy $\frac{5}{8}$ ilorazu jest liczbą $\frac{3}{4}$, to $\frac{1}{8}$ ilorazu jest $\frac{1}{5}$ liczby $\frac{3}{4}$, a iloraz jest: 8 razy $\frac{1}{5}$ liczby $\frac{3}{4}$, czyli: $\frac{8}{5}$ liczby $\frac{3}{4}$, t. j. $\frac{3}{4} \times \frac{8}{5}$, a więc iloczynem dzielnéj $\frac{3}{4}$ przez odwrotność dzielnika $\frac{5}{8}$. Ślad tego rozumowania możemy tak zaznaczać:

$$\frac{3}{4} : \frac{5}{8} * = \frac{3}{4} \times \frac{8}{5}.$$

$\frac{5}{8}$ ilorazu $= \frac{3}{4}$

$\frac{1}{8}$ ilorazu $= \frac{1}{5}$ liczby $\frac{3}{4}$;

iloraz $= \frac{8}{5}$ liczby $\frac{3}{4} = \frac{3}{4} \times \frac{8}{5}$

Zauważymy jeszcze, że gdy mamy przez siebie podzielić dwie liczby całkowite, np. 40 : 5, to podobnie możemy rozumować: 5 ilorazów = 40, więc iloraz jest $\frac{1}{5}$ liczby 40, czyli $40 \times \frac{1}{5}$, t. j. jest iloczynem dzielnéj przez odwrotność dzielnika.

Z powyższego wypada, że ogólnie:

Iloraz może być przedstawiony zapomocą iloczynu dzielnéj przez odwrotność dzielnika.

Dlategoto można w przypadkach b. i c. ustępu poprzedzającego tak się wyrażać: aby całkowitą podzielić przez ułamek, można całkowitą pomnożyć przez odwrotność ułamka dzielnika; aby ułamek podzielić przez ułamek, można ułamek dzielnéj pomnożyć przez odwrotność ułamka dzielnika.

Nawzajem jeżeli mamy np. iloczyn $\frac{3}{20} \times \frac{11}{7}$, to możemy go zastąpić przez iloraz $\frac{3}{20} : \frac{7}{11}$.

Z tego jeszcze wypada, że *dzieląc jakąkolwiek liczbę przez ułamek właściwy, zwiększamy ją*, wychodzi to bowiem na toż samo, co gdybyśmy ją pomnożyli przez ułamek niewłaściwy (§ 18, us. 9).

UŁAMKI O UŁAMKOWYCH LICZNIKACH I MIANOWNIKACH.

5. Jak wiemy (§ 17, us. 5), możemy dzielenie oznaczać, pisząc ułamek, w którego liczniku umieścimy dzielną, w mianowniku zaś dzielnik. Taksamo można postępować wrazie, gdy dzielna, lub dzielnik, albo obie te liczby jednocześnie są liczbami ułamkowymi; otrzymamy w ten sposób ułamek o ułamkowym liczniku albo mianowniku. Taki jednak ułamek, stosując prawidła na dzielenie ułamków, możemy sprowadzić do ułamka o liczniku i mianowniku całkowitym. Np.

$$\frac{\frac{3}{4}}{5} = \frac{3}{4} : 5 = \frac{3}{4 \cdot 5}; \quad \frac{5}{\frac{3}{4}} = 5 : \frac{3}{4} = \frac{5 \cdot 4}{3}; \quad \frac{\frac{3}{4}}{\frac{5}{7}} = \frac{3}{4} : \frac{5}{7} = \frac{3 \cdot 7}{4 \cdot 5}.$$

Podobnie np.

$$\frac{2\frac{1}{2}}{\frac{3}{4}\times 1\frac{4}{7}}=\frac{\frac{5}{2}}{\frac{3}{4}\times\frac{11}{7}}=\frac{5\cdot 4\cdot 7}{2\cdot 3\cdot 11};\qquad \frac{5\times\frac{3}{2}}{7:\frac{11}{2}}=\frac{5\times\frac{3}{2}}{7\times\frac{2}{11}}=\frac{5\cdot 3\cdot 11}{2\cdot 7\cdot 2}$$

Ułamek, w którego liczniku lub mianowniku jest liczba ułamkowa, może być sprowadzony do ułamka, którego licznik i mianownik są liczbami całkowitymi.

W us. 12-ym § 17-go rozwinęliśmy ułamek zwyczajny na ułamek ciągły. Na mocy powyższego, możemy teraz wykonać zadanie odwrotne. Gdy mamy np. ułamek ciągły

$$\cfrac{1}{32+\cfrac{1}{2+\cfrac{1}{5+\frac{1}{3}}}},$$

to kolejno

$$\frac{1}{5+\frac{1}{3}}=\frac{1}{\frac{16}{3}}=\frac{3}{16},\quad \frac{1}{2+\cfrac{1}{5+\frac{1}{3}}}=\frac{1}{2+\frac{3}{16}}=\frac{1}{\frac{35}{16}}=\frac{16}{35},$$

$$\frac{1}{32+\cfrac{1}{2+\cfrac{1}{5+\frac{1}{3}}}}=\frac{1}{32+\frac{16}{35}}=\frac{1}{\frac{1136}{35}}=\frac{35}{1136}.$$

WŁASNOŚCI ILORAZU. WŁASNOŚCI UŁAMKA.

6. W us. 7-ym § 17-go widzieliśmy, że własności, wypowiedziane w us. 15-ym §-u 7-go mają miejsce także w przypadku, gdy dzielna nie jest podzielna przez dzielnik, lub jest od niego mniejsza. W obu jednak przytoczonych miejscach mówiliśmy o powiększaniu lub zmniejszaniu całkowitą ilość razy czyto całkowitéj dzielnéj, czytéż całkowitego dzielnika, t. j. o mnożeniu lub dzieleniu ich przez liczbę całkowitą, a nadto dzieliliśmy dzielną lub dzielnik tylko przez taką liczbę, przez którą one były podzielne.

Chcemy teraz zbadać, jak się zmienia iloraz, gdy dzielną lub dzielnik, jakimikolwiek są one liczbami: całkowitymi, czy ułamkowymi, mnożymy lub dzielimy przez jakąkolwiek, całkowitą lub ułamkową, liczbę; gdy zaś całkowitą można przedstawić w postaci ułamka, więc ograniczymy się do liczb ułamkowych, przez co nie zmniejszymy ogólności wypadków.

Jeżeli mamy dzielenie

$$\frac{3}{8}:\frac{5}{2}=\frac{3}{20},$$

to (§ 19, us. 5, 6, 3; § 20 us. 4)

$$\left(\frac{3}{8}\times\frac{7}{11}\right):\frac{5}{2}=\left(\frac{3}{8}\times\frac{7}{11}\right)\times\frac{2}{5}=\frac{3}{8}\times\frac{7}{11}\times\frac{2}{5}=\left(\frac{3}{8}\times\frac{2}{5}\right)\times\frac{7}{11}=\frac{3}{20}\times\frac{7}{11};$$

$$\left(\frac{3}{8}:\frac{7}{11}\right):\frac{5}{2}=\left(\frac{3}{8}\times\frac{11}{7}\right)\times\frac{2}{5}=\frac{3}{8}\times\frac{11}{7}\times\frac{2}{5}=\left(\frac{3}{8}\times\frac{2}{5}\right)\times\frac{11}{7}=\frac{3}{20}\times\frac{11}{7}=$$

$$=\frac{3}{20}:\frac{7}{11}.$$ A więc ogólnie:

a. *Jeżeli dzielną mnożymy lub dzielimy przez jakąkolwiek, czyto całkowitą, czytéż ułamkową liczbę, nie zmieniając dzielnika, to tymsamym iloraz odpowiednio mnożymy lub dzielimy przez tęż samę liczbę.* —

$$\frac{3}{8}:\left(\frac{5}{2}\times\frac{7}{11}\right)=\frac{3}{8}:\frac{(5\times7)}{(2\times11)}=\frac{3}{8}\times\frac{2\times11}{5\times7}=\frac{3}{8}\times\frac{2}{5}\times\frac{11}{7}=\left(\frac{3}{8}\times\frac{2}{5}\right)\times\frac{11}{7}=$$

$$=\frac{3}{20}:\frac{7}{11};$$

$$\frac{3}{8}:\left(\frac{5}{2}:\frac{7}{11}\right)=\frac{3}{8}:\frac{(5\times11)}{(2\times7)}=\frac{3}{8}\times\frac{2\times7}{5\times11}=\frac{3}{8}\times\frac{2}{5}\times\frac{7}{11}=\left(\frac{3}{8}\times\frac{2}{5}\right)\times\frac{7}{11}=$$

$$=\frac{3}{20}\times\frac{7}{11}.$$ A zatym:

b. *Jeżeli dzielnéj nie zmieniamy, a dzielnik mnożymy lub dzielimy przez jakąkolwiek, czyto całkowitą, czytéż ułamkową liczbę, to tymsamym iloraz odpowiednio dzielimy lub mnożymy przez tęż samę liczbę.* —

Z zestawienia tych własności wypada, że

c. *Jeżeli dzielną i dzielnik albo jednocześnie mnożymy, albo jednocześnie dzielimy przez jakąkolwiek, czyto całkowitą, czytéż ułamkową liczbę, to iloraz się nie zmienia.*

7. Gdy dzielna i dzielnik są tu, w szczególnym przypadku, całkowite, to możemy je uważać (§ 17, us. 5) za licznik i mianownik ułamka, iloraz zaś przedstawia wartość ułamka, t. j. liczbę, którą jest ten ułamek. Moglibyśmy więc z powyższego wnieść o zmianie ułamka wskutek pomnożenia lub podzielenia jego licznika albo mianownika przez jakąkolwiek, czyto całkowitą, czytéż ułamkową liczbę. Wyprowadzimy to jednak wprost. Weźmy np. ułamek $\frac{3}{4}$. Wtedy (§ 19, us. 5, 6, 3; § 20, us. 4, 5):

$$\frac{3\times\frac{5}{7}}{4}=\left(3\times\frac{5}{7}\right):4=\left(3\times\frac{5}{7}\right)\times\frac{1}{4}=3\times\frac{5}{7}\times\frac{1}{4}=\left(3\times\frac{1}{4}\right)\times\frac{5}{7}=$$

$$=\frac{3}{4}\times\frac{5}{7};$$

$$\frac{3:\frac{5}{7}}{4}=\frac{3\times\frac{7}{5}}{4}=\left(3\times\frac{7}{5}\right)\times\frac{1}{4}=3\times\frac{7}{5}\times\frac{1}{4}=\left(3\times\frac{1}{4}\right)\times\frac{7}{5}=\frac{3}{4}\times\frac{7}{5}=$$

$$=\frac{3}{4}:\frac{5}{7}.$$ A więc ogólnie:

a. *Jeżeli, nie zmieniając mianownika, mnożymy lub dzielimy jego licznik przez jakąkolwiek, czyto całkowitą, czytéż ułamkową liczbę, to wskutek tego ułamek zostaje przez tęż liczbę odpowiednio pomnożony lub podzielony.* —

$$\frac{3}{4\times\frac{7}{5}}=3:\left(4\times\frac{5}{7}\right)=3:\frac{4\times5}{7}=\frac{3\times7}{4\times5}=\frac{3}{4}\times\frac{7}{5}=\frac{3}{4}:\frac{5}{7};$$

$$\frac{3}{4:\frac{5}{7}}=3:\left(4:\frac{5}{7}\right)=3:\frac{4\times7}{5}=\frac{3\times5}{4\times7}=\frac{3}{4}\times\frac{5}{7}.$$ A zatym:

b. *Jeżeli, nie zmieniając licznika ułamka, mnożymy lub dzielimy jego mianownik przez jakąkolwiek, czyto całkowitą, czytéż ułamkową liczbę, to wskutek tego ułamek zostaje przez tęż liczbę odpowiednio podzielony lub pomnożony.*

c. *Jeżeli licznik i mianownik ułamka albo jednocześnie mnożymy, albo jednocześnie dzielimy przez tęż samę jakąkolwiek, czyto całkowitą, czytéż ułamkową liczbę, to wartość ułamka się nie zmienia.*

WŁASNOŚCI ILOCZYNU.

8. Możemy podobnie uogólnić własności, wyprowadzone w § 7, us. 13. Mamy iloczyn kilku czynników podzielić przez pewną liczbę; np.

$$\left(\frac{4}{5}\times8\times\frac{7}{11}\times\frac{13}{15}\right):\frac{3}{4}=\frac{4}{5}\times8\times\frac{7}{11}\times\frac{13}{15}\times\frac{4}{3}=\frac{4}{5}\times8\times\left(\frac{7}{11}\times\frac{4}{3}\right)\times\frac{13}{15}=$$
$$=\frac{4}{5}\times8\times\left(\frac{7}{11}:\frac{3}{4}\right)\times\frac{13}{15}.$$

I nawzajem, z ostatniego wyrażenia możemy przejść do piérwszego.

Aby iloczyn podzielić przez jakąkolwiek, czyto całkowitą, czytéż ułamkową liczbę, można którykolwiek jego czynnik przez tę liczbę podzielić; nawzajem: *jeżeli czynnik iloczynu podzielimy przez jakąkolwiek, czyto całkowitą czytéż ułamkową liczbę, to wskutek tego iloczyn zostaje przez tęż liczbę podzielony.*

Łącząc te własności iloczynu z wypowiedzianymi w us. 12-ym §-u 6-go, a uogólnionymi w us. 6-ym §-u 19-go, możemy powiedzieć: *jeżeli jeden czynnik iloczynu mnożymy przez jakąkolwiek, czyto całkowitą, czytéż ułamkową liczbę, a inny jego czynnik jednocześnie przez tęż samę liczbę dzielimy, to iloczyn się nie zmienia.*

DZIELENIE LICZB MIANOWANYCH.

9. Przerobimy tu kilka zadań na dzielenie [1]) liczb mianowanych.

a. Za $2\frac{3}{4}$ metra materyi jedwabnéj zapłacono $56\frac{5}{6}$ złp.; po czemu

[1]) Por. odsyłacz do us. 11-go § 19-go.

płacono metr téj materyi? — Metr kosztował $2\frac{3}{4}$ raza mniéj, niż $56\frac{5}{6}$ złp. Należy więc $56\frac{5}{6}$ zł. podzielić przez $2\frac{3}{4}$,

$$56\frac{5}{6} \text{ zł.} : 2\frac{3}{4} = \frac{341}{6} \text{ zł.} : \frac{11}{4} = \frac{341 \cdot 4}{6 \cdot 11} \text{ zł.} = \frac{31 \cdot 2}{3} \text{ zł.} = 30\frac{2}{3} \text{ zł.}$$

Odp. Metr téj materyi kosztuje $30\frac{2}{3}$ zł.

b. Za $\frac{3}{4}$ metra sukna zapłacono $8\frac{2}{5}$ złp.; ile zapłaconoby za metr tego sukna? — $\frac{3}{4}$ metra kosztuje $8\frac{2}{5}$ zł. czyli: $\frac{3}{4}$ tego (ilości złotych), co należy zapłacić za metr, jest $8\frac{2}{5}$ zł. Gdy więc $\frac{3}{4}$ szukanéj liczby jest $8\frac{2}{5}$ zł., t. j. gdy szukana liczba pomnożona przez $\frac{3}{4}$ równa się $8\frac{2}{5}$ zł., to, aby ową liczbę otrzymać, należy $8\frac{2}{5}$ zł. podzielić przez $\frac{3}{4}$,

$$8\frac{2}{5} \text{ zł.} : \frac{3}{4} = \frac{42}{5} \text{ zł.} \times \frac{4}{3} = \frac{42 \cdot 4}{5 \cdot 3} \text{ zł.} = \frac{56}{5} \text{ zł.} = 11\frac{1}{5} \text{ zł.}$$

Odp. Za metr tego sukna zapłaconoby $11\frac{1}{5}$ zł.

c. Za złoty kupiono $29\frac{1}{3}$ metra sznura; ileby wypadło zapłacić za 110 *m* takiego sznura? — Wypadłoby zapłacić tyle złotych, ile razy 110 *m* jest większe od $29\frac{1}{3}$ *m*. Należy więc 110 *m* podzielić przez $29\frac{1}{3}$ *m*,

$$110 \text{ } m : 29\frac{1}{3} \text{ } m = 110 \text{ } m : \frac{88}{3} \text{ } m = \frac{110 \cdot 3}{88} = \frac{15}{4} = 3\frac{3}{4}.$$

Znaleźliśmy, że 110 *m* jest większe od $29\frac{1}{3}$ *m* $3\frac{3}{4}$ raza. Że zaś powiedzieliśmy, że za 110 *m* wypadnie zapłacić tyle złotych, ile razy 110 *m* jest większe od $29\frac{1}{3}$ *m*, zatym: wypadnie zapłacić $3\frac{3}{4}$ zł.

d. Za 110 metrów sznura zapłacono złoty; ile jest warte $29\frac{1}{3}$ *m* tego sznura? — $29\frac{1}{3}$ *m* tego sznura jest warte taką część złotego, jaką częścią 110-u metrów jest $29\frac{1}{3}$ *m*. Aby się zaś tego dowiedzieć, należy $29\frac{1}{3}$ *m* podzielić przez 110 *m*.

$$29\frac{1}{3} \text{ } m : 110 \text{ } m = \frac{88}{3} \text{ } m : 110 \text{ } m = \frac{88}{3 \cdot 110} = \frac{4}{15}.$$

Odp. Wypadnie zapłacić $\frac{4}{15}$ zł.

e. $76\frac{1}{2}$ minuty wyrazić w częściach godziny. — Ponieważ godzina ma 60 m., więc w $76\frac{1}{2}$ m. jest tyle godzin, ile razy $76\frac{1}{2}$ m. jest większe od 60 m.; trzeba więc $76\frac{1}{2}$ m. podzielić przez 60 m.,

$76\frac{1}{2}$ m. : 60 m. $= \frac{153}{2}$ m. : 60 m. $= \frac{153}{120} = \frac{51}{40} = 1\frac{11}{40}$; $1\frac{11}{40}$ g. [1])

Odp. $76\frac{1}{2}$ m. $= 1\frac{11}{40}$ g.

f. Możemy liczbę wieloraką wyrazić jako liczbę mianowaną prostą nietylko przy pomocy najmniejszéj z jednostek, wchodzących w wyrażenie danéj liczby (por. § 9, us. 1, 2). Np.

9 morgów + 180 prętów kw. wyrazić w częściach włóki. —

180 pr. kw. : 300 pr. kw. $= \frac{180}{300} = \frac{3}{5}$; 180 pr. kw. $= \frac{3}{5}$ morga;

$9\frac{3}{5}$ m. : 30 m. $= \frac{48}{5}$ m. : 30 m. $= \frac{48}{5 \cdot 60} = \frac{8}{25}$; $9\frac{3}{5}$ m. $= \frac{8}{25}$ włóki

Odp. 9 morgów + 180 prętów kw. $= \frac{8}{25}$ włóki.

g. Średnią temperaturę dnia nazywa się zwykle średnią arytmetyczną (§ 7, us. 25) trzech obserwacyi temperatury o godzinie 6-téj rano 2-éj po południu i 10 wieczorem. Jaka była średnia temperatura dnia w którym o 6-éj rano było 6^0 o drugiéj 10^0 a o 10-éj wieczór 7^0 ciepła?

Średnia temperatura dnia tego jest: $\frac{6^0+10^0+7^0}{3} = 7\frac{2}{3}{}^0$ ciepła.

---

[1]) Możemy także tak rozumować: minuta jest $\frac{1}{60}$ g., zatym $76\frac{1}{2}$ m. $= \frac{1}{60}$ g. $\times 76\frac{1}{2}$ i t. d.

ROZDZIAŁ VII.

LICZBY DZIESIĘTNE.

§ 21. O LICZBACH DZIESIĘTNYCH WOGÓLE.

OKREŚLENIE LICZBY DZIESIĘTNÉJ I UŁAMKA DZIESIĘTNEGO.

1. Jeżeli pewną długość mierzymy np. łokciem [1]) i znajdujemy, że w niéj łokieć mieści się dokładnie np.

2 037

razy, to ta liczba (§ 1, u.. 2) składa się z takich części: 2-u tysięcy, 3-ch dziesiątków i 7-u jedności. W téj liczbie obok tysięcy byłyby z prawéj strony oznaczone części liczby 10 razy mniejsze, t. j. setki, gdyby one były w naszéj liczbie; a że ich niéma, przeto na miejscu, które przez nie byłoby zajęte, jest napisane zero (§ 3, us. 11). Obok zera, wskazującego tu, że w naszéj liczbie niéma setek, z prawéj jego strony są oznaczone części liczby 10 razy mniejsze od setek, t. j, dziesiątki. Obok dziesiątków, z prawéj ich strony, są oznaczone części liczby 10 razy mniejsze od dziesiątków, t. j. jedności. Czyli wogóle, obok pewnych części liczby oznaczamy z prawéj ich strony części liczby 10 razy od nich mniejsze.

Przypuśćmy, że w mierzonéj długości łokieć całkowicie mieści się 2 037 razy, i że pozostaje jeszcze jéj część, mniejsza od łokcia, w któréj dziesiąta część łokcia mieści się np. 9 razy. Wtedy, z uwagi, żeśmy dotąd obok pewnych części liczby z prawéj strony wciąż oznaczali części liczby 10 razy mniejsze, moglibyśmy, stosując tę samę zasadę, te 9 części dziesiątych jedności, jako części liczby 10 razy mniejsze od jedności, napisać obok jedności, z prawéj ich strony. Byłoby więc [2]):

2 0379.

---

[1]) Pozornie przy wprowadzaniu liczb dziesiętnych, wygodniejszą wydawałoby się rzeczą użycie miar metrycznych, tak np. przyjmując metr za jednostkę, możnaby decymetry, centymetry i t d. wypisywać jako odpowiednio dziesiąte, setne i t. d. części metra. W takim jednak razie uczniowie późniéj odwykać muszą od łączenia pojęcia części dziesiętnych przyjętéj jednostki z pojęciem nazwanych jéj podziałów. Owo więc ułatwienie może być ze względów praktycznych stosowane w szkole ludowéj, ale w nauczaniu średnim nie jest ono pożądane.

[2]) W tym ustępie i następującym, a niekiedy i w dalszych, po liczbach dziesiętnych niema znaków przestankowych.

Nie możemy jednak téj liczby tak napisanéj pozostawić: możnaby bowiém 9 dziesiątych jedności wziąć za 9 jedności, 7 jedności za 7 dziesiątków i t. d. Trzeba oznaczyć, że cyfra 9 nie przedstawia tu jedności, ale dziesiąte jéj części (gdy takie oznaczenie wprowadzimy, t. j. gdy wyraźnie wskażemy, że cyfra 9 oznacza dziesiąte części jedności, to tymsamym cyfra 7 przedstawiać będzie jedności, cyfra 3 dziesiątki i t. d). W tym celu po cyfrze, przedstawiającéj jedności, t. j., jak tu po cyfrze 7, napiszemy przecinek [1]), tak iż w liczbie

2 037,9

dziesiąte części jedności, oznaczone obok jedności z prawéj ich strony, są od jedności oddzielone przecinkiem. Wskutek tego, licząc miejsca od przecinka w lewą stronę, mamy, jak poprzednio, jedności na miejscu piérwszym, dziesiątki na drugim i t. d.

Podobnie, jeżeliby mierzona długość była taka, iż po odmierzeniu 2 037-u łokci i 9-u dziesiątych części łokcia, pozostała jeszcze jéj część mniejsza od jednéj dziesiątéj części łokcia, w któréjby część łokcia, 10 razy mniejsza od dziesiątéj jego części, t. j. setna część łokcia, mieściła się np. 5 razy, to, postępując według téj saméj zasady, możemy te 5 setnych, jako części 10 razy mniejsze od dziesiątych części jedności, napisać obok dziesiątych części z prawéj strony, tak iż będzie

2 037,95.

Mamy teraz już po przecinku dwa miejsca zajęte: na miejscu piérwszym po przecinku są oznaczone dziesiąte części jedności, a na miejscu drugim po przecinku części setne jedności.

Gdybyśmy nadto w podobnyż sposób mieli do oznaczenia części 10 razy mniejsze od setnych części jedności, t. j. tysiączne części jedności, i było ich np. 4, to według téj saméj zasady napisalibyśmy

2 037,954

tak iż tysiączne części jedności znalazły się na miejscu trzecim po przecinku.

Gdyby jeszcze były do oznaczenia części 10 razy mniejsze od tysiącznych części jedności, t. j. dziesięciotysiączne części jedności, i było ich np. 8, to podobnież oznaczymy je na miejscu czwartym po przecinku, tak iż miéć będziemy

2 037,9548

I t. d. Stotysiączne więc części jedności znajdą się na miejscu

---

[1]) Najwięcéj dla takiego oznaczania jest rozpowszechnione używanie przecinka, chociaż zdarza się dość często, że po jednościach piszą albo kropkę w dolnéj części wiérsza, albo kropkę w górnéj części wiérsza, albo zostawiają tylko po jednościach widoczny odstęp pusty, albo nakoniec wszystkie cyfry po jednościach z prawéj strony piszą znacznie mniejsze.

piątym po przecinku, milionowe na miejscu szóstym po przecinku i t. d.

Widzimy z tego, że w ten sposób, stosując tę samę zasadę, według któréj piszemy liczby całkowite, możemy przedstawiać części liczby mniejsze od jedności.

Ponieważ zaś podstawą naszego sposobu pisania liczb całkowitych jest liczba dziesięć, więc taż liczba dziesięć jest podstawą takiego pisania części liczby mniejszych od jedności. Dlatego te części (dziesiąte jedności, dziesiąte dziesiątych jedności czyli setne, dziesiąte setnych czyli tysiączne, ...) w taki sposób wypisane, nazywają się częściami dziesiętnymi, a liczba, w którą wchodzą części dziesiętne, liczbą dziesiętną [1]). Powiemy więc:

Liczbą dziesiętną nazywamy liczbę, w któréj części mniejsze od jedności są napisane według téj saméj zasady, według któréj piszemy liczby całkowite.

Cyfry, znajdujące się w liczbie dziesiętnéj po przecinku, nazywamy cyframi dziesiętnymi téj liczby.

2. Jeżeli, mając już

2 037,95

chcemy jeszcze w téj liczbie oznaczyć 8 dziesięciotysiącznych, to cyfrę 8 wypada, jako mającą przedstawiać dziesięciotysiączne części, napisać na miejscu czwartym po przecinku. Dwa miejsca po przecinku są już zajęte, aby więc móc napisać 8 na miejscu czwartym, trzeba zająć miejsce trzecie, na którym bywają oznaczane części tysiączne, cyfrą zero, podobnie, jak to robiliśmy w liczbach całkowitych (§ 3, us. 9, 10, 11). Napiszemy więc

2 037,9508.

Taksamo, jeżeli liczba składa się z samych tylko części dziesiętnych, np. z części: 9-u dziesiątych, 5-u setnych i 8-u dziesięciotysiącznych, i chcemy tę liczbę napisać jako dziesiętną, to wypadnie 9 napisać na miejscu piérwszym po przecinku, 5 na drugim, a 8 na czwartym. Przecinek zaś piszemy po cyfrze, oznaczającéj jedności (us. 1), dla oddzielenia jedności od części mniejszych od jedności. Gdy więc w naszéj liczbie niéma jedności, po których należy ów przecinek umieścić, napiszemy przed przecinkiem, aby zająć miejsce jedności, cyfrę zero. W ten sposób tak napiszemy naszę liczbę dziesiętną:

0,9508

---

[1]) Może ze względu na to, że mówimy: systemat dziesiątkowy pisania liczb, byłoby odpowiedniéj mówić: liczba dziesiątkowa, ale dziś nie czas już zmieniać tego powszechnie przyjętego wyrażenia.

Podobnie, gdy mamy do napisania, jako dziesiętną, liczbę: 8 dziesięciotysiącznych, to należy 8 umieścić na czwartym miejscu po przecinku, a że niéma części liczby do oznaczenia na miejscach piérwszym, drugim i trzecim po przecinku, przeto na tych miejscach, aby je zająć, piszemy cyfry zero. Liczbę więc 8 dziesięciotysiącznych tak przedstawimy jako dziesiętną:

0,0008

Z tego widzimy, że to, cośmy w us. 11-ym § 3-go powiedzieli o cyfrze zero w liczbach całkowitych, stosuje się wprost do liczb dziesiętnych.

3. Mieliśmy tu liczby dziesiętne

0,9508 i 0,0008

mniejsze od jedności. Liczby dziesiętne mniejsze od jedności nazywają się u ł a m k a m i d z i e s i ę t n y m i. Możemy więc powiedzieć albo

Ułamkiem dziesiętnym nazywamy liczbę dziesiętną mniejszą od jedności, albo

Ułamkiem dziesiętnym nazywamy liczbę mniejszą od jedności, napisaną według téj saméj zasady, według któréj piszemy liczby całkowite.

4. Gdy mamy np. liczbę dziesiętną 682 037,9508, to wszystkie „części dziesiętne" (us. 1) téj liczby przedstawia ułamek 0,9508; prócz tych „części" dziesiętnych, w téj liczbie jest 682 037 jedności, czyli, jak zwykle mówimy, 682 037 „całkowitych" [1]), tak iż

682 037,9508 = 682 037 + 0,9508.

Podobnie np. w liczbie 682,00012 mamy 682-ie całkowite, a jéj części dziesiętne sa przedstawione przez ułamek 0,00012, tak iż

682,00012 = 682 + 0,00012.

Jeżeli zatym liczba dziesiętna jest większa od jedności, to ją można wyrazić jako sumę liczby całkowitéj i ułamka dziesiętnego.

Liczbę całkowitą, która pozostaje z liczby dziesiętnéj po oddzieleniu ułamka dziesiętnego, nazywamy także c z ę ś c i ą c a ł k o w i t ą téj liczby dziesiętnéj. Tak np. częścią całkowitą liczby 682,00012 są: 682 całkowite.

CZYTANIE LICZB DZIESIĘTNYCH.

5. Liczbę np.

64,9003

możemy tak przeczytać: „64 całkowite, 9 dziesiątych i 3 dziesięciotysiączne.

Z uwagi jednak, że w liczbie dziesiętnéj, części liczby oznaczone na jakimkolwiek miejscu są 10 razy większe od części liczby oznaczonych

---

1) Nie można jednak mówić: „całości", bo tu c a ł o ś c i ą jest liczba 682 037,9508.

obok z prawéj strony, a tymsamym sto razy większe od części oznaczonych z prawéj strony, na drugim skolei miejscu, 1000 razy większe od części oznaczonych z prawéj strony na trzecim skolei miejscu i t. d., możemy o częściach dziesiętnych naszéj liczby powiedzieć, że: 9 dziesiątych jest to samo, co 90 setnych, co 900 tysiącznych, co 9000 dziesięciotysiącznych, tak iż części dziesiętne naszéj liczby przedstawiają: 9000 + 3 dziesięciotysiączne czyli 900 3 dziesięciotysiączne: liczbę więc naszę możemy tak przeczytać: „64 całkowite i 900 3 dziesięciotysiączne".

Zważywszy jeszcze, że jedność jestto 10 000 dziesięciotysiącznych, możemy, czytając liczbę naszę, zamiast mówić: 64 całkowite (64 jedności), powiedzieć 640 000 dziesięciotysiącznych. A że nadto mamy w téj liczbie 900 3 dziesięciotysiączne, zatym możemy ją jeszcze tak przeczytać: „649 003 dziesięciotysiączne".

Gdy w liczbie dziesiętnéj jest część całkowita, to, jeżeli w niéj po przecinku jest niemniéj, niż dwie cyfry znaczące (§ 3, us. 7), możemy ją przeczytać trzema sposobami; jeżeli zaś w niéj po przecinku jest tylko jedna cyfra znacząca, np. 64,0008, to dwoma sposobami; ułamek zaś dziesiętny można przeczytać odpowiednio dwoma sposobami, np. 0,9508, lub jednym tylko, np. 0,0008. Ogólnie zaś powiemy:

Liczbę dziesiętną możemy przeczytać trzema sposobami: albo, przeczytawszy część całkowitą, wymawiamy oddzielnie pokolei każdą cyfrę znaczącą po przecinku, dodając zaraz nazwanie części liczby, jakie bywają oznaczane na miejscu, które ta cyfra zajmuje; albo, przeczytawszy część całkowitą, czytamy liczbę, przedstawioną przez cyfry, znajdujące się po przecinku, jakgdyby to ich zgrupowanie tworzyło liczbę całkowitą [1]*, dodając tylko nazwanie części liczby, oznaczanych na miejscu, zajętym przez ostatnią cyfrę po przecinku; albotéż czytamy tę liczbę jako całkowitą, jakgdyby przecinka nie było, i dodajemy tylko nazwanie części liczby, oznaczanych na miejscu, zajętym przez ostatnią cyfrę po przecinku.*

WPROWADZENIE TERMINU: UŁAMEK ZWYCZAJNY. LICZBA WYRAŻONA JAKO DZIESIĘTNA MOŻE BYĆ PRZEDSTAWIONA PRZY POMOCY UŁAMKA ZWYCZAJNEGO.

6. Ułamek np. dziesiętny 0,0900127, przedstawia liczbę 900 127 dziesięciomilijonowych (us. 5) jedności, która, jak wiemy (§ 17, us. 1), może być przedstawiona w ten sposób $\frac{900\,127}{10\,000\,000}$. Takie przedstawienie téj liczby, tudzież przedstawienia podobne innych, które dotąd (roz. VI) nazywaliśmy „ułamkami", będziemy, w przeciwstawieniu ułamkom

[1] Por. § 3, us. 12.

dziesiętnym, nazywali ułamkami zwyczajnymi. Owóż, ułamek dziesiętny 0,0900127 przedstawia tę samę liczbę, co ułamek zwyczajny $\frac{900\,127}{10\,000\,000}$, tak iż

$$0{,}0900127 = \frac{900\,127}{10\,000\,000}.$$

Podobnie np. (us. 4; § 16, us. 1 a.)

$$64{,}0900127 = 64 + 0{,}0900127 = 64 + \frac{900\,127}{10\,000\,000} = 64\,\frac{900\,127}{10\,000\,000}.$$

A zatym *ułamek dziesiętny możemy zastąpić przez ułamek zwyczajny, pisząc jako jego licznik liczbę, przedstawioną przez cyfry znajdujące się po przecinku, jakgdyby to ich zgrupowanie przedstawiało oddzielną liczbę całkowitą, a jako mianownik liczbę, przedstawioną przez 1 z tylu zerami, ile w danym ułamku jest wszystkich cyfr dziesiętnych* [1]).

Podobnie liczba np. dziesiętna 64,0900127, jako przedstawienie 640 900 127-u dziesięciomilijonowych (us. 5) jedności, może być zastąpiona przez ułamek zwyczajny, t. j.

$$64{,}0900127 = \frac{640\,900\,127}{10\,000\,000}.$$

A więc ogólnie:

Liczbę dziesiętną możemy zastąpić przez ułamek zwyczajny, pisząc jako jego licznik liczbę daną, opuściwszy w niéj przecinek, a jako mianownik liczbę, przedstawioną przez 1 z tylu zerami, ile w danéj liczbie jest wszystkich cyfr dziesiętnych [2]).

7. Ponieważ w liczbie dziesiętnéj np. 237,9548, prócz 237 całkowitych, mamy 9 dziesiątych, 5 setnych, 4 tysięczne i 8 dziesięciotysięcznych (us. 1, 5), zatym wyrażając 9 dziesiątych, 5 setnych, 4 tysięczne, oraz 8 dziesięciotysięcznych jako ułamki zwyczajne, możemy naszę liczbę wyrazić jako sumę 237 jedności i tych ułamków zwyczajnych, t. j.

$$237{,}9548 = 237 + \frac{9}{10} + \frac{6}{100} + \frac{4}{1000} + \frac{8}{10000}.$$

Pisząc jeszcze (§ 6, us. 22), zamiast 237 sumę $2 \times 100 + 3 \times 10 + 7 \times 1$, mieć będziemy

---

[1]) Niewłaściwie mówią: „ułamek dziesiętny jestto ułamek, którego mianownik jest albo 10, albo 100, albo i t. d. — wogóle 1 z zerami", gdyż, jeżeli tylko ułamek ma mianownik, to jednocześnie nie jest już dziesiętny. Dodać jeszcze można, że takie określenie ułamków dziesiętnych nie obejmuje ułamków dziesiętnych nieskończonych (choćby tylko peryodycznych).

[J. A. Serret w *Traité d'arithmétique* (wyd. 6-e, 1875), powiedziawszy uprzednio, że „części dziesiętne jedności są te, które otrzymujemy, dzieląc jedność na 10, 100 1000, . . . części równych", takie podaje określenie: „liczbą dziesiętną nazywa się liczba, która wyraża, ile pewna wielkość zawiéra jedności i części dziesiętnych jedności."]

[2]) Niekiedy można tak otrzymane ułamki zwyczajne następnie skrócić, np. $2{,}75 = 2\,\frac{75}{100} = 2\,\frac{3}{4}$; $0{,}125 = \frac{125}{1000} = \frac{1}{8}$.

$$237{,}9548 = 2\times100 + 3\times10 + 7\times1 + \frac{9}{10} + \frac{5}{100} + \frac{4}{1000} + \frac{8}{10000},$$

albotéż (§ 6, us. 22)

$$237{,}9548 = 2\times10\times10 + 3\times10 + 7\times1 + \frac{9}{10} + \frac{5}{10\times10} + \\ + \frac{4}{10\times10\times10} + \frac{8}{10\times10\times10\times10},$$

co właśnie nam wskazuje, że przy pisaniu naszéj liczby dziesiętnéj służyła nam jako podstawa liczba 10, gdyż każda z części liczby, oznaczonych w liczbie danéj na jakimkolwiek miejscu, jest 10 razy większa od części liczby oznaczonych obok z prawéj strony (por. § 3, us. 16).

Pisząc $9\times\frac{1}{10}$ zamiast $\frac{9}{10}$, $5\times\frac{1}{10\times10}$ zamiast $\frac{5}{10\times10}$ i t. d. i wprowadzając wykładniki, możemy liczbę np. 6237,9548 tak przedstawić (§ 6, us. 40, § 7, us. 28):

$$6237{,}9548 = 6\times10^3 + 2\times10^2 + 3\times10^1 + 7\times10^0 + 9\times\frac{1}{10^1} + \\ + 5\times\frac{1}{10^2} + 4\times\frac{1}{10^3} + 8\times\frac{1}{10^4},$$

t. j. *jedności, dziesiątki i t. d. każdéj liczby przedstawiają iloczyn liczby jednocyfrowéj, przez potęgę liczby 10, części zaś jéj dziesiąte, setne i t. d. przedstawiają iloczyn liczby jednocyfrowéj przez odwrotność* (§ 19, us. 10) *potęgi liczby 10*, co jest następstwem tego, że nasz systemat pisania liczb jest dziesiątkowy [1]).

POWIĘKSZANIE I ZMNIEJSZANIE LICZBY DZIESIĘTNÉJ 10, 100, 1000 I T. D. RAZY.

8. Jeżeli mamy np. 137,028 i po cyfrze ostatniéj po przecinku, t. j. po cyfrze 8, napiszemy jedno lub więcéj zer, to liczba np.

137,028000

przedstawiać nam zawsze będzie 137 całkowitych 2 setne i 8 tysiącznych — taksamo, jak poprzednio: 137,028. Możemy więc powiedzieć, że *liczba dziesiętna się nie zmieni, jeżeli po przecinku z prawéj strony ostatniéj cyfry znaczącéj dopiszemy ilekolwiek zer.* (Por. § 3, us. 12.)

Jeżeli mamy liczbę całkowitą, np. 34, to kładąc przecinek po cyfrze, przedstawiającéj jedności, t. j. po cyfrze 4, możemy po przecinku napisać zera, gdyż np. liczba 34,0000 także przedstawia 34 jedności; zatym, *mając liczbę całkowitą, możemy po cyfrze, zajmującéj miejsce piérwsze, umieścić przecinek, a po nim dopisać ilekolwiek zer.*

Dopisujemy zera, jako końcowe cyfry dziesiętne, ilekroć to w czasie wykonywanego rachunku okazuje się pożytecznym. Nawzajem, jeżeli,

---

[1]) Taksamo moglibyśmy pisać np. ułamki szóstkowe w systemacie szóstkowym i t. d. zob. niżéj § 28, us. 6, 7.

wykonywając pewien rachunek, otrzymujemy, jako wypadek tego rachunku, liczbę dziesiętną, w której ostatnimi cyframi dziesiętnymi są zera, to te zera możemy opuścić.

9. Jeżeli mamy dwie takie np. liczby dziesiętne:

805,2479 i 80,52479

to możemy powiedzieć, że, przesuwając w piérwszéj liczbie przecinek o jedno miejsce (czyli: o jednę cyfrę) wlewo, otrzymujemy z niéj liczbę drugą. Wskutek tego przesunięcia przecinka z 8-u setek powstało 8 dziesiątków, t. j. z każdéj setki powstał dziesiątek, czyli każda setka została zmniejszona 10 razy; podobnież z 5 jedności powstało 5 dziesiątych, t. j. każda jedność została zmniejszona 10 razy; z 2 dziesiątych powstały 2 setne, t. j. każda dziesiąta została zmniejszona 10 razy i t. d. Gdy więc wskutek przesunięcia przecinka o jedno miejsce wlewo każda część liczby została zmniejszona 10 razy, to i cała liczba zmniejszyła się 10 razy. — Nawzajem, moglibyśmy powiedzieć, że piérwszą liczbę otrzymujemy z drugiéj, przesuwając w niéj przecinek o jedno miejsce wprawo, i podobnie objaśnić, że, wskutek tego, każda część liczby drugiéj została powiększona 10 raza, czyli, że wskutek przesunięcia przecinka o jedno miejsce wprawo liczba powiększa się 10 razy.

Podobnież, wprost rozważając np. dwie liczby dziesiętne

805,2479 i 80 524,79

wniesiemy, że, wskutek przesunięcia przecinka o dwa miejsca wprawo, liczba powiększa się 100 razy, a wskutek posunięcia przecinka o dwa miejsca wlewo liczba zmniejsza się 100 razy.

I t. d. Powiemy więc:

Liczbę dziesiętną powiększamy lub zmniejszamy 10, 100, 1000, 10000, ... razy, gdy przecinek przesuwamy o 1, 2, 3, 4, ... miejsca odpowiednio wprawo lub wlewo.

Jeżeli np. mamy liczbę 2,37 powiększyć 10 000 razy, to należy w niéj przecinek przesunąć o 4 miejsca wprawo. W danéj liczbie mamy tylko 2 cyfry dziesiętne; możemy jednak (us. 8) wystawić sobie, że z prawéj strony ostatniéj cyfry dziesiętnéj znajdują się zera, a mianowicie, że jest ich tyle, ile nam potrzeba, aby 4 miejsca po przecinku były zajęte, t. j. że po cyfrze 7 znajdują się dwa zera. Przesuwając więc przecinek o 4 miejsca wprawo, otrzymamy w tym przypadku, jako liczbę od danéj 10 000 razy większą, liczbę całkowitą 24 700. — Podobnie, gdybyśmy chcieli téż samę liczbę 2,37 zmniejszyć np. 10 000 razy, to wypadłoby przecinek przesunąć o 4 miejsca wlewo. Z lewéj strony przecinka jest zajęte w naszéj liczbie tylko jedno miejsce, ale możemy (§ 3, us. 12) wystawić sobie, że z lewéj strony części całkowitéj są dopisane zera, mianowicie, że je mamy na miejscach drugim, trzecim i czwartym. Gdy więc

przesuniemy przecinek wlewo o 4 miejsca, to wypadnie jeszcze, z uwagi, że wskutek tego otrzymamy liczbę złożoną tylko z części dziesiętnych, t. j. ułamek dziesiętny, napisać przed przecinkiem cyfrę zero (us. 2). Ostatecznie więc będziemy mieli 0,000237.

Podobnież, chcąc np. liczbę 734 powiększyć np. 100 razy, możemy ją sobie wystawić (us. 8) jako 734,00, tak iż przesuwając, przecinek o 2 miejsca wprawo, otrzymamy 73 400 [1]). Również np. 1 zmniejszając 100 razy, otrzymamy 0,01. — Gdy np. liczbę 56 020 zmniejszymy 100 razy, to otrzymany 560,20 czyli (us. 8) liczbę 560,2.

ZASTOSOWANIE POPRZEDNIEGO PRAWIDŁA DO MIAR METRYCZNYCH.

10. W us. 2-im § 9-go widzieliśmy, jak łatwo liczbę wieloraką, wyrażoną w jednostkach układu metrycznego, przedstawić jako liczbę mianowaną prostą. Mówiliśmy tam jednak o wyrażeniu takiéj liczby wielorakiéj tylko jako mianowanéj prostéj całkowitéj, t. j. przy pomocy najmniejszéj z wchodzących jednostek, lub też jednostki jeszcze mniejszéj. Możemy jednak wyrazić tę liczbę w jednorodnych jednostkach metrycznych jakiéjkolwiek wielkości.

Tak np. gdy mamy (§ 9. us. 2) 300 865 *cm*, a chcemy tę liczbę wyrazić w metrach, to, zważywszy, że *cm* jest setną częścią *m*, miéć będziemy 3 008,65 *m*. Jeżelibyśmy zaś naszę liczbę 300 865 *cm* wyrazić chcieli w kilometrach, to zważywszy, że *cm* jest stotysiączną częścią *km*, miéć będziemy 3,00865 *km*. Jest więc

$$300\,865\ cm = 3\,008{,}65\ m = 3{,}00865\ km.$$

Podobnie, jeżeli chcemy np. 2 dekametry kw. + 5 m^2 + 8,75 sm^2 wyrazić w m^2, to możemy wprost, zważywszy, że dekametr kw. przedstawia setkę m^2, że dm^2 jest setną częścią m^2, a cm^2 jest dziesięciotysiączną m^2, napisać

2 dekametry kw. + 5 m^2 + 15 dm^2 + 8,75 cm^2 = 205,150875 m^2

(tu 7 dziesiątych cm^2, jako 7 dziesiątych dziesięciotysiącznéj m^2 przedstawia 7 stotysiącznych m^2, a 5 setnych cm^2, jako 5 setnych dziesięciotysiącznéj m^2, przedstawia 5 milijonowych m^2).

Podobnie np.

$$2\ dm^3 + 74{,}25\ mm^3 = 0{,}00200007425\ m^3 = 2\,000{,}07425\ cm^3$$

Również łatwo możemy wykonywać zadania odwrotne, np. 28 342,021 g = 28 kg + 342 g + 21 mg.

11. Możemy teraz już rozwiązywać takie np. zadania (por. § 8 us. 5).

---

[1]) Por. § 6, us. 21.

a. Wyrazić korzec nowopolski przy pomocy hektolitra. — Kwarta n.-p. = litrowi; korzec = 4 kw. × 8 × 4; a więc:

korzec n.-p. = 128 l = 1,28 hl.

b. Wyrazić funt n.-p. w częściach kilograma. — Łut n.-p. = = 12 672 mg, a więc funt n.-p. = 12 672 mg × 32 i

funt n.-p. = 405 504 mg = 0,405504 kg.

c. Wyrazić łokieć n.-p. w częściach ćwierci południka ziemskiego — Łok. n.-p. = 2 mm × 12 × 12 × 2; ćwierć południka ziemskiego = 10 000 000 m; a więc:

łok. n.-p. = 576 mm = 0,576 m = 0,0000000576 ćwierci południka ziemskiego.

d. Ile kg waży stopa sz. n.-p. wody dystylowanéj przy takiéj jéj temperaturze, przy któréj woda jest najgęstsza? — Stopa linijowa n.-p. = 2 mm × 12 × 12; stopa sz. n.-p. = 288 mm^3 × 288 × 288; gram jestto ciężar cm^3 takiéj wody; a więc

stopa sz. n.-p. = 23887 872 mm^3 = 23 887,872 cm^3

ciężar stopy sz. n.-p. wody = 23 887,872 g = 23,887872 kg

e. Ile włóka n.-p. ma hektarów? — a = dekametr kw = 100 m^2; włóka n.-p. = 288 mm^2 × 288 × 225 × 300 × 30; a więc

włóka n.-p. = 168 061 600 000 mm^2 = 168 061,6 m^2

= 1 680,616 a = 16,80616 ha.

PORÓWNYWANIE LICZB DZIESIĘTNYCH.

12. Gdy mamy dwie liczby całkowite, mające różną ilość cyfr, to liczba, mająca więcéj cyfr, jest większa; np. jeżeli mamy liczby całkowite: 3-cyfrową i liczbę 4-ocyfrową, to w ostatniéj jest przynajmniéj 1 tysiąc, gdy tymczasem piérwsza liczba jest mniejsza od tysiąca. Gdy zaś mamy dwa ułamki dziesiętne, np.

0,64 i 0,59249075,

to możemy zauważyć, że w drugim ułamku mamy, prócz 5-u dziesiątych, następujące części: 9 setnych, które przedstawiają mniéj niż 10 setnych, czyli mniéj niż 1-ę dziesiątą; 2 tysiączne, które przedstawiają mniéj niż 1 setną, tak iż 9 setnych wraz z 2-ema tysiącznymi przedstawiają mniéj niż 9 setnych + 1 setna, t. j. mniéj niż 10 setnych, czyli mniéj niż 1 dziesiątą; 4 dziesięciotysiączne, o których podobnie wypadnie nam powiedzieć, że one wraz z 9-setnymi i 2-ema tysiącznymi przedstawiają liczbę mniejszą od 1 dziesiątéj, i t. d. Drugi więc ułamek przed-

stawia liczbę mniejszą od 6-u dziesiątych — gdy piérwszy jest liczbą większą [1]) od 6-u dziesiątych: jest więc

$$0{,}64 > 0{,}50249075.$$

Oczywiście, że z dwu liczb: 598,778947 i 1000,012 druga jest większa.

Podobnie, mając dwa ułamki

0,8062878 i 0,80645

łatwo spostrzeżemy, że w piérwszym części: 2 dziesięciotysiączne, 8 stotysiącznych, 7 milijonowych i 8 dziesięciomilijonowych przedstawiają razem mniéj niż 3 dziesięciotysiączne, tak iż piérwszy ułamek, jest mniejszy od 8-u dziesiątych, 6-u tysiącznych i 3 dziesięciotysiącznych (razem wziętych), a więc jest mniejszy od drugiego ułamka,

$$0{,}8062878 < 0{,}80645.$$

Podobnie

$$405{,}8062878 < 405{,}80645,$$

t. j. *jeżeli dwie liczby* [*całkowite* [2]) *lub dziesiętne*] *mają początkowe cyfry na odpowiednich miejscach jednakowe, to ta z tych liczb jest większa, w któréj piérwsza* (*licząc od strony lewéj*) *z różnych od siebie cyfr przedstawia więcéj części liczby, oznaczanych na odpowiednim miejscu.*

Z tego wypada, że: *zgrupowanie ilukolwiek i jakichkolwiek cyfr dziesiętnych na pewnych miejscach przedstawia mniejszą liczbę niż cyfra 1 napisana na miejscu, poprzedzającym to miejsce, na którym się znajduje piérwsza z owych cyfr;* np. $0{,}000878 < 0{,}001$; podobnie: $0{,}00999 < 0{,}01$.

Powyższe rozważania doprowadzają jeszcze do tego, że *pewna liczba jedynym tylko sposobem może być przedstawiona jako dziesiętna.* Gdyby bowiem pewna cyfra dziesiętna, t. j. cyfra, znajdująca się na pewnym miejscu, mogła być inna, to odpowiednie dwa wyrażenia owéj liczby różniłyby się przynajmniéj o 1-ę część dziesiętną, oznaczoną na owym miejscu, a téj różnicy nie mogłyby pokryć różnice, wynikające z odmiennych cyfr na miejscach dalszych.

LICZBY DZIESIĘTNE PRZYBLIŻONE.

13. Niekiedy zapomocą rachunku otrzymujemy takie drobne części liczby, których w rzeczywistości nie mamy co uwzględniać. Np. Piotr kupił 100 łokci materyi, za którą zapłacił rub. 267 i kop. 85, czyli, ponieważ kopiejka jest setną częścią rubla, zapłacił rub. 267, 85; jeden łokieć téj materyi odstępuje Pawłowi po cenie kosztu; ile Paweł ma Pio-

---

[1]) Ogólniéj: nie mniejszą od 6-u dziesiątych, gdyż byłoby to samo, gdybyśmy mieli ułamki

0,6 i 0,5 92 49075.

[2]) Np. 56 079 i 56 081.

trowi zwrócić za ten łokieć materyi? Ponieważ 100 ł. kosztuje rub. 267,85, więc jeden łokieć kosztuje 100 razy mniéj, t. j. rub. 2,6785, (us. 9). Ma więc Paweł zwrócić Piotrowi rub. 2,6785, czyli 2 rub. i 67,75 kop. Ponieważ jednak kopiejka jest najmniejszą z będących w obiegu monet, więc Paweł może zapłacić tylko 2 rub. i 67 kop., czyli tylko 2,67 rub. Tu więc dokładną byłaby liczba 2,6785 rub., ale przy wypłacie można przyjąć zamiast niéj liczbę bliską dokładnéj, czyli, jak się zwykle mówi [1]), liczbę przybliżoną do dokładnéj, mianowicie 2,67 rub. Ta liczba przybliżona różni się tu od dokładnéj o to, cośmy opuścili, t. j. o 8 tysiącznych i 5 dziesięciotysiącznych rubla, czyli o 0,0085 rub. Ponieważ zaś różnica téj liczby przybliżonéj od dokładnéj, t. j. 0,0085 rub., jest mniejsza (us. 12) od 0,01 rub., więc mówimy, że niedokładność, t. j. błąd, wynosi tu mniéj niż 0,01, czyli, że liczba 2,67 jest przybliżona do dokładnéj (2,6785) więcéj niż na 0,01, albo [2]) krócéj: przybliżona na 0,01. — Zamiast mówić: liczba przybliżona (do liczby dokładnéj) mówimy często krócéj: przybliżenie (liczby dokładnéj). Liczbę zaś, od któréj błąd ma być mniejszy, jak np. tu liczbę 0,01, nazywamy zwykle stopniem przybliżenia [3]).

Popełniliśmy tu błąd 0,0085 rub., który wprawdzie jest mniejszy od 0,01 rub., ale jest już większy od 0,005 rub. (us. 12), t. j. od 0,5 k., czyli od połowy kopiejki. Wskutek tego, biorąc przybliżenie 2,67 rub., opuściliśmy więcéj niż połowę kopiejki (czyli więcéj niż połowę 0,01 rubla). Gdy tymczasem, gdybyśmy oznaczyli wartość łokcia téj materyi o 1 kopiejkę więcéj, t. j. oznaczyli ją jako 2,68 rub., to popełnilibyśmy błąd mniejszy od połowy kopiejki. Liczba więc 2,68 rub. jest przybliżeniem liczby dokładnéj 2,6785 rub. również na 0,01 rub., ale jest bliższą téj liczby dokładnéj niż poprzednie jéj przybliżenie 2,67 rub.

Mamy więc tu dwa przybliżenia liczby dokładnéj 2,6785 rub., jedno 2,67 rub., drugie 2,68 rub. — oba na 0,01 rub. Piérwsze z tych przybliżeń jest mniejsze od liczby dokładnéj; błąd jego trzebaby dodać do niego, aby otrzymać liczbę dokładną; nazywa się ono przybliżeniem z niedomiarem. Drugie zaś przybliżenie jest większe od liczby dokładnéj; błąd jego trzebaby od niego odjąć, aby mieć liczbę do-

---

[1]) W książkach wydawanych w Galicyi często w tym znaczeniu mówią: „liczba niezupełna“ (!).

[2]) Mówimy także: liczba 2,67 jest wyrażeniem liczby dokładnéj 2,6785 „ze ścisłością do 0,01“.

[3]) Prawie zawsze stopień przybliżenia wyraża się przez 1 z zerami lub 1 na pewnym miejscu po przecinku. Stopnie przybliżenia inaczéj wyrażone najczęściéj sprowadzamy do poprzednich.

kładną; nazywa się ono przybliżeniem z nadmiarem [1]) — Jeżeli np. w powyższym zadaniu idzie nam tylko o to, aby błąd nie był większy od 0,01 rub., to wszystko jedno, które z przybliżeń weźmiemy, czy 2,67 rubla, czytéż 2,68 rub. Jeżeli jednak chcemy, aby błąd nie był większy od połowy 0,01-éj rubla, czyli nie większy od 0,005 rub., to wypadnie tu wziąć przybliżenie z nadmiarem, t. j. 2,68 rub.

Przypuśćmy zaś, że Piotr zapłacił za owe 100 łokci materyi np. 267,25 rub., to i w tym także przypadku, wrazie gdy idzie tylko o to, aby błąd był mniejszy od 0,01 rub., Paweł może zwrócić Piotrowi albo 2,67 rub., albo 2,68 rub.; wrazie jednak, gdy idzie o to, aby z tych dwu przybliżeń wziąć to, w którym błąd jest mniejszy, Paweł powinien zwrócić Piotrowi w tym przypadku 2,67 rub. —

Podobnie np., jeżeli chcemy mieć pewne pojęcie o prędkości rozchodzenia się głosu w powietrzu, a z doświadczenia, któreśmy wykonali, wypadło nam, że ta prędkość wynosi np. 1178 stóp n.-p. na sekundę, to jeżeli chcemy tak się wyrazić, żeby nieścisłość była mniejsza od 100 stóp, powiedzieć możemy równie dobrze, że to doświadczenie dało nam, jako prędkość głosu, 1100 stóp n.-p. na sekundę, jak że ono nam dało, jako prędkość głosu, 1200 stóp n.-p. na sekundę. Obie te liczby będą przybliżeniami liczby rzeczywiście z doświadczenia otrzymanéj na 100 stóp n.-p. piérwsze z niedomiarem, drugie z nadmiarem. Jeżeli zaś z tych dwu przybliżeń na 100 stóp, chcemy wziąć to, które jest bliższe liczby otrzymanéj z doświadczenia, to weźmiemy przybliżenie z nadmiarem, t. j. powiemy, że otrzymaliśmy, jako prędkość głosu, 1200 stóp n.-p. na sekundę.

Znajdujemy np., że, według starannych wyrachowań, stopa russka, czyli angielska $= 0{,}3047944$ *m*. Jeżeli chcemy, jako długość téj stopy, wziąć liczbę przybliżoną na 1 *mm* (t. j. na 0,001 *m*) i taką, aby z możliwych zawsze dwu takich liczb, wziąć tę, którąby była bliższa rzeczywistéj długości téj stopy (t. j. właściwie wziąć przybliżenie na 0,0005 *m*), to, z uwagi, że piérwsza z opuszczonych cyfr jest 7, weźmiemy, jako żądane przybliżenie owéj stopy, długość 0,305 *m*. — Gdy zaś z taką samą ścisłością chcemy wziąć przybliżenie arszyna, a z tablic wiadomo, że arszyn $= 0{,}7111870$ *m*, to, z uwagi, że piérwsza z opuszczonach cyfr 1 (na 4-m miejscu) jest mniejsza od 5, weźmiemy, jako żądane przybliżenie arszyna, długość 0,711 *m*. — Gdy podobnie, wiedząc, że garniec n.-p. $=$ 0,32523 wiadra, chcemy z dwu przybliżeń na 0,01 wiadra, wziąć to, które jest bliższe wielkości rzeczywistéj garnca, to z uwagi, że po piérwszéj z opuszczonych cyfr, t, j. po cyfrze 5, są cyfry znaczące, tak iż część téj liczby, którą opuszczamy, t. j. liczba 0,00523, jest większa od 0,005, wy-

[1]) Por. § 5, us. 5.

padnie wziąć tu jako wielkość garnca n.-p. przybliżenie z nadmiarem, t. j. 0,33 wiadra. — Gdy nakoniec znajdziemy się w tym przypadku, że mamy opuścić jednę tylko cyfrę, a tą jest 5 (albo cyfrę 5 z samymi tylko zerami po niéj następującymi), to możemy wziąć dowolnie którekolwiek z dwu przybliżeń; zwykle jednak bierzemy w tym przypadku przybliżenie z nadmiarem. Powiemy więc ogólnie [1]):

Gdy piérwsza z opuszczonych cyfr liczby, któréj wartością przybliżoną się zadowalamy, przedstawia 5 lub więcéj części liczby na tym miejscu oznaczanych, to bierzemy przybliżenie z nadmiarem, t. j. do części, przedstawionych przez ostatnią z pozostających cyfr, dodajemy 1-ę; w innych zaś razach bierzemy przybliżenie z niedomiarem, t. j. pozostających cyfr nie zmieniamy.

Gdy np. mamy wziąć przybliżenie liczby 2,5679965 na 0,00001 . to wypadnie wziąć przybliżenie z nadmiarem, t. j. 2,56800. I jeżeli chcemy zaznaczyć, z jaką ścisłością ta liczba jest wzięta, t. j. jeżeli chcemy wyraźnie wskazać, że ta liczba jest przybliżeniem dokładnéj na 0,00001, to winniśmy w niéj końcowe zera zachować (us. 8). — Dlatego właśnie w jednym z powyższych przykładów mieliśmy: arszyn = 0,7111870 *m*.

---

§ 22. DODAWANIE [2]) I ODEJMOWANIE LICZB DZIESIĘTNYCH.

OKREŚLENIE DODAWANIA.

1. Jak wiemy (§ 4 us. 5), dodawanie liczb całkowitych jest działaniem, zapomocą którego odnajdujemy sumę liczb danych, która jest skupieniem wszystkich jedności liczb danych. Gdy zaś pośród danych liczb są dziesiętne, to podobnie, działanie, doprowadzające nas do jednéj liczby, będącéj skupieniem wszystkich liczb danych, a więc skupieniem

---

[1]) Stosuje się to i do liczb przybliżonych na 10,100 i t. d.; lecz wtedy, zamiast mówić: piérwsza z opuszczonych cyfr, należałoby powiedzieć: piérwsza z cyfr, które zastępujemy przez zera.

[2]) Ponieważ liczby dziesiętne możemy zastąpić przez ułamki zwyczajne (us. 6), zatym aby dodać, odjąć, pomnożyć lub podzielić liczby dziesiętne, moglibyśmy je zastąpić przez ułamki zwyczajne i następnie wykonać to działanie według wskazówek, podanych w rozdziale poprzedzającym. (To jednak nie mogłoby nas doprowadzić do ilorazu, wyrażonego jako liczba dziesiętna). Z uwagi jednak, że w liczbach dziesiętnych części mniejsze od jedności są napisane według téj saméj zasady, co liczby całkowite, należy wykonywanie tych działań na liczbach dziesiętnych oprzeć wprost na rozumowaniu podobnym do tego, które nas doprowadziło do prawideł wykonywania owych działań na liczbach całkowitych. Dlategoteż przy wyprowadzaniu odpowiednich prawideł dla liczb dziesiętnych, możemy przyjąć za wiadome to, co wiemy już o wykonywaniu tych działań na liczbach całkowitych.

wszystkich części liczb danych (czyli, wogóle mówiąc, jedności i części jedności tych liczb), nazwiemy także dodawaniem, a liczbę ową — ich sumą. Powiemy więc ogólnie:

Dodawanie jestto działanie, zapomocą którego, mając dwie lub więcéj liczb danych zwanych składnikami, odnajdujemy liczbę, zwaną sumą, która jest skupieniem jedności i części jedności składników.

WŁASNOŚCI SUMY.

2. Mówiąc o dodawaniu liczb całkowitych, dowodziliśmy, że: suma nie zależy od porządku składników, że: aby do sumy dodać pewną liczbę, można tę liczbę dodać do któregokolwiek składnika, i że: dodawanie trzech lub więcéj składników może być uskutecznione przy pomocy dodawań częściowych, którychkolwiek składników, wziętych w jakimkolwiek porządku (§ 4, us. 5 — 9). Jeżeli zważymy, że, mając np.

$$0{,}03 + 0{,}5 + 2,$$

możemy te liczby wyrazić w najmniejszych z wchodzących do téj sumy częściach jedności, t. j. w setnych, że więc: $0{,}03 = 0{,}01 + 0{,}01 + 0{,}01$; 0,5 jest równe 50-u takim składnikom, a 2 jest równe 200-u takim składnikom, to możemy tę sumę wyrazić jako sumę samych tylko składników 0,01. A łącząc oddzielnie naprzód np. piérwszych 50 tych składników w jednę liczbę, następnie dalszych 200 również w jednę liczbę i nakoniec podobnież pozostałe 3 składniki, otrzymamy

$$0{,}50 + 2{,}00 + 0{,}03, \text{ czyli (§ 21, us. 8) } 05 + 2 + 0{,}03,$$

z czego widzimy, że piérwsza z przytoczonych prawd odnosi się też do liczb dziesiętnych. Na tym zaś się opiérając łatwo już dowiedziemy w takiż sam sposób, jak to było zrobione dla liczb całkowitych, że i dwie pozostałe z wypowiedzianych prawd również stosują się do liczb dziesiętnych.

WYKONYWANIE DODAWANIA.

3. Bezpośrednio z tego wypada, że to wszystko, cośmy mówili o wykonywaniu dodawania liczb całkowitych (§ 4, us. 13 — 15), może być odniesione do dodawania liczb dziesiętnych. Nie powtarzając teraz szczegółowo wszystkich podanych wtedy objaśnień, powiemy tu tylko, że mając np. wykonać dodawanie

$$8{,}846 + 79 + 286{,}97 + 0{,}5,$$

(ponieważ suma nie zależy od porządku składników i to dodawanie uskutecznić możemy przy pomocy dodawań częściowych) oddzielnie wyznaczymy najmniejsze, t. j. tysiączne części sumy, oddzielnie setne i t. d. W tym celu podpiszemy składniki pod sobą tak, aby jedności były pod

```
  8,846
    79
 286,97
   0,5
------
 375,316
```

jednościami. Z uwagi, że tu części tysiączne wchodzą tylko do jednego składnika i jest ich 6, w sumie będzie również tysiącznych 6; piszę zatym pod kréską pod tysiącznymi 6. Setnych jest w jednym składniku 4, w drugim 7; razem setnych 11, czyli 1 dziesiąta i 1 setna; podpisuję więc pod setnymi 1, a 1 dziesiątą dodaję do dziesiątych. Wszystkich więc dziesiątych jest 23, czyli 2 jedności i 3 dziesiąte: pod dziesiątymi piszę 3, a 2 jedności dodam do jedności. Otrzymawszy z dodania jedności 25 i napisawszy pod jednościami 5, kładę po téj cyfrze jako oznaczającéj [1]) jedności, przecinek (us. 1)i, t. d.

Powiemy więc ogólnie:

Aby dodać do siebie liczby dziesiętne, podpisujemy je jedne pod drugimi tak, żeby jedności znajdowały się pod jednościami, i dodajemy je w ten sam sposób, jakgdybyśmy dodawali liczby całkowite, a w sumie kładziemy przecinek po cyfrze, odpowiadającéj tym cyfrom składników, po których znajdują się przecinki.

Przyglądając się powyższemu przykładowi, zauważyć jeszcze możemy, że przy dodawaniu części całkowitych, dodając np. setki, nie zważamy na to, że w składnikach piérwszym i czwartym niéma setek; taksamo dodając tu np. setne części, nie zważamy na to, że ich niéma ani w składniku drugim, ani w czwartym.

OKREŚLENIE ODEJMOWANIA.

4. Odejmowanie, jako działanie odwrotne dodawaniu dwu składników, ma na celu z danych: sumy dwu składników i jednego z tych składników, wyznaczenie drugiego składnika téj sumy. To zadanie istnieć może niezależnie od tego, czy składniki są liczbami całkowitymi, czytéż ułamkowymi. Podane więc w us. 3-im § 5-go określenie odejmowania jest ogólne. Zatym wogóle:

Odejmowanie jestto działanie, w którym, mając dane dwie liczby: odjemną i odjemnik, poszukujemy liczby, zwanéj resztą, po któréj dodaniu do odjemnika otrzymujemy odjemną.

WŁASNOŚCI SUMY I RÓŻNICY.

5. Wypowiedziane w us. 8-ym i 9-ym § 5-go własności sumy i różnicy danych liczb mają miejsce także w przypadku, gdy te liczby są dziesiętne. Łatwo tego dowieść możemy, rozumując podobnie jak poprzednio w us. 7-ym.

---

[1]) Gdyby tu było zero, należałoby powiedzieć: po zerze, zajmującym miejsce, na którym są oznaczane jedności.

WYKONYWANIE ODEJMOWANIA.

6. Wychodząc również z tego, że odejmowanie jest działaniem odwrotnym dodawaniu dwu składników, nietrudno będzie spostrzéc, że to wszystko, cośmy mówili o wykonywaniu odejmowania liczb całkowitych (§ 5, us. 11—17), może być odniesione do odejmowania liczb dziesiętnych. Nie powtarzając szczegółowo wszystkich podanych wtedy objaśnień, powiemy tu tylko, że, mając wykonać np. obok wypisane odejmowanie, zaczynamy je od wyznaczenia najmniejszych części reszty. Ponieważ w odjemnéj jest 6 stotysiącznych, a w odjemniku stotysiącznych niéma, więc te 6 stotysiącznych pozostaną niezmienionymi, t. j. w reszcie [1]) będzie stotysiącznych 6, któráto cyfrę piszemy pod stotysiącznymi (postępujemy przeto taksamo, jak późniéj, przy odejmowaniu części całkowitych tych liczb, z ich tysiącami). Podobnież z 4-ma tysiącznymi, i z uwagi, że w reszcie niéma dziesięciotysiącznych, na miejscu, któreby one zajęły, t. j. po tysiącznych (gdyż po nich są jeszcze części stotysiączne) piszemy zero (§ 21, us. 2). Aby wyznaczyć w reszcie setne, ponieważ 8 jest mniejsze od 3, rozkładamy 2 dziesiąte odjemnéj na 1 dziesiątą, którą zostawiamy, i 1 dziesiątą, którą wyrażamy jako 10 setnych; one wraz z 3 setnymi stanowią 13 setnych. Odjąwszy 8 od 13-u, otrzymujemy 5, które piszemy pod setnymi. 2 dziesiąte jest więcéj niż 1 dziesiąta; rozkładamy więc 9 jedności na 8 jedności, które zostawiamy, i jedność, którą wyrażamy jako 10 dziesiątych, i odejmujemy 2 od 11; resztę 9 piszemy pod dziesiątymi. 6 od 8 jest 2, które piszemy pod jednościami, a po téj cyfrze 2 kładziemy przecinek (§ 21, us. 1). I t. d. — Taksamo odejmowalibyśmy np. 708,23406 — 39.

709,23406
—6,28
702,95406

Podobnie, jeżeli mamy wykonać np. odejmowanie

8,34
—2,06723
6,27277

to zauważymy, że dla wyznaczenia najmniejszych, t. j. stotysiącznych [2]), części reszty, należy 4 setne odjemnéj rozłożyć na 3 setne, które zostawimy, i 1 setną, którą wyrazimy jako 10 tysiącznych; te 10 tysiącznych potrzeba znowu rozłożyć na 9 tysiącznych, które zostaną i 1

---

[1]) Możemy także powiedzieć tak: ponieważ odjemna jest sumą odjemnika i reszty, a w odjemniku niéma stotysiącznych, zatym, aby po dodaniu reszty do odjemnika, móc otrzymać te 6 stotysiącznych, które są w odjemnéj, powinniśmy je mieć w reszcie, i t. d.

[2]) Można tu dodać, że one powinny się znaleść w reszcie; gdyż, gdyby w reszcie nie było stotysiącznych, to po dodaniu reszty do odjemnika, otrzymalibyśmy w odjemnéj 3 stotysiączne, których w odjemnéj niéma. Winno więc w reszcie być tyle stotysiącznych, aby po dodaniu ich do 3 stotysiącznych odjemnika otrzymać tyle stotysiącznych, żeby po wydzieleniu z nich większych części, t. j. dziesięciotysiącznych, nie pozostało już stotysiącznych, czyli, aby było 10 stotysiącznych. I t. d.

tysiączną, którą wyrazimy jako 10 dziesięciotysiącznych; te zaś 10 dziesięciotysiącznych wypadnie znowu rozłożyć na 9 dziesięciotysiącznych, które pozostaną, i 1 dziesięciotysiączną, którą wyrazimy jako 10 stotysiącznych. Widzimy więc, że wskutek tego rozkładu, w tym przypadku ostatnia (licząc od lewéj strony) znacząca cyfra 4 zostanie zastąpiona przez 3, nad następującymi cyframi odjemnika 7 i 2 znajdą się w odjemnéj cyfry 9, a nad cyfrą 3, ostatnią odjemnika, miéć będziemy 10. Będziemy więc tak wykonywali odejmowanie: 3 od 10-u 7, 2 od 9-u 7, 7 od 9-u 2, 6 od 13-u i t. d. — Taksamo odejmowalibyśmy np. 8 — 0,06723.

Powiemy więc ogólnie:

Aby odjąć od siebie dwie liczby dziesiętne, podpisujemy odjemnik pod odjemną, tak, żeby jedności znalazły się pod jednościami, i wykonywamy odejmowanie w ten sam sposób, jakgdybyśmy wykonywali odejmowanie liczb całkowitych, a w reszcie kładziemy przecinek pò cyfrze, odpowiadającéj tym cyfrom liczb danych, po których znajdują się przecinki. W przypadku więc, gdy w odjemnéj jest mniéj cyfr dziesiętnych, niż w odjemniku, ostatnią cyfrę dziesiętną odjemnika odejmujemy od 10, każdą pozostałą z tych cyfr, nie mającą nad sobą cyfry w odjemnéj, odejmujemy od 9, a ostatnią cyfrę znaczącą w odjemnéj zmniejszamy o 1.

---

§ 23. MNOŻENIE LICZB DZIESIĘTNYCH

OKREŚLENIE MNOŻENIA.

1. Gdy mamy pomnożyć np. 8 przez 3, to, jak wiemy (§ 6, us. 3), aby otrzymać iloczyn, możemy mnożną wziąć jako składnik tyle razy, ile jest jedności w mnożniku. Jeżeli atoli chcemy pomnożyć 8 np. przez 0,01 lub przez 0,03, to tu nie może być mowy o tym, abyśmy mieli 8 wziąć odpowiednio 0,01 raza lub 0,03 raza jako składnik. Tak więc wypowiedziane, jak powyżéj, powstawanie iloczynu z mnożnéj nie może się stosować do tych przypadków. Należy więc tak się wysłowić o powstawaniu iloczynu z mnożnéj, aby to mogło się także odnosić do przypadku, gdy mnożnik jest liczbą dziesiętną.

Aby 8 pomnożyć przez 3, mamy 8 wziąć jako składnik tyle razy, ile w mnożniku jest jedności, czyli

ponieważ mnożnik $3 = 1 + 1 + 1$
iloczyn $= 8 + 8 + 8 = 24$

i możemy [1]) powiedzieć, że „iloczyn powstaje z mnożnéj w taki sam sposób, jak mnożnik powstał z jedności".

Gdy więc np. mamy $8 \times 0{,}01$, to ponieważ mnożnik 0,01 powstał z *jedności* w taki sposób, iż 1 zmniejszyliśmy 100 razy (§ 21, us. 9), więc, aby podobnie utworzyć iloczyn z *mnożnéj*, należy tu mnożną 8 zmniejszyć 100 razy, co czyniąc, otrzymamy 0,08; jest zatym $8 \times 0{,}01 = 0{,}08$. Również, gdy mamy np. $8 \times 0{,}03$, to, z uwagi, że mnożnik powstał z jedności w taki sposób, iż 1 zmniejszyliśmy 100 razy i to, cośmy stąd otrzymali, t. j. 0,01, wzięliśmy 3 razy jako składnik, aby podobnie utworzyć iloczyn z *mnożnej*, należy mnożną 8 zmniejszyć 100 razy, a otrzymawszy wskutek tego 0,08, wziąć te 0,08 jako składnik 3 razy; będziemy więc mieli $0{,}08 + 0{,}08 + 0{,}08 = 0{,}24$; jest zatym $8 \times 0{,}03 = 0{,}24$.

Możemy więc powiedzieć ogólnie:

Mnożenie jestto działanie, zapomocą którego, mając dwie liczby, mnożną i mnożnik, odnajdujemy liczbę, zwaną iloczynem, którą możemy otrzymać z mnożnej w taki sam sposób, w jaki mnożnik powstaje z jedności.

W powyższym rozumowaniu mieliśmy na względzie ogólne określenie mnożenia. Można jednak w początku nauki o mnożeniu liczb dziesiętnych [2]), ułatwić rzecz, popierając ją przykładami na liczbach mianowanych. Tak np. jeżeli metr materyi kosztuje 8 rub. to 3 *m* kosztują 8 rub. $\times 3 = 24$ rub. Aby się zaś dowiedzieć, ile kosztuje 1 *cm* czyli 0,01 *m* téj materyi, należy podobnie 8 rub. $\times 0{,}01$; setna część metra kosztuje 100 razy mniéj od 8 rub., (§ 21, us. 9), kosztuje 0,08 rub.; jest więc 8 rub. $\times 0{,}01 = 0{,}08$ rub. Zaś 3 *cm* czyli 0,03 *m* téj materyi kosztuje 8 rub. $\times 0{,}03$, trzy razy więcéj niż 1 *cm*, t. j. 0,08 rub. + 0,08 rub. + 0,08 rub., tak iż 8 rub. $\times 0{,}03 = 0{,}24$ rub.

WYKONYWANIE MNOŻENIA.

2. Weźmy naprzód pod uwagę przypadek, kiedy mamy liczbę dziesiętną pomnożyć przez liczbę całkowitą, np. $3{,}207 \times 4$. Tu mnożnik powstał z jedności wskutek tego, żeśmy ją wzięli jako składnik 4 razy: ażeby więc otrzymać iloczyn, należy mnożną 3,207 wziąć jako składnik 4 razy, t. j.

gdy mnożnik $= 1 + 1 + 1 + 1$
to iloczyn $= 3{,}207 + 3{,}207 + 3{,}207 + 3{,}207$;

---

[1]) Jeżeli wykład liczb dziesiętnych jest prowadzony przed ułamkami zwyczajnymi to należy cały początek tego ustępu rozwinąć szczegółowiéj, jak w ns. 1-ym § 19-go.

[2]) Dążąc do prędszego przyswojenia sobie przez uczniów toku takiego rozumowania.

a zatym, ten przypadek mnożenia sprowadza się bezpośrednio do dodawania. A że to dodawanie (§ 22, us. 3) uskutecznia się tak, jakgdyby składniki były liczbami całkowitymi, a wiemy, że wtedy dodawanie równych składników możemy zastąpić przez mnożenie (§ 6, us. 1), zatym wypadnie wykonać mnożenie:

$$\begin{array}{r} 3{,}207 \\ 3{,}207 \\ 3{,}207 \\ 3{,}207 \\ \hline 12{,}828 \end{array}$$

tak, jakgdybyśmy mieli mnożyć 3207 przez 4, a tylko w iloczynie, t. j. w sumie poprzedniego dodawania, wypadnie przecinek umieścić po cyfrze, odpowiadającéj jednościom składników, a więc po cyfrze 2. — Gdybyśmy mieli mnożyć nie przez 4, ale np. przez 40, to, po dodaniu do siebie 40-u składników 3,207, otrzymalibyśmy 128,280; w téj liczbie przecinek jest po cyfrze 8, którą otrzymujemy również po dodaniu do siebie jedności składników. Możemy to jeszcze tak wypowiedzieć: wypisawszy sumę tak, jakbyśmy to zrobili w razie, gdyby np. składniki były liczbami całkowitymi, czyli: wypisawszy iloczyn tak, jakbyśmy to zrobili w razie, gdyby mnożna była liczbą całkowitą, oddzielamy w nim następnie przecinkiem z prawéj strony tyle cyfr na „dziesiętne" (§ 21, us. 1), ile ich było w każdym z tych równych sobie składników, czyli, ile ich było w mnożnéj.

$$\begin{array}{r} 3{,}207 \\ \times\ 4 \\ \hline 12{,}828 \end{array}$$

Jeżeli w iloczynie końcowe cyfry dziesiętne są zerami, to możemy je następnie opuścić (§ 21, us. 8). Będzie więc np. $3{,}207 \times 400 = 1282{,}800 = 1282{,}8$; $42{,}865 \times 6 = 257{,}190 = 257{,}19$; $3{,}25 \times 4 = 13{,}00 = 13$. Widzimy zatym, że, wogóle mówiąc, w iloczynie może być ostatecznie mniéj cyfr dziesiętnych, niż w mnożnéj.

3. Jeżeli zaś weźmiemy przypadek ogólniejszy, t. j. kiedy mamy liczbę dziesiętną pomnożyć przez liczbę dziesiętną, np.

$$3{,}207 \times 4{,}05,$$

to podobnież, wskazówki ku temu, jak tu postąpić należy, dostarczy nam to, cośmy poprzednio powiedzieli (us. 1) o powstawaniu iloczynu. Mnożnik 4,05 powstał z *jedności* w taki sposób, iż 1-ść zmniejszyliśmy 100 razy i to, cośmy wskutek tego otrzymali, t. j. 0,01, wzięliśmy jako składnik 405 razy. Należy więc również *mnożną* 3,207 zmniejszyć 100 razy, i to, co wskutek tego otrzymamy (§ 21, us. 9), t. j. 0,03207, wziąć jako składnik 405 razy, t. j.

mnożnik . . . 1 zmn. 100 r.; otrz. 0,01 ; $\underbrace{0{,}01+0{,}01+0{,}01+\ldots}_{405\text{ razy}}$

iloczyn . . . 3,207 zmn. 100 r.; otrz. 0,03207; $\underbrace{0{,}03207+0{,}03207+0{,}003207+\ldots}_{405\text{ razy}}$

W mnożnéj są 3 cyfry dziesiętne, w mnożniku 2; zmniejszyliśmy naprzód

mnożną 100 razy, t. j. powiększyliśmy w niéj ilość cyfr dziesiętnych o tyle, ile ich jest w mnożniku, tak iż w téj liczbie 0,03207 jest tyle cyfr dziesiętnych, ile ich jest w mnożnéj i mnożniku razem (3 + 2). Wtedy już działanie sprowadzone zostało do dodawania 405-u składników 0,03207, czyli do przypadku poprzedzającego, t. j. do mnożenia $0{,}03207 \times 405$, które, jak wiemy (us. 2), uskutecznia się tak, jakgdyby mnożna była całkowitą, t. j. jakgdybyśmy mieli pomnożyć 3207 przez 405, a tylko w iloczynie, stąd otrzymanym, t. j. w liczbie 1298 835, należy z prawéj strony oddzielić tyle cyfr na dziesiętne, ile ich jest w téj liczbie 0,03207. W téj zaś liczbie, jak widzieliśmy, jest tyle cyfr dziesiętnych, ile ich było razem w mnożnéj i mnożniku danego zadania. Możemy przeto powiedziedzieć, że, mając pomnożyć $3{,}207 \times 4{,}05$, pomnożymy te liczby przez siebie, jakgdyby one były całkowite, t. j. nie zważając na przecinki, a w otrzymanym iloczynie oddzielimy z prawéj strony tyle cyfr na dziesiętne, ile ich było w mnożnéj i mnożniku razem. Oczywiście, że rozważany tu przypadek obejmuje w sobie tak przypadek poprzedni (us. 2), jak i ten, kiedy mnożna jest liczbą całkowitą, a mnożnik dziesiętną (np. $8 \times 0{,}03$; us. 1). Możemy więc powiedzieć ogólnie:

3,207
× 4,05
16035
12828
12,98835

Aby liczbę dziesiętną pomnożyć przez liczbę dziesiętną, należy wykonywać mnożenie, nie zważając na przecinki, jakgdyby liczb całkowitych, a w otrzymanym iloczynie oddzielić z prawéj strony tyle cyfr na dziesiętne, ile ich było w mnożnéj i mnożniku razem.

Ostatnie z tych cyfr dziesiętnych mogą być niekiedy zerami (np. $22{,}5 \times 0{,}112 = 3{,}6400 = 3{,}64$); w takim razie, po opuszczeniu tych zer końcowych (§ 21, us. 8), otrzymamy ostatecznie w iloczynie mniéj cyfr dziesiętnych, niż ich było w mnożnéj i mnożniku razem.

4. Łatwo to zastosować do iloczynu ilukolwiek czynników. Tak np. gdy mamy $0{,}4325 \times 0{,}032 \times 1{,}5$, to, rozważając, że mamy pomnożyć naprzód dwa piérwsze czynniki przez siebie, a otrzymany stąd iloczyn częściowy pomnożyć przez czynnik trzeci, dojdziemy do tego, że należy w iloczynie liczb (§ 3, us. 12) $4325 \times 32 \times 15 = 2074500$ oddzielić na dziesiętne z prawéj strony 8 cyfr, tak iż szukanym iloczynem jest liczba 0,020745.

WŁASNOŚCI ILOCZYNU.

5. Wyznaczymy liczby przedstawione przez dwa iloczyny:

$$0{,}4325 \times 0{,}032 \times 1{,}5 \times 7 \quad \text{i} \quad 0{,}032 \times 1{,}5 \times 7 \times 0{,}4325,$$

różniące się od siebie tylko porządkiem czynników, gdy, odnalazszy iloczyny

$$4325 \times 32 \times 15 \times 7 \quad \text{i} \quad 32 \times 15 \times 7 \times 4325.$$

oddzielimy tak w jednym, jak w drugim z prawéj strony 8 cyfr na dziesiętne. Że zaś wypisane iloczyny czynników całkowitych, jako różniące się od siebie tylko porządkiem tych czynników, przedstawiają tę samę liczbę (§ 6, us. 10), przeto i dwa iloczyny, mające pośród swych czynników liczby dziesiętne, przedstawiają również tę samę liczbę. Widzimy zatym, że wypowiedziana w us. 10-ym § 6-go własność iloczynu: „iloczyn nie zależy od porządku czynników", stosuje się również do przypadku, kiedy pośród czynników iloczynu są liczby dziesiętne.

Opiérając się zaś na tym, łatwo już dowieść możemy, że inne własności, wypowiedziane w us. 10-ym i 12 — 15-go § 6-go, mają także miejsce wtedy, kiedy pośród liczb danych są dziesiętne, choćbyśmy je mnożyli przez liczbę dziesiętną.

---

§ 24. DZIELENIE LICZB DZIESIĘTNYCH.

OKREŚLENIE DZIELENIA.

1. Dzielenie, jako działanie odwrotne mnożeniu dwu czynników, ma na celu z danych: iloczynu dwu czynników i jednego z tych czynników wyznaczenie drugiego czynnika tego iloczynu. To zadanie istnieć może niezależnie od tego, czy czynniki są liczbami całkowitymi, czytéż dziesiętnymi. Podane więc w us. 3-im § 7-go określenie dzielenia jest ogólne. Zatym wogóle:

Dzielenie jestto działanie, zapomocą którego, mając dwie liczby: dzielną i dzielnik, odnajdujemy liczbę, zwaną ilorazem, taką, iżby iloczyn dzielnika i ilorazu przedstawił dzielną.

Gdy więc mamy np. 8 : 0,5, to mamy znaleść taką liczbę, którą mnożąc przez 0,5, otrzymamy 8, t. j. mamy znaleść taką liczbę, któréj 0,5 jest liczbą 8. Jeżeli więc 0,5 liczby szukanéj jest 8, to 5 liczb szukanych jest 80, a liczba szukana jest $80 : 5 = 16$; więc $8 : 0{,}5 = 16$.

WYKONYWANIE DZIELENIA.

2. Weźmy naprzód pod uwagę przypadek, kiedy mamy liczbę dziesiętną podzielić przez liczbę całkowitą, np. [1]) 257,19 : 6. Ponieważ iloczyn ilorazu i dzielnika przedstawi dzielną,

---

[1]) Można zacząć od przykładów jeszcze prostszych, np. 126,936 : 3, 136,476 : 2, i t. d.

w której są części dziesiętne, a dzielnik jest liczbą całkowitą, zatym (§ 23, us. 2) w ilorazie będą części dziesiętne, t. j. iloraz z podzielenia liczby dziesiętnej przez całkowitą będzie liczbą dziesiętną. Ponieważ $6 \times 10 = 60$ jest liczbą mniejszą niż dzielna, a $6 \times 100 = 600$ jest liczbą większą niż dzielna, zatym iloraz jest liczbą większą od 10, a mniejszą od 100, t. j. część całkowita (§ 21, us. 4) ilorazu jest liczbą dwucyfrową (§ 7, us. 17, 23). Wiemy więc, że w części całkowitej ilorazu będą dwie cyfry — ale ile w ilorazie będzie cyfr dziesiętnych, tego przewidzieć nie możemy, gdyż w iloczynie liczby dziesiętnéj i całkowitéj może być mniéj cyfr dziesiętnych, niż w jego czynniku, będącym liczbą dziesiętną (§ 23, us. 2). Wykonywając to dzielenie, wyznaczymy początkowe cyfry 4 i 2 ilorazu sposobem wiadomym (§ 7, us. 17 — 19). Ponieważ, jak wiemy, te dwie cyfry przedstawiają część całkowitą ilorazu, więc po cyfrze 2 wypadnie umieścić przecinek. Zaznaczyć tu zaraz możemy, że przecinek wypadło położyć po téj cyfrze ilorazu, którąśmy wyznaczyli, przypisawszy do odpowiedniéj reszty ostatnią cyfrę części całkowitéj dzielnéj. Zauważmy, że, po wyznaczeniu piérwszéj cyfry ilorazu, do pozostałéj reszty 1 przypisaliśmy wprost następującą cyfrę dzielnéj 7 dlatego, że owa cyfra 1 (jako odpowiadająca cyfrze dzielnéj 5) oznaczała część liczby 10 razy większą od części liczby bezpośrednio obok z prawéj strony oznaczanych, jakimi właśnie są części liczby, przedstawione przez tę cyfrę 7. Podobnież, po wyznaczeniu drugiéj cyfry ilorazu pozostała reszta 5 przedstawia części liczby 10 razy większe od części liczby, przedstawionéj przez cyfrę 1; dlatego przypisawszy tę cyfrę 1 do owéj reszty, wyznaczymy następującą cyfrę ilorazu zupełnie taksamo, jak wyznaczyliśmy dwie jego piérwsze cyfry, t. j. poszukamy takiéj największéj cyfry (jednocyfrowéj liczby), przez którą mnożąc dzielnik 6 otrzymamy iloczyn niewiększy od 51. Trzecią więc cyfrą w ilorazie, a więc piérwszą po przecinku, będzie 8. Odjąwszy 48 od 51, otrzymamy nową resztę 3, która przedstawia części liczby dziesięć razy większe od oznaczonych w dzielnéj przez następującą cyfrę 9. Przypisawszy więc do téj reszty cyfrę 9, wyznaczymy czwartą, t. j. drugą po przecinku cyfrę w ilorazie, mianowicie 8. Po odjęciu 36 od 39 pozostanie nam reszta dzielenia 3, oznaczająca téż same części liczby, co cyfra 9 dzielnéj, t. j. setne. Wypadło więc nam, że iloraz z podzielenia 257,19 : 6 jest 42,86 wraz z tym (§ 7, us. 11), co wypadnie, gdy podzielimy 3 setne przez 6. Będzie więc tu liczba 42,86 ilorazem niezupełnym, a liczba 0,03 resztą dzielenia (por. § 7, us. 11).

```
257,19 | 6
−24    | 42,86
 17
−12
  51
 −48
   39
  −36
    3
```

Gdybyśmy się zadowolili częściami setnymi w ilorazie, t. j. przybliżoną na 0,01 wartością ilorazu (§ 21, us. 13), moglibyśmy tu przyjąć jako iloraz albo 42,86, albotéż 42,87. Jeżeli jednak nie chcemy poprzestać na téj wartości przybliżonéj, to zauważymy, że mamy tu jeszcze do podzielenia 3 (setne) przez dzielnik. Możemy zaś sobie wystawić, że w dzielnéj po ostatniéj cyfrze dziesiętnéj (9) znajdują się zera (§ 21, us. 8; § 23, us. 2). Przypisując więc do téj reszty 3, jako następującą cyfrę dzielnéj, 0, wyznaczymy, w taki sam sposób jak poprzednie, następującą cyrę ilorazu 5, która, jak widzimy, jest tu ostatnią jego cyfrą. Otrzymaliśmy więc, jako szukany iloraz liczbę, 42,865; rzeczywiście, iloczyn liczb 42,865 i 6 jest 257,190, czyli 257, 19.

```
257,19 | 6
 ·····-|-42,865
    39
   -36
    30
   -30
     0
```

Widzimy więc, że, aby podzielić liczbę dziesiętną przez całkowitą, należy dzielenie uskuteczniać w taki sam sposób, jak dzielenie liczb całkowitych, kładąc w ilorazie przecinek po téj cyfrze, którą w tym dzieleniu wyznaczymy, uwzględniwszy ostatnią przed przecinkiem cyfrę dzielnéj, a jeżeli po wyczerpaniu wszystkich cyfr danych w dzielnéj pozostaje jeszcze reszta, to możemy działanie daléj prowadzić, przypisując tak do tej reszty, jak i do następnych (jeżeli będą), po zerze.

Gdy mamy np. 2,1 : 4, to, ponieważ 1×4 jest mniéj niż dzielna, w ilorazie nie będzie części całkowitéj — składać się on będzie z samych tylko części dziesiętnych (§ 21, us. 2), będzie ułamkiem dziesiętnym. Wypadnie więc mówić: 2 jest mniejsze od 4, więc na miejscu całkowitych piszę w ilorazie 0 (przecinek); wystawiam sobie następującą cyfrę dzielnéj 1 przypisaną do 2; 4 w 21 mieści się 5 razy, piszę w ilorazie po przecinku 5; $4 \times 5 = 20$; po odjęciu od 21 pozostaje 1; dopisuję zero i t. d.

```
2,1 | 4
-20 | 0,525
 10
 -8
  20
 -20
   0
```

Jeżeli mamy np. 0,0003 : 4, to wypadnie mówić: w dzielnéj niéma całkowitych, niéma więc ich i w ilorazie, piszę 0, (przecinek); cyfra dzielnéj 3, znajdująca się na 4-ym po przecinku miejscu, jeszcze nie wyznacza cyfry ilorazu; piszę więc w nim na piérszych 4-ch miejscach po przecinku zera [1]); do 3-ch zaś dopisuję 0; 30 jest większe od 4; wyznacza więc następującą cyfrę ilorazu 7 i t. d.

```
0,0003 | 4
    30 | 0,000075
   -28
    20
   -20
     0
```

[1]) Albo w dzielnéj niéma dziesiątych, setnych i tysiącznych: nie będzie więc ich w ilorazie, przeto piszę w nim po przecinku trzy zera; cyfra dzielnéj 3 nie wyznacza cyfry w ilorazie, piszę więc w nim jeszcze jedno-zero i t. d.

3. Weźmy teraz przypadek ogólniejszy: liczbę dziesiętną podzielić przez liczbę dziesiętną, np.

$$2{,}5719 : 0{,}06.$$

Mamy tu znaléść taką liczbę, iloraz, iżby iloczyn ilorazu i dzielnika 0,06 był równy dzielnéj 2,5719. Możemy więc powiedziéć, że 0,06 ilorazu jest liczbą 2,5719. Jeżeli 0,06 ilorazu jest liczbą 2,5719, to 6 ilorazów jest liczbą 100 razy większą, t. j. (§ 21, us. 9) 257,19. Ponieważ zaś 6 ilorazów jest liczbą 257,19, to iloraz wypadnie, gdy 257,19 : 6. To jest

$$\begin{aligned} 0{,}06 \text{ ilorazu} &= 2{,}5719 \\ 6 \text{ ilorazów} &= 2{,}5719 \times 100 = 257{,}19 \\ \text{iloraz} &= 257{,}19 : 6. \end{aligned}$$

Widzimy więc, że ten przypadek sprowadza się do przypadku poprzedzającego. Aby więc znaléść iloraz z podzielenia 2,5719 : 0,06, należy w dzielnéj przesunąć przecinek wprawo o 2 miejsca, t. j. o tyle miejsc, ile jest cyfr dziesiętnych w dzielniku, i 257,19 : 6, t. j. podzielić tak zmienioną dzielną przez liczbę powstałą z dzielnika wskutek opuszczenia w nim przecinka. Że zaś znaleźliśmy (us. 2), iż 257,19 : 6 = 42,865, zatym także 2,5719 : 0,06 = 42,865.—Zauważyć tu jednak należy, że gdybyśmy, otrzymawszy w ilorazie 42,86, przerwali dzielenie, to wtedy wypadek dzielenia przedstawiłby się tak: 42,86 (iloraz niezupełny) wraz z tym, co wypadnie gdy 0,03 podzielimy przez 6, czyli (wprowadzając pierwotnie dany dzielnik) wraz z tym, co wypadnie gdy 0,0003 podzielimy przez dzielnik 0,06. Resztą więc pierwotnie danego dzielenia nie jest 0,03, otrzymane przy wykonywaniu dzielenia pomocniczego 257,19 : 6, lecz 0,0003, t. j. reszta dzielenia jest wyrażona w najmniejszych częściach jedności, danych w dzielnéj.

4. Jeżeli dzielna i dzielnik są liczbami dziesiętnymi, a w dzielniku jest tyle cyfr dziesiętnych, co w dzielnéj, lub więcéj, to dzielenie sprowadzi się do dzielenia dwu liczb całkowitych, np. dzielenie 1,089 : 0,072 do dzielenia 1089 : 72, a dzielenie 10,89 : 0,072 do dzielenia 10 890 : 72. Wrazie, gdy w takim dzieleniu liczb całkowitych dzielna nie jest podzielna (§ 7, us. 11) przez dzielnik, to w ilorazie znajdzie się część mniejsza od jedności (§ 7, us. 11), którą należy wyrazić (§ 21, us. 1) przy pomocy dziesiątych części jedności. Idzie więc nam teraz o wyznaczenie ilorazu z podzielenia dwu liczb całkowitych przez siebie, jako liczby dziesiętnéj.

Zadanie takie sprowadza się bezpośrednio do przypadku, roztrząsanego w ustępie 2-im. Gdy mamy np. 1089 : 72.

1089	72
—72	15,125
369	
360	
90	
—72	
180	
—144	
—360	
360	
0	

i, wyznaczywszy piérwsze dwie cyfry ilorazu, przekonaliśmy się, że pozostaje reszta 9, to, z uwagi, że możemy w dzielnéj po cyfrze na piérwszym miejscu (9) umieścić przecinek, a po nim dopisać ilekolwiek zer (§ 21, us. 8), możemy daléj prowadzić dzielenie, jak w przypadku dzielenia liczby dziesiętnej przez całkowitą, t. j. kładąc w ilorazie po cyfrze 5 przecinek, do owéj reszty 9 dopisując 0, wyznaczając następującą cyfrę ilorazu i t. d. Otrzymamy $1089 : 72 = 15{,}125$.— Podobnie znajdziemy, że $10\,890 : 72 = 151{,}25$. Wskutek zaś tego także $1{,}089 : 0{,}072 = 15{,}125$, a $10{,}89 : 0{,}072 = 151{,}25$.

Taksamo znajdziemy, że np. $21 : 4 = 5{,}25$; $3 : 4 = 0{,}75$; $29 : 1250 = 0{,}0232$; $0{,}02 : 0{,}0005 = 40$; $7 : 0{,}125 = 56$ i t. d.

5. Zastanawiając się nad dzieleniami, przeprowadzonymi w us. 2—4, możemy powiedzieć:

Aby podzielić liczbę dziesiętną przez liczbę dziesiętną, posuwamy w dzielnéj przecinek o tyle miejsc wprawo, ile jest cyfr dziesiętnych w dzielniku, a tak zmienioną dzielną dzielimy przez liczbę całkowitą, powstałą z dzielnika wskutek opuszczenia w nim przecinka, t. j. sprowadzamy w ten sposób zadanie do dzielenia albo liczby dziesiętnéj przez całkowitą, albotéż całkowitej przez całkowitą.

Mając liczbę dziesiętną podzielić przez całkowitą, uskuteczniamy dzielenie nie zważając na przecinek, jakgdyby dzielna była również całkowita, kładąc tylko w ilorazie przecinek po cyfrze, którą wyznaczyliśmy przy pomocy ostatniej cyfry części całkowitej dzielnej, a wrazie, gdy, po wyczerpaniu wszystkich danych cyfr dzielnej, pozostaje jeszcze reszta, prowadzimy działanie dalej, przypisując po zerze tak do tej reszty, jak i do reszt następujących [1]).

Mając liczbę całkowitą podzielić przez całkowitą, wrazie gdy pierwsza jest niepodzielna przez drugą, możemy przyjąć, że w dzielnej po cyfrze, zajmującej miejsce pierwsze, znajduje się przecinek, po którym następują zera, i postępować tak, jak przy dzieleniu liczby dziesiętnej przez całkowitą.

UŁAMEK DZIESIĘTNY NIESKOŃCZONY. ILORAZ PRZYBLIŻONY.

6. Weźmy zadanie $70{,}77 : 11$. Wykonywając to dzielenie, dochodzimy do reszty 4, którąśmy już mieli jako resztę trzecią, tam,

[1]) Jeżeli więc po przypisaniu już jednego zera otrzymujemy liczbę mniejszą od dzielnika, to wypadnie w ilorazie napisać zero (por. § 7, us. 17, 18 i do téj reszty przypisać następującą cyfrę dzielnéj, t. j. drugie zero, i t. d.

```
 70,77 | 11
-66   |-----
 ---  | 6,4336
  47
 -44
 ---
   37
  -33
  ---
  *40
  -33
  ---
   70
  -66
  ---
    4
```

gdzie umieszczona jest *. Przypisawszy więc 0, otrzymamy znowu w ilorazie cyfrę 3, a następnie znowu resztę 7, do której przypisawszy 0, otrzymamy znowu w ilorazie 7, i t. d. do nieskończoności. Dzielenie więc to będzie się ciągnęło do nieskończoności, gdyż nie dojdziemy do reszty 0, a w ilorazie będziemy mieli nieskończony ciąg powtarzających się dwu cyfr 3 i 6, tak iż

$$70{,}77 : 11 = 6{,}4336363636\ldots;$$

tu kropki oznaczają, iż te cyfry 3 i 6 wciąż w tymże samym porządku po sobie następują do nieskończoności. Podobnie

$$7077 : 11 = 643{,}363636\ldots$$

Taksamo znajdziemy, dzieląc 3 : 35,

$$3 : 35 = 0{,}0857142857142857142\ldots$$

Powiemy więc: *jeżeli, przy wyznaczaniu cyfry dziesiętnéj ilorazu, otrzymujemy w dzieleniu resztę, którąśmy mieli poprzednio, już po wyczerpaniu wszystkich danych cyfr w dzielnej, to, od tej cyfry począwszy, dalsze cyfry dziesiętne ilorazu będą wciąż następowały po sobie w tymże samym porządku do nieskończoności* [1])

Takie ułamki dziesiętne, jak ostatni, lub jak w poprzedniéj liczbie dziesiętnéj ułamek 0,43363636 . . . , z uwagi, że w ich wyrażeniu zachodzi nieskończona ilość cyfr dziesiętnych, są ułamkami dziesiętnymi nieskończonymi. W przeciwstawieniu im, o ułamku takim, jak np. 0,525, mówimy, że on jest ułamkiem dziesiętnym skończonym.

7. Wrazie więc, gdy w ilorazie otrzymujemy ułamek dziesiętny nieskończony, nie może być mowy o tym, byśmy mogli w ten sposób otrzymać iloraz zupełny. Zadowolić się więc wtedy należy wartością przybliżoną ilorazu. Według więc tego, cośmy mówili w us. 13-ym § 21-go, jako wartość ilorazu z podzielenia 70,77 : 11 przybliżoną np. na 0,001 przyjmiemy 6,434; jako wartość przybliżoną na 0,0001 przyjmiemy 6,4336 i t. d.

Po wyczerpaniu w czasie dzielenia wszystkich cyfr pierwotnie danych w dzielnéj, wszystkie przybliżone z niedomiarem [2]) wartości ilorazu odpowiadać będą temu, cośmy (§ 7, us. 11) nazwali „ilorazem niezupełnym", a reszty, otrzymywane w czasie dzielenia, odpowiadające tym ilora-

[1]) O czytaniu takiej liczby w § 26, us. 5.

[2]) W poprzedniéj więc liczbie jako taką wartość przybliżoną na 0,001 mieć będziemy 6,433.

zom niezupełnym (t. j. otrzymywane po wyznaczeniu ostatniéj z zatrzymanych cyfr w tych ilorazach), przedstawią „reszty dzielenia".

8. Jeżeli np. mamy podzielić 978,425 67134 : 492 i chcemy otrzymać wartość ilorazu przybliżoną na 0,000 001, to mogą tu zajść wogóle dwa przypadki: albo dzielenie skończy się w taki sposób, iż w ilorazie mieć będziemy nie więcéj niż 6 cyfr dziesiętnych, a w tym razie otrzymamy iloraz (zupełny) usunie potrzebę wprowadzania przybliżonéj jego wartości, albo téż w ilorazie wypaść może więcéj niż 6 cyfr dziesiętnych i w tym tylko razie wziąć należy przybliżoną na 0,000 001 jego wartość. Gdy dostrzeżemy, że ten ostatni wypadek ma zachodzić, to możemy w dzielnéj nie uwzględnić niektórych końcowych jéj cyfr (ściśléj mówiąc zastąpić je zerami), zważmy bowiem, że tu dzielnik jest liczbą większą od 100 a mniejszą od 1000; jeżeli weźmiemy przybliżoną wartość dzielnéj na $0{,}000\,001 \times 100 = 0{,}0001$, to wtedy opuścimy w dzielnéj część jéj mniejszą od 0,0001, a więc w ilorazie część jego mniejszą od 0,0001 : 492; a przeto tym więcéj od $0{,}0001 : 100 = 0{,}000\,0001$. Wykonywajac zatym dzielenie 978,425 6 : 492, możemy je poprowadzić aż do 6-téj cyfry dziesiętnéj, t. j. do części milionowych ilorazu, do których z uwagi, żeśmy wzięli wartość dzielnéj przybliżoną z niedomiarem, dodamy 1-nę.

9. Gdybyśmy np. mieli zadanie: wziąć średnią arytmetyczną (§ 7, us. 25) trzech obserwacyi wysokości barometru: 733,9 *mm*, 734,8 *mm*, 731,1 *mm*, to wypada: $\frac{733{,}9+734{,}8+731{,}1}{3}$ *mm* $= 733{,}266\ldots$ *mm*. Ponieważ niedokładność każdéj obserwacyi jest niewiększa od 0,05 *mm*, przeto niedokładność sumy tych 3 obserwacyj nie jest większa od 0,15 *mm*, a ich średniéj arytmetycznéj od 0,05 *mm*; z takim więc przybliżeniem mamy wziąć wartość średniéj arytmetycznéj. Weźmiemy zatym w tym przypadky jako przybliżoną wartość ilorazu 733,3 *mm*.

WŁASNOŚCI ILOCZYNU I ILORAZU.

10. Opierając się na tym, że tak własność: „iloczyn nie zależy od porządku czynników", jak i własności, wypowiedziane w us. 12-ym § 6-go, mają miejsce również wtedy. kiedy pośród liczb danych są dziesiętne (§ 23; us. 5), łatwo dowieść, że własności, wypowiedziane w us. 13-ym i 15-ym § 7-go, stosują się również do przypadku, kiedy pośród liczb danych są dziesiętne i kiedy mnożymy lub dzielimy przez liczby dziesiętne. Jeżeli zaś, wykonywając dzielenie liczb dziesiętnych, doszliśmy do pewnego ilorazu niezupełnego i reszty dzielenia (por. us. 2, 3, 7), to własności, wypowiedziane w us. 14-ym § 7-go, miéć tu także będą swoje zastosowanie.

§ 25. DZIAŁANIA NA LICZBACH PRZYBLIŻONYCH.

1. Mówiliśmy w us. 13-ym § 21-go, iż niekiedy zadawalać się wypada wartością przybliżoną liczby. Zwykle wartości przybliżone liczb są wyrażane jako dziesiętne; dlatego zajmiemy się szczegółowo rozważeniem, jak wykonywać należy działania na liczbach dziesiętnych, jeżeli, czy to chcemy otrzymany wypadek mieć z pewnym przybliżeniem, czy też pośród danych liczb są liczby przybliżone.

W § 24-ym w us. 2-gim i 7-ym widzieliśmy, że nawet wykonywanie dzielenia liczb dokładnych prowadzić może do wartości przybliżonych ilorazu, w us. zaś 13-ym § 21-go mieliśmy cały szereg przykładów wyjaśniających potrzebę uwzględniania przybliżonych wartości liczb. Ponieważ jakkolwiek starannie wykonane narzędzia, służące do pomiarów, są zawsze do pewnego stopnia niedokładne, przeto w rachunkach praktycznych z tego powodu występują wartości przybliżone liczb, z pomiarów wynikające. Nadto podobnie, jakto widzieliśmy w pierwszym przykładzie us. 13-go. § 21-go, wykonywanie rachunku na liczbach danych, może prowadzić do części tak drobnych, że już nam o nie nie idzie, że one w zadaniach praktycznych znaczenia nie mają. Dlatego przy wykonywaniu zadań mieć należy na uwadze niekiedy, jaka jest pożądana dokładność rezultatu, który otrzymać chcemy, albotéż jaką dokładność tego rezultatu otrzymać możemy.

Jeżeli do rachunku wchodzą liczby przybliżone, to gdy mamy wypisaną liczbę, może powstać wątpliwość, czy ona jest liczbą dokładną, czy też liczbą przybliżoną, (ściśléj mówiąc: wartością przybliżoną pewnéj liczby.) Tak np. gdy mamy pośród liczb danych wypisaną liczbę 6,434, to, jeżeli wiemy, iż między liczbami danymi mogą być liczby przybliżone, potrzeba, aby było wyraźnie zaznaczone, czy ta liczba jest dokładna, czy też przybliżona. W piérwszym bowiem razie możemy ją w naszym rachunku uwzględniać bez żadnego zastrzeżenia; w drugim zaś razie trzeba w rachunku zważać na to, iż niedokładność téj liczby jest mniejsza, albo od 0,001, albo od 0,0005 (§ 21, us. 13), że wtedy liczba 6,434 może przedstawiać wartość przybliżoną np. liczby 6,43363626 ... (por. § 24, us. 6 i 7), a równie dobrze mogła być wartością przybliżoną innéj liczby np. 6,43447, albo 6,4339827 i t. d.

2. Aby więc uniknąć podobnych wątpliwości, i aby nie omawiać oddzielnie każdéj przybliżonéj z liczb danych, umówmy się, iż w tym paragrafie każda *z danych* liczb przybliżonych jest dokładna na 0,5 części, oznaczanych na ostatnim miejscu, i nadto, iż zapomocą np. gwiazdki *

postawionéj u góry z prawéj strony liczby oznaczać będziemy [1]) tak pojęte *dane* liczby przybliżone. Tak np. 2,3145* oznaczać nam tu będzie liczbę daną przybliżoną na 0,00005 t. j. nie mniejsza od 2,31445, a mniejsza od 2,31455, gdy tymczasem liczba: 2,3145 oznaczać nam tu będzie liczbę dokładną: 23145 dziesięciotysiącznych, zaś liczba: 2,3145... oznacza liczbę w któréj niewiadoma jest ilość części stotysiącznych i t. d., t. j. liczbę większą od 2,3145 a mniejszą od 2,3146. Podobnie np. liczba 0,09300* oznaczać będzie wartość przybliżoną na 0,000005 pewnéj liczby, a więc nie mniejszéj od 0,092995 a mniejszéj od 0,093005, przyczym zauważymy, że choć 0,09300 = 0,093 (§ 21, us. 8) to jednak nie jest 0,09300* toż samo, co 0,093*, gdyż ta ostatnia liczba może być np. wartością przybliżoną liczby: 0,0926.

3. Gdybyśmy mieli np. pomnożyć liczbę 4,235 przez 12,057, a szło nam o to, aby otrzymać wartość przybliżoną iloczynu z trzema cyframi dziesiętnymi, to gdybyśmy wykonali mnożenie liczb danych według znanego prawidła (§ 23, us. 3), otrzymalibyśmy w iloczynie 6 cyfr dziesiętnych, a więc trzy ostatnie z nich byłyby zbyteczne. Iść więc nam może o to, abyśmy tak postępowali, iżby w tym mnożeniu niewykonywać częściowych działań, nie mających wpływu na żądaną wartość iloczynu z 3-a tylko cyframi dziesiętnymi, t. j. tak skrócić postępowanie, iżby najprostszą drogą dojść do owéj wartości przybliżonéj.

W innym przypadku iść nam może o to, aby, mając np. liczbę przybliżoną 28,2346* pomnożyć przez liczbę przybliżoną 3,246*, oznaczyć z jakim możliwie największym przybliżeniem otrzymać możemy iloczyn takich liczb, aby następnie po oznaczeniu tego, również nie wykonywać tych częściowych działań, które nie mogą mieć wpływu na wartość przybliżoną iloczynu, którą otrzymać mamy.

Podobne postępowanie przy wykonywaniu dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia, w których albo mając na widoku przybliżoną wartość wypadku, albo też uwzględniając przybliżone wartości liczb danych, niewykonywamy tych części rachunku, które następnie okazaćby się mogły niepotrzebnie wykonanymi, jako nie mające wpływu na otrzymany wypadek, stanowią oczywiście postępowanie „skrócone". Odpowiednie wykonywanie działań nazywamy krótko: *działaniami skróconymi.*

Możemy więc przy wykonywaniu działań skróconych mieć dwa cele na widoku:

a. Oznaczyć z jakim przybliżeniem należy wziąć każdą z liczb da-

---

[1]) Liczb przybliżonych na 5 jedności, dziesiątków, setek i t. d., nie możnaby w taki sposób oznaczyć; wypadłoby więc każdą z takich liczb wyraźnie omówić.

nych, aby wypadek działania skróconego, które na tych liczbach wykonać mamy, otrzymać z żądanym przybliżeniem.

b. Z jakim przybliżeniem otrzymać możemy wypadek działania na liczbach danych, jeżeli pośród nich są liczby przybliżone, wskutek czego wykonać mamy również działanie skrócone.

DODAWANIE SKRÓCONE.

4. Weźmy zadanie. Dane są liczby

5,470235 0,002 8,303667 117 3,98267 i 0,00004

a chcemy znaleść tylko przybliżoną, np. na 0,001 (§ 21, us. 13), wartość sumy tych liczb.

Mamy tu składników 6, t. j. mniéj niż 10. Gdy więc weźmiemy zamiast każdego składnika, liczbę doń przybliżoną na 0,0001, to wtedy błąd z powodu wzięcia tych przybliżonych wartości wszystkich składników jest mniejszy od $0{,}0001 \times 10$, t. j. mniejszy od 0,001. Gdy więc mamy te składniki pod sobą podpisane, to uwzględniamy w nich tylko piérwsze 4 cyfry dziesiętne, a następne opuszczamy. Dodając tedy do siebie te przybliżone z niedomiarem wartości składników, otrzymamy 134,7584. Ponieważ w składnikach opuściliśmy pewne części, przeto ta suma 134,7584 jest widocznie mniejsza od dokładnéj sumy pierwotnie danych składników. Że zaś, jakeśmy tylko co widzieli, błąd, powstały z zadowolenia się przybliżonymi na 0,0001 wartościami składników, jest mniejszy od 0,001, zatym dokładna suma jest mniejsza od 134,7584 + 0,001, czyli jest mniejsza od 134,7594. Jest tedy dokładna suma pierwotnie danych składników zawarta między 134,7584 a 134,7594. A gdy różnica między tymi liczbami krańcowymi jest wszystkiego 0,001, to biorąc jakąkolwiek liczbę pośrednią, np. najdogodniéj 134,759, jesteśmy (wogóle mówiąc) tymbliżéj dokładnéj wartości sumy.

```
 5,470235
 0,002
 8,303667
117
 3,98267
 0,00004
-------
134,7584
134,759
```

Aby przy danym stopniu przybliżenia sumy, wykonać skrócone dodawanie niewięcéj niż 10-u składników, należy wziąć wartości składników przybliżone z niedomiarem na 10-tą część stopnia żądanego przybliżenia sumy, dodać je do siebie i w otrzymanéj liczbie, opuściwszy ostatnią cyfrę dziesiętną, do części oznaczonych na ostatnim z pozostałych miejscu dodać 1-nę.

W podobny sposób dojdziemy do tego, że

Aby, przy danym stopniu przybliżenia sumy, wykonać skrócone dodawanie więcéj niż 10-u, a niewięcéj niż 100-u składników, należy wziąć war-

tości przybliżone z niedomiarem na 100-ną część stopnia żądanego przybliżenia sumy, dodać je do siebie i w otrzymanéj liczbie, opuściwszy ostatnie dwie cyfry dziesiętne, do części oznaczonych na ostatnim z pozostałych miejscu dodać 1-nę. — I t. d.

Według powyższego prawidła należało każdy składnik brać z niedomiarem; dlatego powiększaliśmy o 1 ostatnią z cyfr, zatrzymanych w sumie. Gdybyśmy, zamiast wartości składników przybliżonych z niedomiarem na 1 ostatniéj z zatrzymanych w nich części, brali ich wartości przybliżone na 0,5, tych części, to często powyższego prawidła stosowaćby nie można. Wprawdzie w poprzednio wypisanym przykładzie możnaby tak postąpić: jako składniki trzeci i piąty wzięlibyśmy odpowiednio: 8,3037* i 3,9827*, w otrzymanéj liczbie 134,7586 opuszczając ostatnią cyfrę 6 doszlibyśmy do téj saméj co poprzednio wartości 134,759 przybliżonéj sumy. Ale jednak niezawsze takby było, (por. pierwszy przypisek do us. 5-go).

5. Gdy mamy wykonać dodawanie liczb, a pośród nich są takie, których są dane przybliżone tylko wartości (us. 2), to może się zdarzyć, że we wszystkich tych wartościach przybliżonych jest jednakowa ilość cyfr dziesiętnych, albo też, że jedne z nich mają mniéj cyfr dziesiętnych niż inne; prócz tego mogą zachodzić składniki, będące liczbami dokładnymi.

Weźmy naprzód pod uwagę przypadek, kiedy wszystkie dane liczby są przybliżone i z jednakową ilością cyfr dziesiętnych. Np.

O każdym ze składników wypisanego dodawania wiemy, iż on jest od liczby dokładnéj, którą zastępuje, albo większy nie więcéj niż o 0,0005, albo téż mniejszy mniéj niż o 0,0005; że zaś takich składników mamy tu 9, przeto otrzymana suma 34,382 albo jest za wielka nie więcéj niż o 0,0045, albo też mniejsza mniéj niż o 0,0045. Z tego powodu nietylko ostatnią cyfrę 2 sumy należy opuścić, jako zupełnie niepewną — ale nadto w tym przypadku, po odrzuceniu jéj nie należy powiększać ostatniéj zatrzymanéj cyfry o 1, lecz należy przyjąć jako wartość sumy przybliżoną na 0,01 (nie zaś na 0,005) liczbę 34,38. Uwidocznimy to, zauważywszy, że np. w każdym z dwu dodawań:

$$\begin{array}{r} 6{,}267^* \\ 0{,}584^* \\ 4{,}313^* \\ 2{,}897^* \\ 3{,}218^* \\ 6{,}813^* \\ 2{,}315^* \\ 7{,}854^* \\ 0{,}121^* \\ \hline 34{,}382 \\ 34{,}38 \end{array}$$

6,26657	6,26743
0,58363	0,58437
4,3125 27	4,313473
2,89654	2,89746
3,21756	3,21844
6,81257	6,81343
2,31452	2,31548
7,853523	7,854477
0,12056	0,12144
34,378000	34,386000

wziąwszy przybliżone na 0,0005 wartości składników, mieć będziemy do wykonania poprzednio wypisane dodawanie liczb przybliżonych. Otrzymana więc poprzednio suma 34,38 jest zarówno sumy 34,378, jako i sumy 34,386 wartością przybliżoną [1]) na 0,01.

Gdybyśmy wzięli nieco odmiennie od poprzedniego zadanie, mianowicie, gdyby np. zamiast drugiego składnika 0,584* był składnik 0,589*, wszystkie zaś pozostałe składniki były takie same jak w poprzednim dodawaniu, to jako sumę otrzymalibyśmy liczbę 34,387. Ponieważ ta liczba może być zawielka nie więcéj niż o 0,0045, albo też za mała mniéj niż o 0,0045, przeto istotna wartość sumy nie jest mniejsza od 34,3835, a mniejszą od 34,3915, tak, że jako wartość sumy przybliżoną na 0,01 wypadnie w tym razie wziąć liczbę 34,39.

W obu tych zadaniach mieliśmy nie więcéj niż 10 składników, przybliżonych na 0,0005. Otrzymana z ich dodania suma jest od sumy liczb dokładnych albo większa nie więcéj niż o 0,0005 ilość tych składników, czyli krótko mówiąc nie więcéj niż o 0,005, albo też za mała mniéj niż o 0,005. Dlatego w otrzymywanéj sumie opuszczając cyfrę tysiącznych jako niepewną, stosownie do tego, czy ta opuszczona cyfra jest mniejsza, czytéż większa od 5, odpowiednio: nie zmienimy cyfry części setnych (jak w piérwszym przykładzie), lub też powiększymy ją o 1 (jak w przykładzie ostatnim). A tak powstała liczba przedstawia wartość sumy przybliżoną na 0,01. Gdyby opuszczona cyfra była 5, to moglibyśmy poprzedzającéj cyfry nie zmieniać, lub téż powiększyć ją o 1, a każda z tych dwu liczb przedstawia sumę z takim samym przybliżeniem, — jakto sobie łatwo wyjaśnić.

Gdyby w podobnych zadaniach było składników przybliżonych z je-

---

[1]) Wartościami przybliżonymi na 0,005 tych sum, byłaby dla piérwszéj sumy liczba 34,38, dla drugiéj liczba 34,39. Ta ostatnia więc liczba, którą otrzymalibyśmy, stosując do powyżéj wypisanego dodawania liczb przybliżonych prawidło us. poprzedzającego, byłaby więcéj niż o 0,01 (gdyż o 0,012) większa od istotnéj wartości sumy piérwszego z dwu ostatnich dodawań.

dnakową ilością cyfr dziesiętnych więcéj niż 10 a nie więcéj niż 100 to, podobnie jak powyżéj rozumując, przekonamy się, że w otrzymanéj z dodania ich sumie ostatnie dwie [1]) cyfry są niepewne, które też odrzucić należy, przyczym stosownie do tego, czy owe dwie cyfry przedstawiają liczbę mniejszą, czy też większą od 50, nie zmieniamy ostatniéj z zatrzymanych cyfr, lub też powiększamy ją o 1, wrazie zaś gdy owe dwie cyfry przedstawiają liczbę 50, możemy wziąć dowolnie którekolwiek z tych dwu przybliżeń. Stopień dokładności tak otrzymanéj przybliżonéj wartości sumy wynosi 1-nę najmniejszą z zatrzymanych w niéj części. I t. d.

Jeżeli pośród składników są czy to liczby dokładne, czy też liczby przybliżone z większą ilością cyfr dziesiętnych, niż ich mają przybliżone wartości innych składników, np. jeżeli mamy wykonać dodawanie:

2,345625*	2,346*
0,234	0,234
2,535*	2,535*
3,456 78	3,457*
5,24	5,24
6,3456*	6,346*
6,230*	6,230*
	26,388
	26,39

to, z uwagi, że są składniki, w których opuszczone są części dziesięciotysiączne, nie może być mowy o wyznaczeniu tak dziesięciotysiącznych, jak i mniejszych części sumy. Dlatego w tych z danych składników, które mają części dziesięciotysiączne lub mniejsze, opuszczamy je, biorąc przybliżone na 0,0005 wartości tych składników; wskutek tego zadanie sprowadza się do zadania obok wypisanego, w którym mamy pięć składników przybliżonych. Otrzymawszy z dodania wszystkich siedmiu składników liczbę 26,388, widzimy, że istotna wartość sumy jest zawarta między liczbami 26,3855 i 26,3905. Jest więc liczba 26,39 przybliżoną na 0,01 (w tym szczególnym przypadku także na 0,005) wartością sumy.

---

[1]) W niektórych książkach, podawana bywa wskazówka, iż w razie kiedy składników przybliżonych np. na 0,0005, jest nie więcéj niż 20, należy w sumie przybliżonych wartości składników, odrzucić cyfrę tysiącznych, albo też w innych nieco słowach, że w takim razie ostatnia cyfra sumy (t. j. cyfra tysiącznych) jest niepewna. Przypuśćmy że mamy składników 19 i że z dodania wartości przybliżonych składników otrzymaliśmy liczbę 15,246; istotna tedy wartość sumy jest zawarta między liczbami 15,2365 i 15,2555. Gdybyśmy więc wzięli jako przybliżoną wartość sumy: 15,24 toby ona nie była na 0,01 przybliżoną wartością sumy dokładnéj w tych przypadkach, kiedy owa suma jest np. 15,251, albo 15,253 i t. d.; gdybyśmy zaś jako przybliżoną wartość sumy wzięli liczbę 15,25, toby ona nie była na 0,01 przybliżoną wartością sumy dokładnéj w tych przypadkach, kiedy ona jest 15,237, albo 15,2384 i t. d.

Możemy powiedzieć ogólnie:

Jeżeli pośród danych do dodania liczb, znajdują się przybliżone, to każdy składnik należy wziąć z tyloma tylko cyframi dziesiętnymi, ile ich jest w składniku przybliżonym, mającym najmniejszą ilość cyfr dziesiętnych; w otrzymanéj zaś następnie sumie należy odrzucić jednę, dwie i t. d., końcowych cyfr, stosownie do tego, czy w tym dodawaniu zmienionych już składników jest przybliżonych nie więcéj niż 10, więcéj niż 10 a nie więcéj niż 100, i t. d., a nadto gdy piérwsza z opuszczonych cyfr jest większa od 5, należy ostatnią z zatrzymanych cyfr powiększyć o 1.

Jeżeli pośród danych do dodania liczb, znajdują się przybliżone, to stosownie do tego, czy po odrzuceniu, w razie potrzeby, końcowych cyfr w niektórych składnikach, miéć będziemy wszystkich składników przybliżonych nie więcéj niż 10, więcéj niż 10 a nie więcéj niż 100, i t. d., możemy obliczyć sumę, mającą odpowiednio 1-ę, 2-e, i t. d. cyfr końcowych mniéj, niż ich jest w tym z pierwotnych składników przybliżonych, który ma najmniéj cyfr dziesiętnych. Tak obliczonéj sumy stopień przybliżenia będzie wyrażany przez 1-ę część zaznaczoną na ostatnim w niéj miejscu.

Jeżeliby pośród liczb danych były liczby przybliżone, czyto na 1-ość, czy to na 10, czyto na 100, i t. d., to oczywiście stopień przybliżenia sumy zależałby od tego z danych składników, którego stopień przybliżenia wyraża się przez największą liczbę.

ODEJMOWANIE SKRÓCONE.

6. Gdy chcemy np. wyznaczyć różnicę dwu liczb 43,5672 i 25,89604 przybliżoną na 0,01, to aby wykonać odpowiednie odejmowanie skrócone, należy wziąć przybliżone z niedomiarem także na 0,01 wartości odjemnéj i odjemnika i odjąć je od siebie:

$$\begin{array}{r} 43{,}5672 \\ -\,25{,}89604 \\ \hline 17{,}67 \end{array}$$

Wtedy bowiem tak w odjemnéj jak i w odjemniku popełniamy błąd mniejszy od 0,01; zatym w reszcie opuszczamy różnicę między takimi dwiema liczbami, z których każda jest mniejsza od 0,01. Tymwięcéj przeto ta różnica (t. j. błąd w różnicy danych liczb) jest mniejsza od 0,01. Różnica więc $43{,}56 - 25{,}87 = 17{,}67$ przedstawia żądane przybliżenie różnicy liczb danych.

Aby, przy danym stopniu przybliżenia różnicy, wykonać skrócone odejmowanie dwu liczb, należy z tymże stopniem przybliżenia wziąć wartości przybliżone z niedomiarem liczb danych i odjąć je od siebie.

7. Gdybyśmy mieli wykonać odejmowanie np. $14{,}234^* - 3{,}638752^*$, to nie mogłoby być mowy o wyznaczeniu dziesięciotysiącznych lub

mniejszych części różnicy. Wypadnie więc tu w odjemniku zostawić tylko 3 cyfry dziesiętne.

$$\begin{array}{r} 14{,}234^* \\ -\,3{,}639^* \\ \hline 10{,}595 \end{array}$$

odjemna jest wartością przybliżoną liczby nie mniejszéj od 14,2335, a mniejszéj od 14,2345, odjemnik zaś ogólnie rzecz biorąc jest wartością przybliżoną liczby nie mniejszéj od 3,6385 a mniejszéj od 3,6395. A więc wypisana różnica 10,595 jest (§ 22, us. 5; § 5, us. 9) wartością przybliżoną liczby większéj od $14{,}2335 - 3{,}6395 = 10{,}594$, a mniejszą od $14{,}2345 - 3{,}6385 = 10{,}596$, jest więc otrzymana różnica 10,595 wartością różnicy dokładnéj przybliżoną na 0,001.

Jeżeli z danych do odjęcia liczb, jedna lub też obie są przybliżone, to bierzemy obie liczby z tyloma cyframi dziesiętnymi, ile ich jest w téj z liczb przybliżonych, która ma mniéj cyfr dziesiętnych. Tak obliczonéj różnicy stopień przybliżenia będzie wyrażony przez 1-ną część zaznaczaną na ostatnim w niéj miejscu.

Jeżeli z danych do odjęcia liczb, jedna lub też obie są przybliżone na 1-ść, albo na 10, albo na 100 i t. d., to stopień przybliżenia różnicy zależałby od téj z danych liczb, któréj stopień przybliżenia wyraża się przez większą liczbę.

MNOŻENIE SKRÓCONE.

8. Przypuśćmy, że mamy pomnożyć [1]) liczbę 4689,798798 przez 86,897, i że chcemy otrzymać wartość iloczynu tych liczb, przybliżoną na 0,1. Uskuteczniajmy działanie w ten sposób (por. § 6, us. 24), iż naprzód wypiszemy częściowy iloczon mnożnéj przez piérwszą z lewéj strony cyfrę mnożnika, następnie przez drugą i t. d.

$$\begin{array}{r} 4689{,}798798 \\ 86{,}897 \\ \hline 375183\,90384 \\ 28138\,792788 \\ 3751\,8390384 \\ 422\,08189182 \\ 32\,828591586 \\ \hline 407529{,}4\,46149806 \end{array}$$

Ponieważ nam szło tylko o 10-te części iloczynu, przeto dla ich uwidocznienia oddzielmy kreską pionową 10-te części tak w iloczynach częściowych jak i w iloczynie zupełnym. Łatwo spostrzeżemy, że niektóre z częściowych mnożeń cyfr mnożnéj przez cyfry mnożnika, uwzględnionych po za tą kréską pionową, niepotrzebnie (z uwagi na żądane przybliżenie iloczynu) były wykonane.

[1]) Są tu wzięte liczby dość duże, aby odrazu mieć materyjał do uwag w us. 16-ym.

Niektóre jednak miały wpływ na cyfry z lewéj strony téj kreski się znajdujące. Tak np. w drugim iloczynie częściowym z pomnożenia 6-ciu jedności mnożnika przez 9 setnych w mnożnéj otrzymaliśmy 5 dziesiątych w tym częściowym iloczynie; prócz tego jednak nie tylko pozostałe 4 setne, lecz jeszcze 4 setne, otrzymane z pomnożenia 6-ściu jedności mnożnika przez 7 tysięcznych w mnożnéj, razem $4 + 4 = 8$ setnych, ma wpływ w sumie takich częściowych iloczynów na cyfrę dziesiątych w iloczynie szukanym. Widzimy więc, że w owym iloczynie częściowym mnożnéj przez jedności mnożnika należy uwzględnić nietylko dziesiąte, ale jeszcze setne i tysięczne części w mnożnéj. Podobnie, przypatrując się piérwszemu iloczynowi częściowemu, dostrzeżemy, że choć 10-te w nim części powstają z pomnożenia 8 dziesiątków mnożnika przez setne części w mnożnéj, to jednak w nim (ze względu na 10-te części otrzymać się mającego iloczynu) należy uwzględnić iloczyny 8 dziesiątków mnożnika przez tysięczne i dziesięciotysięczne części mnożnéj. I t. d.

Moglibyśmy zatym, z uwagi na żądane przybliżenie iloczynu, wykonać mnożenie nasze w taki sposób:

```
4689,798798
   86,897
-----------
375183 896
 28138 788
  3751 832
   422 073
    32 823
-----------
407529 412
```

Mamy tu wszystkie iloczyny częściowe „ograniczone" do części tysięcznych t. j. do części 100 razy mniejszych od stopnia żądanego przybliżenia iloczynu. Dla otrzymania piérwszego z tych iloczynów częściowych zaczynaliśmy mnożenie od pomnożenia 10-tysięcznych w mnożnéj przez dziesiątki mnożnika; dla otrzymania drugiego iloczynu częściowego — od pomnożenia tysięcznych w mnożnéj przez jedności mnożnika; dla otrzymania trzeciego iloczynu częściowego — od setnych mnożnéj przez dziesiąte mnożnika, i t. d. Wogóle stopniowo coraz o jednę mniéj cyfr mnożnéj uwzględnialiśmy. Dlatego zwykle inaczéj podpisujemy cyfry mnożnika pod mnożną; mianowicie tak, aby każda cyfra mnożnika znalazła się pod piérwszą (od prawéj strony) z mnożonych przez nią cyfr mnożnéj. W tym więc przykładzie cyfrę jedności (6) mnożnika piszemy pod tą cyfrą mnożnéj, od któréj zaczynamy odpowiednie mnożenie częściowe, t. j. pod tysięcznymi mnożnéj; obok tak napisanéj cyfry jedności mnożnika piszemy z prawéj strony cyfrę jego dziesiątków i t. d., z lewéj zaś strony jedności mnożnika cyfrę jego dziesiątych części i t. d.

Gdy tak cyfry mnożnika zostały wypisane, to każde częściowe mnożenie przez oddzielną cyfrę mnożnika zaczynamy od téj cyfry mnożnéj, która nad ową cyfrą mnożnika się znajduje a iloczyny częściowe tak wy-

```
4689,798798
   7,9868
-----------
375183 896
 28138 788
  3751 832
   422 073
    32 823
-----------
407529,412
407529,5
```

pisujemy, aby piérwsze z prawéj strony ich cyfry znalazły się w jednéj kolumnie. Zestawiając tak otrzymany iloczyn 407 529,412 z iloczynem dokładnym 407 529,446 149 806, widzimy, że po opuszczeniu setnych i tysiącznych części iloczynu, powyżéj otrzymanego w sposób skrócony, miéć będziemy [1]) wartości tak 407 529,4, jak i 407 539,5 iloczynu liczb danych, istotnie przybliżone na 0,1.

Gdybyśmy pomnożyli 56 489,878 978 934 przez 9 789,879 89, to otrzymalibyśmy, jako iloczyn, liczbę 553 029 130,204 399 700 237 26. Chcąc skróconym sposobem otrzymać iloczyn tych liczb przybliżony na 0,1, postąpilibyśmy tu, podobnie jak w piérwszym przykładzie, t. j. wykonalibyśmy działanie następujące:

```
56 489,878 978 934
    989 789 879
-----------------
508 408 010 802
 39 542 915 279
  4 519 190 312
    508 408 902
     45 190 312
      3 954 286
        508 401
         45 184
          5 076
-----------------
553 029 130,138
553 029 130,2
```

Opuściwszy w otrzymanéj liczbie części setne i tysiączne miéć będziemy liczbę 553 029 130, 1; zestawiając ją z iloczynem dokładnym liczb danych, powyżéj wypisanym, widzimy, że ta liczba jest mniejsza od iloczynu dokładnego więcéj niż o 0,1. W tym więc przypadku dopiéro po powiększeniu o 1-nę ostatniéj z zatrzymywanych części liczby, otrzymamy liczbę 553 029 130,2, przedstawiającą wartość iloczynu liczb danych przybliżoną na 0,1.

9. O wartości wyłożonego powyżéj postępowania skróconego, jako téż o wskazówce, co do tego czy zatrzymywaną, po odrzuceniu cyfr końcowych, ostatnią cyfrę należy zawsze powiększyć o 1, wnieść będziemy mogli, zastanowiwszy się nad wielkością różnicy, jaka być może między

---

[1]) Ograniczaliśmy tu w mnożeniu skróconym częściowe iloczyny do części tysiącznych, choć szukaliśmy wartości iloczynu przybliżonéj na 0,1. Gdybyśmy iloczyny częściowe ograniczyli do części setnych, to wykonawszy działanie (jedności mnożnika podpisując pod setnymi mnożnéj i t. d.):

```
4 689,798 798
   79 868
-----------
375 183 84
 28 138 74
  3 751 76
    422 01
     32 76
-----------
407 529,11
```

otrzymalibyśmy liczbę 407 529,11 czyli po opuszczeniu części setnych 407 529,1. Widocznie ani ta liczba 407 529,1 ani téż liczba 407 529,2 nie przedstawia wartości iloczynu liczb danych przybliżonéj na 0,1.

iloczynem dokładnym, a przybliżoną wartością iloczynu, otrzymanego przy postępowaniu skróconym.

Zastanówmy się nad ostatnim mnożeniem skróconym. Mnożyliśmy naprzód przez 9 (tysięcy) liczbę 56 489,878 978, tak iż nie uwzględniliśmy iloczynu $0{,}000\,000\,934 \times 9\,000$, a ta ostatnia liczba jest mniejsza od $0{,}001 \times 9$. Podobnie w drugim iloczynie częściowym nie uwzględniliśmy $0{,}000\,008\,934 \times 700$, a ta liczba jest mniejsza od $0{,}001 \times 7$ i t. d. W ogóle opuściliśmy części iloczynu, które razem wzięte, są mniejsze od liczby:

$$0{,}001 \times [9+7+8+9+8+7+9+8+9] = 0{,}001 \times 74 = 0{,}074,$$

którato liczba jest mniejsza od 0,1. A więc: po piérwsze, otrzymana w postępowaniu skróconym suma iloczynów częściowych 553 029 130,128 jest mniejsza od iloczynu dokładnego, i mianowicie mniejsza mniéj niż o 0,1; powtóre możemy powiedziéć, iż iloczyn dokładny jest zawarty między liczbą 553 029 130,138 a liczbą 553 029 130,238; a po trzecie, że, opuszczając w liczbie 553 029 130,138 końcowe dwie cyfry, należy ostatnią zatrzymaną powiększyć o 1, aby miéć przybliżoną napewno na 0,1 wartość iloczynu liczb danych.

Taksamo rozumując w przykładzie piérwszym, znajdziemy, że w postępowaniu skróconym opuściliśmy część iloczynu mniejszą od

$$0{,}001 \times [8+6+8+9+7] = 0{,}001 \times 38,$$

a ta liczba jest mniejsza od 0,1. A więc otrzymana sposobem skróconym suma iloczynów częściowych: 407 529,412 jest mniejszą od iloczynu dokładnego mniéj niż o 0,1; a więc: iloczyn dokładny jest zawarty między 407 529,412 a 407 529,512; opuszczając w liczbie 407 529,412 dwie końcowe cyfry, należy ostatnią zatrzymaną powiększyć o 1, aby miéć przybliżoną (napewno) na 0,1 wartość 407 529,5 iloczynu liczb danych.

Na tych dwu przykładach widzieliśmy, że otrzymana zapomocą skróconego postępowania wartość iloczynu jest mniejsza odpowiednio od

$$8+6+8+9+7$$

lub

$$9+7+8+9+8+7+9+8+9$$

części najmniejszych każdego z iloczynów częściowych. Wypisane tylkoco sumy przedstawiają sumy cyfr odpowiednich mnożników. Obie te sumy, piérwsza 36, druga 74, są liczbami większymi od 10 a nie większymi od 100. Ponieważ szło nam o to, aby otrzymać wartości iloczynów przybliżone na 0,1, przeto trzeba było w rachunku uwzględnić tysiączne w iloczynach częściowych, gdyż w skutek tego opuszczone ich części, razem wzięte, były mniejsze odpowiednio od 36 tysiącznych lub 74 tysiącznych, t. j. mniejsze od 0,01. Gdyby nam było szło o znalezienie wartości iloczynu przybliżonéj na 0,01, wypadałoby uwzględnić w częściowych iloczynach

10-tysiączne, co osięgnęlibyśmy, podpisując jedności mnożnika pod dziesięciotysiącznymi mnożnéj (gdyż wtedy opuszczone w tym postępowaniu skróconym części iloczynu, razem wzięte, byłyby mniejsze odpowiednio od 36 lub 74 dziesięciotysiącznych, t. j. mniejsze od 0,01), a następnie postępując podobnie jak powyżéj. I. t. d.

10. Rozważymy kilka przykładów, które nam wyjaśnią, jak w szczególnych przypadkach postępować należy przy wykonywaniu mnożenia skróconego.

a. $586{,}2497856 \times 2\,010{,}214$ z przybliżeniem na 0,01. Ponieważ suma cyfr mnożnika jest 10, przeto w rachunku uwzględnić należy tysiączne iloczynów częściowych, gdyż wówczas suma tych iloczynów częściowych będzie mniejsza od iloczynu dokładnego mniéj niż o $0{,}001 \times 10 = 0{,}01$. Podpiszemy więc cyfrę jedności mnożnika pod tysiącznymi mnożnéj i t. d.

```
   586,249 785 6
     4 120 102
-----------------
 1 172 499 570
     5 862 497
       117 248
         5 862
         2 344
-----------------
 1 178 487,521
 1 178 487,53
```

W otrzymanéj z tego działania liczbie 1 178 487,521 opuściwszy części tysiączne, a zatrzymaną ostatnią cyfrę powiększając o 1, mieć będziemy wartość iloczynu liczb danych, przybliżoną na 0,01.

Gdyby odpowiednia suma cyfr mnożnika była większa od 100; a mniejsza od 1000, to łatwo wyrozumieć, że należałoby jedności mnożnika podpisać pod częściami mnożnéj, 1000 razy mniejszymi od stopnia żądanego przybliżenia iloczynu. I. t. d.

Niezawsze jednak zachodzi potrzeba brania na uwagę sumy wszystkich cyfr mnożnika. Rozważymy odpowiednie przypadki (b., c.)

b. $2{,}34567892 \times 63427{,}028$ z przybliżeniem na 0,01. Podpisujemy jedności mnożnika pod dziesięciotysiącznymi mnożnéj i t. d.

```
 2,345 67892
   820 72436
-------------
```

Tu przez cyfrę 6 mnożnika mnożymy całą mnożną, a więc nie opuszczamy w tym mnożeniu częściowym żadnych części iloczynu dokładnego. Wskutek tego możemy powiedzieć, że suma iloczynów częściowych w mnożeniu skróconym będzie tu mniejsza od iloczynu dokładnego mniéj niż o

$$3+4+2+7+2+8$$

dziesięciotysiącznych.

Gdybyśmy mieli $2{,}345\frac{6}{7}67 \times 63427{,}028$ z przybliżeniem na 0,01, to wykonywalibyśmy działanie skrócone:

Z mnożenia 6 (dziesiątków tysięcy) przez 7 (stotysięcznych) otrzymujemy cyfrę 2, która przedstawia części dziesiąte tego piérwszego iloczynu częściowego; że zaś wszystkie iloczyny częściowe są wyrażane w takich częściach, jakimi są części mnożnéj, pod którymi podpisano części jedności mnożnika t. j. w dziesięciotysiącznych, przeto w naszym iloczynie częściowym należy postawić zera na miejscach części setnych, tysięcznych i dziesięciotysiącznych. I t. d. Jeżeli więc, po podpisaniu mnożnika pod mnożną, nad końcowymi z prawéj strony cyframi mnożnika niema cyfr mnożnéj, to działanie tak prowadzimy, jak gdyby w mnożnéj nad owymi cyframi mnożnika były zera. W naszym przykładzie przez końcowe cyfry 6, 3, 4 i 2 mnożyliśmy całą mnożną, a więc suma iloczynów częściowych w mnożeniu skróconym będzie tu mniejsza od iloczynu dokładnego mniéj niż o

$$7+2+3$$

dziesięciotysiącznych.

```
2,34567
  32072436
1407402000
  70370100
   9382680
    469134
      i t. d.
```

Powiedzieć więc można krótko, że przy wyrachowywaniu odpowiedniéj liczby, należy brać sumę tych tylko cyfr mnożnika, przez które są mnożone niewszystkie cyfry mnożnéj.

c. $56{,}203174 \times 76{,}981432$ z przybliżeniem na 1-ość. Suma cyfr mnożnika jest większa od 10 a mniejsza od 100; iloczyny częściowe ograniczymy do setnych (a więc jedności mnożnika podpisujemy pod setnymi mnożnéj i t. d.), gdyż wówczas suma iloczynów częściowych będzie od iloczynu dokładnego mniejsza mniéj niż o $0{,}01 \times$ liczbę mniejszą od 100. Po podpisaniu cyfr mnożnika, w odwrotnym porządku widzimy, że są z lewéj strony cyfry mnożnika 4, 3, 2, nad którymi niéma cyfr mnożnéj, tak iż, wykonywając działanie, przez te cyfry nie mamy co mnożyć, t. j. nie będziemy mieli iloczynów częściowych, odpowiadających tym cyfrom mnożnika. W rzeczywistości więc wykonywamy tylko mnożenie:

```
56,203 174
23418 967
```

```
56,203 174
18 967
```

t. j. postępować będziemy tak, jakgdybyśmy szukali iloczynu 56,203 174 przez 76,981 przybliżonego na 1. Liczba, którą otrzymamy, będzie mniejsza od iloczynu dokładnego liczb $59{,}203\,174 \times$ $\times 76{,}981$ mniéj niż o $0{,}01 \times [7+6+9+8+1]$. Opuściliśmy zatym całkiem iloczyn mnożnéj 56,203 174 przez część mnożnika 0,000432, która to liczba jest mniejsza od $100 \times 0{,}0005 = 0{,}05$. Widzimy, że, wykonywając sposobem skróconym mnożenie liczb pierwotnie tu danych, otrzy-

mujemy jako sumę iloczynów częściowych liczbę, która jest mniejsza od iloczynu dokładnego mniéj niż o

$$7+6+9+8+1+[4+1],$$

setnych [1]).

Gdybyśmy mieli wykonać mnożenie: 56,203144 × 76,9814 z przybliżeniem na 1, to w mnożeniu skróconym opuścilibyśmy iloczyn mnożnéj przez 0,0004, którato liczba jest mniejsza od $100 \times 0{,}0004 = 0{,}04$, tak iż wtedy suma iloczynów częściowych byłaby mniejsza od iloczynu dokładnego mniéj niż o:

56 203 144
418 967

$$7+6+9+8+1+4$$

setnych.

A więc przy wyliczaniu liczby, od któréj jest mniejsza różnica między iloczynem dokładnym a sumą otrzymywanych w postępowaniu skróconym iloczynów częściowych, należy do sumy cyfr mnożnika, przez które były mnożone nie wszystkie cyfry mnożnéj, dodać piérwszą z cyfr mnożnika, przez które nie uskutecznialiśmy częściowych mnożeń, a tę należy powiększyć o 1, w razie, kiedy takich zaniedbanych cyfr mnożnika jest więcéj niż jedna.

Ostatecznie zatym z tego, cośmy pod b. i c. widzieli, wynika, że *różnica między iloczynem dokładnym dwu liczb a sumą iloczynów częściowych, otrzymywanych zapomocą mnożenia skróconego, wyrażona w tych że, co te iloczyny, częściach, jest mniejsza od sumy tych cyfr mnożnika, przez które były mnożone niewszystkie cyfry mnożnéj, i piérwszéj z zaniedbanych cyfr mnożnika, którąto cyfrę należy powiększyć o 1, jeżeli w mnożniku takich zaniedbanych cyfr jest więcéj niż jedna.*

Co się zaś tyczy samego wykonywania mnożenia skróconego [2]), to powiedzieć możemy: *aby, przy danym stopniu przybliżenia, wykonać skrócone mnożenie dwu liczb, tak podpisujemy pod mnożną cyfrę mnożnika, iżby stosownie do tego, czy liczba, od któréj jest mniejsza różnica między iloczynem dokładnym, a sumą iloczynów częściowych mnożenia skróconego, jest: nie większa od 10, większa od 10 a nie większa od 100, większa od*

---

[1]) Zamiast mówić, iż opuszczony iloczyn mnożnéj 56,203 144 przez część 0,000,432 mnożnika jest mniejszy od $100 \times 0{,}0005$, możnaby powiedzieć, iż jest on mniejszy od $60 \times 0{,}001 = 0{,}06$, a więc o różnicy między iloczynem dokładnym a sumą iloczynów częściowych mnożenia skróconego moglibyśmy powiedzieć, iż ona jest mniejsza od:

$$7+6+9+8+1+(5+1)$$

setnych, t. j., iż owa suma składa się z cyfr mnożnika, przez które były mnożone nie wszystkie cyfry mnożnéj, i z powiększonéj o 1 téj cyfry mnożnéj, przed którą znajdują się jeszcze zaniedbane w mnożeniu skróconym cyfry mnożnika. (Tak tę rzecz wypowiadają autorowie francuscy).

[2]) Pomysł takiego wykonywania mnożenia skróconego podał uczony angielski Wiliam *Oughtred* w piérwszéj połowie w. XVII.

100 a nie większa od 1000 i t. d., cyfra jedności mnożnika znalazła się pod cyfrą mnożnéj, oznaczającą takie jéj części, jakie wyznacza odpowiednio 10-ta, 100-na, 1000-na i t. d. część stopnia żądanego przybliżenia iloczynu, a inne cyfry mnożnika znalazły się w porządku odwrotnym, t. j. dziesiątki z prawéj strony obok jedności i t. d., dziesiąte z lewéj strony obok jedności i t. d. Mnożymy następnie mnożną oddzielnie przez każdą cyfrę mnożnika, zaniedbując w każdym takim mnożeniu cyfry mnożnéj, znajdujące się z prawej strony owej cyfry mnożnika, przez którą mnożymy; częściowe iloczyny, stąd otrzymywane, podpisujemy jedne pod drugimi tak, żeby ich pierwsze (z prawej strony) cyfry były pod sobą. Dodawszy po siebie te iloczyny częściowe, otrzymamy sumę wyrażoną w takich częściach, pod jakimi częściami mnożnéj znajduje się cyfra jedności mnożnika. Nie zważając [1]) *zaś w tej sumie odpowiednio* [2]) *na 1-nę, 2-c, 3-y i t. d. ostatnie cyfry, a do części, oznaczonych na bezpośrednio poprzedzającym miejscu, dodając 1-nę, otrzymujemy żądaną wartość przybliżoną iloczynu.*

Oczywiście, że niekiedy nie odrazu można spostrzec, pod którą cyfrą mnożnéj należy według tego prawidła podpisać cyfrę jedności mnożnika, tak np. może się zdarzyć, iż jedności mnożnika, zamiast podpisać już pod częściami mnożnéj, 10 razy mniejszymi od stopnia żądanego przybliżenia iloczynu, podpisujemy pod częściami mnożnéj 100 razy mniejszymi. Wówczas tylko iloczyny częściowe będziemy mieli wyrażane w mniejszych częściach, niż tego konieczna zachodzi potrzeba, ale po odrzuceniu w sumie tych iloczynów dwu ostatnich cyfr i powiększeniu o 1 ostatniéj z zatrzymanych, mieć będziemy tę samę liczbę, co w razie, gdybyśmy jedności mnożnika mieli podpisane o jedno miejsce daléj w lewo Np. gdy mamy: $7{,}865 \times 861{,}24286$ z przybliżeniem na 0,1 i drugą z liczb danych bierzemy za mnożnik, to mogłoby się zdarzyć, że jedności mnożnika podpisujemy pod tysiącznymi mnożnéj, zamiast, jakby wypadało z prawidła $[1+2+4+(2+1)]$, pod setnymi mnożnéj.

7,865	7,865
68242168	6824,2168
6773603	6773,60
6773,7	6773,7

[1]) T. j. opuszczając je, jeżeli to są cyfry dziesiętne, a zastępując je zerami w przeciwnym razie.

[2]) T. j. zależnie od tego, jak wielka jest wzmiankowana poprzednio liczba, od któréj jest mniejsza różnica między iloczynem dokładnym a sumą iloczynów częściowych mnożenia skróconego.

Gdybyśmy mieli np. $54267804{,}6 \times 80008{,}21$ z przybliżeniem na 10000, to wypada jedności mnożnika podpisać pod setkami mnożnéj i znajdziemy.

$$\begin{array}{r} 542678046 \\ \hline 1280008 \\ 43414243680 \\ 4341424 \\ 108534 \\ 5426 \\ \hline 434186990\,64 \\ 434186991{,}0000 \end{array}$$

Oczywiście, że jeżeli mnożnik jest mniejszy od jedności, to nie będziemy podpisywali 0 (jedności), lecz piérwszą znaczącą cyfrę po przecinku napiszemy na takim miejscu na jakim ona stać winna, gdyby na miejscu jedności była także cyfra znacząca. Tak np. gdy mamy: $4{,}67843 \times 0{,}028\,563\,8$ z przybliżeniem na 0,001 to należałoby jedności mnożnika podpisać pod stotysiącznymi mnożnej, wskutek czego cyfra 2 (setnych) mnożnika ma stanąć pod tysiącznymi mnożnéj.

$$\begin{array}{r} 4{,}678\,48 \\ 836\,582 \\ \hline 0{,}13\;3\,46 \\ 0{,}13\;4 \end{array}$$

11. Obliczaliśmy przy pomocy cyfr mnożnika liczbę, od któréj jest mniejsza różnica między iloczynem dokładnym dwu liczb a sumą iloczynów częściowych mnożenia skróconego. Moglibyśmy ją jednak obliczyć przy pomocy cyfr mnożnéj. Gdy mamy np. $4{,}678\,43216 \times \times 45{,}328\,563\,8$ z przybliżeniem na 0,001, to wykonywając:

$$\begin{array}{r} 4{,}678\,432\,16 \\ 836\,582\,354 \\ \hline \end{array}$$

opuszczamy iloczyny: części mnożnika 0,000 0038 i 4-ch jedności mnożnéj, któryto iloczyn jest mniejszy od $0{,}00001 \times 4 = 0{,}000\,04$; części mnożnika 0,000 0638 i 0,6 mnożnéj, który jest mniejszy od $0{,}0001 \times 0{,}6 = 0{,}000\,06$; $0{,}0005638 \times 0{,}07$, który jest mniejszy od 0,00007; i t. d.; nakoniec iloczyn całego mnożnika przez 0,000 000 16 mnożnéj, który jest mniejszy od $100 \times 0{,}000\,0002 = 0{,}00002$. Ostatecznie tedy, różnica, o którą idzie w tym przykładzie, jest mniejsza od

$$4+6+7+8+4+3+2[1+1]$$

stotysiącznych.

A zatym ogólnie: Różnica miedzy iloczynem dokładnym dwu liczb, a sumą iloczynów częściowych mnożenia skróconego, wyrażona w tychże, co one częściach, jest mniejsza od sumy cyfr mnożnéj, które były mnożone nie przez wszystkie cyfry mnożnika, i piérwszéj z zaniedbanych cyfr

mnożnéj, którąto cyfrę należy powiększyć o 1, jeżeli w mnożnéj takich zaniedbanych cyfr jest więcéj niż jedna.

12. Gdy mamy znaléść iloczyn dwu liczb z pewnym przybliżeniem, to wykonywając mnożenie sposobem skróconym, mamy prawo którąkolwiek z dwu liczb danych wziąć za mnożną, a więc pozostałą za mnożnik, to znaczy, że po opuszczeniu cyfr zbytecznych w odpowiednich sumach iloczynów częściowych i po powiększeniu ostatniéj z zatrzymanych cyfr o 1, otrzymamy w obu razach tę samę liczbę. Wynika to wprost z prawidła us. 10-go.

Co się tyczy owych opuszczonych cyfr w sumach odpowiednich iloczynów częściowych, to jeżeli w obu mnożeniach wypadło podpisać jedności jednego z czynników pod cyfrą części jednakowéj wielkości czynnika drugiego, np. przy mnożeniu 4 689,798 798×86,897 z przybliżeniem na 0,1

4689,798798	86,897
7 9868	8978 979864

otrzymamy w obu razach tę samę sumę iloczynów częściowych 407 529,412. W obu bowiem razach opuszczamy też same iloczyny oddzielnych części czynników: 0,000 006×80 i t. d.

Jeżeliby jednak wypadło w jednym z dwu takich mnożeń jedności jednego czynnika podpisać pod innéj wielkości częściami czynnika drugiego, niż w drugim mnożeniu, to ostatnie cyfry w sumach odpowiednich iloczynów częściowych mogłyby być różne np. 7,865 × 861,24286 z przybliżeniem na 0,1

861,24286	7,865
5 687	6824 2168
6773,663	6773, 60
6773,7	6773, 7

Różnica jednak w owych końcowych cyfrach nie może wpływać na stopień przybliżenia otrzymanéj wartości iloczynu, (us. 9, 10).

Możemy więc powiedzieć: *przybliżona wartość iloczynu dwu liczb, otrzymywana według prawidła* us. 10-go, *nie zależy od tego, którą z danych liczb przyjmiemy jako mnożnik.*

13. Moglibyśmy bliżéj, niż to czyniliśmy w us. 9. 10 i 11, określić różnicę między iloczynem dokładnym dwu liczb, a sumą iloczynów częściowych mnożenia skróconego. Tak np. 4,678 43×0,0285638 z przybliżeniem na 0,001, to wykonywając mnożenie:

4,67843
836 582
0,13 346
0,134

opuszczamy iloczyny: 0,00043×0,0285638; 0,008×0,0085638; 0,07×0,000 5638; 0,6×0,000 0638; 4×0,000 0038. Te iloczyny są mniejsze odpowiednio od liczb: 0,0005×0,03; 0,008×0,009; 0,07×0,0006; 0,6×0,000 07; 4×0,000 004; większa zaś odpowiednio od liczb 0,0004×0,02; 0,008×0,008; 0,07×0,0005; 0,6×0,000 06;

$4 \times 0{,}000\,003$. Suma więc tych iloczynów opuszczonych jest mniejsza od 0,000 187 a większa od 0,000 155, iloczyn więc dokładny jest większy od liczby: $0{,}13346 + 0{,}000155 = 0{,}133615$, zaś mniejszy od liczby: $0{,}13346 + 0{,}000\,187 = 0{,}133647$. W naszym zatym przypadku wnieść możemy, iż otrzymana powyżéj przybliżona na 0,001 wartość 0,134 iloczynu liczb danych, przedstawia przybliżenie z nadmiarem.

W innych przypadkach postępowanie podobne może nas doprowadzić do wniosku, że otrzymana według prawidła wartość iloczynu jest przybliżeniem z niedomiarem; niekiedy jednak zdarzyć się może, że nawet w ten sposób nie będziemy mogli wnieść (jeżeli z owych dwu liczb jedna jest mniejsza, druga zaś większa od otrzymanéj według prawidła wartości przybliżonéj), czy otrzymana wartość przybliżona przedstawia przybliżenie z niedomiarem, czy też z nadmiarem.

Z tego widzimy, że w razie, kiedy nam idzie o to, aby wiedzieć, czy wyliczyć się mająca według prawidła us. 10-go przybliżona wartość iloczynu przedstawi przybliżenie z nadmiarem, czy też z niedomiarem, jest rzeczą w wielu razach bezpieczniejszą, a w każdym razie nawet prostszą, odrazu szukać według tego prawidła, iloczynu przybliżonego z jedną cyfrą więcéj.

14. Gdy, podpisawszy pod mnożną cyfry mnożnika w odwrotnym porządku, wykonywamy mnożenie skrócone, to nie uwzględniamy tych cyfr mnożnéj, które przypadają z prawéj strony poza cyframi mnożnika, ani też tych cyfr mnożnika, które przypadają z lewéj strony przed cyframi mnożnéj, tak iż możemy powiedzieć, że owe cyfry, tak jedne jak drugie, nie mają wpływu ani na iloczyny częściowe, ani tymsamym na ich sumę i na braną ostatecznie wartość przybliżoną iloczynu. Tak np. wartość iloczynu $4{,}678\,43 \times 0{,}0285638$ z przybliżeniem na 0,001 znaleźliśmy (ostatnie zadanie us. 10-go) w taki sposób, jakgdybyśmy szukali wartości iloczynu $4{,}678 \times 0{,}028\,56$ również przybliżonéj na 0,001; ograniczyliśmy mnożną do części tysiącznych, zaś mnożnik do części stotysiącznych. Najmniejsze z zatrzymanych części w mnożnéj, tysiączne, są takie, iż po pomnożeniu ich przez największe części mnożnika, setne, otrzymujemy części 100 razy mniejsze od stopnia żądanego przybliżenia iloczynu; nawzajem, najmniejsze z zatrzymanych części mnożnika, stotysiączne, są takie, iż po pomnożeniu ich przez największe części mnożnéj, jedności, otrzymujemy części również 100 razy mniejsze od stopnia żądanego przybliżenia iloczynu. Gdyby w innym przykładzie wypadło jedności mnożnika podpisać pod częściami mnożnéj nie 100 lecz 10 razy mniejszymi od stopnia żądanego przybliżenia iloczynu, to z podobnego pomnożenia najmniejszych zatrzymanych części jednego czynnika przez największe drugiego wypadłyby części nie 100 lecz 10 razy mniejsze od stopnia żądanego przybliżenia iloczynu. I t. p.

Na zapytanie więc: z jakim przybliżeniem należy wziąć mnożną i z jakim mnożnik, aby otrzymać iloczyn z żądanym przybliżeniem?, odpowiedzieć

możemy: *stosownie do tego, czy jedności mnożnika wypada podpisać pod częściami mnożnéj 10 czy 100 czy i t. d. razy mniejszymi od stopnia żądanego przybliżenia iloczynu, należy liczbę, odpowiednio 10, 100 i t. d. razy mniejszą od stopnia żądanego przybliżenia iloczynu, podzielić raz przez największą z części mnożnej, drugi raz przez największe z części mnożnika; piérwsza z tak otrzymanych liczb wyraża stopień przybliżenia, z jakim należy wziąć mnożnik, druga zaś stopień przybliżenia, z jakim należy wziąć mnożną.*

Gdy mamy 586,249 7856×2010,214 z przybliżeniem na 0,01, to ponieważ wypada tu jedności mnożnika podpisać pod częściami 10 razy mniejszymi od stopnia przybliżenia iloczynu (por. us. 10, a), przeto liczby:

$$[0{,}01 : 10] : 100 = 0{,}000\,01\,;\quad [0{,}01 : 10] : 1000 = 0{,}000\,001$$

wyrażają przybliżenia, z jakimi wziąć należy odpowiednio dany mnożnik i daną mnożną. Weźmiemy więc przybliżoną na 0,000 001 wartość mnożnéj 586,249 7856 t. j. wartość 586,249 785, oraz przybliżoną na 0,000 01 wartość mnożnika 2010,214 t. j. w tym przypadku weźmiemy wartość dokładną naszego mnożnika, czyli pierwotnie dany mnożnik. Uskuteczniając więc w tym razie mnożenie mamy:

$$\begin{array}{r} 586{,}249\ 785 \\ 4\ 120\ 102 \\ \hline 1178\ 487{,}53 \end{array}$$

15. Może się zdarzyć, że jednéj z dwu liczb danych, których iloczyn należy znaléść, lub też obu, mamy tylko wartości przybliżone; wówczas potrzeba wiedzieć, z jakim przybliżeniem otrzymać możemy iloczyn liczb danych.

Ponieważ zwykle przybliżoną wartość liczby danéj, mamy na 0,5 części oznaczonych przez ostatnią zatrzymaną cyfrę, przeto ta wartość może być przybliżona z nadmiarem lubteż z niedomiarem. Uskuteczniając zaś mnożenie skrócone na liczbach danych, opuszczaliśmy w nich ostatnie cyfry (us. 10), t. j. braliśmy ich przybliżone wartości z niedomiarem. Z tego powodu przy omówieniu stosowania mnożenia skróconego należy teraz uwzględnić, iż liczby dane mogą być przybliżone równie dobrze z nadmiarem jak z niedomiarem.

Weźmy przykład: pomnożyć 91,118* przez 97,997*. Ponieważ niedokładność każdego z czynników wynosi 0,0005, a każdy czynnik jest mniejszy od 100, przeto iloczyn liczb danych jest od iloczynu liczb 91,118×97,997 albo mniejszy mniéj niż o 0,0005×100+0,0005×100 = = 0,1, albo też większy mniéj niż o 0,1.

Zdawałoby się, iż mogłaby tu być mowa o znalezieniu wartości iloczynu liczb danych z przybliżeniem na 0,1. Zważmy jednak, że gdy zwykłym sposobem uskutecznimy mnożenie 91,118×97,997, to jako do-

kładny iloczyn tych liczb otrzymamy liczbę 8 929,290 646. Ponieważ ten iloczyn od iloczynu liczb 91,118* × 97,997* jest albo większy albotéż mniejszy mniéj niż o 0,1, przeto iloczyn 91,118* × 97,997* jest albo większy od 8 929,19... a mniejszy od 8929,39... Gdybyśmy więc jako przybliżoną wartość iloczynu przyjęli 8929,2, to ta liczba mogłaby być za mała więcéj niż o 0,1, przyjmując zaś 8 929,3 moglibyśmy mieć zawiele więcéj niż o 0,1. Widzimy więc, że dokładnie części dziesiętnych w tym przykładzie wyznaczyć nie możemy. — Gdybyśmy zaś do iloczynu 91,118×97,997 stosowali mnożenie skrócone, szukając jego wartości przybliżonéj na 0,1,

91,118
7 9979
8929,281

to, zważywszy, że otrzymana suma iloczynów częściowych jest za mała mniéj niż 9+9+7=25 tysiącznych, z tego mnożenia skróconego mielibyśmy, co do iloczynu liczb 91,118*×97,997* tę wskazówkę, iż on jest większy od liczby 8 929,281 — 0,1 = 8 929,181, zaś mniejszy od liczby 8 929,281+0,025+0,1 = 8 929,406. Tymmniéj więc może być mowa o wyznaczeniu dokładnym części dziesiątych iloczynu liczb danych przy pomocy mnożenia skróconego.

Możemy więc w tym przykładzie dokładnie wyznaczyć jedności iloczynu. Osiągnąć to możemy zapomocą mnożenia skróconego. Gdy bowiem szukamy iloczynu 91,118×97,997 z przybliżeniem na 1,

91 118
79 979
8929,20

to znajdziemy, że iloczyn 91,118*×97,997* jest większy od liczby 8 929,20 — 0,1 = 8 929,10, zaś mniejszy od liczby 8 929,20+0,32+0,1 = 8 929,62. Otrzymana przeto według prawidła us. 10-go wartość 8 929+1 = 8930 jest [1]) przybliżoną na 1 wartością iloczynu liczb 91,118*×97,997*.

Zważmy, że w tym przykładzie iloczyn największych części jednego z czynników (dziesiątków), przez najmniejsze części drugiego (tysiączne) przedstawiał setne części, i że w takich setnych częściach były wyrażone iloczyny częściowe; ponieważ suma cyfr mnożnika, przez które były mnożone niewszystkie cyfry mnożnéj, jest większa od 10, a niewiększa od 100, przeto owe setne części były (por. us. 10) sto razy mniejsze od stopnia przybliżenia, z jakim można było otrzymać iloczyn danych liczb przybliżonych, t. j. od jedności. Gdybyśmy mieli np. pomnożyć 30,213*× ×97,997*, to i tu iloczyny częściowe mnożenia skróconego byłyby wyra-

[1]) Gdyby w sumie iloczynów częściowych piérwsza z opuszczonych cyfr była 0, zaś suma cyfr mnożnika, przez które były mnożone niewszystkie cyfry mnożnéj, była mała, to mogłoby się zdarzyć, że żądana przybliżona wartość iloczynu (liczb przybliżonych), powstałaby z sumy częściowych iloczynów bez powiększenia piérwszej z zatrzymanych w niéj cyfr.

żone w częściach setnych, jako też również możnaby oznaczyć iloczyn tych liczb z przybliżeniem na 1. Jeżeli piérwszą z danych liczb weźmiemy za mnożnik i zważymy, że suma jéj cyfr jest niewiększa od 10, to, wykonywając mnożenie, możemy jedności liczby 30,213 podpisać już pod dziesiątymi liczby drugiéj:

97 997
312 03
2960,2
2961

Weźmy przypadek, kiedy dane dwie liczby przybliżone są takie, iż iloczyn najmniejszych części piérwszéj przez największe drugiéj przedstawia inne części, niż iloczyn najmniejszych części drugiéj liczby, przez największe piérwszéj, np. 91,11857* przez 97,997*. Wzmiankowane iloczyny przedstawiają tu odpowiednio części dziesięciotysiączne i setne. A więc iloczyn liczb 91,11857×97,997 otrzymany zwykłym sposobem, może być mniejszy lub większy od iloczynu liczb danych mniej niż 0,0505, a więc po odrzuceniu w iloczynie, otrzymanym zwykłym sposobem, części setnych i dalszych, należałoby ostatnią z zatrzymanych cyfr powiększyć o 1, wrazie, gdyby piérwsza z opuszczonych cyfr była niemniejsza od 5, w przeciwnym zaś razie nie należałoby zmieniać ostatniéj z zatrzymanych cyfr; ta liczba przedstawiałaby przybliżoną na 0,1 wartość iloczynu liczb danych. Jeżelibyśmy jednak chcieli tu zastosować mnożenie skrócone, to, szukając iloczynu liczb 91,11857×97,997, przybliżonego na 0,1

91,11857
79979
8929,326

otrzymalibyśmy sumę iloczynów częściowych 8 929,326, która może być za mała mniej niż o 0,041, co miałoby miejsce także wtedy, kiedybyśmy zamiast mnożnéj wzięli, czyto liczbę 91,118565 czy też 91,118575 [1]). A więc iloczyn liczb danych jest większy od liczby 8929,326 — 0,05 = 8929,276, a mniejszy od liczby 8929,326+0,041+ +0,05 = 8929,417, tak iż 8929,3 mogłoby być niekiedy liczbą za wielką od iloczynu 91,11857*×97,997* więcéj niż o 0,1. I w tym więc razie w otrzymanéj zapomocą skróconego mnożenia wartości iloczynu liczb danych przybliżonéj na 0,1 mogłaby cyfra dziesiątych być za mała lub za wielka, tak iż tą drogą możemy istotnie znaleść iloczyn liczb danych z przybliżeniem tylko na 1.

Gdyby tylko jednéj z dwu liczb była dana wartość przybliżona, np.

[1]) Zatym zamiast wspomnianéj liczby 0,0505 możemy brać liczbę 0,05.

gdybyśmy mieli $1{,}7185^* \times 97{,}997\,216$, to tu niedokładność iloczynu jest mniejsza od $0{,}000\,05 \times 100 = 0{,}005$. Podobnie, jak powyżéj, objaśnilibyśmy, że przy pomocy zwykłego mnożenia możnaby otrzymać wartość iloczynu liczb danych przybliżoną na 0,1; przy pomocy zaś mnożenia skróconego otrzymana cyfra setnych mogłaby być niekiedy za mała, niekiedy zaś za wielka, tak iż tą drogą dojść możemy do iloczynu przybliżonego tylko na 0,1.

Możemy zatym ogólnie powiedzieć: *wartość iloczynu liczb, z których jedna lub obie są przybliżone, może być zapomocą mnożenia skróconego wyznaczona zawsze z przybliżeniem, którego stopień jest liczbą 100 razy większą od większéj z dwu liczb, z których każda wyraża iloczyn najmniéjszéj z części jednéj z liczb danych przez największe pozostałéj.*

16. W wielu książkach niemieckich, a także w niektórych polskich, pisanych pod wpływem owych podręczników niemieckich, podawane bywa inne niż w us. 10-ym prawidło wykonywania mnożenia skróconego.

Mianowicie, gdy mamy np. piérwsze z zadań us. 8-go $4689{,}798\,798 \times 86{,}897$ z przybliżeniem na 0,1, to według owego prawidła [1]) należy jedności mnożnika podpisać pod częściami mnożnéj, odpowiadającymi stopniowi żądanego przybliżenia iloczynu, t. j. już pod dziesiątymi, a inne cyfry mnożnika w porządku odwrotnym, następnie należy przez każdą cyfrę mnożnika mnożyć mnożną poczynając od cyfry znajdującéj się nad ową cyfrą mnożnika, przyczym jednak uwzględnić należy dziesiątki, wypadające z pomnożenia piérwszej z zaniedbanych cyfr mnożnéj. Tak więc mnożąc przez piérwszą cyfrę mnożnika 8, powiemy 8 razy 9 jest 72, a z 8-miu razy 8, dziesiątków 6, będzie 78, i dlatego piszemy 8; podobnie mnożąc przez 3-cią cyfrę 8, mamy $8 \times 9 = 72$, a z pomnożenia 8-u przez 7 t. j. z liczby 56 (bliższéj 60-u niż 50-u) mamy 6 dziesiątków, zatym razem 78, i dlatego piszemy 8, i t. d.

```
4689,798 798
  798,68
-----------
3751838
 281387
 37518
  4220
   328
-----------
407529,1
```

Niekiedy zaś zalecane bywa [2]) postępowanie, różniące się od powyższego tym, iż cyfry mnożnika są napisane w zwykłym, nie zaś w zmienionym porządku, przyczym same mnożenie wykonywa się w ten sposób:

---

[1]) Np. w podręcznikach Močnika i w wielu arytmetykach handlowych.

[2]) W niektórych wydaniach Močnika i u Baltzer'a.

```
4689,798798
      86897
-----------
3751838
 281387
  37518
   4220
    328
-----------
407529,1
```

naprzód mnoży się przez cyfrę, oznaczającą największe części mnożnika, mnożną tak, aby w piérwszym iloczynie częściowym miéć części odpowiadające żądanemu stopniowi przybliżenia iloczynu, przyczym uwzględnia się dziesiątki z pomnożenia następnéj jeszcze cyfry mnożnéj; mnożąc przez drugą od lewéj strony cyfrę mnożnika, postępuje się podobnie, uwzględniając tylko w mnożnéj o jednę cyfrę mniéj, i t. d.

Otrzymaliśmy w ten sposób liczbę 407 529,1, kiedy tymczasem powinna nam wypaść albo liczba 407 529,4 albo też liczba 407 529,5 (us. 3). Błędność wyniku powstaje z tego, że nie można liczb, będących częściowymi iloczynami, uważać za niezależne od cyfr mnożnika, którym one odpowiadają [1]); jak to widzieliśmy w us. 9-ym.

Zaznaczyć należy usiłowanie wprowadzenia pewnéj poprawki przez szczegółowe uwzględnienie tego, co się otrzymuje z pomnożenia każdym razem następnéj cyfry mnożnéj, innymi słowy, zalecone bywa mnożenie o jednę każdym razem więcéj cyfr mnożnéj, a sumę tych dodatkowych cyfr ostatnich iloczynów częściowych uwzględnia się przy wypisywaniu ostatecznego wypadku. W powyższym zadaniu otrzymalibyśmy w taki sposób, jako iloczyny częściowe, te same liczby, które są wypisane w przypisku do us. 8-go. Jako suma owych dodatkowych cyfr wypada nam 21, a więc uwzględniając stąd cyfrę 2, dojdziemy w tym przypadku także do liczby 407 529,1. A zatym nawet zachowanie tak zalecanéj ostrożności [2]) nie może nas zabezpieczyć od bardzo błędnego wyniku.

DZIELENIE SKRÓCONE.

17. Zauważmy, że możemy dane dzielenie przy różnym od jedności stopniu przybliżenia ilorazu zastąpić takim dzieleniem, w którym szukamy ilorazu przybliżonego na jedność. Tak np. gdy chcemy otrzymać wartość ilorazu przybliżoną na 100, to, zmiejszywszy daną dzielną 100 razy i wyznaczywszy wartość ilorazu przybliżoną na 1, powiększając następnie znaleziony iloraz 100 razy, miéć będziemy wartość ilorazu danego dzielenia przybliżoną na 100. Podobnie, gdy mamy znaléść wartość ilorazu przybliżoną na 0,01, zwiększymy daną dzielną 100 razy i wyznaczymy wartość ilorazu danego dzielenia przybliżoną na 1, którą zmniejszywszy 100 razy, otrzymamy wartość ilorazu danego dzielenia przybliżo-

[1]) Wskutek tego rzecz naturalna, podawane przez tychże autorów prawidło wykonywania dzielenia skróconego, będącego w związku z takimże mnożeniem, także szwankuje pod względem pewności cyfr, otrzymywanych w przybliżonéj wartości ilorazu.

[2]) Dopiero uwzględnienie w tym przykładzie dwu następujących cyfr w każdym mnożeniu częściowym ochroniłby mogło od błędnego wypadku.

ną na 0,01. Dlatego nadal mieć będziemy na uwadze tylko wyznaczanie ilorazu przybliżonego na 1.

Przypuśćmy, że mamy podzielić 271,9425069 przez 0,1451292929 i chcemy wyznaczyć wartość ilorazu przybliżoną na 1. Innymi słowy: chcemy wyznaczyć wszystkie cyfry całkowitéj części ilorazu. Trzeba się więc dowiedzieć, ilocyfrową będzie całkowita część ilorazu. Wiemy (§ 24; us. 8), że

271,9425069 : 0,1451292929 = 2 719 425 069 000 : 1 451 292 929;

a więc (§ 7, us. 23) cyfr w całkowitéj części ilorazu [1]) będzie $13 - 10 + 1 = 4$. Będziemy zatym mieli do wykonania 4 dzielenia częściowe. W tych dzieleniach nie będziemy zważali na przecinki; dlatego pozostawiamy je w danych do podzielenia liczbach.

Wyznaczmy taką liczbę, przedstawioną przez początkowe cyfry dzielnika, aby ona (uważana jako całkowita) była już większa od sumy tylu jego cyfr, bezpośrednio po tamtych następujących, ile mamy wykonać dzieleń częściowych, zwiększonéj o jedność, jeżeli są jeszcze inne cyfry w dzielniku. Widzimy, że tu $14 < 5 + 1 + 2 + (9 + 1)$, lecz już $145 > 1 + 2 + 9 + (2 + 1)$. Ta liczba 145 będzie w tym sposobie wykonywania dzielenia „ostatnim dzielnikiem". Przedostatnim będzie 1451, trzecim od końca 14 512, czwartym od końca, czyli, jak tu, „piérwszym dzielnikiem", będzie liczba 145 129. Pozostałymi cyframi dzielnika nie będziemy się posługiwali; podkréślamy je zwykle z dołu. Nad ostatnim dzielnikiem poprowadźmy kréskę poziomą. Będziemy więc w dzielniku mieli $0,\overline{1451}292929$. Widzimy z tego, że z ostatniego dzielnika otrzymamy piérwszy, opuszczając w ostatnim o jednę mniéj cyfr końcowych, niż jest dzieleń częściowych do wykonania.

Ponieważ piérwszą cyfrę ilorazu wyznaczymy, dzieląc liczbę, przedstawioną przez początkowe cyfry dzielnéj, przez 145 129, a następnie dzielić będziemy przez liczby, które powstają z piérwszego dzielnika wskutek opuszczenia w nim stopniowo po jednéj od prawéj strony cyfrze, przeto nie będzie potrzeba przypisywać następujących cyfr dzielnéj do reszt, otrzymywanych w czasie wykonywania dzielenia, tak iż tylko tymi cyframi dzielnéj będziemy się tu posługiwali [3]), które są potrzebne do

---

[1]) Gdyby po przesunięciu przecinka o tyle miejsc, ile [2]) jest cyfr w dzielniku, pozostały cyfry dziesiętne w dzielnéj, toby należało przyjąć na uwagę ilość cyfr w całkowitéj części dzielnéj. Zresztą por. us. 2, § 24-go.

[2]) Wystarcza przesunięcie przecinka o tyle tylko miejsc, żeby tak w dzielnéj, jak i w dzielniku była część całkowita różna od zera. Przesunąwszy tu np. przecinek o jedno miejsce i zważywszy, że dość tyle wziąć początkowych cyfr w dzielnéj ile jest w dzielniku, aby otrzymać cyfrę piérwszą ilorazu, znajdziemy, że w jego części całkowitéj jest $4 - 1 + 1 = 4$ cyfry.

[3]) Ostatnia z tych cyfr przedstawia części takie same (w tym przykładzie tysiączne) jak ostatnia cyfra ostatniego dzielnika.

wyznaczenia piérwszéj cyfry ilorazu. Podobnie więc, jakeśmy zrobili z zaniedbanymi cyframi dzielnika, podkréślmy z dołu owe zaniedbywane cyfry dzielnéj.

Tak przygotowawszy dzielnik i dzielną, przystąpmy do dzielenia. Dzielimy tedy 271 942 przez piérwszy dzielnik 145 129; otrzymujemy piérwszą cyfrę ilorazu 1 i resztę 126 813. Przekréślamy ostatnią cyfrę (9) piérwszego dzielnika i dzielimy 126 813 przez 14 512; otrzymujemy w ilorazie następującą cyfrę 8 i resztę 10 717. Przekréślamy ostatnią cyfrę (2) poprzedniego dzielnika i dzielimy 10 717 przez 1451; otrzymujemy następującą cyfrę ilorazu 7 i resztę 560. Przekréślamy ostatnią cyfrę (1) poprzedniego dzielnika i dzielimy 560 przez ostatni dzielnik 145; otrzymujemy w ilorazie ostatnią z żądanych cyfr 3 i resztę 125.

```
271,94250 69 | 0,1451292929
−145129      |
-------------|  1873
 126813
−116096
-------
  10717
 −10157
 ------
    560
   −435
   ----
    125
```

Należy dowieść, że otrzymany w ten sposób iloraz 1873 jest wartością ilorazu, wynikającego z podzielenia przez siebie pierwotnie danych liczb, przybliżoną na jedność. — Zważmy, że częściowe iloczyny dzielnika przez cyfry ilorazu, które tu stopniowo odejmowaliśmy od dzielnéj, są utworzone według prawidła us. 10-go, jeżeli, mnożąc $0{,}1451292929$ przez 1873 sposobem skróconym, podpiszemy cyfrę jedności mnożnika (3) pod piérwszą z prawéj strony cyfrą ostatniego dzielnika (t. j. pod cyfrą 5),

$$0{,}1451292929$$
$$3781$$

I rzeczywiście mnożyliśmy: $145\,129 \times 1$; $14\,512 \times 8$, i t. d. Liczba, od któréj jest mniejszy błąd sumy owych iloczynów częściowych, wyrachowana zapomocą cyfr dzielnika (to jest mnożnéj tego mnożenia; us. 11) jest $1+2+9+(2+1)=15$ takich samych części liczby, w jakich są wyrażone tak iloczyny częściowe, jak i [1]) ostatni dzielnik 145, który wyznaczyliśmy z warunku [2]), aby był większy od owéj liczby 15.

Z tego wypada bezpośrednio, że iloczyn dokładny danego piérwot-

[1]) Gdyż cyfra jedności (3) ilorazu (mnożnika) znajduje się właśnie pod ostatnią cyfrą (5) ostatniego dzielnika.

[2]) Widzimy z tego, że *dzielenie skrócone polega na tym, aby jako ostatni dzielnik wziąć liczbę większą od błędów sumy iloczynów częściowych mnożenia skróconego, odpowiadającego temu dzieleniu.*

nie dzielnika przez iloraz 1873, będąc oczywiście większy od iloczynu, wypadającego z powyższego skróconego mnożenia, jest mniejszy od tegoż iloczynu, powiększonego o 0,015, a tymwięcéj mniejszy od tego iloczynu, powiększonego o ostatni dzielnik 0,145. — Z drugiéj strony, po odjęciu od danéj dzielnéj wszystkich części iloczynu, wypadającego ze skróconego mnożenia, pozostała liczba 0,1255069, mniejsza od ostatniego dzielnika 0,145; dzielna więc, będąc oczywiście większa od iloczynu, wypadłego z owego mnożenia skróconego [1]), jest mniejsza od tegoż iloczynu, powiększonego o 0,145. — Obie więc liczby: dzielna pierwotna i iloczyn dokładny dzielnika danego piérwotnie przez 1873 są zawarte między dwiema liczbami, różniącymi się od siebie o 0,145. Różnica więc danéj dzielnéj i iloczynu dokładnego dzielnika danego przez 1873, jest tymwięcéj mniejsza od liczby 0,145, mniejszéj od dzielnika danego 0,1451292929. A zatym 1873 jest wartością ilorazu, różniącą się od jego wartości dokładnéj mniéj niż o 1, czyli jest szukaną wartością ilorazu przybliżoną na jedność.

W powyższym przykładzie w dzielniku danym było tyle cyfr, iż po obliczeniu, z ilu cyfr składać się ma część całkowita ilorazu, nie było żadnéj wątpliwości przy wyznaczaniu tak ostatniego jak i piérwszego dzielnika dzielenia skróconego. Gdybyśmy jednak mieli np. podzielić 9 294 703 568 : 73 945, z przybliżeniem na 1, to, mając wyznaczyć 6 cyfr w ilorazie, wzięlibyśmy jako ostatni dzielnik 73, gdyż $73 > 9 + 4 + 5$, a piérwszym dzielnikiem byłaby liczba powstała z dopisania do 73 następujących 5-u cyfr danego dzielnika, t. j. byłaby nim liczba 73 945,00 i wypadłoby dzielić 9 294 703 568 : $\overline{73945,00} = 125\,685$. — Podobnie gdybyśmy mieli np. 2,34 : 0,000 610 1287 z przybliżeniem na jedność, to wypadłoby uskutecznić dzielenie 23400 : $\overline{6,101\ 287} = 3835$.

Możemy więc powiedzieć ogólnie:

Ażeby zapomocą dzielenia skróconego odnaléść wartość ilorazu przybliżoną na jedność, należy uprzednio oznaczyć ilość cyfr całkowitéj części ilorazu, która jednocześnie wyrażać będzie ilość dzieleń częściowych, mających być wykonanymi. To wiedząc, należy następnie oddzielić tyle początkowych cyfr dzielnika, aby one przedstawiały już liczbę, większą od sumy tylu nasiępnych cyfr dzielnika, ile ma być wykonanych dzieleń częściowych (powiększonéj o 1, jeżeli są jeszcze dalsze cyfry w dzielniku), ta oddzielona liczba będzie ostatnim dzielnikiem. Z tego ostatniego dzielnika, dołączając doń o jednę mniéj następujących w danym dzielniku cyfr,

[1]) Jest ona bowiém także większa od iloczynu dokładnego danego piérwotnie dzielnika przez 1873.

niż jest dzieleń częściowych do wykonania, otrzymamy piérwszy dzielnik. Zauważywszy zaś, jakie części liczby przedstawia piérwsza z prawéj strony cyfra ostatniego dzielnika, opuszczamy w dzielnéj wszystkie te cyfry, które w niéj przedstawiają mniejsze od tamtych części liczby. Dzieląc liczbę, przedstawioną przez zatrzymane cyfry dzielnéj, przez piérwszy dzielnik, otrzymujemy piérwszą cyfrę w ilorazie; pozostałą resztę dzieląc przez dzielnik, powstały z poprzedniego wskutek opuszczenia w nim piérwszéj z prawéj strony cyfry, otrzymamy następną cyfrę w ilorazie, i t. d., póki nie wyznaczymy cyfry przy pomocy ostatniego dzielnika [1]).

18. Ponieważ w naszym przykładzie iloczyn dokładny dzielnika danego przez 1873 jest mniejszy niż iloczyn wypadający ze skróconego mnożenia + 0,015, a dana dzielna równa się temuż iloczynowi (wypadającemu ze skróconego mnożenia) + 0,1255069, więc 1873 jest wartością ilorazu przybliżoną na 1 z niedomiarem [2]). — Gdybyśmy zaś wykonali np. dzielenie (szukając przybliżonéj na 1 wartości ilorazu):

$$\begin{array}{r|l} 271{,}8275069 & 0{,}1451292929 \\ \cdots\cdots & \overline{1873} \\ 10 & \end{array}$$

to wtedy o iloczynie dokładnym dzielnika danego przez 1873 wypadłoby powiedzieć to samo, co poprzednio, lecz dana dzielna byłaby równa iloczynowi, wypadającemu ze skróconego mnożenia, + 0,0105069; nie moglibyśmy więc napewno wnieść, czy w tym przypadku wartość 1873 ilorazu, przybliżona na 1, przedstawia przybliżenie z niedomiarem, czytéż z nadmiarem.

19. Niekiedy zdarza się, że któraś z reszt nie jest mniejsza od pomnożonego przez 10 dzielnika, przez który ona ma być podzielona. Np. gdy wy-

---

[1]) Guy w r. 1845 przedstawił akademii nauk w Paryżu sposób wykonywania skróconego dzielenia, polegający na uprzednim wyznaczeniu troskliwym ostatniego dzielnika i na stopniowym zmniejszaniu ilości cyfr dzielnika piérwszego. Ów sposób został podany i udowodniony niezależnie od mnożenia skróconego Oughtred'a. Zaznaczyć jednak wypada, że już w książce *Anleitung zur Rechnung mit Dezimalbrüchen*, którą Adam Burg wydał w Wiedniu w r. 1836, znajdujemy skrócone dzielenie przy opuszczaniu kolejnych cyfr dzielnika (str. 36), ale bez wszelkiego zastrzeżenia co do ostatniego dzielnika, a tymsamym bez udowodnienia. Do metody, którą podał Guy, różni uczeni francuscy wprowadzili stopniowo niektóre uproszczenia, tak iż, wskutek odpowiednich częściowych zmian, ustalony został ścisły związek wykonywania skróconego dzielenia z wykonywaniem skróconego mnożenia Oughtred'a.

[2]) Wyraźniéj:

dzielnik $\times$ iloraz przyb. = dzielnikowi przyb. $\times$ iloraz przyb. + liczba mniejsza od 0,015

dzielna = dzielnik $\times$ iloraz = dzielnikowi przyb. $\times$ iloraz przyb. + 0,1255069.

więc

dzielnik $\times$ iloraz przyb. $<$ dzielnika $\times$ iloraz (dokładny),

czyli 1873 jest wartością ilorazu przybliżoną z niedomiarem.

konywamy skrócone dzielenie 19 501 757 : 4535,475 (szukając zawsze przybliżonéj na 1 wartości ilorazu), to, po wyznaczeniu cyfry drugiéj w ilorazie otrzymujemy resztę 4531, którą mamy dzielić przez trzeci dzielnik 453. Albo więc jako drugą cyfrę w ilorazie weźmiemy cyfrę 3 i jako cyfry trzecią i czwartą weźmiemy zera, albotéż, pozostawiając cyfrę 2 jako drugą, weźmiemy jako trzecią 9; w takim razie otrzymamy resztę 454, która znowu jest większa od odpowiedniego dzielnika 45 pomnożonego przez 10, i wypadnie jako ostatnią cyfrę wziąć 9. Zauważymy, że jeżeli przyjmiemy jako iloraz 4299, to dokładny iloczyn dzielnika danego przez 4299 jest mniejszy niż iloczyn, wypadający ze skróconegn mnożenia, + 3 + 5 + 4 + (7 + 1) takich części liczby, w jakich są wyrażone iloczyny częściowe, t. j. dokładny iloczyn dzielnika danego przez 4299 jest mniejszy niż iloczyn, wypadający ze skróconego mnożenia, + 2000, gdy tymczasem dzielna równa się owemu iloczynowi + 4957; liczba więc 4299 jest wartością ilorazu przybliżoną na 1 z niedomiarem. Zatym 4300 będzie wartością tego ilorazu przybliżoną na 1 z nadmiarem. Którakolwiek więc z tych wartości 4299 i 4300 może tu być uważana, jako przedstawiająca żądaną wartość. Zatym, *jeżeli w czasie wykonywania dzielenia skróconego otrzymamy resztę nie mniejszą od pomnożonego przez 10 dzielnika, przez który mamy ją podzielić, to należy wtedy w ilorazie jako każdą z cyfr, mających być wyznaczonymi, wziąć 9, albotéż ostatnią z otrzymanych cyfr powiększyć o 1, a jako dalsze wziąć zera.*

```
19501757 | 4535475
-181416  |  4299
  13601
 -9070
   4531
 -4077
    454
   -405
     49
```

20. Aby oznaczyć, z jakim przybliżeniem należy wziąć dzielną i dzielnik, kiedy mamy zapomocą skróconego dzielenia otrzymać wartość ilorazu z żądanym przybliżeniem, zastępujemy to zadanie przez inne równoważne, w którymby już szło o wartość ilorazu przybliżoną na 1 (por. us. 17). Tak np. gdy idzie nam o wartość ilorazu przybliżoną na 0,001, to powiększywszy daną dzielną 1000 razy zastąpimy dane zadanie przez zadanie równoznaczne: z jakim przybliżeniem należy wziąć tak zmienioną dzielną i dany dzielnik, aby otrzymać wartość ilorazu przybliżoną na 1.

Jak widzieliśmy, ilość cyfr, które zatrzymać należy, tak w dzielnéj, jak i w dzielniku, zależeć wtedy będzie nietylko od ilości cyfr, które otrzymać mamy w ilorazie, ale także od tego, ile początkowych cyfr dzielnika wystarczy już dla utworzenia ostatniego dzielnika dzielenia skróconego. Dlatego najprostszą rzeczą będzie w każdym przypadku „przygotować" dzielnik do wykonywania dzielenia skróconego. *Gdy mamy otrzymać wartość ilorazu przybliżoną na 1, to*

wtedy najmniejsze części pierwszego dzielnika wyrażają stopień przybliżenia, z jakim wziąć należy daną dzielną i dzielnik.

21. Weźmy pod uwagę zadania, w których czy to dzielna i dzielnik jednocześnie, czytéż jedna tylko z tych liczb są przybliżone.

Gdy mamy np. podzielić : 583,243* : 72,356*, to nie zważając całkiem na przecinki, zajmijmy się naprzód tym, ile zapomocą dzielenia skróconego możemy otrzymać początkowych pewnych cyfr w ilorazie tych liczb. Ponieważ tu liczba (całkowita), utworzona przez cyfry dzielnika, 72 356 nie jest mniejsza od liczby utworzonéj przez cyfry dzielnéj 583 243, przeto jako piérwszy dzielnik można przyjąć liczbę 72 356; z tego już wynika, że ostatnim dzielnikiem będzie tu liczba 72. A więc będziemy mieli do wykonania 4 dzielenia częściowe, czyli w ilorazie początkowe 4 cyfry będą pewne. Z danych dzielnéj i dzielnika wynika, że część całkowita ilorazu ma tu $3-2=1$ cyfrę całkowitą, a zatym mamy jeszcze pewne tysiączne części ilorazu, czyli otrzymać możemy iloraz liczb danych z przybliżeniem na 0,001:

583,243	$\overline{72}$,356
−578848	8,060
4395	
−4338	
57	

$$583{,}243^* : \overline{72}{,}356^* = 8{,}060$$

jakoż iloraz z podzielenia liczb danych przypada między ilorazami:

$$583{,}2425 : 72{,}3565 = 8{,}06067\ldots$$

i

$$583{,}2435 : 72{,}3555 = 8{,}06080\ldots$$

Weźmy zadanie: 5832,4367* : 72,356*. Tu znowu, ponieważ liczba 72 356 jest mniejsza od liczby 58 324 367, za piérwszy dzielnik weźmiemy 72356, a za ostatni 72, tak iż będziemy mieli 4 cyfry pewne w ilorazie. Wypadnie więc uskutecznić dzielenie: 58 324 367 : $\overline{72}$ 356. Ponieważ z danych tu liczb wypada, że część całkowita ilorazu jest dwucyfrowa, przeto otrzymać możemy w tym przypadku wartość ilorazu przybliżoną na 0,01:

$$5\,832{,}4367^* : \overline{72}{,}356^* = 80{,}60.$$

Gdybyśmy mieli 5,83243* : 72,356*, to tu, dzieląc podobnie jak w piérwszym przykładzie 583 243 : 72 356, otrzymalibyśmy w ilorazie liczbę, któréj początkowe 4 cyfry (poczynając od piérwszéj znaczącéj) mielibyśmy pewne. Ponieważ całkowita część ilorazu, wrazie, gdybyśmy daną dzielną powiększoną 100 razy dzielili przez dany dzielnik, byłaby jednocyfrowa, przeto piérwsza znacząca cyfra ilorazu danych liczb przedstawia jego części setne, a wskutek tego ostatnia pewna cyfra w tym ilora-

zie będzie przedstawiała części stotysiączne. Otrzymać możemy w tym przypadku wartość ilorazu przybliżoną na 0,00001,

$$5{,}832\ 43^* : \overline{72{,}356}^* = 0{,}08060.$$

Gdybyśmy mieli 583,243* : 0,72356*, to i tu mielibyśmy pewnych cyfr początkowych 4. Gdybyśmy daną dzielną dzielili przez liczbę 10 razy większą od danego dzielnika, to całkowita część ilorazu byłaby dwucyfrowa, a więc całkowita część ilorazu liczb danych jest trzycyfrowa, tak iż w tym przypadku otrzymać możemy wartość ilorazu przybliżoną na 0,1:

$$583{,}243^* : 0{,}\overline{72\ 356}^* = 806{,}0.$$

Gdy np. mamy [1]) 9 294 703 568* : 73 945*, to rozumując jak poprzednio, wniesiemy, iż jako piérwszy dzielnik możemy przyjąć liczbę 73 945, wskutek czego ostatnim dzielnikiem będzie liczba 73 i w ilorazie możemy wyznaczyć pewnych początkowych cyfr 4. Ponieważ tu całkowita część ilorazu jest 6-ciocyfrowa, a 4 wynaczyć możemy początkowe cyfry pewne, zatym może tu [2]) być mowa tylko o wartości ilorazu przybliżonéj na 100:

$$9\ 294\ 703\ 568^* : \overline{73945}^* = 1256 \text{ setek.}$$

Powyższe przykłady były takie, iż w nich mieliśmy (nie zważając na przecinki) liczbę utworzoną przez cyfry dzielnika mniejszą od liczby utworzonéj przez cyfry dzielnéj.

Weźmy teraz przypadek przeciwny. Np. 583,2* : 7,2357*. Tu od liczby 5832 jest większa tak liczba 72357 jak i liczba [3]) 7236, tak iż dopiero może być mowa o wykonywaniu dzielenia liczby 5832 przez 724. W tym zaś dzieleniu liczba 724 będzie piérwszym dzielnikiem a ostatnim 7, i będziemy mieli piérwsze 3 pewne cyfry ilorazu. Widocznie 3 początkowe pewne cyfry ilorazu liczb 583,2* : 7,24* są jednocześnie także pewne w ilorazie liczb 583,2* : 7,2357*. A więc w tym przypadku należy zamiast danéj, wziąć taką przybliżoną wartość dzielnika, iżby liczba utworzona przez jéj cyfry była mniejsza od liczby utworzonéj przez cyfry danéj wartości dzielnéj, innymi słowy przypadek ten sprowadza się do poprzedniego. W naszym zadaniu, ponieważ możemy wyznaczyć 3 cyfry ilorazu pewne, a jego część całkowita jest dwucyfrowa, może być mowa o wartości ilorazu przybliżonéj na 0,1:

$$583{,}2^* : \overline{7{,}23\ 57}^* = 80{,}5.$$

---

[1]) Por. przedostatni przykład us. 17 go.

[2]) Nie możemy się tu posługiwać cyframi, dzielnéj oznaczającymi dziesiątki tysięcy lub mniejsze części, gdyż iloczyn ilorazu większego od 100 000 przez stopień przybliżenia dzielnika t. j. 0,5 może już wydać dziesiątki tysięcy.

[3]) Opuściwszy ostatnią cyfrę 7, powiększyliśmy cyfrę 5 o 1. Podobnie robić będziemy daléj.

Gdybyśmy mieli 72,4* : 7,2357*, to wyznaczyć moglibyśmy 3 pewne cyfry ilorazu [1]) i znaleźlibyśmy wartość ilorazu przybliżoną na 0,1:

$$72{,}4^* : 7{,}2357^* = 10{,}0.$$

Podobnie np. gdy mamy 0,02057* : 87,37*, to z uwagi, że liczba 8734 jest większa od 2057, wypadnie tu uskutecznić dzielenie 2057 przez 873; tu liczba 873 będzie piérwszym dzielnikiem, zaś ostatnim będzie liczba 87, a więc tylko dwie cyfry będą pewne w ilorazie, tak iż, jak to łatwo dostrzeżemy, otrzymać tu możemy wartość ilorazu przybliżoną na 0,000 01:

$$0{,}02057^* : \overline{87{,}34}^* = 0{,}000\,23.$$

Tak samo, gdy mamy [2]) 2,34* : 0,000 610 1287*, należy rzecz sprowadzić do dzielenia 2,34* : 0,000 61*. Piérwszym dzielnikiem będzie liczba 61, ostatnim 6, a więc możemy wyznaczyć początkowe 2 pewne cyfry w ilorazie. Że zaś część całkowita ilorazu będzie tu 4-cyfrowa, przeto możemy znaléść wartość ilorazu przybliżoną na 100:

$$2{,}34^* : 0{,}000\,\overline{610}\,1287^* = 38 \text{ setek.}$$

Gdyby tylko dzielna była liczbą przybliżoną, to niekiedy wypadałoby podobnie postępować jak w poprzedzających przykładach. Jeżeli np. mamy 583,2* : 7,2357, to może być tu mowa o dzieleniu 5832 przez liczbę 724, z czego otrzymamy 3 pewne cyfry w ilorazie, tak iż będziemy mieli wartość ilorazu przybliżoną na 0,1:

$$583{,}2^* : \overline{7{,}23}\,57 = 80{,}5.$$

Podobnie, gdybyśmy mieli liczbę 28 600 przybliżoną na 100, podzielić przez 586, to tu może być mowa o uskutecznieniu dzielenia liczby przedstawionéj przez cyfry pewne dzielnéj t. j. 286 tylko przez liczbę utworzoną przez piérwsze dwie cyfry dzielnika, t. j. przez liczbę 59, która będzie ostatnim dzielnikiem. Będzie ona, jak widzimy, jednocześnie także piérwszym dzielnikiem, tak iż w ilorazie będziemy mieli 1-ę cyfrę pewną, i może tu być mowa o wartości ilorazu przybliżonéj na 10:

$$286 \text{ setek} : \overline{586} = 4 \text{ dziesiątki.}$$

Gdyby zaś tylko dzielnik był liczbą przybliżoną, to zawsze liczbę utworzoną przez wszystkie cyfry dzielnika wziąć należy za piérwszy dzielnik. Tak np. gdybyśmy mieli 583,2 : 7,2357*, to mogąc tu do dziel-

---

[1]) Też zame co ilorazu 72,4* : 72,4*, gdyż iloraz tych liczb otrzymać możemy z przybliżeniem tylko na 0,01

$$72{,}4^* : \overline{72{,}4}^* = 1{,}00.$$

Iloraz zaś liczb np. 74,4* : 74,4* możemy otrzymać z przybliżeniem tylko na 0,1

$$74{,}4^* : \overline{74{,}4}^* = 1{,}0.$$

[2]) Por. ostatni przykład us. 17-go.

néj dopisać 2 zera, mamy 583,200 : 7,2357* i znajdziemy wartość ilorazu przybliżoną na 0,01:

$$583{,}2 : \overline{7{,}2}\,357^* = 80{,}60.$$

Widzimy zatym, że, *jeżeli danych do podzielenia liczb mamy tylko wartości przybliżone, a chcemy wiedzieć, z jakim przybliżeniem może być wyliczony zapomocą skróconego postępowania iloraz tych liczb, to naprzód określić należy, ile można otrzymać początkowych (licząc od piérwszej znaczącéj) cyfr pewnych w ilorazie, a następnie dopiéro, jakie części liczby przedstawia ostatnia z owych cyfr. W przypadku, kiedy tylko dzielnik jest liczbą przybliżoną, należy liczbę przedstawioną przez cyfry dzielnika wziąć za piérwszy dzielnik; w przypadku zaś, kiedy tylko dzielna jest liczbą przybliżoną, jak również, kiedy tak dzielna jak dzielnik są liczbami przybliżonymi, należy za piérwszy dzielnik wziąć liczbę utworzoną przez tyle początkowych cyfr dzielnika danego, iżby ona nie była większą od liczby przedstawionej przez cyfry dzielnéj. Za ostatni dzielnik przyjąć należy liczbę, utworzoną przez początkowe cyfry dzielnika piérwszego, większą od sumy pozostałych jego cyfr. Ilość owych pozostałych cyfr, powiększona o 1, wyznaczy ilość pewnych cyfr początkowych ilorazu. Wprost zaś z danych liczb wniesiemy, jakie części przedstawia ostatnia z tych pewnych cyfr w ilorazie, co właśnie wyznaczy stopień przybliżenia ilorazu.*

ROZDZIAŁ VIII.

WYRAŻANIE UŁAMKÓW ZWYCZAJNYCH W POSTACI DZIESIĘTNYCH, I ODWROTNIE. UŁAMKI DZIESIĘTNE PERYJODYCZNE.

§ 26. O LICZBIE DZIESIĘTNÉJ, PRZEDSTAWIAJĄCÉJ ILORAZ Z PODZIELENIA DWU LICZB CAŁKOWITYCH PRZEZ SIEBIE. WYRAŻANIE UŁAMKÓW ZWYCZAJNYCH W POSTACI DZIESIĘTNYCH.

WYRAŻANIE UŁAMKA ZWYCZAJNEGO W POSTACI DZIESIĘTNEGO.

1. Widzieliśmy (§ 24, us. 4, 6), że

$$1089 : 72 = 15{,}125; \quad 3 : 4 = 0{,}75; \quad 29 : 1250 = 0{,}0232;$$
$$7077 : 11 = 643{,}3636\ldots; \quad 3 : 35 = 0{,}0857142857142\ldots,$$

t. j. że, wyrażając iloraz [1]) jako liczbę dziesiętną, otrzymujemy w ilorazie niekiedy ułamek dziesiętny skończony, niekiedy zaś ułamek dziesiętny nieskończony. Owóż, należałoby zbadać, od czego to zależy.

Wiemy, że dzielenie dwu liczb całkowitych przez siebie doprowadza nas do rezultatu, który możemy przedstawić w postaci ułamka zwyczajnego, mającego dzielnik jako mianownik, a dzielną jako licznik (§ 17, us. 5), tak iż np. iloraz z podzielenia 1089 : 72, t. j. liczba 15,125, jest tą samą liczbą, którą przedstawia ułamek zwyczajny $\frac{1089}{72}$, albo — ponieważ to jest ułamek niewłaściwy (§ 17, us. 4) — całkowita z ułamkiem: $15\frac{9}{72}$, czyli (§ 17, us. 9) : $15\frac{1}{8}$. Stosując toż samo do każdego z powyższych dzieleń, mamy

$$\frac{1089}{72} = 15\frac{1}{8} = 15{,}125; \quad \frac{3}{4} = 0{,}75; \quad \frac{29}{1250} = 0{,}0232;$$
$$\frac{7077}{11} = 643\ \frac{4}{11} = 643{,}3636\ldots; \quad \frac{3}{35} = 0{,}0857142857142\ldots.$$

[1]) W dzieleniu liczb dziesiętnych, jak widzieliśmy (§ 24, us. 2 — 6), wyznaczamy cyfry w ilorazie tak, jakgdyby przecinka nie było, czyli, jakgdybyśmy dzielili przez siebie liczby całkowite; jeżeli więc w ilorazie z dzielenia liczb całkowitych otrzymujemy ułamek dziesiętny nieskończony, to on wypadnie również wtedy, kiedy przecinek znajduje się czyto w dzielnéj, czyto w dzielniku, czytéż w dzielnej i dzielniku jednocześnie.

Stąd widzimy, że ułamek zwyczajny (tak właściwy, jak i niewłaściwy) możemy wyrazić jako liczbę dziesiętną.

A więc, zamiast rozważać: kiedy, dzieląc dane dwie liczby całkowite przez siebie i wyznaczając iloraz jako liczbę dziesiętną, otrzymamy w ilorazie ułamek dziesiętny skończony, a kiedy nieskończony — możemy zastanawiać się nad tym: kiedy, wyrażając ułamek zwyczajny jako liczbę dziesiętną, otrzymamy w tym wyrażeniu ułamek dziesiętny skończony, a kiedy nieskończony.

Aby jednak, mając ułamek zwyczajny, otrzymać jego wyrażenie w postaci liczby dziesiętnéj, korzystamy z tego, że na ułamek zwyczajny możemy patrzéć jako na wskazane dzielenie, w którym dzielną jest licznik, dzielnikiem mianownik, a ilorazem wartość ułamka (§ 17, us. 5). Możemy zatym powiedzieć (§ 24, us. 5):

Aby ułamek zwyczajny wyrazić jako liczbę dziesiętną, dzielimy licznik przez mianownik, postępując tak, jak wtedy, kiedy, mając podzielić przez siebie dwie liczby całkowite, wyznaczamy iloraz jako liczbę dziesiętną, t. j. przyjmując, że w czasie tego dzielenia w dzielnéj po cyfrze, zajmującéj miejsce piérwsze, znajduje się przecinek, po którym następują zera; czyli innymi słowy:

Aby ułamek zwyczajny wyrazić jako liczbę dziesiętną, dzielimy licznik przez mianownik; jeżeli licznik nie jest mniejszy od mianownika, to, wyznaczywszy iloraz niezupełny (§ 7, us. 11), *miéć zeń będziemy część całkowitą liczby dziesiętnéj, a jeżeli licznik jest mniejszy od mianownika, to piszemy zamiast części całkowitéj zero, a licznik uważamy daléj jako resztę dzielenia; do reszty dzielenia przypisujemy zero i, uważając tak powstałą liczbę jako nową dzielną, wyznaczamy piérwszą cyfrę dziesiętną; do reszty, jeżeli ona z tego dzielenia częściowego wypadnie, dopisujemy zero, wyznaczamy z téj liczby drugą cyfrę dziesiętną, i t. d.*

Jeżeli dany ułamek zwyczajny jest niewłaściwy, to, jak widzimy, taksamo postępujemy przy wyznaczaniu części całkowitéj liczby dziesiętnéj, jak przy wyciąganiu całkowitéj z ułamka danego (§ 17, us. 4), gdyż w obu razach jest toż samo zadanie; dalsze zaś postępowanie jest wyrażaniem ułamka zwyczajnego właściwego w postaci ułamka dziesiętnego, np.

$$\frac{7077}{11} = 643 + \frac{4}{11} = 643{,}3636\ldots = 643 + 0{,}3636\ldots$$

Dlatego tu nadal przypuścimy, że zawsze, ilekroć dany jest ułamek niewłaściwy, całkowitą z niego wyciągamy, tak iż pozostaje tylko rozważyć: kiedy, wyrażając ułamek zwyczajny właściwy jako dziesiętny, otrzymamy ułamek dziesiętny skończony, a kiedy nieskończony.

KIEDY OTRZYMUJEMY UŁAMEK DZIESIĘTNY SKOŃCZONY, A KIEDY NIESKOŃCZONY?

2. W us. 6-ym § 21-go widzieliśmy, że np.

$$0{,}0900127 = \frac{900\,127}{10\,000\,000};$$

teraz dodamy, że to, cośmy tam mówili, odnosiło się oczywiście tylko do ułamków dziesiętnych skończonych. Powiemy więc: ułamek dziesiętny skończony możemy zastąpić przez ułamek zwyczajny, pisząc jako jego licznik liczbę, przedstawioną przez cyfry znajdujące się po przecinku, jakgdyby to ich zgrupowanie przedstawiało oddzielną liczbę całkowitą, a jako mianownik liczbę, przedstawioną przez 1 z tylu zerami, ile w danym ułamku jest wszystkich cyfr dziesiętnych.

Jeżeli więc dany ułamek zwyczajny może być wyrażony jako ułamek dziesiętny skończony, to z tego ułamka dziesiętnego moglibyśmy wprost otrzymać taką postać danego ułamka zwyczajnego (§ 17, us. 8), któréj mianownikiem jest liczba, przedstawiona przez 1 z zerami. A więc ułamek zwyczajny wtedy da się wyrazić jako ułamek dziesiętny skończony, kiedy pośród różnych (§ 17, us. 10) postaci danego ułamka zwyczajnego może się znaleść taka, w któréj mianowniku jest liczba, przedstawiona przez jedność z zerami.

Wiemy zaś, że wszystkie postaci ułamka zwyczajnego powstają z jego postaci nieskracalnéj, wskutek jednoczesnego pomnożenia jéj licznika i mianownika przez odpowiednią tę samę [1]) liczbę (§ 17, us. 10). Aby więc, mając pewien ułamek zwyczajny, móc zgóry powiedzieć, czy, wyrażając go (us. 1) jako dziesiętny, otrzymamy ułamek dziesiętny skończony, czytéż nieskończony, należy przedewszystkim dany ułamek zwyczajny przywieść do postaci nieskracalnéj (§ 17, us. 9) wrazie, gdyby on nie był już dany w téj postaci. Jeżeli mianownik nieskracalnéj postaci danego ułamka jest taką liczbą, że, mnożąc ją przez odpowiednią liczbę całkowitą, możemy otrzymać liczbę, przedstawioną przez 1 z zerami, to, mnożąc przez nią licznik i mianownik nieskracalnéj postaci, otrzymamy postać, mającą w mianowniku liczbę, przedstawioną przez 1 z zerami, czyli: ułamek dziesiętny, wyrażający dany ułamek zwyczajny, jest skończony. Jeżeli zaś mianownik nieskracalnéj postaci danego ułamka jest taką liczbą, że niema żadnéj liczby całkowitéj, przez którąby mnożąc ów mianownik można było otrzymać liczbę, przedstawioną przez 1 z zerami [2]), to pośród różnych postaci danego ułamka nie może się znaleść taka, któréjby mianownik był liczbą przedstawioną przez 1 z zerami, czyli:

---

[1]) Całkowitą.

[2]) Innymi słowy: jeżeli pośród różnych wielokrotności (§ 12, us. 3) mianownika nieskracalnéj postaci danego ułamka niéma liczby, przedstawionéj przez 1 z zerami.

nie możemy ułamka danego wyrazić w postaci ułamka dziesiętnego skończonego, a tymsamym ułamek dziesiętny, wyrażający dany ułamek zwyczajny, jest nieskończony.

Zważmy, że wszelkie liczby przedstawione przez 1 z zerami, t. j. liczby 10, 100, 1000 i t. d., w rozkładzie swoim na czynniki piérwsze (§ 15, us. 1, 4) mają tylko czynniki 2 i 5. Żeby więc, mnożąc mianownik nieskracalnéj postaci danego ułamka przez pewną liczbę całkowitą, móc otrzymać liczbę, przedstawioną przez 1 z zerami, trzeba, aby pośród czynników piérwszych, na które się ten mianownik rozkłada, prócz czynników 2 lub 5, nie było innych. Jeżeli bowiém pośród czynników rozkładu owego mianownika na czynniki piérwsze jest czynnik inny, niż 2 lub 5, to, gdy mnożyć będziemy ów mianownik przez jakąkolwiek liczbę całkowitą, zawsze ów czynnik wejdzie do rozkładu otrzymanego iloczynu na czynniki piérwsze, a tymsamym tym iloczynem nie może być liczba przedstawiona przez 1 z zerami.

Tak np. gdy mamy dany ułamek $\frac{21}{120}$, to, ponieważ $\frac{21}{120} = \frac{7}{40}$. gdzie $\frac{7}{40}$ jest już postacią nieskracalną, zaś $40 = 2.2.2.5$, zatym możemy, mnożąc licznik i mianownik postaci $\frac{7}{40}$ przez liczbę 5.5, otrzymać $\frac{7 \times 5 \cdot 5}{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 5 \times 5 \cdot 5} = \frac{175}{1000}$ i $\frac{21}{120} = 0{,}175$, co otrzymalibyśmy także, dzieląc (us. 1) 21 przez 120. Jeżeli zaś mamy np. ułamek $\frac{5}{6}$, gdzie $6 = 2.3$, to niéma takiéj liczby całkowitéj, przez którą mnożąc liczbę 2.3, otrzymalibyśmy liczbę, przedstawioną przez 1 z zerami, a więc ułamek dziesiętny, wyrażający ułamek $\frac{5}{6}$, jest nieskończony; jakoż, dzieląc 5 przez 6, otrzymamy $\frac{5}{6} = 0{,}8333\ldots$. Powiemy przeto:

Jeżeli w rozkładzie mianownika postaci nieskracalnéj danego ułamka na czynniki piérwsze niéma czynnika, któryby był inną liczbą niż 2 lub 5, to ułamek dziesiętny, wyrażający dany ułamek zwyczajny, jest skończony.

Jeżeli w rozkładzie mianownika postaci nieskracalnéj danego ułamka na czynniki piérwsze jest czynnik, inny niż 2 lub 5, to ułamek dziesiętny, wyrażający dany ułamek zwyczajny, jest nieskończony.

3. Jeżeli więc ułamek dziesiętny, wyrażający dany ułamek zwyczajny, ma być skończony, to w rozkładzie mianownika postaci nieskracalnéj danego ułamka mogą być tylko czynniki 2 lub 5, t. j. mogą być albo same czynniki 2, albo same czynniki 5, albotéż i czynniki 2 i czynniki 5, ale nie inne.

Ułamek dziesiętny skończony, wyrażający ten dany ułamek zwyczajny, miéć będzie (us. 2) tyle cyfr dziesiętnych (bez końcowych zer),

ile może być najmniéj zer przy 1 w mianowniku najprostszéj z tych [1]) postaci ułamka danego, które mają w mianowniku liczbę, przedstawioną przez 1 z zerami. Ponieważ zaś w rozkładach liczb 10, 100, 1000 i t. d. na czynniki piérwsze mamy tyle czynników 2, ile [2]) czynników 5, zatym, jeżeli w rozkładzie owego mianownika są same czynniki 2 lub same czynniki 5, to, mnożąc przez liczbę, będącą iloczynem tyluż czynników odpowiednio 5 lub 2, otrzymamy liczbę, przedstawioną przez 1 z tyluż zerami. Jeżeli zaś są czynniki 2 i 5 jednocześnie, i jednych, np. czynników 2, jest więcéj, to mnożąc przez iloczyn tylu czynników 5, o ile ich jest w rozkładzie mniéj, otrzymamy liczbę, przedstawioną przez 1 z tylu zerami, ile było w rozkładzie czynników 2. A więc:

Jeżeli w rozkładzie mianownika postaci nieskracalnéj danego ułamka na czynniki piérwsze znajdują się same czynniki 2 lub same czynniki 5, to w ułamku dziesiętnym, wyrażającym dany ułamek zwyczajny, jest tyle cyfr dziesiętnych, ile tych czynników w rozkładzie; jeżeli zaś w owym rozkładzie są tylko czynniki 2 i 5, to w ułamku dziesiętnym, wyrażającym dany ułamek zwyczajny, jest tyle cyfr dziesiętnych, ile razy w tym rozkładzie znajduje się ten czynnik, który większą ilość razy doń wchodzi.

DLACZEGO OTRZYMYWANY UŁAMEK DZIESIĘTNY NIESKOŃCZONY JEST PERYJODYCZNY?

4. Widzieliśmy, że jeżeli w rozkładzie mianownika postaci nieskracalnéj danego ułamka jest czynnik inny, niż 2 lub 5, to ułamek dziesiętny, przedstawiający dany ułamek zwyczajny jest nieskończony. Dzieląc więc licznik przez mianownik (us. 1), nie dojdziemy do reszty 0, t. j. dzielenie będzie się ciągnęło do nieskończoności. Każda z nieskończenie wielu reszt w tym dzieleniu jest mniejsza od dzielnika (§ 7, us. 11); ilość więc różnych reszt jest ograniczona [3]), t. j. też same liczby będą się powtarzały jako reszty. Że zaś z tych reszt dla wyznaczenia następujących cyfr ilorazu tworzymy liczby w sposób jednostajny (mianowicie dopisując 0), przeto gdy którakolwiek z reszt dzielenia się powtórzy, to powtórzy się również odpowiadająca cyfra w ilorazie. Tak np., odnajdując zapomocą dzielenia wyrażenie ułamka $\frac{3}{35}$ w postaci ułamka dziesiętnego (o którym zgóry wiemy, że będzie nieskończony, bo $35 = 5 \cdot 7$), spostrzeżemy, że ósma reszta jest taż sama, co druga (30); dopisawszy więc do niéj zero wyznaczymy w ilorazie tę samę cyfrę 8, co z drugiéj

---

[1]) Może być bowiém takich postaci nieskończenie wiele, np. $\frac{21}{120} = \frac{175}{1000} = \frac{1750}{10000}$ i t. d.

[2]) Bo $100 = 10 \times 10$; $1000 = 10 \times 10 \times 10$ i t. d., a każdy czynnik takiego (§ 15, us. 1, 4) iloczynu $= 2 \cdot 5$.

[3]) Reszt różnych może być conajwięcéj o jednę mniéj, niż jest jedności w dzielniku.

reszty po dopisaniu do niéj zera. Z tego także wypada, że dziewiąta reszta będzie taż sama, co trzecia, i t. d., a więc i w ilorazie dziewiąta cyfra taż sama, co trzecia, i t. d.,

$$\frac{3}{35} = 0{,}0857142857142\ldots.$$

Widzimy więc, że w tym ułamku dziesiętnym nieskończonym grupa cyfr 8, 5, 7, 1, 4, 2 wciąż się powtarza do nieskończoności. Taką najmniejszą grupę cyfr dziesiętnych ułamka dziesiętnego nieskończonego, wciąż w tymże samym porządku po sobie następujących, nazywamy peryjodem ułamka dziesiętnego nieskończonego, taki zaś ułamek dziesiętny nieskończony nazywamy ułamkiem dziesiętnym peryjodycznym [1]).

Możemy więc, w uzupełnieniu tego, cośmy wyprowadzili w us. 2-im, powiedzieć:

Jeżeli w rozkładzie mianownika postaci nieskracalnéj danego ułamka na czynniki piérwsze jest czynnik inny, niż 2 lub 5, to ułamek dziesiętny, wyrażający dany ułamek zwyczajny, jest peryjodyczny.

5. Widzieliśmy, że

$$\frac{4}{11} = 0{,}\underline{36}3636\ldots; \quad \frac{3}{35} = 0{,}\underline{0857142857142}\ldots;$$

podobnie znajdziemy np.

$$\frac{65}{185} = \frac{13}{37} = 0{,}\underline{342342}\ldots; \quad \frac{4339}{33300} = 0{,}1\underline{3003}0\ldots$$

Przyglądając się tym ułamkom dziesiętnym peryjodycznym i dla uwidocznienia podkréślając początkowe cyfry, tworzące peryjód, widzimy, że tu w ułamkach 0,3636... i 0,342342... piérwsza po przecinku cyfra, czyli piérwsza cyfra dziesiętna, już należy do peryjodu, gdy tymczasem w dwu pozostałych ułamkach są „cyfry dziesiętne, nie należące do peryjodu", mianowicie w jednym cyfra 0, a w drugim cyfry 1 i 3. Jeżeli w ułamku dziesiętnym peryjodycznym piérwsza cyfra dziesiętna już należy do peryjodu, to nazywamy ten ułamek ułamkiem dziesiętnym peryjodycznym prostym; jeżeli zaś w ułamku dziesiętnym peryjodycznym są cyfry dziesiętne nie należące do peryjodu, to nazywamy go ułamkiem dziesiętnym peryjodycznym mieszanym.

Moglibyśmy przyjąć, że np. w piérwszym z wypisanych wyżéj ułamków, t. j. w ułamku 0,342342342... grupę powtarzających się cyfr tworzą cyfry 4, 2 i 3, albo cyfry 2, 3 i 4, a wtedy moglibyśmy ten ułamek dziesiętny peryjodyczny uważać za mieszany. Podobnie w ostatnim z wypisanych ułamków moglibyśmy przyjąć, iż grupę powtarzają-

---

[1]) Niedość jest mówić „ułamek peryjodyczny", bo są jeszcze ułamki ciągłe peryjodyczne. (Zob. *Algiebra*, t. III seryi III «Bibl.-mat.-fiz.»).

cych się cyfr tworzą cyfry 3, 0 i 0, albo cyfry 0, 0 i 3, a wtedy przyjmowalibyśmy, że w tym ułamku są odpowiednio trzy lub cztery cyfry dziesiętne nie należące do peryjodu. Zwykle jednak tak nie postępujemy. Owszem, chcąc rzecz przedstawić najprościéj, jeżeli np., mając ostatni ułamek, zdawałoby się nam, że jako peryjód przyjąć należy grupę cyfr 3, 0 i 0, to zważamy na ostatnią z cyfr téj grupy (0) w początkowych cyfrach (t. j. w piérwszéj po przecinku takiéj grupie) i porównywamy ją z cyfrą poprzedzającą tę grupę; znajdujemy, że jest nią także cyfra 0, a więc ta cyfra należy już do cyfr peryjodu, i dlatego jako peryjód przyjmiemy grupę cyfr 0, 3 i 0; przed nią jest cyfra 3, odmienna od ostatniéj cyfry peryjodu, a więc w tym ułamku dziesiętnym peryjodycznym są dwie cyfry dziesiętne nie należące do peryjodu.

Ułamka dziesiętnego peryjodycznego nie możemy tak czytać, jak czytamy ułamki dziesiętne skończone (§ 21, us. 5), t. j. tak, jakbyśmy mogli przeczytać jego wartość przybliżoną (§ 24, us. 7). Czytając ułamek dziesiętny peryjodyczny, np. wypisane wyżéj ułamki 0,342342... lub 0,13030030.... mówimy: «zero, przecinek», a następnie albo wypowiadamy pewną ilość cyfr dziesiętnych, nie opuszczając zer, robiąc pewne przerwy głosu dla oddzielenia peryjodów, t. j. powiemy: «zero, przecinek; trzy, cztéry, dwa; trzy, cztéry, dwa; i t. d.» i «zero, przecinek; jeden, trzy; zero, trzy, zero; zero, trzy, zero; i t. d.», albotéż, wprowadzając wyraźnie wyraz: peryjód, powiemy: «zero przecinek, i peryjód: trzy, cztéry, dwa» i «zero, przecinek; jeden, trzy, i peryjód: zero, trzy, zero». Gdybyśmy mieli np. 643,3636..., to oczywiście, czytając to, powiedzielibyśmy: «643 całkowite», a daléj tak, jak poprzednio, albo: «trzy, sześć; trzy, sześć, i t. d.», albotéż: «i peryjód: trzy, sześć».

Jeżeli o ułamku dziesiętnym peryjodycznym wiemy, jakiego ułamka zwyczajnego jest on wyrażeniem, lub jeżeli mamy już wyraźnie zaznaczony peryjód, np. gdyby w ułamku dziesiętnym nieskończonym peryjodycznym, oddzielnie napisanym, cyfry tworzące peryjód były podkréślone, jak na początku tego ustępu, wówczas żadnéj wątpliwości być nie może. Gdybyśmy jednak mieli napisany ułamek dziesiętny:

0,342342342...,

a kropki oznaczałyby tylko, że w tym ułamku jest nieskończenie wiele cyfr dziesiętnych, to, choćbyśmy wiedzieli, że ten ułamek dziesiętny jest peryjodyczny, nie moglibyśmy napewno twierdzić, że cyfry 3, 4 i 2 przedstawiają już peryjód. Mogłoby bowiem być np.

0,342342342347734234234 77....

Dlatego, jeżeli, mając ułamek dziesiętny peryjodyczny, nie wiemy, jaki on przedstawia ułamek zwyczajny, jest rzeczą dogodną wyraźnie zaznaczyć peryjód. Zaznaczają to różnie: albo podkreślają cyfry (zwykle

początkowe), tworzące peryjód, albo ujmują je w klamry nawiasu, albo też nad piérwszą i nad ostatnią cyfrą piérwszego peryjodu stawiają kropki. Gdy więc mamy napisano:

$$0{,}\underline{342342}\ldots, \text{ albo: } 0{,}(342), \text{ albo: } 0{,}\dot{3}4\dot{2},$$

$$19{,}13\underline{030030}\ldots, \text{ albo: } 19{,}13(030), \text{ albo: } 19{,}13\dot{0}3\dot{0},$$

to żadnéj już wątpliwości być nie może co do tego, które cyfry dziesiętne tworzą peryjód.

6. Widzieliśmy, że jeżeli do rozkładu mianownika postaci nieskracalnéj danego ułamka zwyczajnego na czynniki piérwsze wchodzi czynnik inny, niż 2 lub 5, to ułamek dziesiętny, wyrażający dany ułamek zwyczajny, jest peryjodyczny, i mianowicie albo peryjodyczny prosty, albo też peryjodyczny mieszany (us. 4, 5). W ustępach 5-ym i 9-ym § 27-go otrzymamy a posteriori wskazówkę tego, po czym zgóry poznać, czy ułamek dziesiętny będzie peryjodyczny prosty, czyléż mieszany. Tu zaś podamy inne wyprowadzenie owéj wskazówki.

a. Niech $\frac{l}{m}$ będzie nieskracalną postacią danego ułamka zwyczajnego i niech m będzie liczbą piérwszą względem 10-u (t. j. do rozkładu liczby m na czynniki piérwsze nie wchodzą czynniki 2 lub 5; § 15, us. 5). Gdy dzielimy $l : m$, to kolejne reszty dzielenia odpowiadają (§ 24, us. 7) dzielnym

$$l,\ l.\ 10,\ l.\ 10^2,\ l.\ 10^3, \ldots,\ l.\ 10^a,\quad l.\ 10^{a+1}, \ldots,\ l.\ 10^{a+b}, \ldots$$

Ponieważ (us. 4) też same liczby będą się powtarzały jako reszty, więc pewne dzielne odpowiadają téj saméj liczbie jako reszcie. Niech np. dwie dzielne

$$l.\ 10^a \quad \text{i} \quad l.\ 10^{a+b}$$

mają tę samę liczbę r jako reszty, im odpowiadające, a ich ilorazy niezupełne niech będą odpowiednio i_1 i i_2. Wtedy (§ 7, us. 11)

$$l.\ 10^a = m.\ i_1 + r, \quad l.\ 10^{a+b} = m.\ i_2 + r,$$

a liczba

$$l.\ 10^{a+b} - l.\ 10^a = m.\ i_2 - m.\ i_1,$$

t. j. liczba (§ 6, us. 15)

$$10^a.\ (l.\ 10^b - l = m.\ (i_2 - i_1),$$

jest widocznie podzielna przez liczbę m. Ponieważ założyliśmy, że liczba m jest piérwsza względem 10, więc jest ona także piérwszą względem (§ 14, us. 15, b,) liczby 10^a. Gdy więc liczba $10^a.\ (l.\ 10^b - l)$ jest podzielna przez m, przeto jéj czynnik $l.\ 10^b - l$ jest podzielny (§ 14, us. 13) przez m. Wiemy zaś, że liczba l nie jest podzielna przez m; aby więc różnica $l.\ 10^b - l$ była podzielna przez m, trzeba, aby także dzielne

$$l \quad \text{i} \quad l.\ 10^b$$

odpowiadały téj saméj reszcie dzielenia. Z tego wypada, że reszta, odpowiadająca dzielnéj l, t. j. piérwsza reszta, należy już do reszt powtarzających się, a tymsamym piérwsza cyfra dziesiętna należy już do peryjodu. Widzimy przeto, że *jeżeli mianownik nieskracalnéj postaci danego ułamka jest liczbą piérwszą względem 10-u, to ułamek dziesiętny, wyrażający dany ułamek zwyczajny, jest peryjodyczny prosty.*

b. Weźmy ułamek zwyczajny, którego postać nieskracalna ma jako mianownik taką liczbę, iż w rozkładzie jéj na czynniki piérwsze znajduje się czynnik 2 lub 5 i jednocześnie czynnik inny, niż 2 lub 5. Np. do rozkładu mianownika ułamka $\frac{51}{88}$ (który jest już w postaci nieskracalnéj) wchodzi czynnik 2 i jednocześnie wchodzi czynnik 11,

$$88 = 2.2.2.11.$$

Zważmy, że taki ułamek możemy wyrazić, wogóle mówiąc, jako sumę lub różnicę dwu ułamków, z których jeden będzie miał w mianowniku liczbę piérwszą względem 10-u, a drugi będzie miał w mianowniku iloczyn samych tylko czynników 2 lub 5. [Gdy bowiém napiszemy

$$\frac{51}{88} = \frac{x}{11} + \frac{y}{8},$$

to, znosząc mianowniki, otrzymujemy

$$51 = 8x + 11y,$$

równanie nieoznaczone stopnia 1-go z dwiema niewiadomymi x i y, dla których, z uwagi, że spółczynniki przy x i y są liczbami piérwszymi względem siebie, istnieją zawsze wartości całkowite (z których jedna może być ujemną), zadość czyniące temu równaniu — jak się tego dowodzi w algiebrze.] Jakoż,

$$\frac{51}{88} = \frac{5}{11} + \frac{1}{8}.$$

Piérwszy z tych ułamków zwyczajnych, t. j. $\frac{5}{11}$, wyraża się jako ułamek dziesiętny peryjodyczny prosty, drugi zaś, t. j. ułamek $\frac{1}{8}$, jako ułamek dziesiętny skończony. W sumie więc ich cyfry dziesiętne ułamka dziesiętnego skończonego zmienią początkowe cyfry po przecinku ułamka dziesiętnego peryjodycznego prostego, tak iż otrzymamy ułamek dziesiętny peryjodyczny mieszany, z tylu cyframi dziesiętnymi, nie należącymi do peryjodu, ile było cyfr dziesiętnych w ułamku dziesiętnym skończonym (por. us. 3),

$$\frac{5}{11} = 0,\underline{45}4545\ldots$$
$$\frac{1}{8} = 0,125$$
$$\frac{51}{88} = 0,57\underline{95}45454\ldots.$$

Podobnie np. $\frac{79}{3150}$; $3150 = 2.3.3.5.5.7 = 63.50$; $\frac{79}{3150} = \frac{23}{63} - \frac{17}{50}$;

$$\frac{23}{63} = 0,365079365079\ldots$$

$$\frac{17}{50} = 0,34$$

$$\frac{79}{3150} = 0,025079365079\ldots.$$

Widzimy więc [1]), że *jeżeli w rozkładzie mianownika nieskracalnéj postaci danego ułamka zwyczajnego na czynniki piérwsze znajduje się czynnik 2 lub 5 i jednocześnie czynnik inny, niż 2 lub 5, to ułamek dziesiętny, przedstawiający dany ułamek zwyczajny, jest peryjodyczny mieszany i ma tyle cyfr dziesiętnych, nie należących do peryjodu, ile razy do jego rozkładu wchodzi ten z czynników 2 lub 5, który większą ilość razy w nim się znajduje.*

W ILORAZIE DWU LICZB CAŁKOWITYCH UŁAMEK DZIESIĘTNY JEST ALBO SKOŃCZONY ALBOTEŻ PERYJODYCZNY.

7. Z tego, cośmy dotąd mówili, widoczna, że jeżeli iloraz z podzielenia dwu liczb całkowitych mamy przedstawić jako liczbę dziesiętną [2]), a chcemy wiedzieć, czy ułamek dziesiętny, który otrzymamy w ilorazie, będzie skończony, czytéż nieskończony (peryjodyczny), to trzeba dzieleniem dzielnéj i dzielnika przez ich spólne dzielniki doprowadzić je do tego, aby dzielna i dzielnik były liczbami piérwszymi względem siebie. Jeżeli wtedy już dzielnik jest podzielny tylko przez liczby piérwsze 2 lub 5, to w ilorazie otrzymamy ułamek dziesiętny skończony; jeżeli zaś jest on wtedy podzielny przez liczbę piérwszą, inną niż 2 lub 5, to w ilorazie otrzymamy ułamek dziesiętny peryjodyczny.

Oczywiście, że jeżeli dany dzielnik (choćby nie był liczbą piérwszą względem dzielnéj) jest podzielny tylko przez liczby piérwsze 2 lub 5, to w ilorazie może być tylko ułamek dziesiętny skończony, a wrazie, gdy dany dzielnik jest niepodzielny ani przez 2, ani przez 5 (t. j. jest liczbą piérwszą względem 10), to w ilorazie może być tylko ułamek dziesiętny peryjodyczny.

---

[1]) Niektórzy, dowodząc tego inaczéj, przyjmują, że jeżeli w liczbie dziesiętnéj, któréj ułamek jest peryjodyczny prosty, przesuwamy przecinek o odpowiednią ilość cyfr wlewo, to otrzymujemy ułamek dziesiętny peryjodyczny mieszany, to niezawsze jednak ma miejsce, np. gdy owa liczba dziesiętna wyraża $\frac{2300}{63}$.

[2]) Przyjmujemy więc, że dzielna nie jest podzielna przez dzielnik.

§ 27. WYRAŻANIE UŁAMKÓW DZIESIĘTNYCH W POSTACI ZWYCZAJNYCH.

WYRAŻANIE UŁAMKA DZIESIĘTNEGO W POSTACI UŁAMKA ZWYCZAJNEGO.

1. Należy teraz wziąć na uwagę zadanie odwrotne temu, którym głównie zajmowaliśmy się w § poprzedzającym, t. j. rozważyć wyrażanie ułamków dziesiętnych w postaci zwyczajnych.

Jak już wiemy (§ 21, us. 6), *aby ułamek dziesiętny skończony wyrazić jako ułamek zwyczajny, należy jako licznik napisać liczbę, przedstawioną przez cyfry, znajdujące się po przecinku, jakgdyby to ich zgrupowanie przedstawiało oddzielną liczbę całkowitą, a jako mianownik 1 z tylu zerami, ile w danym ułamku jest wszystkich cyfr dziesiętnych.* Otrzymany ułamek zwyczajny należy następnie, jeżeli można skrócić (§ 17, us. 9).

Należy więc tylko zbadać, jak wyrażać ułamki dziesiętne peryjodyczne w postaci ułamków zwyczajnych.

WYRAŻANIE UŁAMKA DZIESIĘTNEGO PERYJODYCZNEGO PROSTEGO W POSTACI UŁAMKA ZWYCZAJNEGO.

2. Weźmy naprzód ułamek dziesiętny peryjodyczny prosty, np. $0{,}\overline{342342}\ldots$. Zauważmy, że

$$342 = 0{,}342 \times 1000,$$

lub, jeżeli zamiast 1000 napiszemy $999 + 1$ i zważymy, że: aby liczbę pomnożyć przez sumę dwu liczb, można liczbę daną pomnożyć przez każdy ze składników téj sumy i otrzymane iloczyny do siebie dodać (§ 6, us. 14; § 23, us. 5), możemy zamiast $0{,}342 \times 1000$ napisać: $0{,}342 \times 999 + 0{,}342$, tak iż

$$342 = 0{,}342 \times 999 + 0{,}342.$$

Do tegoż samego przyszlibyśmy, gdybyśmy 342 dzielili przez 999 i wyznaczyli w ilorazie piérwsze trzy cyfry dziesiętne; ilorazem niezupełnym jest 0,342, a resztą dzielenia 0,342 (§ 24, us. 7). Innymi słowy (§ 26, us. 1): wyrażając ułamek zwyczajny $\frac{342}{999}$ w postaci ułamka dziesiętnego, znajdziemy, iż piérwsze trzy cyfry dziesiętne są 3, 4, 2, a następne znajdziemy, dzieląc w dalszym ciągu resztę 342 przez 999 (t. j. dopisując do téj reszty 0, wyznaczając stąd czwartą cyfrę dziesiętną i t. d.); będziemy zatym teraz znowu w takim samym położeniu, w jakim byliśmy na początku; a więc w ilorazie te trzy cyfry 3, 4 i 2 będą się wciąż

w tymże samym porządku powtarzały. A zatym [1]) ułamek zwyczajny $\frac{342}{999}$ jest tym właśnie, który, wyrażony jako dziesiętny, da nam ułamek $0{,}342342\ldots$, t. j.

$$0{,}342342\ldots = \frac{342}{999} = \frac{13}{37}.$$

Podobnie znajdziemy, że np. $0{,}03600360\ldots = \frac{360}{9999} = \frac{40}{1111}$.

Powiemy więc.

Aby ułamek dziesiętny peryjodyczny prosty wyrazić jako ułamek zwyczajny, należy jako licznik napisać liczbę, przedstawioną przez cyfry peryjodu, jakgdyby ich zgrupowanie przedstawiało liczbę całkowitą, a w mianowniku napisać liczbę, przedstawioną przez tyle cyfr 9, ile jest wszystkich cyfr w peryjodzie. Otrzymany ułamek zwyczajny należy następnie, jeżeli można, skrócić.

3. Zauważmy, że z równości

$$342 = 0{,}342 \times 999 + 0{,}342$$

wypada, że

$$\frac{342}{999} = 0{,}342 + \frac{0{,}342}{999}$$

i następnie

$$\frac{342}{999} = 0{,}342342 + \frac{0{,}000342}{999};\quad \frac{342}{999} = 0{,}342342342 + \frac{0{,}000000342}{999}$$ i t. d.,

skąd wynika, że w miarę tego, jak coraz więcéj uwzględniamy peryjodów, co

---

[1]) Dowód ten (wzięty z przytoczonéj poprzednio arytmetyki J. A. Serret'go) opiéra się właściwie na tym samym, co dowód, w którym naprzód rozważamy, iż ułamki $\frac{1}{9}$, $\frac{1}{99}$, $\frac{1}{999}$ i t. d. są przedstawione przez ułamki dziesiętne peryjodyczne proste: $0{,}111\ldots$, $0{,}010101\ldots$, $0{,}001001001\ldots$, i t. d., a następnie dane ułamki np. $0{,}444\ldots$: $0{,}525252\ldots$ uważamy jako $4\times 0{,}111\ldots$; $52\times 0\ 010101\ldots$, [Zauważymy, że to ostatnie uzasadnienie sposobu wyrażania ułamków dziesiętnych peryjodycznych prostych w postaci ułamków zwyczajnych jest już wyłożone w *Arytmetyce* Konkowskiego z r. 1811; w późniejszych jednak arytmetykach przeważnie przytaczany jest dowód następujący.]

Najwięcéj u nas rozpowszechniony jest dowód taki, od powiększonego 1000 razy ułamka danego $0{,}342342342\ldots$ odejmijmy ułamek dany:

1000 ułamków danych $= 342{,}342342\ldots$
ułamek dany $= 0{,}342342\ldots$

999 ułamków danych $= 342$
ułamek dany $= \frac{342}{999}$

Jest tu jednak niedogodne z różnych względów takie odejmowanie nieskończonych ciągów cyfr od siebie. Dlatego bardzo wielu autorów obcych wprowadza do tego zmianę, polegającą na tym, że się zadowala ograniczoną ilością peryjodów ułamka danego i w podobny temu sposób zaznacza, że wtedy ów ułamek różni się od ułamka $\frac{342}{999}$ o liczbę, która staje się tym mniejszą, im więcéj uwzględniamy peryjodów. Takie wprowadzenie rozważania granicy jest jednak zawczesne przy piérwszym wykładaniu uczniom o wyrażaniu ułamków dziesiętnych w postaci zwyczajnych.

raz więcéj zbliżamy się do liczby, którą przedstawia ułamek zwyczajny $\frac{342}{999} = \frac{13}{37}$.

Ułamek $0{,}\overline{342342342}\ldots$ możemy tak wyrazić:

$$0{,}\overline{342342342}\ldots = \frac{342}{1000} + \frac{342}{1000000} + \frac{342}{1000000000} + \ldots,$$

t. j., wyrażając się, jak w algiebrze, możemy dany ułamek uważać jako sumę wyrazów postępu gieometrycznego nieskończonego malejącego, którego wyrazem piérwszym jest $\frac{342}{1000}$, a wykładnikiem $\frac{1}{1000}$. Dowodzi się w algiebrze, że suma skończonéj ilości wyrazów początkowych takiego postępu, wmiarę uwzględniania coraz większéj ilości tych wyrazów, zdąża do liczby stałéj, zwanéj granicą, od któréj może się różnić mniéj niż o jakkolwiek małą oznaczoną liczbę, i że ta granica jest ilorazem z podzielenia wyrazu piérwszego przez różnicę 1-ści i wykładnika postępu. Będzie więc tu (§ 20, us. 5):

$$\frac{\frac{342}{1000}}{1 - \frac{1}{1000}} = \frac{342}{999} = \frac{13}{37}.$$

Widzimy więc, że ułamek zwyczajny $\frac{342}{999} = \frac{13}{37}$ jest granicą, do któréj zdąża ułamek $0{,}\overline{342342}\ldots 342$ wmiarę uwzględniania coraz większéj ilości peryjodów [1]).

4. Ułamek dziesiętny peryjodyczny prosty

$$0{,}\overline{999}\ldots$$

posiada tę własność, że gdy bierzemy jego wartości przybliżone z niedomiarem (§ 21, us. 13) na 0,1; 0,01; 0,001 i t. d., to ułamki dziesiętne skończone przedstawiające owe przybliżenia, są większe od wszelkich innych ułamków dziesiętnych skończonych, mających odpowiednio jednę, dwie trzy i t. d. cyfry dziesiętne (§ 21, us. 12). Każda zaś z wartości przybliżonych z nadmiarem przedstawia tę samą liczbę 1.

Tęż liczbę (gdyż $\frac{9}{9} = 1$) otrzymamy, gdy do ułamka $0{,}\overline{999}\ldots$, największego ze wszystkich ułamków dziesiętnych peryjodycznych, zastosujemy prawidło ustępu 2-go [2]), czyli, wyrażając się, jak w drugiéj części ustępu 3-go: 1-ść jest granicą, do któréj zdąża ułamek $0{,}\overline{999}\ldots 9$ wmiarę uwzględniania coraz większéj ilości peryjodów.

---

[1]) Albo, oznaczając n-ty od początku peryjód zapomocą wskaźnika n, umieszczonego przy ostatniéj cyfrze peryjodu: ułamek zwyczajny $\frac{342}{999}$ jest granicą, do któréj zdąża ułamek

$$0{,}\overline{342}\ldots 342_n$$

wmiarę ustawicznego powiększania się liczby n.

[2]) A więc wzmiankowane wyżéj przybliżenia z nadmiarem są tylko pozornie przybliżeniami — one przedstawiają wartość dokładną téj liczby.

Ten więc największy ze wszystkich ułamków dziesiętnych peryjodycznych, a zarazem największy ze wszelkich wogóle ułamków dziesiętnych możliwych, jest właściwie wyrażeniem jedności. Dlatego to tego krańcowego ułamka dziesiętnego nie można otrzymać jako ilorazu z podzielenia dwu liczb całkowitych przez siebie (§ 26, us. 1, 7), a wszczególności nie można tą drogą [1]) otrzymać owego ułamka, jako wyrażenia ułamka zwyczajnego.

Z tego zaś jeszcze wynika, że, wykonawszy jakikolwiek rachunek, nie otrzymamy w wypadku ułamka dziesiętnego peryjodycznego $0,\overline{999}\ldots$

KIEDY Z UŁAMKA ZWYCZAJNEGO OTRZYMUJEMY UŁAMEK DZIESIĘTNY PERYJODYCZNY PROSTY?

5. Jak widzieliśmy (us. 2), ułamek zwyczajny, którego wyrażeniem jest ułamek dziesiętny peryjodyczny prosty, może być przedstawiony w postaci, któréj mianownik jest liczbą przedstawioną wyłącznie przez cyfry 9, a więc liczbą niepodzielną ani przez 2 ani przez 5 (§ 13, us. 5), czyli liczbą piérwszą względem 10-u (§ 15, us. 11). Jeżeli owę postać można skrócić, to mianownik nieskracalnéj postaci tego ułamka zwyczajnego jest również liczbą piérwszą względem 10-u. Uzupełniając więc to, cośmy powiedzieli w us. 4-ym § 26-go, dodamy teraz:

Jeżeli mianownik nieskracalnéj postaci danego ułamka zwyczajnego jest liczbą piérwszą względem 10-u [2]*), to ułamek dziesiętny, wyrażający dany ułamek zwyczajny, jest peryjodyczny prosty* [3]),

WYRAŻANIE UŁAMKA DZIESIĘTNEGO PERYJODYCZNEGO MIESZANEGO W POSTACI UŁAMKA ZWYCZAJNEGO.

6. Weźmy teraz pod uwagę ułamek dziesiętny peryjodyczny mieszany, np. ułamek $0,13\overline{030}\ldots$. Zważmy, że

$$0,13\overline{030}\ldots = 0,13 + 0,00\overline{030}\ldots \text{ [4])}$$
$$= 0,13 + \frac{1}{100} \times 0,\overline{030}\ldots \text{ [5])}$$
$$= \frac{13}{100} + \frac{1}{100} \times \frac{30}{999}$$
$$= \frac{13 \times 999 + 30}{99900}.$$

---

[1]) Można go otrzymać przez stosowanie równości $9 = 0,9 \times 9 + 0,9$.

[2]) Albo: jeżeli w rozkładzie mianownika nieskracalnéj postaci danego ułamka zwyczajnego na czynniki piérwsze niéma ani czynnika 2, ani czynnika 5, to i t. d.

[3]) W peryjodzie zaś jest tyle cyfr, ile najmniéj potrzeba cyfr 9, aby one, razem uważane, przedstawiały liczbę podzielną przez mianownik owéj postaci nieskracalnéj.

[4]) Gdybyśmy to tak napisali:

$$0,13\overline{030}\ldots = 0,13 + 0,0003\overline{003}\ldots,$$

to otrzymalibyśmy $\frac{13}{100} + \frac{1}{10} \times \frac{3}{999} = \frac{13 \times 999 + 3 \times 10}{99900}$ i t. d.

[5]) Własność, iż przesuwając przecinek wprawo o dwa miejsca, powiększamy liczbę dziesiętną 100 razy, możemy tu zastosować do ułamków dziesiętnych peryjodycznych, gdyż

W liczniku zamiast 999 możemy napisać 1000 — 1; robiąc to i zważając (§ 6, us. 15), że $13 \times (1000 - 1) = 13 \times 1000 - 13 = 13000 - 13$, miéć będziemy:

$$0{,}\underline{13030030}\ldots = \frac{13000-13+30}{99900}$$

$$= \frac{13030-13}{99900} = \frac{13017}{99900} = \frac{4339}{33300}.$$

Podobnie znajdziemy, że np.

$$0{,}0\underline{725454}\ldots = \frac{7254-72}{99000} = \frac{7182}{99000} = \frac{399}{5500}.$$

$$0{,}\underline{0857142857142}\ldots = \frac{857142}{9999990} = \frac{3}{35}.$$

Aby ułamek dziesiętny peryjodyczny mieszany wyrazić jako ułamek zwyczajny, należy w liczniku napisać liczbę, którą otrzymamy, gdy od liczby, przedstawionéj przez cyfry dziesiętne nie należące do peryjodu i wszystkie cyfry peryjodu, odejmiemy liczbę, przedstawioną przez cyfry dziesiętne nie należące do peryjodu, jakgdyby te dwa zgrupowania cyfr przedstawiały liczby całkowite, a w mianowniku napisać liczbę, przedstawioną przez tyle cyfr 9, ile jest wszystkich cyfr w peryjodzie, oraz tyle zer, ile jest wszystkich cyfr dziesiętnych nie należących do peryjodu. Otrzymany ułamek zwyczajny należy następnie, jeżeli można, skrócić.

7. Napisawszy

$$0{,}\underline{13030030}\ldots = 0{,}13 + \frac{1}{100} \times 0{,}\underline{030030}\ldots,$$

mozemy do ułamka dziesiętnego peryjodycznego prostego $0{,}\underline{030030}\ldots$ zastosować to, cośmy mówili na początku ustępu 3-go, wskutek czego wyniknie, że dany ułamek peryjodyczny mieszany, wmiarę tego, jak coraz więcéj uwzględniamy peryjodów, coraz więcéj się zbliża do liczby, którą przedstawia suma $\frac{13}{100} + \frac{1}{100} \times \frac{30}{999}$, czyli ułamek zwyczajny $\frac{13030-13}{99900} = \frac{4339}{33300}$.

Stosując zaś do tegoż ułamka dziesiętnego peryjodycznego prostego to, cośmy powiedzieli w drugiéj części ustępu 3-go, będziemy mogli się wyrazić, że wypisany ułamek zwyczajny jest granicą, do któréj zdąża ułamek 0,13030030 . . . 030 wmiarę uwzględniania coraz większéj ilości peryjodów.

8. Ułamek dziesiętny peryjodyczny mieszany, którego peryjodem jest 9, np.

$$0{,}\underline{527999}\ldots$$

może być tak wyrażony

$$0{,}\underline{527999}\ldots = 0{,}527 + \frac{1}{1000} \times 0{,}999\ldots.$$

---

sposób, w jaki to objaśniliśmy (§ 21, us. 9) stosuje się i do tego przypadku: każda cyfra, którekolwiek miejsce zajmująca, staje się o 2 miejsca bliższą przecinka, a więc oznacza części liczby 100 razy większe, niż oznaczała poprzednio.

Wszystko więc, cośmy w ustępie 4-ym mówili o największym ze wszelkich możliwych ułamków dziesiętnych, który tu wchodzi w wypisane wyrażenie, ma tu również swoje zastosowanie. Tak więc:

Ułamek dziesiętny peryjodyczny mieszany $0{,}527\overline{999}\ldots$ jest największy z tych wszystkich ułamków dziesiętnych, których piérwsze trzy cyfry dziesiętne są pokolei: 5, 2 i 7.

Ten ułamek dziesiętny peryjodyczny mieszany jest właściwie innym wyrażeniem ułamka dziesiętnego skończonego: 0,528, czyli jest wyrażeniem ułamka zwyczajnego $\frac{5279-527}{9000}=\frac{4752}{9000}=\frac{528}{1000}=\frac{66}{125}$.

Taki więc ułamek dziesiętny peryjodyczny mieszany, jak tu rozważany, nie może być otrzymany jako iloraz z podzielenia dwu liczb całkowitych przez siebie, a tymsamym nie można tą drogą otrzymać owego ułamka jako wyrażenia ułamka zwyczajnego.

Z tego jeszcze wynika, że, wykonawszy jakikolwiek rachunek, nie otrzymamy w wypadku ułamka dziesiętnego peryjodycznego mieszanego, któregoby peryjodem było 9.

KIEDY Z UŁAMKA ZWYCZAJNEGO OTRZYMUJEMY UŁAMEK DZIESIĘTNY PERYJODYCZNY MIESZANY?

9. Jak widzieliśmy (us. 6), ułamek zwyczajny, którego wyrażeniem jest ułamek dziesiętny peryjodyczny mieszany, może być przedstawiony w postaci, któréj mianownik jest liczbą, utworzoną przez tyle cyfr 9, ile jest wszystkich cyfr w peryjodzie, oraz tyle cyfr 0, ile jest wszystkich cyfr dziesiętnych nie należących do peryjodu. Jeżeli owę postać skrócimy, to mianownik postaci nieskracalnéj będzie liczbą podzielną przez 2 lub 5, gdyż w przeciwnym razie dany ułamek dziesiętny peryjodyczny byłby prostym (us. 5; § 26, us. 5). Zauważymy nadto, że licznik i mianownik owéj wzmiankowanéj wyżéj postaci, mającéj w mianowniku liczbę przedstawioną przez cyfry 9 i 0, nie mogą miéć spólnego dzielnika 10, gdyż wtedy (us. 6) ostatnia cyfra dziesiętna nie należąca do peryjodu byłaby takąż samą, jak ostatnia cyfra peryjodu, coby wskazywało, żeśmy niewłaściwą (§ 26, us. 5) grupę cyfr przyjęli jako peryjód. Skracając więc owę postać, jeżeli to będzie możliwe, przez 2, nie będziemy jéj mogli skrócić przez 5) a jeżeli będzie ją można skrócić przez 5, to nie będzie można jéj skrócić przez 2. Innymi słowy, większa z liczb, wskazujących, ile do rozkładu na czynniki piérwsze mianownika nieskracalnéj postaci ułamka zwyczajnego, przedstawiającego ułamek peryjodyczny mieszany, wchodzi czynników 2 i ile czynników 5, przedstawi jednocześnie ilość zer w mianowniku wyżéj wzmiankowanéj postaci, a tymsamym ilość cyfr dziesiętnych w owym ułamku dziesiętnym peryjodycznym, nie na-

leżących do peryjodu. Z tego wynika, że to, cośmy powiedzieli w us. 4-ym § 26-go, możemy teraz uzupełnić (por. us. 5), dodając, iż:

Jeżeli w rozkładzie mianownika nieskracalnéj postaci danego ułamka zwyczajnego na czynniki piérwsze znajduje się czynnik 2 lub 5 i jednocześnie czynnik inny, niż 2 lub 5, to ułamek dziesiętny, przedstawiający dany ułamek zwyczajny, jest peryjodyczny mieszany i ma tyle cyfr dziesiętnych, nie należących do peryjodu, ile razy do tego rozkładu wchodzi ten z czynników 2 lub 5, który większą ilość razy w nim się znajduje [1]).

WYRAŻANIE LICZB DZIESIĘTNYCH WIĘKSZYCH OD JEDNOŚCI ZAPOMOCĄ UŁAMKÓW ZWYCZAJNYCH.

10. Rozważaliśmy tu tylko wyrażanie ułamków dziesiętnych w postaci ułamków zwyczajnych. Gdybyśmy zaś mieli liczbę dziesiętną większą od jedności, to odpowiednie zadanie wykonamy najprościéj, gdy oddzielimy ułamek dziesiętny od części całkowitéj, ten ułamek dziesiętny przedstawimy według podanych powyżéj wskazówek w postaci ułamka zwyczajnego, a ten ułamek zwyczajny napiszemy obok części całkowitéj danéj liczby.

---

§ 28. UWAGI OGÓLNE O LICZBACH DZIESIĘTNYCH.

1. Z tego wszystkiego, cośmy tu o ułamkach zwyczajnych i dziesiętnych mówili, wypada, że ułamki dziesiętne różnią się tylko postacią od ułamków zwyczajnych, tak, iż liczbę wyrażoną jako ułamek zwyczajny możemy przedstawić jako ułamek dziesiętny, i nawzajem. Dlatego określenia dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia, jak również wszystkie własności, niezwiązane z postacią ułamków, były w rozdziałach VI i VII też same.

Zauważymy tu jeszcze, że przy rozpoczynaniu nauki o ułamkach zwyczajnych, możemy odrazu wszelkie takie ułamki miéć na myśli, gdy tymczasem przy rozpoczynaniu nauki o ułamkach dziesiętnych, możemy z początku rozważać tylko ułamki dziesiętne skończone, odsuwając na późniéj rozważanie tak prostych liczb, jak: jedna-trzecia, pięć-szóstych, dwie-siódme i t. d.

2. Jeżeli wykonawszy pewien rachunek, otrzymaliśmy w wypadku ułamek dziesiętny peryjodyczny, to możemy tę postać zachować, jeżeli

---

[1]) Ilość cyfr peryjodu wyznaczy największy z dzielników mianownika nieskracalnéj postaci danego ułamka zwyczajnego, piérwszych względem 10-u. (Por. odsyłacz do ustępu 5-go).

niéma wskazówki, że ów wypadek ostateczny powinien być przedstawiony inaczéj, np. z pewnym przybliżeniem.

Jeżeli jednak pośród liczb, które mamy dodać lub odjąć od siebie, albo pomnożyć lub podzielić przez siebie, jest ułamek dziesiętny peryjodyczny (albo, wogóle, liczba dziesiętna, któréj ułamek jest peryjodyczny), to nie wykonywamy tych działań na ułamkach dziesiętnych nieskończonych, lecz albo bierzemy wartość przybliżoną téj liczby, albotéż, jeżeli chcemy wykonać rachunek dokładnie, ułamek dziesiętny peryjodyczny wyrażamy w postaci ułamka zwyczajnego.

3. W stosunkach handlowych często małe ułamki zwyczajne, dla łatwiejszego ich ze sobą porównania (§ 17, us. 14), przedstawiają w postaciach, których licznikiem jest zawsze 1-ść; doprowadza to niekiedy do ułamka, którego licznikiem jest 1, a mianownikiem liczba dziesiętna. Np. drogi żelazne wożą zboże, pobierając za pełny ładunek od wagonu, w który wchodzi 610 pudów zboża, 10 kopiejek za werstę, czyli wożą zboże „w pełnych ładunkach po $\frac{1}{61}$ kop. od puda i wersty". Jeżeli np. z powodów konkurencyjnych pewna droga żelazna obniża ową opłatę z 10 kop. na 9 kop., to wypadnie $\frac{9}{610}$ kop. „od puda i wersty". Owóż, dzieląc licznik i mianownik przez licznik, a w mianowniku zatrzymując 2 cyfry dziesiętne (§ 21, us. 13), otrzymamy, iż owa droga wozi zboże po $\frac{1}{67{,}78}$ kopiejki „od puda i wersty".

4. Chociaż ułamek dziesiętny peryjodyczny, jak widzieliśmy (§ 27, us. 3, 7), jest sumą nieskończenie wielu wyrazów postępu gieometrycznego (do któréj wrazie, gdy ten ułamek jest peryjodyczny mieszany, dodaje się pewien ułamek dziesiętny skończony), to jednak granica téj sumy przedstawia albo jednę, albo więcéj razem wziętych części, otrzymanych z rozłożenia jedności na części równe (§ 17, us. 1). Dlatego ułamki dziesiętne peryjodyczne należą do liczb, z którymi mamy do czynienia w arytmetyce (§ 17, us. 2).

5. Jeżeli wystawimy sobie, że mamy liczbę, w któréj cyfr dziesiętnych jest nieskończenie wiele, ale one, jakkolwiek wiele ich weźmiemy, nie przedstawią peryjodu, to taka liczba, z uwagi, że jéj części mniejsze od jedności są napisane według téj saméj zasady, według któréj piszemy liczby całkowite (§ 21, us. 1), jest liczbą dziesiętną. Nadto powszechnie przyjęto w przypadku, gdy taka liczba jest mniejsza od jedności (a w przeciwnym razie, część jéj pozostającą po oddzieleniu części całkowitéj), nazywać ją także „ułamkiem" dziesiętnym [1]). Będzie to więc „ułamek dziesiętny nieskończony nieperyjodyczny". Ułamki dziesiętne nieskończone nieperyjodyczne należą do liczb, które

[1]) Dlatego podane w § 21 us. 3 określenie ułamków dziesiętnych obejmuje również te liczby.

otrzymujemy w algiebrze elementarnéj, np. do wyliczanych przy pomocy cyfr dziesiętnych pierwiastków jakiegokolwiek stopnia z liczb całkowitych, które nie dadzą się dokładnie przedstawić jako liczby całkowite [1]), do logarytmów zwyczajnych tych liczb, które nie są potęgami całkowitymi 10-u i t. d.; wchodzą one do niektórych liczb, wynikających w gieometryi elementarnéj z wymierzenia pewnéj wielkości inną jednorodną, przyjętą za jednostkę, np. okręgu koła jego średnicą i t. d., jak również do pewnych liczb, wynikających z badań, przeprowadzanych w innych częściach matematyki. — Z tego, cośmy mówili o wyrażaniu ułamka zwyczajnego w postaci dziesiętnego, wynika bezpośrednio, że niéma przypadku, w którymby ułamek zwyczajny mógł być wyrażony jako ułamek dziesiętny nieskończony nieperyjodyczny. Nawzajem, ułamek dziesiętny nieskończony nieperyjodyczny nie może być wyrażony w postaci ułamka zwyczajnego. Innymi słowy, liczba, którą wyraża ułamek dziesiętny nieskończony nieperyjodyczny, nie może być przedstawiona takim sposobem: rozłożyć jedność na pewne części równe i skupić pewną ilość takich części. Albo nieco inaczéj, nie można, zapomocą rozłożenia jedności na części równe, wyznaczyć takiéj części jedności, aby ta mieściła się dokładnie (bez reszty) w liczbie, przedstawionéj przez ułamek dziesiętny nieskończony nieperyjodyczny. Zwykliśmy w takim przypadku mówić, że dla takiéj liczby i dla jedności „niéma spólnéj miary", czyli, że ta liczba jest „niespółmierna z jednością"; taką liczbę nazywamy „liczbą niewymierną". — Dlategoto ułamki dziesiętne nieskończone nieperyjodyczne, jako liczby niewymierne, nie należą już do liczb, z którymi mamy do czynienia w arytmetyce, chociaż i je, według przyjętego zwyczaju, nazywamy „ułamkami" dziesiętnymi.

O UŁAMKACH W INNYCH NIŻ DZIESIĄTKOWY SYSTEMATACH.

6. W § 6, us. 41 i 42 i w § 7, us. 29, mówiliśmy o liczbach całkowitych wypisanych w systemacie, różnym od dziesiątkowego. Oczywiście, że także liczby ułamkowe mogły być wypisane w systemacie, różnym od dziesiątkowego. Ułamki takie mogą być albo zwyczajne, albotéż wypisane na podobieństwo ułamków dziesiętnych t. j. szóstkowe w systemacie szóstkowym, dwunastkowe w dwunastkowym i t. d.

Gdy mamy ułamek zwyczajny w systemacie różnym od dziesiątkowego, to możemy go wyrazić w systemacie dziesiątkowym, przedstawiając odpowiednio w tym ostatnim systemacie, tak licznik jak i mianownik ułamka danego. Nawzajem, przekształcając licznik i mianownik ułamka danego w systemacie

[1]) Dowodzimy bowiem w algiebrze, że wtedy taki pierwiastek nie jest ułamkiem właściwym, a więc w liczbie dziesiętnéj, którą wyliczać możemy, przedstawiającéj pierwiastek, część jéj, pozostająca po oddzieleniu części całkowitéj, nie może być ani ułamkiem dziesiętnym skończonym, ani ułamkiem dziesiętnym peryjodycznym; jest ona przeto ułamkiem dziesiętnym nieskończonym nieperyjodycznym. — I t. d.

dziesiątkowym, na liczby wypisane w pewnym systemacie, różnym od dziesiątkowego, możemy dojść do postaci ułamka w tymże systemacie. Np. wyrazić w systemacie dziesiątkowym ułamek zwyczajny wypisany w systemacie szóstkowym.

$$\left(\frac{3004}{250\,413}\right)_6 = \frac{3\times6^3+4}{2\times6^5+5\times6^4+4\times6^2+1\times6+3} = \frac{652}{22185}$$

Wyrazić w systemacie ósemkowym ułamek zwyczajny wypisany w systemacie dziasiątkowym:

$$\frac{513}{28325} = \frac{1\times8^3+1}{\{[(6\times8+7)\times8+2]\times8+4\}\times8+5} = \left(\frac{1001}{67245}\right)_8$$

7. Jeżeli w systemacie np. szóstkowym wypiszemy liczbę mniejszą od jedności według téj saméj zasady, według któréj piszemy w nim liczbę całkowitą, a dla oddzielenia części mniejszych od jedności użyjemy przecinka, to powstanie w tym systemacie liczba odpowiadająca liczbie dziesiętnéj w systemacie dziesiątkowym. I t. p. Można łatwo wyrazić takie liczby w systemacie dziesiątkowym.

Np. $(21{,}2103)_4 = 2\times4+1+2\times\frac{1}{4}+1\times\frac{1}{4^2}+3\times\frac{1}{4^4} = 9{,}57421875$

$(0{,}1423)_6 = \frac{1}{6}+\frac{4}{6^2}+\frac{2}{6^3}+\frac{3}{6^4} = \frac{125}{432} = 0{,}2893\underline{518}\ldots$

$(0{,}01\underline{132054}\ldots)_6 = \left(\frac{1132054-11}{55555000}\right)_6 = \left(\frac{1132043}{55555000}\right)_6 =$

$= \frac{6^6+6^5+3\times6^4+2\times6^3+4\times6+3}{(6^5-1)\times6^3} = \frac{58\,779}{1\,679\,400} = \frac{7}{200} = 0{,}035.$

Odwrotnie, możemy liczbę dziesiętną przedstawić jako liczbę podobnego kształtu w systemacie różnym od dziesiątkowego np. 1

0,035 wyrazić w systemacie szóstkowym; ponieważ $0{,}035 = \frac{7}{200}$, zaś

$\frac{7}{200}:\frac{1}{6} = \frac{21}{100} = 0+\frac{21}{100}$; $\frac{21}{100}:\frac{1}{6} = \frac{63}{50} = 1+\frac{13}{50}$; $\frac{13}{50}:\frac{1}{6} = \frac{39}{25} = 1+\frac{14}{25}$;

$\frac{14}{25}:\frac{1}{6} = \frac{84}{25} = 3+\frac{9}{25}$; $\frac{9}{25}:\frac{1}{6} = \frac{54}{25} = 2+\frac{4}{25}$; $\frac{4}{25}:\frac{1}{6} = \frac{24}{25} = 0+\frac{24}{25}$;

$\frac{24}{25}:\frac{1}{6} = \frac{144}{25} = 5+\frac{19}{25}$; $\frac{19}{25}:\frac{1}{6} = \frac{114}{25} = 4+\frac{14}{25}$; przeto $0{,}035 = 0{,}011\,\underline{32054}\ldots)_6$

$1059{,}289\,\underline{3518}\ldots = 1059+\frac{125}{432} = (4523{,}1423)_6.$

ROZDZIAŁ IX.

STOSUNKI. PROPORCYJE. WIELKOŚCI PROPORCYJONALNE.

§ 29. STOSUNKI.

OKREŚLENIE STOSUNKU.

1. Gdy mamy dwie liczby, albo obie oderwane, albo też obie mianowane jednorodne, to często przy pomocy tych liczb wyrażamy liczbę oderwaną, którą otrzymalibyśmy, dzieląc piérwszą z liczb danych przez drugą. Chociaż wtedy wymieniamy przytym liczby dane, to jednak głównie mamy na myśli ów iloraz, tak iż tylko dla wyrażenia go służą dane dwieliczby. Takie zapomocą dwu liczb danych wyrażenie liczby oderwanéj, którąby wypadła zpodzielenia piérwszéj z liczb danych przez drugą nazywamy stosunkiem liczb danych. Tak np. gdy mówimy „stosunek 12-u do 3-ch" lub „stosunek 12-u *m* do 3-ch *m*" to mamy tu na myśli tę liczbę oderwaną 4, która wypadnie, gdy odpowiednio $12 : 3$ lub $12\,m : 3\,m$. Podobnie np. „stosunek 3 sążni do 2-u łokci + 12 cali" wyraża liczbę, którą otrzymamy dzieląc piérwszą z tych dwu liczb przez drugą; ponieważ to dzielenie sprowadza się do dzielenia liczb mianowanych prostych, wyrażonych przy pomocy téj saméj jednostki (§ 7, us. 7, § 11, us. 6), przeto zwykle taki stosunek zastępujemy przez stosunek liczb mianowanych prostych, a więc tu albo przez stosunek 216 cali do 60 cali, albo przez stosunek 9 łokci do 2,5 łokcia, albo przez stosunek 3 sążni do $\frac{5}{6}$ sążnia. Tak samo np. „stosunek 1 *m* do 1 łokcia nowopolskiego" zastępujemy np. przez stosunek 1000 *mm* do 576 *mm*.

Powiemy więc ogólnie: *stosunkiem dwu liczb danych nazywamy wyrażenie przez nie téj liczby, którąbyśmy otrzymali, dzieląc piérwszą z liczb danych przez drugą.*

Z tego określenia wprost wynika, że nie może być mowy o stosunku dwu liczb niejednorodnych, np. o stosunku 50 łokci do 3 sekund, gdyż takich liczb przez siebie dzielić nie można.

2. Chociaż wypowiadając lub pisząc stosunek dwu liczb, mamy na myśli tę liczbę, która wypadnie z podzielenia piérwszéj z liczb danych

przez drugą, to jednak zwykle wyraźnie téj liczby nie wymieniamy, ani téż w rachunkach jéj nie wyznaczamy, lecz zadowalamy się tym, iż gdyby nam o to szło, to moglibyśmy się zająć jéj wyznaczeniem.

Gdybyśmy tę liczbę wyznaczyli [1]), to: *a)* ona wskazywałaby, ile razy w piérwszéj z liczb, wchodzących do stosunku, mieści się liczba druga; czyli *b)* ona byłaby liczbą, otrzymaną z wymierzenia piérwszéj z tych liczb liczbą drugą, przyjętą za jednostkę; albo *c)* przez owę liczbę mnożąc drugą z liczb danych, otrzymalibyśmy piérwszą z nich [2]).

3. Z powodu, że, aby wyznaczyć liczbę, wyrażoną przez jakikolwiek stosunek, należałoby piérwszą z liczb wchodzących do tego stosunku podzielić przez drugą, oznaczamy stosunek w ten sam sposób, co dzielenie dwu liczb. A więc np. stosunek 12-u do 3-ch oznaczymy, pisząc albo 12 : 3, albo (§ 17, us. 5) także $\frac{12}{3}$. Taksamo należałoby oznaczyć stosunek np. 12-u metrów do 3-ch metrów. Z uwagi jednak, że nam tu idzie tylko o liczbę oderwaną, mającą być wypadkiem dzielenia, która jest niezależną od tego, czy dzielna i dzielnik są wyrażone przy pomocy pewnéj (téj saméj w obu liczbach, us. 1) jednostki, czy przy pomocy innéj jednostki, czytéż obie te liczby są oderwane, w piśmiennym przedstawianiu stosunku nie zaznaczamy miana owéj jednostki. Dlatego, choć mówimy: stosunek 12-metrów do 3-ch metrów, to jednak napiszemy 12 : 3, albo $\frac{12}{3}$, a w dalszym rachunku postępujemy z tymi liczbami tak, jakgdyby one były oderwane.

Piérwszą z liczb, wchodzących do stosunku, nazywamy poprzednikiem, drugą z nich następnikiem, a liczbę, którą stosunek przedstawia, nazywamy wykładnikiem stosunku. Tak np. w stosunku

$$12 : 3, \text{ czyli } \frac{12}{3}$$

liczba 12 jest poprzednikiem, liczba 3 następnikiem, a liczba 4, którą wyraża ten stosunek, jest wykładnikiem stosunku.

---

[1]) Por. § 7, us. 6 — 8; § 16, us. 1 b.; § 17, us. 5; § 20, us. 9: § 1, us. 3.

[2]) Powszechnie przyjmują ową mogącą być wyznaczoną liczbę za określenie stosunku, korzystając z jednego z przytoczonych powyżéj trzech odcieni w jéj znaczeniu (np. a). Baltzer, *Die Elemente der Mathematik* (1868); *b*). Bertrand, *Traite d'arithmétique* (1867) *bl.* i *c*), Serret, i c.] — Określenie może nie potrzebuje, zdaje się, szczegółowszego uzasadnienia; może jednak nie będzie zbyteczne zaznaczenie, że np. w gieometryi elementarnéj dowodzimy naprzód twierdzenia, że stosunek okręgu koła do jego średnicy jest stały, a późniéj dopiéro zajmujemy się wyznaczeniem liczby, wyrażonéj przez ten stosunek; podobnie np. mówimy, że stosanek obwodów dwu wielokątów podobnych jest równy stosunkowi ich boków odpowiednich, choć liczby, wyrażonéj przez te stosunki, nie wyznaczamy.

Poprzednik i następnik stosunku nazywają się wyrazami stosunku.

4. Gdy mamy dane dwie liczby, np. 10 i 14, to między nimi istnieć może albo stosunek 10 : 14, albotéż stosunek 14 : 10. Wykładniki tych stosunków, t. j. liczby $\frac{5}{7}$ i $\frac{7}{5}$, są każda odwrotnością drugiéj (§ 19, us. 10), czyli: *z dwu stosunków, które między dwiema liczbami istnieć mogą, jeden jest odwrotnym względem drugiego.* Oczywiście, że iloczyn liczb, które one wyrażają, jest jednością.

WŁASNOŚCI STOSUNKU.

5. Ponieważ, według określenia stosunku, poprzednik odpowiada w dzieleniu dzielnéj, następnik dzielnikowi, a wykładnik stosunku ilorazowi, przeto

poprzednik : następnik = wykładnikowi stosunku.

A z tego, według określenia dzielenia (§ 7, us. 3; § 20, us. 1), wypada, że

popozednik = następnikowi × wykładnik stosunku,

skąd nawzajem (§ 7, us. 5)

następnik = poprzednikowi : wykładnik stosunku.

6. Z tego, że poprzeduik odpowiada dzielnéj, następnik dzielnikowi, a wykładnik stosunku ilorazowi, wypada jeszcze (§ 7, us. 15; § 17, us. 7; § 20, us. 6, 7):

a. *Jeżeli poprzednik stosunku pomnożymy lub podzielimy przez pewną liczbę, to wskutek tego wykładnik stosunku zostanie przez tęż liczbę odpowiednio pomnożony lub podzielony.*

b. *Jeżeli następnik stosunku pomnożymy lub podzielimy przez pewną liczbę, to wskutek tego wykładnik stosunku zostanie przez tęż liczbę odpowiednio podzielony lub pomnożouy.*

c. *Jeżeli oba wyrazy stosunku albo jednocześnie pomnożymy, albo jednocześnie podzielimy przez pewną tę samę liczbę, to wykładnik stosunku się nie zmieni.*

STOSUNKI RÓWNE. WŁASNOŚCI STOSUNKÓW RÓWNYCH.

7. Gdy mamy stosunek dwu liczb, to nam idzie (us. 1) o liczbę (oderwaną), którą ten stosunek wyraża, t. j. o wykładnik stosunku. Wskutek tego ze stosunków, mających ten sam wykładnik, jako wyrażających tę samę liczbę, każdy może być wzięty zamiast innego. Wszystko więc jest jedno, czy pewną liczbę wyrażamy zapomocą stosunku 4 : 8, czy 7 : 14 czytéż 0,5 : 1, gdyż te stosunki, jako mające ten sam wykładnik

$\left(\frac{1}{2}\right)$, przedstawiają tę samę liczbę; one więc wszystkie są równoznaczne. Dlatego stosunki, mające ten sam wykładnik, nazywamy stosunkami równymi.

8. Możemy więc ostatnią z własności, wypowiedzianych w ustępie 6-ym, tak wysłowić: stosunek, otrzymany z danego, czyto wskutek jednoczesnego pomnożenia obu jego wyrazów przez tę samę liczbę, czytéż wskutek jednoczesnego podzielenia obu jego wyrazów przez tę samę liczbę, jest równy danemu stosunkowi i może go zastąpić. Gdy więc mamy np. stosunek 0,5 : 1, to możemy go zastąpić stosunkiem liczb całkowitych, mnożąc oba jego wyrazy przez 10, t. j. stosunkiem 5 : 10, a dzieląc tu oba wyrazy przez 5, otrzymany stosunek zastąpimy prostszym 1 : 2. Podobnie możemy stosunek $\frac{7}{6} : \frac{3}{8}$, mnożąc oba jego wyrazy przez 24, zastąpić stosunkiem liczb całkowitych 28 : 9.

9. Jeżeli mamy dwa lub więcéj stosunków równych, np.

$$4 : 8; \quad 7 : 14, \quad 0{,}5 : 1; \quad 5 : 10,$$

a więc mających ten sam wykładnik $\left(\frac{1}{2}\right)$, to (us. 5)

$$4 = 8 \times \frac{1}{2}, \quad 7 = 14 \times \frac{1}{2}, \quad 0{,}5 = 1 \times \frac{1}{2}, \quad 5 = 10 \times \frac{1}{2}.$$

Wskutek tego, suma $4 + 7 + 0{,}5 + 5$ przedstawia tęż samę liczbę, co suma $8 \times \frac{1}{2} + 14 \times \frac{1}{2} + 1 \times \frac{1}{2} + 10 \times \frac{1}{2}$, a więc

$$4 + 7 + 0{,}5 + 5 = 8 \times \frac{1}{2} + 14 \times \frac{1}{2} + 1 \times \frac{1}{2} + 10 \times \frac{1}{2},$$

albo (§ 6, us. 14; § 19, us. 6)

$$4 + 7 + 0{,}5 + 5 = (8 + 14 + 1 + 10) \times \frac{1}{2};$$

a więc stosunek liczby $4 + 7 + 0{,}5 + 5$ do liczby $8 + 14 + 1 + 10$ wyraża liczbę $\frac{1}{2}$ (us. 1, 7), t. j. tę samę, co stosunki dane, jest im równy, tak iż możemy napisać

$$(4 + 7 + 0{,}5 + 5) : (8 + 14 + 1 + 10) = 4 : 8 = 7 : 14 = 0{,}5 : 1 = 5 : 10.$$

Możemy więc powiedzieć: *gdy mamy dwa lub więcéj stosunków równych, to stosunek sumy ich poprzedników do sumy ich następników jest równy każdemu z danych stosunków.*

10. Podobnie gdy mamy dane dwa stosunki równe, np.

$$7 : 14, \quad 5 : 10,$$

to

$$7 = 14 \times \frac{1}{2}, \quad 5 = 10 \times \frac{1}{2},$$

różnice $7 - 5$ i $14 \times \frac{1}{2} - 10 \times \frac{1}{2} = (14 - 10) \times \frac{1}{2}$ przedstawiają tęż samę

liczbę, a stosunek liczby 7 — 5 do liczby 14 — 10 wyraża tęż liczbę, co stosunki dane, jest im równy, a więc

$$(7 - 5) : (14 - 10) = 7 : 14 = 5 : 10,$$

t. j. *gdy mamy dwa równe stosunki, to stosunek różnicy ich poprzedników do różnicy ich następników jest równy każdemu z danych stosunków* [1]).

§ 30. PROPORCYJE.

OKREŚLENIE PROPORCYI.

1. Gdy wyraźnie zaznaczymy, że pewne dwa stosunki są równe, to mówimy, że mamy proporcyją. A więc

Proporcyja jestto zaznaczona równość dwu stosunków.

Tak np. stosunki 5 : 10 i 7 : 14 są równe; gdy to zaznaczymy, t. j. gdy napiszemy [2])

$$5 : 10 = 7 : 14,$$

to tę równość dwu stosunków nazywamy proporcyją [3]).

W proporcyi mamy (§ 29, us. 3) cztéry wyrazy; poprzednik piérwszego stosunku i poprzednik drugiego tworzą dwa poprzedniki proporcyi; następnik piérwszego i następnik drugiego są dwoma następnikami proporcyi; poprzednik piérwszego stosunku i następnik drugiego, jako znajdujące się z kraju lewego i z kraju prawego, nazywają się wyrazami skrajnymi proporcyi; następnik piérwszego i poprzednik drugiego stosunku nazywają się wyrazami średnimi proporcyi. Ponieważ stosunki są równe, więc (§ 29, us. 7) liczba, która jest wykładnikiem jednego stosunku, jest także wykładnikiem drugiego; na-

---

[1]) Por. § 17, us. 11.

[2]) Używają także, jako znaku wiążącego dwa stosunki, dwu dwukropków; więc:

$$5 : 10 :: 7 : 14.$$

[3]) Niektórzy taką proporcyją nazywają „proporcyją gieometryczną", a stosunki do niéj wchodzące „stosunkami gieometrycznemi", rozważając t. z. stosunki i proporcyje „arytmetyczne", t. j. różnice dwu liczb i równość zachodzącą między dwiema takimi różnicami. Ściśle rzecz biorąc, rozwiązywanie zadań arytmetycznych (i, wogóle, żadnych zadań) do takich „proporcyj" nie doprowadza. Dlatego cała ich teoryja (dość kłopotliwa przy starannym wykładzie ze względu na potrzebę unikania różnic ujemnych), jako do niczego nie prowadząca, powinna być z tych programów szkolnych, w których się jeszcze tuła, stanowczo usunięta. [Powstała ona prawdopodobnie pod wpływem chęci wytworzenia już w nauce o proporcyjach czegoś, coby odpowiadało dwojakim postępom, arytmetycznym i gieometrycznym, których dawniéj, przed należytym uwzględnieniem w wychowaniu średnim ogólnym systematycznego wykładu algiebry elementarnéj, uczono przy arytmetyce.]

[Badaniu stosunków i proporcyj, więcéj szczegółowemu, niż teraz się je przeprowadza, poświęca Euklides w *Elementach* księgę V (zob. *Euklidesa początków jeometryi xiąg ośmioro, to jest sześć piérwszych, jedenasta i dwunasta*, tłómaczenie Józefa Czecha, Wilno, 1-sze wyd. r. 1807, 2-ie 1817), oraz częściowo ks. VII — IX].

zywamy ją wykładnikiem stosunków proporcyi, albo krócéj wykładnikiem proporcyi.

2. Jeżeli mamy cztéry liczby i wiemy, że stosunek dwu z nich jest równy stosunkowi dwu pozostałych, to mówimy, że one tworzą proporcyją, albo że one są proporcyjonalne, wystawiając sobie przytym, że rozważamy je tak uporządkowane, iżby stosunek piérwszéj do drugiéj z nich był równy stosunkowi trzeciéj do czwartéj. Tak np. jeżeli mając liczby: 5, 10, 14, 7, powiemy o nich, że to są cztéry liczby proporcyjonalne, to jednocześnie wystawiamy sobie, że one następują po sobie w porządku 5, 10, 7, 14.

3. Proporcyje np.

$$5 : 10 = 7 : 14, \quad 7 : 5 = 14 : 10$$

czytamy: „stosunek 5-u do 10-u równa się stosunkowi 7-u do 14-u", „stosunek 7-u do 5-u równa się stosunkowi 14-u do 10-u", albo niekiedy krócéj „5 do 10-u równa się 7 do 14-u" i 7 do 5-u równa się 14 do 10".

W drugiéj proporcyi wykładnik stosunków jest większy od jedności, gdyż w tych stosunkach poprzednik jest większy od swego następnika. Możemy więc tu powiedzieć, że liczba, któréj wyrażeniem jest każdy z tych stosunków, przedstawia zarazem, ile razy jego poprzednik jest większy od następnika (§ 7, us. 8; § 16, us. 2). Dlatego drugą z danych proporcyj możemy przeczytać: „tyle razy 7 jest większe od 5-u, ile razy 14 jest większe od 10-u".

Piérwszéj zaś z danych proporcyj nie możemy czytać: „tyle razy 5 jest mniejsze od 10-u, ile razy 7 jest mniejsze od 14-u"; wtedy bowiem mielibyśmy na myśli liczbę 2, gdy tymczasem wykładnikiem stosunków téj proporcyi jest liczba $\frac{1}{2}$ i jąto właśnie wyrażają oba stosunki proporcyi; ją więc przy czytaniu mieć mamy na uwadze [1]).

---

[1]) Dodać jeszcze można, że, aby się dowiedzieć, ile razy 5 mniejsze od 10, należałoby 10 : 5, gdy tymczasem mamy tu 5 : 10.

[Pod wpływem właśnie poczucia tego, że piérwszéj z danych proporcyj nie można czytać ani: „tyle razy 5 jest mniejszé od 10-u, ile razy 7 mniejsze od 14-u", ani też: „tyle razy 5 jest większe od 10-u, ile razy 7 jest większe od 14-u" powstało rozpowszechnione, że tak powiém, nijakie wyrażanie się: „tak się ma 5 do 10-u, jak się ma 7 do 14 u", które niéma żadnéj racyi bytu.]

[Przy stosowaniu proporcyi do niektórych dowodzeń gieometrycznych, używają niekiedy wyrażenia „proporcyja fałszywa" albo „proporcyja nieprawidłowa", mimo, że można się obejść wygodnie bez tak nielogicznego zestawienia wyrazów. Jedno z dwu: albo rozważane dwa stosunki są równe i wtedy zachodzi proporcyja, albo téż one nie są równe, wtedy rozważane „dwa stosunki nie tworzą proporcyi"]

GŁÓWNA WŁASNOŚĆ PROPORCYI.

4. Widzieliśmy (§ 29, us. 6 c.), że wskutek jednoczesnego pomnożenia poprzednika i następnika stosunku przez tę samę liczbę wykładnik jego nie zmienia się. Gdy więc mamy np. proporcyją

$$7 : 5 = 14 : 10,$$

to jeżeli oba wyrazy piérwszego stosunku pomnożymy przez następnik drugiego, a oba wyrazy drugiego stosunku pomnożymy przez następnik piérwszego, to te stosunki:

$$(7 \times 10) : (5 \times 10) \quad \text{i} \quad (14 \times 5) : (10 \times 5)$$

mają też same wykładniki, co stosunki danéj proporcyi, t. j. wykładniki wypisanych stosunków są tąż samą liczbą. Następniki zaś tych stosunków, 5×10 i 10×5, są iloczynami tych samych czynników, wypisanych tylko w innym porządku; że zaś iloczyn nie zależy od porządku czynników (§ 6, us. 9; § 19, us. 5), przeto następniki tych stosunków są tą samą liczbą. Ponieważ następniki tych dwu stosunków są tą samą liczbą, ich wykładniki są tą samą liczbą, a poprzednik stosunku równa się następnikowi pomnożonemu przez wykładnik (§ 29, us. 5), przeto i poprzedniki tych stosunków, t. j. iloczyny

$$7 \times 10 \quad \text{i} \quad 14 \times 5$$

są tą samą liczbą; a zatym

$$7 \times 10 = 14 \times 5.$$

Czynniki piérwszego z wypisanych tu równych sobie iloczynów, 7 i 10, są wyrazami skrajnymi danéj proporcyi, a czynniki drugiego iloczynu, 14 i 5, są jéj wyrazami średnimi; a więc:

Iloczyn wyrazów skrajnych proporcyi jest równy iloczynowi jéj wyrazów średnich.

Ta własność proporcyi nazywa się g ł ó w n ą w ł a s n o ś c i ą proporcyi, gdyż przy pomocy téj własności i odwrotnéj własności iloczynów równych (us. 5) można wyprowadzić wiele innych własności proporcyj.

5. Widzieliśmy, że proporcyja prowadzi za sobą równość dwu iloczynów, z których w każdym są dwa czynniki. Odwrotnie:

Z dwu równych dwuczynnikowych iloczynów można utworzyć proporcyją, biorąc czynniki jednego iloczynu za wyrazy skrajne, a czynniki drugiego iloczynu za wyrazy średnie. Jakoż, mając np.

$$3 \times 8 = 4 \times 6,$$

zważmy naprzód, że gdy oba te iloczyny, przedstawiające tę samę liczbę, podzielimy przez pewną tę samę liczbę, mianowicie przez iloczyn jednego czynnika piérwszego iloczynu i jednego czynnika drugiego iloczynu, np.

przez liczbę 3×6, to jako ilorazy otrzymamy również tę samę liczbę. Zatym

$$(3 \times 8) ; (3 \times 6) = (4 \times 6) : (3 \times 6).$$

Możemy tu wyrażenia $(3 \times 8) : (3 \times 6)$ i $(4 \times 6) : (3 \times 6)$ uważać jako stosunki, które dlatego są połączone znakiem równości, że wyrażają tę samę liczbę (jednakowy iloraz tych dzieleń), t. j. mają ten sam wykładnik. Wykładnik zaś ich się nie zmieni, gdy oba wyrazy piérwszego stosunku podzielimy przez 3, a oba wyrazy drugiego przez 6 (§ 29, us. 6 c.). Stosunki zatym $8 : 6$ i $4 : 3$ mają także ten sam wykładnik, są przeto równe, t. j.

$$8 : 6 = 4 : 3,$$

a w téj proporcyi wyrazy skrajne, 8 i 3, są czynnikami jednego z danych iloczynów, a wyrazy średnie, 6 i 4, są czynnikami drugiego.

Gdybyśmy mieli np. $8 \times 7 \times 9 = 6 \times 3 \times 2 \times 14$, a chcieli utworzyć proporcyją, to [1]) moglibyśmy np. iloczyn 7×9 uważać jako przedstawienie pewnéj liczby, i podobnie np. iloczyny 6×3 i 2×14, tak iż, przedstawiając daną równość jako

$$8 \times (7 \times 9) = (6 \times 3) \times (2 \times 14),$$

z tych dwu równych dwuczynnikowych iloczynów możemy utworzyć proporcyją

$$8 : (6 \times 3) = (2 \times 14) : (7 \times 9).$$

Podobnie np. z równości $22 = 2 \times 11$ utworzymy $22 : 2 = 11 : 1$.

6. Jeżeli w proporcyi jeden wyraz jest niewiadomy, to, opiérając się na głównéj własności, łatwo możemy go wyznaczyć. Np. jeżeli mamy proporcyją

$$8 : x = 4 : 3,$$

gdzie x oznacza liczbę niewiadomą, to według głównéj własności

$$x \times 4 = 8 \times 3;$$

jeżeli zaś liczba x pomnożona przez 4, czyli, jeżeli 4 liczby $x = 8 \times 3$, to liczba x jest cztéry razy mniejsza (§ 17, us. 5)

$$x = \frac{8 \times 3}{4} = 6,$$

t. j. *niewiadomy wyraz średni proporcyi równa się iloczynowi skrajnych, podzielonemu przez drugi średni.* Podobnie

$$8 : 6 = 4 : x; \quad x \times 8 = 6 \times 4; \quad x = \frac{6 \times 4}{8},$$

t. j. *niewiadomy wyraz skrajny proporcyi równa się iloczynowi średnich, podzielonemu przez drugi skrajny.*

Oczywiście, że gdyby wszystkie wyrazy proporcyi były wiadome, to taksamo rozumując, moglibyśmy *którykolwiek wyraz proporcyi wyrazić*

[1]) T. j. na mocy tego, że w iloczynie kilku czynników możemy dowolnie wybrane czynniki zastępować przez ich iloczyny (§ 6, us. 10; § 19, us. 6).

przez trzy pozostałe jéj wyrazy. Tak np. gdy $8 : 6 = 4 : 3$, to np. $8 = \frac{6 \times 4}{3}$; $6 = \frac{8 \times 3}{4}$ i t. d.

7. Z tego wypada, że wogóle trzy wyrazy proporcyi, zajmujące oznaczone w niéj miejsca, wyznaczają czwarty jéj wyraz, czyli (us. 2), że *do trzech liczb, zajmujących w proporcyi oznaczone miejsca można znaléść czwartą liczbę proporcyjonalną.*

Gdy mamy dane trzy liczby, a nie wiemy, jakie one miejsca w proporcyi zająć mogą, to zadanie nie jest jeszcze dostatecznie oznaczone, gdyż mogą być trzy odpowiedzi. Np. gdy mamy liczby 8, 4, 2, to czwarta liczba, któraby wraz z tymi trzema danymi tworzyła proporcyją, może być, zależnie od tego, jakie miejsca te trzy liczby dane zajmują w proporcyi, albo $\frac{8 \times 4}{2} = 16$, albo $\frac{8 \times 2}{4} = 4$, albotéż $\frac{4 \times 2}{8} = 1$, i rzeczywiście odpowiednio albo np. $2 : 4 = 8 : 16$, albo np. $4 : 2 = 8 : 4$, albotéż np. $8 : 4 = 2 : 1$.

PRZESTAWIANIE WYRAZÓW PROPORCYI.

8. Gdy mamy proporcyją, np.

$$8 : 6 = 4 : 3,$$

to, według głównéj własności,

$$8 \times 3 = 6 \times 4.$$

Z tych zaś dwu równych dwuczynnikowych iloczynów (us. 5) możemy utworzyć osiem proporcyj. Gdyż możemy czynniki iloczynu 8×3 wziąć albo za wyrazy skrajne, albo za wyrazy średnie, a wtedy czynniki iloczynu 6×4 będą odpowiednio albo wyrazami średnimi, albo wyrazami skrajnymi. W każdym zaś z tych dwu przypadków możemy w proporcyi z czynników iloczynu 8×3 albo naprzód napisać czynnik 8, albo czynnik 3. A w każdym z tych cztérech przypadków możemy z czynników iloczynu 6×4 naprzód napisać albo czynnik 6, albo czynnik 4. Będziemy więc mieli osiem proporcyj :

$8 : 6 = 4 : 3$; $3 : 6 = 4 : 8$; $8 : 4 = 6 : 3$; $3 : 4 = 6 : 8$;
$6 : 8 = 3 : 4$; $4 : 8 = 3 : 6$; $6 : 3 = 8 : 4$; $4 : 3 = 8 : 6$.

Porównywając te proporcyje z jedną którąkolwiek z nich, np. z pierwszą (która tu jest taka, jak dana), widzimy, że inne powstają z niéj albo wskutek przestawienia wyrazów średnich z sobą, albo wskutek przestawienia średnich ze skrajnymi (czyli odwrócenia obu stosunków), albo wskutek przestawienia skrajnych z sobą, albotéż wskutek jednoczesnego wykonania dwu z powyższych zmian.

Okażemy, że kolejno stosując do jakiéjkolwiek proporcyi piérwsze dwa z powyższych przestawień wyrazów, t. j. stosując kolejno to, iż

a. *W proporcyi można przestawić wyrazy średnie.*

b. *W proporcyi można odwrócić oba stosunki.*

wyprowadzimy [1]) z niéj wszystkie powyższe osiem proporcyj. Jakoż, niech będzie:

$8 : 6 = 4 : 3$;	z niéj według a.	$8 : 4 = 6 : 3$;	z niéj według b.
$4 : 8 = 3 : 6$;	„ „	$4 : 3 = 8 : 6$;	„ „
$3 : 4 = 6 : 8$;	„ „	$3 : 6 = 4 : 8$;	„ „
$6 : 3 = 8 : 4$;	„ „	$6 : 8 = 3 : 4$.	

Do wszystkich tych proporcyj wchodzą też same liczby; z kazdéj z nich możemy wyprowadzić wszystkie pozostałe; dlatego uważamy je jako równoznaczne.

9. Gdy mamy cztéry liczby, to rozmaicie je ustawiając, możemy każdą z nich postawić na miejscu piérwszym. Obok każdéj z tych 4-ch liczb, zajmującéj miejsce piérwsze, możemy umieścić każdą z 3-ch każdym razem pozostałych liczb; otrzymamy w ten sposób 12 par liczb, różniących się albo liczbami albo porządkiem ich następstwa. Obok każdéj z tych 12-u par możemy postawić jednę z 2-u pozostałych liczb, a do każdéj z tych 24-ch trójek liczb dołączyć czwartą pozostałą. Widzimy więc, że cztéry dane liczby możemy 24-ema sposobami ustawić. W ośmiu tylko z tych 24 ustawień dane cztéry liczby tworzyć mogą proporcyją (us. 2). (Por. us. 7).

MNOŻENIE LUB DZIELENIE WYRAZÓW PROPORCYI PRZEZ TĘ SAMĘ LICZBĘ.

10. Wiemy (§ 29, us. 6 c.), że gdy oba wyrazy stosunku pomnożymy lub podzielimy przez tę samą liczbę, to wykładnik stosunku się nie zmieni. Gdy więc mamy np. proporcyją

$$8 : 6 = 4 : 3,$$

to możemy powiedzieć [2]), że *możemy przez tę samą liczbę jednocześnie pomnożyć lub jednocześnie podzielić albo oba wyrazy piérwszego stosunku, albo téż oba wyrazy drugiego stosunku proporcyi.*

Jeżeli przestawimy w téj proporcyi wyrazy średnie i do proporcyi tak powstałéj, t. j. do proporcyi $8 : 4 = 6 : 3$, zastosujemy powyższą własność, to mieć będziemy np.

$$(8 \times 5) : (4 \times 5) = 6 : 3; \qquad (8 : 5) : (4 : 5) = 6 : 3;$$
$$8 : 4 = (6 \times 5) : (3 \times 5); \qquad 8 : 4 = (6 : 5) : (3 : 5).$$

Gdy znowu w tych proporcyjach przestawimy wyrazy średnie i proporcyje

---

[1]) Rozumie się, że to samoby było, gdybyśmy stosowali kolejno drugie i trzecie z wyliczonych przestawień wyrazów proporcyj.

[2]) Można tu powtórzyć to, co przy podobnéj sposobności jest powiedziane w us. 4-ym i 5-ym.

$(8 \times 5) : 6 = (4 \times 5) : 3$; $(8 : 5) : 6 = (4 : 5) : 3$;
$8 : (6 \times 5) = 4 : (3 \times 5)$; $8 : (6 : 5) = 4 : (3 : 5)$

porównamy z piérwotnie wypisaną proporcyją, t. j. z proporcyją $8 : 6 = 4 : 3$, to dostrzeżemy, że *możemy przez tę samę liczbę jednocześnie pomnożyć lub jednocześnie podzielić albo oba poprzedniki albo oba następniki proporcyi* [1]).

Zestawiając z sobą te dwie własności, t. j. zaznaczając dwa wyrazy proporcyi, które możemy albo jednocześnie mnożyć albo jednocześnie dzielić przez tę samę liczbę, znajdziemy, iż ogólnie:

Możemy przez tę samę liczbę jednocześnie pomnożyć lub jednocześnie podzielić jeden z wyrazów skrajnych i jeden z wyrazów średnich proporcyi.

Z téj własności wprost wynika, że *możemy wszystkie wyrazy proporcyi albo jednocześnie pomnożyć, albo téż jednocześnie podzielić przez tę samę liczbę.*

Z tych własności korzystamy np. wtedy, kiedy chcemy ułamkowe wyrazy proporcyi zastąpić przez całkowite, lub liczby całkowite, wchodzące do proporcyi, zastąpić, jeżeli można, przez mniejsze. Np. jeżeli mamy proporcyją $0{,}04 : 0{,}006 = 5 : x$, to, mnożąc oba wyrazy piérwszego stosunku przez 1000, miéć będziemy $40 : 6 = 5 : x$, a tu, dzieląc oba poprzedniki przez 5, dojdziemy do proporcyi $8 : 6 = 1 : x$; dzieląc jeszcze oba wyrazy piérwszego stosunku téj proporcyi przez 2, mamy $4 : 3 = 1 : x$, (Tak zwykle postępujemy, gdy mamy wyznaczyć niewiadomy wyraz proporcyi, w któréj można uskutecznić podobne uproszczenia.) Ostatniéj proporcyi już uprościć nie można; wyznaczymy więc z niéj $x = 0{,}75$. Te uproszczenia proporcyj są też same, które uskutecznialibyśmy w wyrażeniu $x = \frac{0{,}006 \times 5}{0{,}04}$, gdybyśmy nie odrazu wykonywali wskazane tu działania, lecz uprzednio piérwszy z czynników licznika i mianownik pomnożyli przez 100, następnie drugi czynnik licznika i mianownik podzielili przez 5 i nakoniec piérwszy czynnik licznika i mianownik podzielili przez 2. (Por. § 20, us. 5; § 19, us. 4.)

PRZEKSZTAŁCENIA PROPORCYI.

11. Gdy do dwu równych stosunków, tworzących proporcyją, np.

$$8 : 4 = 6 : 3,$$

zastosujemy to, cośmy wyprowadzili w us. 9-ym § 29-go, to

$(8 + 6) : (4 + 3) = 8 : 4 = 6 : 3$; $(8 - 6) : (4 - 3) = 8 : 4 = 6 : 3$, t. j.

[1]) Wskutek pomnożenia tych wyrazów wykładnik stosunku będzie odpowiednio albo pomnożony albo podzielony, a wskutek podzielenia odpowiednio albo podzielony albo pomnożony przez tęż samę liczbę (§ 29, us. 5).

Stosunek sumy albo różnicy poprzedników proporcyi odpowiednio do sumy albo różnicy jéj następników jest równy stosunkowi któregokolwiek poprzednika proporcyi do swego następnika.

Jeżeli w danéj proporcyi przestawimy wyrazy średnie i do proporcyi tak powstałéj, t. j. do proporcyi $8 : 6 = 4 : 3$, zastosujemy powyższą własność, to mieć będziemy

$$(8+4) : (6+3) = 8 : 6 \qquad (8-4) : (6-3) = 8 : 6$$
$$= 4 : 3; \qquad = 4 : 3.$$

A gdy te proporcyje odniesiemy do pierwotnie danéj proporcyi, t. j. do proporcyi $8 : 6 = 4 : 3$, to dostrzeżemy, że

Stosunek sumy albo różnicy wyrazów piérwszego stosunku proporcyi odpowiednio do sumy albo różnicy wyrazów drugiego jéj stosunku jest równy stosunkowi odpowiednich poprzedników proporcyi, lub stosunkowi odpowiednich jéj następników.

12. Widzieliśmy, że gdy mamy np. proporcyją $8 : 4 = 6 : 3$ to

$$(8+6) : (4+3) = 8 : 4, \quad (8-6) : (4-3) = 8 : 4$$

Oba więc stosunki $(8+6) : (4+3)$ i $(8-6) : (4-3)$ przedstawiają tę samę liczbę co stosunek $8 : 4$, a więc są sobie równe, t. j. $(8+6) : (4+3) = (8-6) : (4-3)$, albo po przestawieniu wyrazów średnich:

$$(8+6) : (8-6) = (4+3) : (4-3)$$

czyli: *stosunek sumy poprzedników proporcyi do ich różnicy jest równy stosunkowi sumy jéj następników do ich różnicy.*

Taksamo przy pomocy drugiéj z własności dowiedzionych w us. 11-ym okazalibyśmy, że gdy mamy proporcyją $8 : 4 = 6 : 3$, to:

$$(8+4) : (8-4) = (6+3) : (6-3)$$

czyli: *stosunek sumy wyrazów piérwszego stosunku proporcyi do ich różnicy, jest równy stosunkowi sumy wyrazów jéj drugiego stosunku do ich różnicy.*

PROPORCYJE ZŁOŻONE.

13. Oczywiście, iż *jeżeli jeden stosunek jednéj proporcyi jest taki sam, jak jeden ze stosunków drugiéj proporcyi, to z pozostałych stosunków tych proporcyj można utworzyć proporcyją*, gdyż one mają tę samę liczbę jako wykładnik. Tak np. jeżeli mamy dane $2 : 5 = 10 : 25$ i $6 : 15 = 2 : 5$, to także $10 : 25 = 6 : 15$.

Jeżeli dwie proporcyje mają odpowiednie poprzedniki równe, np.

$$2 : 10 = 5 : 25 \quad \text{i} \quad 2 : 6 = 5 : 15,$$

to, przestawiając wyrazy średnie, otrzymamy

$$2 : 5 = 10 : 25 \quad \text{i} \quad 2 : 5 = 6 : 15, \text{ skąd}$$
$$10 : 25 = 6 : 15, \text{ albo } 10 : 6 = 25 : 15.$$

Podobnie, gdyby następniki były równe. A więc:

Jeżeli dwie proporcyje mają też same odpowiednie poprzedniki, to ich następniki tworzą proporcyją; jeżeli dwie proporcyje mają też same odpowiednie następniki, to ich poprzedniki tworzą proporcyją.

14. Jeżeli mamy kilka proporcyj z tymiż samymi odpowiednio czyto poprzednikami, czy też następnikami, np. z tymiż samymi poprzednikami:

$$2:5=6:15;\quad 2:7=6:21;\quad 2:10=6:30;\quad 2:11=6:33,$$

to według tylkoco dowiedzionéj własności mamy także:

$$5:7=15:21;\quad 5:10=15:30;\quad 5:11=15:33;$$
$$7:10=21:30;\quad 7:11=21:33;$$
$$10:11=30:33.$$

Zwykle te wszystkie proporcyje łącznie przedstawiamy w taki sposób:

$$2:5:7:10:11=6:15:21:30:33,$$

rozumiejąc, że stosunek dwu którychkolwiek z liczb, tu wypisanych przed znakiem =, jest równy stosunkowi dwu liczb, na odpowiednich miejscach po znaku = się znajdujących. Każde więc dwie liczby przed znakiem = i dwie liczby, na odpowiednich miejscach po znaku = się znajdujące, są proporcyjonalne względem siebie (us. 2), co zwykle wyrażamy krótko, mówiąc, że *liczby* 2, 5, 7, 10, 11 *są proporcyjonalne względem odpowiednich liczb* 6, 15, 21, 30, 33. Często takiego właśnie sposobu używamy dla krótkiego zaznaczenia proporcyjonalności dwu grup liczb.

15. Gdy dwie proporcyje mają ten sam wykładnik, np.

$$18:9=30:15 \text{ i } 8:4=6:3,$$

to wszystkie cztéry stosunki, do tych proporcyj wchodzące, jako wyrażające tę samę liczbę, są równe sobie. A zatym (us. 11, lub § 29, us. 9),

gdy $18:9=8:4$, to $(18+8):(9+4)=8:4$ i
$(18-8):(9-4)=8:4$;

gdy $30:15=6:3$, to $(30+6):(15+3)=6:3$ i
$(30-6):(15-3)=6:3$.

Że zaś $8:4=6:3$, przeto także

$$(18+8):(9+4)=(30+6):(15+3) \text{ i}$$
$$(18-8):(9-4)=(30-6):(15-3),$$

t. j. gdy odpowiednie wyrazy dwu proporcyj, mających ten sam wykładnik, albo dodamy do siebie albotéż od siebie odejmiemy, to cztéry tak otrzymane liczby tworzą proporcyją (mającą również ten sam wykładnik, co poprzednie). Zwykle mówimy krócéj: *dwie proporcyje, mające ten sam wykładnik, można odpowiednimi wyrazami dodać do siebie, albo je od siebie odjąć.* Również: *ilekolwiek proporcyi, mających ten sam wykładnik, możemy odpowiednimi wyrazami dodać do siebie.*

16. Weźmy dwie jakiekolwiek [1]) proporcyje, np.

$$5 : 10 = 7 : 14 \quad \text{i} \quad 8 : 6 = 4 : 3.$$

Według głównéj własności,

$$5 \times 14 = 10 \times 7 \quad \text{i} \quad 8 \times 3 = 6 \times 4.$$

Iloczyny 5×14 i 10×7, jako równe, przedstawiają tę samę liczbę, iloczyny 8×3 i 6×4 również przedstawiają tę samę liczbę; a więc i iloczyny $5 \times 14 \times 8 \times 3$ i $10 \times 7 \times 6 \times 4$ przedstawią tę samę liczbę, tak iż

$$5 \times 14 \times 8 \times 3 = 10 \times 7 \times 6 \times 4.$$

Ponieważ w iloczynie kilku czynników możemy dowolnie wybrane czynniki zastępować przez ich iloczyny (§ 6, us. 10; § 19, us. 6), przeto możemy napisać

$$(5 \times 8) \times (14 \times 3) = (10 \times 6) \times (7 \times 4)$$

Z tych zaś równych iloczynów dwuczynnikowych tworząc proporcyją (us. 5)

$$(5 \times 8) : (10 \times 6) = (7 \times 4) : (14 \times 3)$$

i porównywając ją z proporcyjami danymi, widzimy, że gdy odpowiednie wyrazy dwu proporcyi przez siebie pomnożymy, to 4 tak otrzymane liczby tworzą proporcyją. Zwykle krócéj mówimy: *możemy dwie proporcyje odpowiednimi wyrazami pomnożyć przez siebie.* Wykładnik téj nowéj proporcyi jest $\frac{3 \times 8}{10 \times 6} = \frac{2}{5}$; liczba zaś ta jest iloczynem (§ 19, us. 3) liczb $\frac{3}{10}$ i $\frac{4}{3}$, t. j. wykładników dwu danych proporcyj.

Gdybyśmy mieli trzecią proporcyją, np. $11 : 12 = 22 : 24$, to moglibyśmy własność powyższą zastosować do téj proporcyi i proporcyi, otrzymanéj już z pomnożenia przez siebie odpowiednimi wyrazami dwu danych proporcyj. — Toż samo, gdyby było więcéj proporcyj. A więc:

Dwie lub więcéj proporcyj można odpowiednimi wyrazami przez siebie pomnożyć. Wykładnik proporcyi tak powstałéj jest iloczynem wykładników proporcyj danych.

17. Gdyby dane proporcyje były tąż samą jedną proporcyją, to wtedy, według powyższego, liczby, będące jednakowymi potęgami (§ 6 us. 38) wyrazów proporcyi, tworzą proporcyją, czyli, jak się często mówi, *można wszystkie wyrazy proporcyi podnieść do téj samej potęgi.*

18. Weźmy jeszcze dwie jakiekolwiek proporcyje, np.

$$5 : 10 = 7 : 14 \quad \text{i} \quad 8 : 6 = 4 : 3.$$

Według głównéj własności,

$$5 \times 14 = 10 \times 7 \quad \text{i} \quad 8 \times 3 = 6 \times 4.$$

Gdy iloczyny 5×14 i 10×7, przedstawiające tę samę liczbę, podzielimy odpowiednio przez iloczyny 8×3 i 6×4, przedstawiające również tę samę liczbę, to ilorazy $(5 \times 14) : (8 \times 3)$ i $(10 \times 7) : (6 \times 4)$ przedstawią również tę samę liczbę, co wyrazimy, pisząc (§ 17, us. 5; § 29, us. 3)

[1]) T. j. mogące mieć różne wykładniki.

$$\frac{5\times14}{8\times3}=\frac{10\times7}{6\times4}.$$

Piérwszą z tych liczb możemy napisać $\frac{5}{8}\times\frac{14}{3}$ (§ 19, us. 3), a drugą: $\frac{10}{6}\times\frac{7}{4}$; mamy więc

$$\frac{5}{8}\times\frac{14}{3}=\frac{10}{6}\times\frac{7}{4}.$$

Z tych zaś dwu równych dwuczynnikowych iloczynów tworząc proporcyją

$$\frac{5}{8}:\frac{10}{6}=\frac{7}{4}:\frac{14}{3},$$

którą możemy także tak pisać:

$$(5:8):(10:6)=(7:4):(14:3),$$

i porównywając ją z proporcyjami danymi, widzimy, że gdy odpowiednie wyrazy dwu proporcyj przez siebie podzielimy, to cztéry tak otrzymane liczby tworzą proporcyją. Zwykle krócéj mówimy:

Można dwie proporcyje odpowiednimi wyrazami przez siebie podzielić.

Wykładnik otrzymanej proporcyi $\frac{3}{8}$ jest wypadkiem dzielenia $\frac{5}{8}:\frac{10}{6}$; lecz (§ 20, us. 4)

$$\frac{5}{8}:\frac{10}{6}=\frac{5\times6}{8\times10}=\frac{5\times6}{10\times8}=\frac{5}{10}:\frac{8}{6}=\frac{1}{2}:\frac{4}{3},$$

a więc wykładnik proporcyi otrzymanéj jest ilorazem wykładników danych proporcyj.

ŚREDNIA GIEOMETRYCZNA DWU LICZB.

19. Jeżeli w proporcyi czyto oba wyrazy skrajne, czytéż oba wyrazy średnie są tą samą liczbą, np.

$$2:6=6:18, \qquad 15:3=75:15,$$

to ta liczba nazywa się średnią gieometryczną dwu pozostałych liczb; jest więc 6 średnią gieometryczną liczb 2 i 18, a 15 średnią gieometryczną liczb 3 i 75.

Proporcyją, któréj wyrazy średnie są tą samą liczbą, nazywają proporcyją ciągłą. Piérwsza więc z wypisanych dwu proporcyj jest proporcyją ciągłą.

Z tych proporcyj, według głównéj własności, mamy

$$6\times6=2\times18, \qquad 15\times15=3\times75.$$

Jeżeli w iloczynie dwu czynników oba te czynniki są tą samą liczbą, to taki iloczyn nazywamy kwadratem liczby owéj; jest więc 6×6 kwadratem liczby 6, a 15×15 kwadratem liczby 15. Takie iloczyny zwykle tak piszemy: liczbę piszemy raz i przy niéj z prawéj strony u góry piszemy mniejszą cyfrę 2. Zamiast więc 6×6 możemy napisać 6^2,

a zamiast 15×15 napisać 15^2. To więc, cośmy powyżéj napisali, możemy tak przedstawić:

$$6^2 = 2 \times 18, \qquad 15^2 = 3 \times 75$$

i powiemy:

Kwadrat średniéj gieometrycznéj dwu liczb jest równy iloczynowi tych liczb.

W algiebrze będzie mowa o wynajdywaniu średniéj gieometrycznéj dwu jakichkolwiek liczb. W gieometryi ma ona ważne zastosowania.

20. Jeżeli za określenie średniéj gieometrycznéj dwu liczb przyjmiemy własność powyższą, t. j. przyjmiemy, że «średnia gieometryczna dwu liczb jestto liczba, któréj kwadrat równa się iloczynowi dwu danych liczb», to takie określenie będziemy mogli uogólnić, a mianowicie powiedzieć: *liczbę, którą biorąc zamiast każdéj z danych liczb, otrzymujemy ten sam iloczyn, co z pomnożenia liczb danych, nazywamy średnią gieometryczną liczb danych*, co odpowiada określeniu średniéj arytmetycznéj dwu lub więcéj liczb (§ 7, us. 25). Średnia więc gieometryczna pewnych n liczb jestto liczba, któréj n-ta potęga równa się iloczynowi liczb danych. Np. średnia gieometryczna cztérech liczb: 6, 30, 200 i 360 jest 60, bo $60^4 = 6.\ 30.\ 200.\ 360$.

21. W gieometryi (zob. t. V seryi III «Bibl. mat. fiz.») występuje jeszcze średnia harmoniczna dwu liczb. Jako jéj określenie możemy przyjąć albo własność: «stosunek różnicy większej z danych liczb i średniéj harmonicznéj do owéj większéj z danych liczb jest równy stosunkowi różnicy średniéj harmonicznéj i mniejszéj z danych liczb do téj ostatniéj», albotéż własność: «odwrotność średniéj harmonicznéj dwu danych liczb jest średnią arytmetyczną odwrotności każdéj z danych liczb», t. j. jeżeli dane liczby są a i b i $a > b$, a średnia ich harmoniczna jest h, to

$$\frac{a-h}{a} = \frac{b-h}{b}, \text{ albo } \frac{2}{h} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}.$$

Przyjmując jednę którąkolwiek z tych własności za określenie średniéj harmonicznéj dwu liczb, łatwo z niéj można wyprowadzić drugą. [Na mocy czyto jednéj, czytéż drugiéj, $h = \frac{2ab}{a+b}$.]

W algiebrze dowodzi się, że średnia harmoniczna dwu liczb nierównych jest mniejsza od ich średniéj gieometrycznéj, a ta ostatnia jest mniejsza od ich średniéj arytmetycznéj.

Np. dla liczb 10 i 40 średnia arytmetyczna jest 25, średnia gieometryczna 20, średnia harmoniczna 16; dla licz 4 i 16 średnia arytmetyczna

jest 10, średnia gieometryczna 8, średnia harmoniczna 6,4; dla liczb $\frac{1}{2}$ i $\frac{1}{8}$ średnia arytmetyczna jest $\frac{5}{16}$, średnia gieometryczna $\frac{1}{4}$, średnia harmoniczna $\frac{1}{5}$.

Drugie z podanych powyżéj określeń średniej harmonicznéj dwu liczb, można uogólnić dla ilukolwiek liczb danych: liczba, któréj odwrotność jest średnią arytmetyczną odwrotności liczb danych, nazywa się średnią harmoniczną liczb danych; np. średnią harmoniczną liczb 2, $\frac{1}{10}$, $\frac{1}{5}$, $\frac{1}{7}$, $\frac{2}{5}$ jest liczba $\frac{1}{5}$, albowiem liczba 5 jest średnią arytmetyczną liczb $\frac{1}{2}$, 10, 5, 7, $\frac{5}{2}$.

§ 31. O WIELKOŚCIACH PROPORCYJONALNYCH.

OKREŚLENIE WIELKOŚCI.

1. Wszystko, co pod jakimkolwiek względem może być mierzone nazywa się wielkością; tak pojęte wielkości są przedmiotem badań w matematyce lub w jéj zastosowaniach.

Ponieważ wielkość może być mierzona, przeto albo każda wielkoś składa się z części, albo też możemy sobie wyobrazić, iż ona jest z pewnych części złożona. Możemy zatym powiedzieć, iż wielkością jest każdy przedmiot, który może się stawać mniejszym lub większym. Oddzielny stan pewnéj wielkości nazywamy jéj wartością, a więc wielkość może, wogóle mówiąc, mieć różne wartości.

Mierzyć jakąś wielkość jestto poszukiwać, ile razy w niéj się mieści pewna dowolnie wybrana jéj wartość, dobrze znana, którą przyjmujemy za jednostkę.

Wynik takiego mierzenia wielkości przedstawia, jak wiemy (§ 1, us. 1—4), liczbę.

Np. Ilość stopni ciepła, wskazywana przez termometr, jest wielkością; a gdy wiemy, że jednego dnia było w południe 20° ciepła, drugiego zaś dnia 17° ciepła, to te oddzielne «stany» termometru, przedstawiają oddzielne wartości rozważanej wielkości, mianowicie: ilości [1]) stopni ciepła.

---

[1]) Przykry jest w języku polskim zbieg zakończeń wyrazów: wielkość, wartość, ilość (co jeszcze dotkliwiéj uczuć się daje, kiedy w zadaniach wypada wprowadzić pojęcia: długość, szerokość, wysokość, grubość). Takiego przykrego zbiegu niema w innych językach (grandeur, valeur, quantité; Grösse, Werth, Anzahl; величина, значение, количество). Dlatego trzeba rezygnować z troski o staranność pod względem fonetycznym przy budowie zdań, mając na widoku rzecz główną, t. j. dokładność w oddawaniu myśli; lepsze to dla rzeczy saméj, niż powierzchowne i nieścisłe określenia i wyjaśnienia, choćby najdźwięczniéj wypowiedziane.

STOSUNEK DWU WARTOŚCI PEWNÉJ WIELKOŚCI.

2. Gdy mamy dwie wartości téj saméj wielkości, to możemy rozważać ich stosunek; tak np. jeżeli korzec pszenicy kosztuje 3 ruble, a korzec owsa 4 ruble, to téj saméj wielkości: ilości rubli, płaconych za korzec zboża, mamy tu dwie wartości: 8 rub. i 4 rub. i może tu być mowa o stosunku 8 : 4 (§ 29, us. 3) tych dwu wartości, co możemy inaczéj wysłowić mówiąc, iż pszenicę płacono 2 *razy więcéj* [1]) niż za owies. Podobnie, jeżeli jednego dnia żęło zboże 30 żniwiarzy, drugiego zaś dnia żniwiarzy 20, to może tu być mowa o stosunku 30 : 20, ilości żniwiarzy w tych dwu dniach, co możemy także inaczéj wypowiedzieć, mówiąc, iż piérwszego dnia żęło zboże $1\frac{1}{2}$ *raza więcéj* żniwiarzy niż drugiego dnia.

DWIE WIELKOŚCI PROPORCYJONALNE WZGLĘDEM SIEBIE.

3. Mówiliśmy dotąd o jednéj tylko wielkości i o stosunku dwu jéj wartości. Jednak w różnego rodzaju zadaniach mamy często do czynienia z dwiema wielkościami takimi, iż kiedy jedna z nich się zmienia, to jednocześnie druga także zmianie ulega. Tak np. kupiono tego samego towaru raz 5 *m* drugim razem 15 *m*; zapłacono za 5 *m* 8 zł., a za 15 *m* zapłacono 24 zł. Mamy tu dwie wielkości: ilość metrów kupionego towaru i ilość zapłaconych za nie złotych; piérwszej wielkości mamy dwie wartość: 5 *m* i 15 *m*; drugiéj wielkości mamy dwie wartości: 8 zł. i 24 zł. Zauważmy nadto, że wartości 5 *m* piérwszej wielkości «odpowiada» wartości 8 zł. drugiéj wielkości, i podobnie 15-u *m* odpowiada 24 zł. A więc kiedy zmieniła się ilość kupionych metrów towaru, to jednocześnie zmieniła się ilość zapłaconych za nié złotych tak, iż w tym przykładzie stosunek 15 : 5 dwu wartości piérwszéj wielkości jest równy stosun-

---

Co do wyrazu ilość, zauważyć należy, że wielu autorów u nas używa go w znaczeniu wielkość, gdy tymczasem wyraz ilość wymaga zawsze dopełnienia w przyp. 2-gim (ilość drgań na sekundę, ilość dni w miesiącu, ilość jabłek i t. d.). Takie niewłaściwe używanie wyrazu ilość powstało wskutek tego, że łaciński wyraz quantitas, oznacza jednocześnie tak wielkość jak i ilość (co się odbija w chwiejnym używaniu niekiedy przez francuzów wyrazu quantité), a autorowie polscy tych dwu znaczeń nie rozróżniali.

Co się zaś tyczy wyrazu wielkość, to naturalnie, prócz w pojęciu tu zaznaczonym, bywa on także używany w pojęciu wymiaru wogóle, a w takim razie wymaga dopełnienia w przypadku 2-im np. wielkość płotu, wielkość drzewa, wielkość planety, i t. d.

[1]) Gdybyśmy rozważali stosunek ilości rubli zapłaconych za korzec owsa do ilości rubli zapłaconych za korzec pszenicy, t. j. stosunek 4 : 8, to, unikając wyrażania się «za korzec owsa zapłacono $\frac{1}{2}$ raza więcéj niż za korzec pszenicy», mówić można za korzec owsa zapłacono 2 *razy mniéj* niż za korzec pszenicy, — gdyż ten ostatni sposób wyrażania się jest więcéj zrozumiały, a prowadzi także do ścisłego wyniku dalszego rozumowania w odpowiednich zadaniach.

kowi 24 : 8 dwu odpowiadających wartości drugiéj z tych wielkości, czyli te wielkości zmieniają się w tymże samym (§ 29, us. 7) stosunku. Innymi słowy: *ile razy jest większa* ilość metrów kupionego towaru drugim razem od kupionych piérwszym razem, *tyle razy jest większa* ilość złotych zapłacona drugim razem od zapłaconych piérwszym razem.

Rozważane tu dwie wielkości są takie, iż gdybyśmy wzięli jakiekolwiek dwie wartości jednéj z nich np. ilości kupionych metrów tego samego towaru, i obliczyli odpowiadające wartości ilości należnych za nie złotych, to zawsze stosunek wziętych dwu wartości jednéj wielkości będzie równy stosunkowi odpowiadających wartości drugiéj wielkości. Dwie wielkości taką posiadające własność nazywamy wielkościami proporcyjonalnymi względem siebie.

Jeżeli dwie wielkości zmieniają się jednocześnie w ten sposób, iż stosunek dwu jakichkolwiek wartości jednéj z tych wielkości jest równy stosunkowi dwu wartości odpowiadających wielkości pozostałéj, to mówimy, że takie dwie wielkości są proporcyjonalne względem siebie albo, iż zmieniają się w tym samym stosunku.

Tak np. zapłata robotnika jest proporcyjonalna względem ilości wykonanéj przezeń roboty, droga przebyta przez pociąg kolei żelazaéj z pewną stałą prędkością jest proporcyjonalna względem czasu jazdy, i t. d. [1]).

4. Mając dwie wielkości proporcyjonalne względem siebie, weźmy jednéj z tych wielkości dwie jakiekolwiek wartości i odpowiadające im dwie wartości drugiéj wielkości.

Weźmy np. też same wielkości i ich wartości, któreśmy rozważali na początku ustępu poprzedzającego. Wypiszemy je w ten sposób, aby wartości téj saméj wielkości były pod sobą, zaś każda para wartości sobie odpowiadających tych dwu wielkości były pod sobą, zaś każda para wartości sobie odpowiadających tych dwu wielkości była w tym samym poziomym wierszu:

$$\begin{array}{rcl} 5\ m & \text{——} & 8\ \text{zł.} \\ 15\ \text{„} & \text{——} & 24\ \text{„} \end{array}$$

Zaznaczyliśmy już, że stosunek 15 *m* do 5 *m* jest równy stosunkowi 24 zł. do 8 zł., tak iż:

$$15 : 5 = 24 : 8.$$

[1]) Tak w tych przykładach, jak i w innych, któreby można przytoczyć, przyjmujemy proporcyjonalność wielkości uważanych względem siebie jako rzecz znaną lub umówioną. Okazanie, że owe wielkości są względem siebie proporcyjonalne, nie należy do założeń arytmetyki; wchodzi ono w zakres tych nauk, w których owe wielkości są badane.

Z téj proporcyi wynika (§ 30, us. 6)

$$15 = \frac{5 \times 24}{8}, \qquad 24 = \frac{8 \times 15}{5},$$

czyli

$$15\ m = 5\ m \times \frac{24}{8}, \quad 24\ \text{zł.} = 8\ \text{zł.} \times \frac{15}{5},$$

t. j. *gdy mamy dwie pary odpowiadających sobie wartości dwu wielkości proporcyjonalnych względem siebie, to jedna wartość któréjkolwiek wielkości równa się drugiéj wartości tejże wielkości, pomnożonéj przez stosunek odpowiadających wartości drugiéj wielkości.*

DWIE WIELKOSCI ODWROTNIE PROPORCYJONALNE WZGLĘDEM SIEBIE.

5. W zadaniach występują dwie wielkości zmieniające się jednocześnie w taki sposób, iż stosunek dwu wartości jednéj wielkości jest równy stosunkowi odwrotnemu (§ 29, us. 4) wartości odpowiadających wielkości pozostałéj. Tak np. gdy obszar każdego z dwu pól, kształtu prostokątnego, wynosi 6 *ha* i szerokość jednego pola wynosi 200 *m*, drugiego zaś 240 *m*, to długości tych pól wynoszą piérwszego 300 *m*, drugiego 250 *m*; stosunek więc szerokości drugiego pola do szerokości piérwszego 240 : 200 nie jest tu równy stosunkowi długości drugiego pola do długości piérwszego, t. j. nie jest równy stosunkowi 250 : 300, lecz jest równy stosunkowi odwrotnemu 300 : 250, czyli długość i szerokość zmieniają się w stosunku odwrotnym. Innymi słowy: *ile razy jest większa* szerokość drugiego pola od szerokości piérwszego, *tyle razy jest mniejsza* długość drugiego pola od długości piérwszego.

Taki związek między długością i szerokością dwu pól kształtu prostokątnego, a jednakowego obszaru, zawszeby zachodził, jakiekolwiek byłyby ich szerokości, t. j. stosunek ich szerokości byłby równy odwrotnemu stosunkowi odpowiadających im długości. Dwie wielkości taką posiadające własność nazywamy wielkościami odwrotnie proporcyjonalnymi wzlędem siebie.

Jeżeli dwie wielkości zmieniają się jednocześnie w ten sposób, iż stosunek dwu jakichkolwiek wartości jednej z tych dwu wielkości jest równy stosunkowi odwrotnemu wartości odpowiadających wielkości pozostałéj, to mówimy, że takie dwie wielkości są odwtotnie proporcyjonalne względem siebie, albo że one zmieniają się w stosunku odwrotnym.

Tak np. czas potrzebny na wykonanie pewnéj roboty jest odwrotnie proporcyjonalny względem ilości pracujących robotników; przeciąg czasu, w ciągu którego ciało poruszające się ruchem jednostajnym przebiega pewną drogę, jest odwrotnie proporcyjonalny względem prędkości takiego ruchu.

Gdy w zadaniu obok wielkości odwrotnie proporcyjonalnych występują wielkości, któreśmy w us. 3-im nazwali proporcyjonalnymi, to zwykle te ostatnie miannjemy wtedy wprost proporcyjonalnymi, w przeciwstawieniu wielkościom [1]) odwrotnie proporcyjonalnym. (Jeżeli zaś jest mowa o wielkościach i zaznaczono tylko, że one są «proporcyjonalne», to wtedy zawsze rozumieć należy wielkości wprost proporcyjonalne).

6. Mając dwie wielkości odwrotnie proporcyjonalne względem siebie, weźmy jednéj z tych wielkości dwie jakiekolwiek wartości i odpowiadające im dwie wartości drugiéj wielkości.

Weźmy np. też same wielkości i ich wartości, któreśmy rozważali na początku us. poprzedzającego. Wypiszmy je w ten sposób, aby wartości téj saméj wielkości były pod sobą, zaś każda para wartości sobie odpowiadających tych dwu wielkości była w tym samym poziomym wierszu:

200 *m* szer. —— 300 *m* dług.
240 „ „ —— 250 „ „

Zaznaczyliśmy już, że stosunek 240 *m* do 200 *m* nie jest równy stosunkowi wartości odpowiadających 250 *m* do 300 *m*, lecz jest równy stosunkowi odwrotnemu, t. j. stosunkowi 300 *m* do 250 *m*, tak iż:

$$240 : 200 = 300 : 250$$

Z téj proporcyi wynika:

$$240 = \frac{200 \times 300}{250}, \quad 250 = \frac{300 \times 200}{240},$$

czyli

$$240 \text{ } m \text{ szer.} = 200 \text{ } m \text{ szer.} \times \frac{300}{250}.$$

---

[1]) Dobrze jest wskazać tu uczniom kilka przykładów wielkości, które, choć są zależne od siebie, jednak mogą być nieproporcyjonalne względem siebie ani wprost, ani też odwrotnie. Np. cena masła w dwa dnie targowe, przy jednakowym zapotrzebowaniu, a znacznie większym lub znacznie mniejszym dowozie, jest zależna od ilości dowiezionego masła, jest większa, gdy dowóz jest mniejszy, ale nie jest względem niego odwrotnie proporcyjonalna; koszt wydania książki nie jest proporcyjonalny względem ilości odbijanych egzemplarzy; aby punkt taksamo oświecić niedość na odległości 2, 3, 4, . . . razy większéj umieścić światło odpowiednio 2, 3, 4, . . . razy silniejsze niż początkowo, a więc siła oświecenia punktu przez źródło światła, choć zależna od odległości, nie jest względem niéj odwrotnie proporcyjonalna (na to potrzeba światła odpowiednio 4, 9, 16, . . . razy silniejszego niż początkowo, a więc owa wielkość jest odwrotnie proporcyjonalna względem kwadratu odległości); wysokość barometru zależy od wyniesienia nad poziom morza, szerokości geograficznéj, temperatury, ale nie jest ani wprost ani odwrotnie proporcyjonalna względem żadnéj z tych wielkości, i t. d.

(Uogólnione, przy pomocy wprowadzenia liter na oznaczenie tak wielkości wprost, lub odwrotnie proporcyjonalnych względem siebie, jak i na oznaczenie ich wartości, przedstawienie własności wielkości proporcyjonalnych będzie wyłożone w algiebrze.)

$$250\ m \text{ dług.} = 300\ m \text{ dług.} \times \frac{200}{240}$$

t. j. *gdy mamy dwie pary wartości sobie odpowiadających dwu wielkości odwrotnie proporcyjonalnych względem siebie, to jedna wartość którejkolwiek wielkości równa się drugiéj wartości téjże wielkości, pomnożonéj przez stosunek odwrotny, odpowiadających wartości drugiéj wielkości.*

ROZDZIAŁ X.

REGUŁA TRZECH.

§ 32. REGUŁA TRZECH.

OKREŚLENIE ZĄDANIA NA REGUŁĘ TRZECH. ROZWIĄZYWANIE WYNIKAJĄCE WPROST Z PROPORCYJONALNOŚCI WIELKOŚCI.

1. Jeżeli mamy daną jednę parę odpowiadających sobie wartości dwu wielkości, wprost lub odwrotnie względem siebie proporcyjonalnych, to dla każdéj innéj wartości jednéj z tych wielkości możemy znaléść odpowiadającą jéj wartość drugiéj wielkości. Dla objaśnienia tego weźmy następujące zadania.

a. Jeżeli za 16 łokci sukna zapłacono 27 rubli, to ile wypadnie zapłacić za 35 łokci tego sukna? — Jeżeli niewiadomą ilość rubli, które wypadnie zapłacić za 35 łokci sukna, nazwiemy x, to zadanie możemy tak wypisać:

16 łok. —— 27 rub.
35 „ —— x „

W tym zadaniu mamy dwie wielkości: długość sukna i wartość wszystkiego kupionego każdym razem sukna. Zważmy, że wogóle, jeżeli kupujemy *więcéj* sukna, to *tyleż razy więcéj* wypadnie za nie zapłacić. A więc (§ 31, us. 3) te dwie wielkości są względem siebie wprost proporcyjonalne. Tych wielkości wprost proporcyjonalnych względem siebie mamy dane: jednę parę odpowiadających sobie wartości, t. j. 16 łok. i 27 rub., oraz drugą wartość jednéj z tych wielkości (długości sukna), t. j. 35 łok., a szukamy odpowiadającéj jéj wartości drugiéj wielkości (wartości sukna), t. j. szukamy, jaką jest ilość rubli, odpowiadająca 35-u łokciom. — A zatym, według tego, cośmy powiedzieli w us. 4-ym § 31-go, ta szukana wartość x rubli jest równa drugiéj wartości ilości rubli, (27-u rublom), pomnożonéj przez stosunek odpowiadających wartości wielkości pozostałéj, t. j.

$$x \text{ rub.} = 27 \text{ rub.} \times \frac{35}{16} = 59{,}0625 \text{ rub.}$$

Odp. Za 35 łokci sukna zapłacono 59 rubli i 6 kopiejek (por. § 21, us. 13).

b. Pewną robotę można wykonać, pracując w ciągu 5-u dni po 4 godziny dziennie; po ile godzin codziennie trzebaby pracować, aby tę robotę wykonać w ciągu 3-ch dni? — Niewiadomą ilość godzin codziennéj pracy, potrzebnych dla wykonania téj roboty w ciągu 3-ch dni, nazwiemy x; wtedy zadanie możemy tak wypisać:

5 dni ——— 4 godz.
3 „ ——— x „

Do tego zadania wchodzą dwie wielkości: ilość dni pracy i ilość godzin codziennéj pracy, potrzebnych dla wykonania pewnéj roboty. Zważmy, że wogóle, jeżeli na *więcéj* dni rozłożymy tę robotę, to codziennie możemy *tyleż razy mniéj* godzin pracować, ile razy więcéj mamy dni na wykonanie téj roboty. Przeto (§ 31, us. 5) te dwie wielkości są względem siebie odwrotnie proporcyjonalne. Tych wielkości odwrotnie proporcyjonalnych względem siebie, mamy dane: jednę parę wartości sobie odpowiadających, t. j. 5 dni i 4 godziny, oraz drugą wartość jednéj z tych wielkości (ilości dni), t. j. 3 dnie, a szukamy odpowiadającéj jéj wartości drugiéj wielkości (ilości godzin), t. j. szukamy, jaką jest ilość godzin codziennéj pracy, odpowiadająca 3 dniom pracy. — A zatym według tego, cośmy powiedzieli w us. 6-ym § 31-go, ta szukana wartość x godzin jest równa drugiéj wartości ilości godzin (4 godz.), pomnożonéj przez stosunek odwrotny odpowiadających wartości wielkości pozostałéj t. j.

$$x \text{ godz.} = 4 \text{ godz.} \times \frac{5}{3} = 6\frac{2}{3} \text{ g.}$$

Odp. Aby owę robotę wykonać w ciągu 3 dni, należałoby codziennie pracować po 6 godzin i 40 minut.

Takiego rodzaju zadania oddawna nazywają się zadaniami na regułę trzech. Zatym przez «regułę trzech» [1]) rozumiéć należy zbiór objaśnień i wskazówek rozwiązywania takich zadań.

Powiemy więc:

Zadanie na regułę trzech jestto zadanie, w którym, mając dane: ednę parę odpowiadających sobie wartości dwu wielkości, wprost lub odwrotnie względem siebie proporcyjonalnych, oraz drugą wartość jednéj z tych wielkości, mamy znaléść odpowiadającą jéj wartość drugiéj wielkości.

[1]) Niektórzy dotąd jeszcze rozróżniają regułę trzech w tym przypadku, kiedy wielkości, wchodzące do zadania, są wprost proporcyjonalne, od reguły trzech w przypadku, kiedy wielkości wchodzące do zadania, są odwrotnie proporcyjonalne względem siebie, jak to robiono zawsze dawniéj («Regula Detri» i «Regula Detri conversa», albo «inversa»).

2. Zestawmy z sobą powyższe zadania i ich rozwiązania:

16 łok. —— 27 rub.	5 dni —— 4 godz.
35 „ — x „	3 „ —— x „
$x = \frac{27 \times 35}{16}$;	$x = \frac{4 \times 5}{3}$,

albo:

$$x = 27 \times \frac{35}{16}; \qquad x = 4 \times \frac{5}{3}.$$

Z tego widzimy, że:

Jeżeli zadanie na regułę trzech wypiszemy w dwu wiérszach tak, żeby każde dwie wartości téj saméj wielkości były w tym samym rzędzie pionowym, a odpowiadające sobie wartości różnych wielkości znalazły się w tym samym rzędzie poziomym [1]*), to wrazie gdy wielkości, wchodzące do zadania, są względem siebie wprost proporcyjonalne, otrzymamy liczbę szukaną, mnożąc liczbę, znajdującą się w tym samym, co szukana, pionowym przez liczbę, znajdującą się w tym samym, co szukana, rzędzie poziomym, i dzieląc ten iloczyn przez pozostałą liczbę; wrazie zaś gdy wielkości, wchodzące do zadania, są względem siebie odwrotnie proporcyjonalne, otrzymamy liczbę szukaną, mnożąc liczbę, znajdującą się w tym samym, co szukana, rzędzie pionowym przez liczbę drugiego rzędu pionowego, lecz znajdującą się w innym, niż szukana, rzędzie poziomym, i dzieląc ten iloczyn przez pozostałą liczbę.*

Albo: *wrazie, gdy wielkości, wchodzące do zadania, są względem siebie wprost proporcyjonalne, otrzymamy liczbę szukaną, mnożąc liczbę, wyrażającą daną wartość téjże, co szukana, wielkości, przez stosunek wartości odpowiadających drugiéj wielkości; wrazie zaś, gdy wielkości, wchodzące do zadania, są względem siebie odwrotnie proporcyjonalne, otrzymamy liczbę szukaną mnożąc liczbę, wyrażającą daną wartość téjże, co szukana, wielkości przez stosunek odwrotny wartości odpowiadających drugiéj wielkości.*

Jeżelibyśmy w powyższych zadaniach nie powoływali się na własności wypowiedziane w us. 4-ym i 6-ym § 31-go, lecz odpowiednie rozumowanie w całości na zadaniach przeprowadzali, to wypisawszy każde z tych zadań, jak powyżéj w dwu wierszach, mówilibyśmy daléj:

a. *Ile razy więcéj* kupujemy łokci, *tyle razy więcéj* rubli za nie należy zapłacić; a więc stosunek kupionych ilości łokci sukna jest równy stosunkowi zapłaconych za nie ilości rubli, t. j.

---

[1]) Wrazie, gdyby w zadaniu dane wartości któréjkolwiek wielkości były wyrażone jako liczby wielorakie, wypisując tu zadanie, należy te wartości wyrazić jako liczby mianowane proste, bacząc jeszcze na to, aby wartości téj saméj wielkości były liczbami mianowanymi prostymi, wyrażonymi przy pomocy téj saméj jednostki (§ 29, us. 1).

$$x : 27 = 35 : 16, \qquad x = \frac{27 \times 35}{16} = 59{,}0625$$

Odp. 59 rub. + 6 kop.

b. *Ile razy mniéj* mamy dni na wykonanie pewnéj pracy, *tyle razy więcéj* godzin codziennie pracować potrzeba; a więc stosunek ilości dni pracy jest równy odwrotnemu stosunkowi ilości godzin codziennéj pracy, t. j.

$$x : 4 = 5 : 3$$
$$x = \frac{4 \times 5}{3} = 6\frac{2}{3}$$

Odp. 6 godz. + 40 minut.

Takie rozwiązywanie zadań na regułę trzech, przy wyraźnym wypisaniu proporcyi, wynikającéj z rozważenia, czy wielkości wchodzące do zadania, są wprost, czy też odwrotnie proporcyjonalne względem siebie, nazywa się rozwiązywaniem przy pomocy proporcyi.

Widzimy z powyższego, jak ważnym jest staranne wyznaczenie tego, czy wielkości, wchodzące do zadania, są wprost, czytéż odwrotnie proporcyjonalne względem siebie.

METODA SPROWADZANIA DO JEDNOŚCI.

3. Mając np. zadanie a. ustępu 1-go i zaznaczywszy, że dwie wielkości, wchodzące do tego zadania, są względem siebie wprost proporcyjonalne, możemy je rozwiązać, przeprowadzając dalsze rozumowanie w ten sposób. Ponieważ za 16 łokci zapłacono 27 rubli, więc za 1 łokieć wypadnie zapłacić (§ 31, us. 3) 16 razy mniéj rubli t. j. 27 rub. : 16, czyli (§ 17, us. 5) $\frac{27}{16}$ rub. Ponieważ za 1 łokieć zapłacono $\frac{27}{16}$ rub., to za 35 łokci wypadnie zapłacić [1]) 35 razy więcéj, t. j. $\frac{27}{16}$ rub. $\times$ 35, czyli $\frac{27 \times 35}{16}$ rub. = 59,0625 rub., t. j. 59 rub. + 6 kop.

16 łok. —— 27 rub.
35 „ —— x „

16 łok. —— 27 rub.
1 „ —— $\frac{27}{16}$ „
35 „ —— $\frac{27 \times 35}{16}$ rub. = 59,0625 rub.

---

[1]) Jeżelibyśmy chcieli wyrażenie: «za 35 łokci wypadnie zapłacić 35 razy więcéj» odnieść do przypadku, kiedy w tym zadaniu zamiast 35 łokci byłoby np. $\frac{5}{9}$ łokcia, to najlepiéj naprzód wziąć pod uwagę $\frac{1}{9}$ łokcia, a późniéj dopiero $\frac{5}{9}$ łokcia.

Podobnie, mając zadanie b. ustępu 1-go i zaznaczywszy, że dwie wielkości, wchodzące do tego zadania, są względem siebie odwrotnie proporcyjonalne, możemy następnie tak rozumować. Ponieważ dla wykonania téj roboty, należało w ciągu 5 dni pracować po 4 godziny dziennie, przeto w ciągu jednego dnia należy pracować (§ 31, us. 5) 5 razy więcéj godzin, t. j. 4 godz. $\times 5 = 4 \times 5$ godz. [1]); ponieważ dla wykonania téj roboty w ciągu jednego dnia należałoby pracować 4×5 godzin, więc, aby ją wykonać w ciągu 3 dni, należałoby pracować codziennie 3 razy mniéj godzin, t. j. 4×5 godzin : 3 t. j. $\frac{4 \times 5}{3}$ godz. $= 6\frac{2}{3}$ godz. $= 6$ godz. $+ 40$ min

5 dni —— 4 godz.
3 „ —— x „
5 dni —— 4 godz.
1 „ —— 4×5 „
3 „ —— $\frac{4 \times 5}{3}$ godz. $= 6\frac{2}{3}$ godz.

Taki sposób rozwiązywania zadań na regułę trzech (w nim więc, jak z powyższego widoczna, przechodzimy przez wartość jednostki téj wielkości, któréj w zadaniu dane są dwie wartości) nazywa się [2]) metodą sprowadzania do jedności.

Oczywiście, że z otrzymanych wypadków wypada toż samo, cośmy wypowiedzieli w ustępie 2-gim.

PRAKTYKA WŁOSKA.

4. Niektóre zadania na regułę trzech można dogodnie rozwiązywać w następujący sposób.

Weźmy np. zadanie a. ustępu 1-go. Zamiast odrazu wyszukiwać, jaka jest ilość rubli, odpowiadająca 35 łokciom, możemy z tego, iż wiemy, że za 16 łok. należy się 27 rub., znaléść oddzielnie, ile wypadnie zapłacić za 32 łok. (mnożąc 27 rub. przez 2), i oddzielnie, ile wypadnie zapłacić za 2 łok. (dzieląc 27 rub. przez 8), a następnie, z tego, ile wypada zapłacić za 2 łokcie, znajdziemy (dzieląc przez 2), ile wypadnie zapłacić

16 łok. —— 27 rub.
35 „ —— x „
32 łok. —— 27 rub. $\times 2 = 54$ rub.
2 „ —— 27 rub. : $8 = 3{,}375$ „
1 „ ——3,75 rub. : $2 = 1{,}6875$ „
35 łok. —— 59,0625 rub.

[1]) Rozumiejąc to tak, jakgdyby było napisane (4×5) godz.
[Gdyby w zadaniu zamiast 4 godz. było np. 6 godz., to (6×5) godz. $= 30$ godzinom, więcéj niż ich jest w dobie; w takim razie ta liczba wskazywałaby, ileby trzeba godzin pracować bez przerwy.]

[2]) Niektórzy nazywają go «metodą wnioskowania» — niesłusznie, gdyż kurs arytmetyki, gdy jest należycie prowadzony, jest cały metodą wnioskowania. Nadto wielu utrzymuje, iż ta metoda rozwiązywania zadań na regułę trzech powstała w Niemczech około r. 1840; jest ona jednak przeprowadzona szczegółowo już w *Arytmetyce dla szkół narodowych* (piérwsze wydanie r. 1778).

za 1 łokieć. Dodawszy zaś do siebie to, co trzeba zapłacić za 32 łok., za 2 łok. i za 1 łok., otrzymamy, iż za 35 łokci wypadnie (§ 21, us. 13) zapłacić 59 rub. + 6 kop.

Postępując takim sposobem, nieodrazu znaleźliśmy wartość ilości rubli, odpowiadającą 35 łokciom, lecz znajdowaliśmy kolejno wartości ilości rubli, odpowiadające oddzielnym częściom 35 łokci, na które je rozłożyliśmy tak, jak nam się wydało najdogodniéj. Taki sposób rozwiązywania zadań przedstawia metodę rozkładową, nazywaną praktyką włoską. Używa się téj metody przeważnie przy wyliczaniu wartości przedmiotów. Przerobimy tu jeszcze według téj metody następujące zadania.

a. Ile kosztuje $3\frac{1}{8}$ funta towaru, jeżeli za 7,5 funta tego towaru zapłacono 30,96 rubla? — Tu najdogodniéj będzie rozłożyć $3\frac{1}{8}$ funta na jednę-trzecią $7\frac{1}{2}$ fun., t. j. na $2\frac{1}{2}$ fun., na jednę-piątą $2\frac{1}{2}$ fun., t. j. na $\frac{1}{2}$ fun., oraz na jednę-czwartą $\frac{1}{2}$ funta, t. j. na $\frac{1}{8}$ f., gdyż $2\frac{1}{2}$ f. + $\frac{1}{2}$ f. + $\frac{1}{8}$ f. = $= 3\frac{1}{8}$ f. Odpowiednio więc do tego wypadnie kolejno 30,96 rubli : 3; 10,32 rub. : 5 i 2,064 rub. : 4. Odp. $3\frac{1}{8}$ funta tego towaru kosztuje 12 rub. + 90 kop.

$7\frac{1}{2}$ fun.	——	30,96	rub.
$3\frac{1}{8}$ „	——	x	„
$2\frac{1}{2}$ fun.	——	10,32	rub.
$\frac{1}{2}$ „	——	2,064	„
$\frac{1}{8}$ „	——	0,516	„
$3\frac{1}{8}$ fun.	——	12,9	rub.

b. Za jeden sążeń kwadratowy placu w mieście chcą 11 rub. + 56 kop.; ile wypadnie zapłacić za 684 sąż. kw.? —

1 s. kw.	——	11,56	rub.
684 „	——	x	„
100 „	——	1156	rub.
500 „	——	5780	„
50 „	——	578	„
10 „	——	115,6	„
20 „	——	231,2	„
4 „	——	46,24	„
684 s. kw.	——	7907,04	rub.

Odp. Za 684 sążni kw. wypadnie zapłacić 7907 rub. + 4 kop.

W przypadku, gdy, jak w ostatnim zadaniu, jest dana cena jednostki, często tę właśnie cenę rozkładają na części. Tak np. to samo zadanie b. moglibyśmy tak zrobić:

1 sąż. kw. —— 11,56 rub.
684 „ —— x „

684 sąż. kw.	po	10	rub.	——	6840 rub.
„ „	„	1	„	——	684 „
„ „	„	0,5	„	——	342 „
„ „	„	0,05	„	——	34,2 „
„ „	„	0,01	„	——	6,84 „
684 sąż. kw.	po	11,56	rub.	——	7907,04 rub.

Niekiedy w takich zadaniach rozkładają na części tak cenę jednostki, jak i liczbę, wyrażającą ilość kupowanego towaru. Np.

c. Ile kosztuje 39 funtów i 22 łuty towaru, którego funt kosztuje 5 złp. i 27 $\frac{1}{2}$ grosza? —

39 fun.	po	5 zł.	——	195 zł.
„ „	„	15 gr. (5 zł. : 10)	——	19 „ 15 gr.
„ „	„	5 „ (15 gr. : 3)	——	6 „ 15 „
„ „	„	5 „	——	6 „ 15 „
„ „		$2\frac{1}{2}$ gr.	——	3 „ 8 „
16 łut.	(1 f. : 2)		——	2 „ 29 „
4 „			——	— „ 22 „
2 „			——	— „ 11 „
39 fun. + 22 łuty			——	234 zł. 25 gr.

§ 33. REGUŁA TRZECH ZŁOŻONA.

OKREŚLENIE ZADANIA NA REGUŁĘ TRZECH ZŁOŻONĄ. ROZWIĄZYWANIE WPROST Z PROPORCYJONALNOŚCI WIELKOŚCI.

1. Jeżeli zadanie dane może być wprost rozłożone na dwa lub więcéj zadań na regułę trzech, tak iż, rozwiązując kolejno owe zadania, wyznaczymy nakoniec liczbę, o którą nam idzie w zadaniu danym, to takie zadanie nazywamy zadaniem na regułę trzech złożoną.

Powiemy więc: *zadanie, które może być wprost rozłożone na dwa lub więcéj zadań na regułę trzech, nazywa się zadaniem na regułę trzech złożoną.* Zaś przez regułę trzech złożoną rozumieć należy zbiór objaśnień i wskazówek rozwiązywania takich zadań.

Np. 15 tkaczy, pracując po 9 godzin dziennie, w ciągu 32 dni utkało 2400 metrów płótna, mającego 1,5 metra szerokości; w ciągu ilu dni 24 tkaczy, pracujących po 8 godzin dziennie, utkać może 3600 metrów płótna tegoż gatunku, lecz mającego szerokości 1,8 metra? — Oznaczywszy przez literę x liczbę oderwaną, wyrażającą ilość dni, odpowiadającą wartościom: 24 tk., 8 g. dziennéj pracy, 3600 m długości i 1,8 m szerokości płótna, zadanie to tak wypiszemy:

15 tk. —— 9 g. —— 2400 m —— 15 dm —— 32 d.
24 „ —— 8 „ —— 3600 „ —— 18 „ —— x „

Jeżeli przypuścimy, że tylko ilość tkaczy uległa zmianie, t. j. że zamiast wartości 15 tk. mamy wartość 24 tk., wartości zaś innych wielkości (t. j. ilości godzin dziennéj pracy, długości i szerokości płótna) zmianie nie uległy, to wtedy iść nam będzie o taką wartość ilości dni, która odpowié wartościom: 24 tk., 9 g. dziennéj pracy, 2400 m długości i 15 dm szerokości. Ta więc liczba odpowiada innym wartościom wchodzących do zadania wielkości, niż owa liczba, którąśmy oznaczyli przez literę x; dlatego oznaczymy ją przez inną literę, np. przez literę y. Tak iż mamy teraz zadanie:

I) 15 tk. —— 9 g. —— 2400 m —— 15 dm —— 32 d.
24 „ —— 9 „ —— 2400 „ —— 15 „ —— y „

Tu ilość dni pracy jest niezależna od niezmieniających się: godzin dziennéj pracy, długości i szerokości płótna, a jest zależna tylko od ilości tkaczy. Aby zbadać, jakimi względem siebie są te dwie wielkości: ilość tkaczy i ilość dni pracy, zważmy, że wogóle [1]) «aby, pracując tę samę ilość godzin codziennie, utkać tę samę ilość metrów płótna téjże saméj szerokości, większa ilość tkaczy potrzebuje tyle razy mniejszéj ilości dni, ile razy tkaczy jest więcéj». Powiemy więc, że dwie wielkości: ilość tkaczy i ilość dni pracy są odwrotnie proporcyjonalne względem siebie. Tych dwu wielkości mamy parę wartości sobie odpowiadających, t. j. 15 tk. i 32 d., oraz drugą wartość ilości tkaczy, t. j. 24 tk., dla któréj mamy znaleść odpowiadającą wartość ilości dni. Jest to więc zadanie na regułę trzech. Moglibyśmy więc je rozwiązać t. j. znaléść liczby y (§ 32, us. 2). Dlatego tę liczbę y, choć jéj nie wyliczymy (por. niżéj piérwszy przypisek us. 2-go), możemy nadal przyjmować za liczbę już wiadomą.

Mamy liczbę y d., odpowiadającą wartościom: 24 tk., 9 g., 2400 m i 15 dm. Zmieńmy tylko wartość 9 g. na wartość 8 g. Wtedy liczba, która odpowie wartościom: 24 tk., 8 g., 2400 m i 15 dm, jest inna od

[1]) Podobne wypowiedzenie bywa najzręczniejsze i najjaśniejsze, gdy się naprzód mówi o wielkościach, których wartości zmianie nie ulegają.

liczb, któreśmy oznaczyli przez litery x i y; oznaczmy ją przez literę np. z. Miéć będziemy teraz zadanie:

II) 24 tk. —— 9 g. —— 2400 *m* —— 15 *dm* —— *y* d.
24 „ —— 8 „ —— 2400 „ —— 15 „ —— *z* „

Objaśniając znowu to zadanie tak szczegółowo, jak poprzednie, wypadnie nam tu zauważyć wogóle, że «taż sama ilość tkaczy, aby utkać tę samę ilość płótna téjże saméj szerokości, pracując więcéj [1]) godzin codziennie, będzie potrzebowała tyle razy mniéj dni, ile razy więcéj godzin codziennie pracuje», i powiemy, że dwie wielkości: ilość dni pracy i ilość godzin codziennéj pracy są odwrotnie proporcyjonalne względem siebie, i t. d. Jest to więc zadanie na regułę trzech. Liczbę y, choć jéj nie obliczyliśmy, wyznacza zadanie I; dlatego ostatnie zadanie II w zupełności wyznacza liczbę z i możemy ją nadal przyjmować za liczbę już wiadomą.

Liczba z odpowiada wartościom: 24 tk., 8 g., 2400 *m* i 12 *dm*. Zmieńmy tylko wartość 2400 *m* na 3600 *m*, a liczbę, odpowiadającą wartościom: 24 tk., 8 g., 3600 *m* i 15 *dm*, oznaczmy np. przez literę w. Przy objaśnianiu zadania

III) 24 tk. —— 8 g. —— 2400 *m* —— 15 *dm* —— *z* d.
24 „ —— 8 „ —— 3600 „ —— 15 „ —— *w* „

zauważymy ogólnie, że «ta sama ilość tkaczy, pracując tę samę ilość godzin codziennie, aby utkać płótna téj saméj szerokości więcéj metrów, potrzebuje dni tyle razy więcéj, ile razy więcéj należy utkać płótna», i powiemy, że dwie wielkości: ilość dni pracy i długość płótna są wprost proporcyjonalne względem siebie. I t. d. Jest to więc zadanie na regułę trzech. I t. d.

Liczba w d. odpowiada wartościom: 24 tk., 8 g., 3600 *m* i 15 *dm*. Zmieńmy nakoniec wartość 15 *dm* na wartość 18 *dm*. Liczba, odpowiadająca wartościom: 24 tk., 8 g., 3600 *m* i 18 *dm*, jest tą liczbą, którąśmy już nazwali x. Miéć więc będziemy zadanie:

IV) 24 tk. —— 8 g. —— 3600 *m* —— 15 *dm* —— *w* d.
24 „ —— 8 „ —— 3600 „ —— 18 „ —— *x* „

które objaśniając podobie jak poprzednie, znajdziemy, że ono jest również zadaniem na regułę trzech.

Widzimy więc, że zadanie dane rozłożyliśmy na cztéry zadania na regułę trzech. Gdybyśmy je kolejno rozwiązywati, to wyznaczywszy z zadania I liczbę y, wyznaczylibyśmy następnie z zadania II liczbę z,

[1]) Por. przypisek do us. 2-go § 31-go.

później z zadania III liczbę w i nakoniec z zadania IV liczbę x, t. j. tę, o którą nam idzie w zadaniu pierwotnie danym. Dlatego takie zadania, jak pierwotnie tu dane, które można rozwiązać przy pomocy dwu lub więcéj zadań na regułę trzech, na jakie zadanie dane wprost rozłożyć możemy, nazywa się zadaniem na regułę trzech złożoną [1]).

2. Rozwiązując kolejno powyższe zadania na regułę trzech (§ 32, us. 2), otrzymujemy:

$$\text{z I} \quad y = \frac{32 \times 15}{24};$$

$$\text{z II} \quad z = y \times \frac{9}{8}, \text{ t. j. } z = \frac{32 \times 15}{24} \times \frac{9}{8} = \frac{32 \times 15 \times 9}{24 \times 8};$$

$$\text{z III} \quad w = z \times \frac{3600}{2400}, \text{ t. j. } w = \frac{32 \times 15 \times 9 \times 3600}{24 \times 8 \times 2400};$$

$$\text{z IV} \quad x = w \times \frac{18}{15}, \text{ t. j. } x = \frac{32 \times 15 \times 9 \times 3600 \times 18}{24 \times 8 \times 2400 \times 15},$$

skąd, po wykonaniu skróceń [2]), otrzymamy 40,5 dnia, co wskazuje, że owych 24 tkaczy powinno pracować po 8 godzin dziennie w ciągu 40-u dni, a nadto 41-go dnia pracy jeszcze 4 godziny.

Jeżeli otrzymane wyrażenie liczby x przez liczby pierwotnie danego zadania zestawimy z tymże zadaniem,

odw.	odw.	wpr.	wpr.	
15 tk.	—— 9 g.	—— 2400 m	—— 15 dm	—— 32 d.
24 „	—— 8 „	3600 „	—— 18 „	—— x „

$$x = \frac{32 \times 15 \times 9 \times 3600 \times 18}{24 \times 8 \times 2400 \times 15},$$

i uważnie przyjrzymy się temu, jak ta liczba x wyrażoną została przez liczby, dane w zadaniu, to dostrzeżemy, że liczba x równa się [3]) iloczynowi, którego czynnikami są: liczba znajdująca się nad x-em, liczby, wyrażające wartości wielkości odwrotnie proporcyjonalnych, znajdujące się w piérwszym wierszu poziomym, i liczby, wyrażające wartości wielkości wprost proporcyjonalnych, znajdujące się w wiérszu drugim, podzielonemu przez iloczyn liczb pozostałych. Moglibyśmy jednak tak wypisać to zadanie, żeby wszystkie liczby, które są w wiérszu drugim, znalazły się w wiérszu piérwszym, i nawzajem. Dlatego powiemy ogólniéj:

Jeżeli zadanie na regułę trzech złożoną wypiszemy w dwu wiérszach tak, żeby każde dwie wartości téj saméj wielkości były w tym samym rzę-

---

[1]) W przeciwstawieniu temu nazywają często zwykłe zadanie na regułę trzech zadaniem na «regułę trzech prostą».

[2]) Zwykle mniéj bywa roboty, gdy, po wykonaniu skróceń dopiéro w tym ostatecznym wypadku rozumowania, wyliczamy z niego liczbę x, niż gdybyśmy kolejno wyliczali liczby y, z, w i x, choćby wykonywając przed każdym z tych wyliczeń skrócenia możliwe.

[3]) Por. przypisek do us. 2-go § 32-go.

dzie pionowym, a odpowiadające sobie wartości różnych wielkości znalazły się w tym samym rzędzie poziomym, i wyznaczymy, które wielkości są wprost, a które odwrotnie proporcyjonalne względem téj wielkości, któréj jednéj wartości szukamy, to liczbę szukaną otrzymamy, mnożąc liczbę, znajdującą się w tym samym, co szukana, rzędzie pionowym, przez liczby wyrażające wartości wielkości wprost proporcyjonalnych, znajdujące się w tym samym, co szkuana, rzędzie poziomym, i przez liczby wyrażające wartości wielkości odwrotnie proporcyjonalnych, znajdujące się w innym, niż szukana, rzędzie poziomym, a ten iloczyn dzieląc przez iloczyn liczb pozostałych.

Jeżeli wyrażenie liczby x przez liczby pierwotnie danego zadania wypiszemy tak:

$$x = 32 \times \frac{15}{24} \times \frac{9}{8} \times \frac{3600}{2400} \times \frac{18}{15},$$

to dostrzeżemy, że *otrzymamy liczbę szukaną, mnożąc liczbę, wyrażającą daną wartość téjże, co szukana, wielkości, przez stosunki wartości odpowiadających każdéj wielkości wprost proporcyjonalnéj i przez stosunki odwrotne wartości odpowiadających każdéj wielkości odwrotnie proporcyjonalnéj.*

Widzimy z tego, jak ważnym jest staranne wyznaczenie, które z wielkości, wchodzących do zadania, są wprost, a które odwrotnie proporcyjonalne względem téj wielkości, któréj jednéj wartości szukamy. Wyznaczywszy to uważnie, możemy odrazu, według powyższéj wskazówki, utworzyć wyrażenie liczby szukanéj przez liczby dane w zadaniu, a następnie ją obliczyć.

ROZWIĄZYWANIE ZA POMOCĄ PROPORCYJ.

3. Z każdego z powyższych cztérech zadań na regułę trzech, na które rozłożyliśmy dane zadanie, tworząc tak, jak w us. 2-im § 32-go, proporcyją, miéć będziemy kolejno:

$$\begin{aligned} &\text{z I} \quad y : 32 = 15 : 24, \\ &\text{z II} \quad z : y = 9 : 8, \\ &\text{z III} \quad w : z = 3600 : 2400, \\ &\text{z IV} \quad x : w = 18 : 15. \end{aligned}$$

Mnożąc te proporcyje przez siebie odpowiednimi wyrazami (§ 30, us. 16), otrzymujemy

$$(y.z.w.x) : (32.y.z.w) = (15.9.3600.18) : (24.8.2400.15).$$

Albo, po podzieleniu obu wyrazów stosunku piérwszego przez liczby y, z i w,

$$x : 32 = (15.9.3600.18) : (24.8.2400.15).$$

Gdybyśmy z téj proporcyi wyrazili wyraz x przez pozostałe wyrazy, to otrzymalibyśmy to wyrażenie liczby x, któreśmy mieli w us. 2-im. Dzie-

ląc jednak jednocześnie przez też same liczby jeden wyraz średni i jeden skrajny (§ 30, us. 10), zastąpimy tę proporcyją przez prostszą,

$$x : 1 = 81 : 2,$$

z któréj znajdziemy $x = 40{,}5$. Taki sposób rozwiązywania zadań na regułę trzech złożoną nazywają rozwiązywaniem zapomocą proporcyj.

METODA SPROWADZANIA DO JEDNOŚCI.

Zadanie na regułę trzech złożoną można rozwiązać metodą sprowadzania do jedności. Postępowanie to składa się z kolejnego rozwiązywania tą metodą oddzielnych zadań na regułę trzech (§ 32, us. 3), na które dane zadanie się rozkłada. Tych częściowych zadań na regułę trzech nie wypisujemy [1]), lecz przeprowadzamy odpowiednie rozumowanie, mając przed oczyma dane zadanie na regułę trzech złożoną. Cała robota przedstawi się piśmiennie tak:

odw.	odw.	wpr.	wpr.	
15 tk.	9 g.	2400 *m*	15 *dm*	32 d.
24 „	8 „	3600 „	18 „	*x* „
15 tk.	9 g.	2400 *m*	15 *dm*	32 d.
1 „	1 „	1 „	1 „	$\frac{32\times15\times9}{2400\times15}$ d.
24 „	8 „	3600 „	18 „	$\frac{32\times15\times9\times3600\times18}{2400\times15\times24\times8}$ d.

$$x \text{ dni} = \frac{32\times15\times9\times3600\times18}{2400\times15\times24\times8} \text{ d.} = 40{,}5 \text{ dnia.}$$

Wyznaczywszy tu, tak jak w ustępie 1-ym, które wielkości są wprost, a które odwrotnie proporcyjonalne względem ilości dni, dalsze rozumowanie przeprowadzimy w ten sposób. Ponieważ 15 tk., pracując po 9 g. codziennie, może utkać 2400 *m* płótna, szerokiego na 15 *dm*, w ciągu 32 dni, to, jeżeli ma pracować 1 tk. (zamiast 15 tk.), wypadnie ilość dni (32 d.) pomnożyć przez 15 [2]); jeżeli on ma pracować 1-nę godzinę codziennie (zam. 9-u g.), to wypadnie ilość dni pomnożyć przez 9; jeżeli ma utkać 1 *m* (zam. 2400-u *m*), to wypadnie ilość dni podzielić przez 2400, a jeżeli to płótno ma być szerokie na 1 *dm* (zam. 15 *dm*), to wypadnie ilość dni podzielić przez 15. Wiemy więc, że 1 tk., pracując codziennie 1 g., aby utkać 1 *m* płótna, szerokiego na 1 *dm*, potrzebuje $\frac{32\times15\times9}{2400\times15}$ d. [3]).

---

[1]) Jak i przy wynajdywaniu niewiadomej zapomocą postępowania takiego, jak w us. 2-im, albo jak w us. 3-im—gdy już nabędziemy dostatecznéj wprawy w wypowiadaniu wprost z wypisanego zadania na regułę trzech złożoną oddzielnych zadań na regułę trzech, na które dane zadanie może być rozłożone.

[2]) Por. us. 3, § 32.

[3]) Ułamek dnia mniejszy od jedności będzie w tym razie jednoznaczny z takimże ułamkiem godziny.

Wskutek tego, jeżeli ma pracować 24 tk. (zamiast 1-go tk.), to wypadnie ilość dni podzielić przez 24; jeżeli oni mają pracować po 8 g. (zam. po 1-néj g.) dziennie, to wypadnie i t. d.

Oczywiście, że dochodzimy do tegoż samego wypadku, co w us. 2-im.

SZCZEGÓLNY WARUNEK DODATKOWY.

5. W zadaniu naszym (por. us. 1) druga partyja tkaczy (24 tk.) tkała płótno «tegoż gatunku», co piérwsza partyja (15 tk.). Gdyby jednak zamiast tego było powiedziane np. «płótna, które ma wyrobić druga partyja, można utkać 2 *m* w ciągu takiego czasu, jakiego potrzeba dla utkania 3 *m* płótna, wyrabianego przez piérwszą partyją tkaczy», to z tego warunku wypada, że dla utkania każdego metra płótna druga partyja potrzebuje $\frac{3}{2}$ tego czasu, co piérwsza. Dlatego, gdyby do zadania ten warunek był dodany, to najdogodniéj [1]), znalazszy ilość dni w przypuszszeniu, że obie partyje tkają płótno jednakowego gatunku, pomnożyć ją następnie przez tę liczbę $\frac{3}{2}$.

UWAGA OGÓLNA O ZADANIACH ARYTMETYCZNYCH.

6. Ponieważ zadanie na regułę trzech złożoną jest złożone z zadań na regułę trzech, przeto, ogólnie używając wyrażenia: «reguła trzech», rozumiéć nadal będziemy, iż ono obejmuje w sobie także regułę trzech złożoną.

Wszystkie [2]) zadania arytmetyczne, oile nie sprowadzają się wyłącznie do dodawania lub odejmowania [3]), lub nie są zadaniami na obliczenie średniéj arytmetycznéj (§ 7, us. 25), są zadaniami na regułę trzech, lubteż do takich zadań się sprowadzają. Dlategoteż sposoby postępowania, wskazywane w regule trzech, właściwie są nam już znane z poprzedniéj nauki i z przerabianych zadań. Tu tylko z tych sposobów zdaliśmy sobie należytą sprawę.

Zauważymy przy téj sposobności, że, przerabiając rachunki w celu rozwiązania różnych zadań arytmetycznych, wykonywamy na liczbach całkowitych lub ułamkowych (§ 17, us. 2) takie działania: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Dlatego te działania nazywają się cztérema działaniami arytmetycznemi.

---

[1]) Możnaby go wprowadzić do zadania, jako dwie wartości wielkości: prędkość w robocie, ale w takich razach rozumowanie często jest bałamutne dla uczniów.

[2]) Oczywiście nie mamy tu na myśli zadań na mechaniczne wyliczénia, np. sumę dwu liczb podzielić przez trzecią, od ilorazu odjąć czwartą i t. d., i innych podobnych.

[3]) Jako działań, sprowadzających się bezpośrednio do liczenia (§ 4, us. 2; § 5, us. 2),

ROZDZIAŁ XI.

REGUŁY SZCZEGÓLNE.

JAK POJMOWAĆ NALEŻY SZCZEGÓLNE «REGUŁY».

Rozważaliśmy zadania tego rodzaju, iż wprost do podanych zadań można było zastosować metody i prawidła w poprzedzającym rozdziale wyłożone. Wynikało to z tego, iż w oddzielnym takim zadaniu były dane wartości wielkości, czyto wprost, czytéż odwrotnie proporcyjonalnych względem téj wielkości, któréj jedna wartość była szukana.

Może być jednak zadanie takie, iż wprawdzie wielkości, których wartości są podane w wysłowieniu zadania, nie są ani wprost, ani też odwrotnie proporcyjonalne względem siebie, ale można tak zadanie przekształcić, iż ono sprowadzonym zostanie do zadania, w którym już będziemy mieli do czynienia tylko z wielkościami albo wprost, albo też odwrotnie proporcyjonalnymi względem siebie. Innymi słowy, może być ono sprowadzone do zadania na regułę trzech. Zbiór wskazówek i objaśnień rozwiązywania oddzielnéj grupy takich zadań stanowi odpowiednią «regułę» szczególną, np. regułę procentu, regułę podziału proporcyjonalnego i t. d.

Zadania, podpadające pod każdą taką regułę szczególną, mają pewne właściwości, które początkowo były istotną przyczyną oddzielnego takich zadań traktowania. Ale jednak w dawniejszych książkach w wydzielaniu różnych grup zadań kierowano się nie zasadniczym powodem, t. j. nie sposobem sprowadzania takich zadań do zadań na regułę trzech, lecz głównie względem na treść ich, t. j. na przedmioty, do których się zadania odnoszą. Dochodziło np. do tego, iż podawano osobno regułę o wełnie, regułę o rodzynkach i t. p. [1]).

Ślad takiego pojmowania potrzeby wydzielania oddzielnych grup zadań pozostał dotąd, chociaż dziś podstawą główną oddzielnych reguł tworzy rodzaj postępowania, które przeprowadzić należy, aby zadania

[1]) Zob. np. we wstępie historycznym ustęp o książkach Kłosa i Wojewódki.

sprowadzić do zadań na regułę trzech. Mianowicie jeżeli np. niektóre z zadań na obliczanie odsetek wymagają potrzeby przekształcenia takich zadań na zadania na regułę trzech, to już wszystkie zadania na obliczanie procentu, lub odsetek, choćby one odrazu przedstawiały się jako zadania na regułę trzech, zaliczamy do zadań na szczególną «regułę procentu»; i t. p. Objaśnia się to doniosłością odpowiednich zadań w życiu praktycznym.

---

§ 34. REGUŁA PROCENTU.

OGÓLNE OKREŚLENIE ZADAŃ NA REGUŁĘ PROCENTU.

1. W niektórych zadaniach na regułę trzech jedna z wartości danych (albotéż wartość wprowadzana podczas rachunku dla otrzymania odpowiedzi) jest zwykle taż sama, mianowicie, według zwyczaju powszechnego, jest ona wyrażana jako 100 jednostek; takie zadania nazywamy zadaniami na regułę procentu [1]). Owóż, *takie zadanie, w których, według przyjętego zwyczaju, jedna z wartości, albo dana w zadaniu, albotéż wprowadzona podczas rachunku, jest wyrażona jako 100 jednostek, nazywamy zadaniem na regułę procentu* [1]).

Zbiór objaśnień i wskazówek rozwiązywania takich zadań stanowi regułę procentu.

Tak np. jeżeli obliczamy, ile trzeba papiéru drukowego na książkę, mającą 20 arkuszy druku, a odbijaną w 1600 egzemplarzach, to musimy wziąć na uwagę, że podczas druku pewna ilość arkuszy papiéru zepsuje się; gdy pod tym względem umawiamy się z zarządem drukarni, to powiedzą nam, że trzeba na to liczyć np. 5 «od sta», czyli 5 «procent», t. j. że nad każde 100 arkuszy papiéru trzeba jeszcze na zepsucie liczyć 5 arkuszy. Jeżeli więc nad 100 arkuszy trzeba liczyć 5 arkuszy. Jeżeli więc nad 100 arkuszy trzeba liczyć 5, to ile arkuszy trzeba liczyć nad 32 000 ark. Rozwiązawszy to zadanie na regułę procentu,

$$\begin{array}{r} 100 \text{ ark.} \text{ —— } 5 \text{ ark.} \\ 32000 \text{ „ —— } x \text{ „} \\ \hline x = \frac{5 \cdot 32000}{100} = 1600, \end{array}$$

[1]) Z łacińskiego «procento» od sta.

powiemy, że: 5 procent od 32000 ark. jest 1600 ark. Zamiast pisać «procent», albo «od sta», piszemy znak %; owóż, tę odpowiedź napiszemy: 5% od 32000 ark. jest 1600 ark.

Podobnie np. jeżeli chcemy się dowiedzieć, czy w Warszawie umiejętność czytania i pisania jest więcéj rozpowszechniona pośród mężczyzn, czyteż pośród kobiet, i w jakim stosunku, a chcemy to wyrachowanie oprzeć na liczbach, otrzymanych podczas spisu jednodniowego ludności Warszawy, dokonanego w dniu 9 lutego r. 1882, mianowicie na tym, że pośród ludności [1]) zamieszkałéj w Warszawie (t. j. nie licząc osób czasowo przyjezdnych i wojska) okazało się, iż na 181 362 osoby płci męskiej umiało czytać i pisać 94 868 mężczyzn, a na 201 602 osoby płci żeńskiéj umiało czytać i pisać 80 664 kobiety, to należy naprzód wyznaczyć, ile na pewną tę samę liczbę osób, czyto płci żeńskiéj, czytéż męskiej przypada umiejących czytać i pisać. I w takim wyrachowaniu, jako ową stałą liczbę przyjmujemy zwykle liczbę 100. Znajdziemy więc (§ 21, us. 13), rozwiązując następujące zadania na regułę procentu:

181 362 m. —— 94 868 m.
100 „ —— x „

$$x = \frac{94868 \times 100}{181362} = 52,$$

201 602 k. —— 80 664 k.
100 „ —— x „

$$x = \frac{80664 \times 100}{201602} = 40,$$

że w Warszawie pośród mężczyzn jest 52%, a pośród kobiet jest 40% umiejących czytać i pisać, tak iż stosunek rozpowszechnienia umiejętności czytania i pisania pośród mężczyzn i pośród kobiét w Warszawie [2]) jest 52 : 40, czyli 13 : 10.

Podobnie z «procentem» spotykamy się przy różnych kwestyjach. Np. mówimy, że w powietrzu jest tlenu 21% objętości, że mamy 5% (pięcioprocentowy) rozczyn kwasu karbolowego, że w pewnym mieście przyrost roczny ludności wynosi 1,5% i t. d.

Najczęściéj jednak «procent» występuje w różnych zadaniach, odnoszących się do stosunków handlowych i przemysłowych, tak przy obrotach pieniężnych, jak i przy kupnie i sprzedaży towarów. W takich zadaniach na regułę procentu spotykamy się ze szczególnymi nazwami, odpowiadającymi czynionym tranzakcyjom. Tak np. rabat oznacza, przy nabywaniu większéj ilości towaru, ustępstwo na rzecz kupującego; prowizya lub komisowe oznacza wynagrodzenie za wykonanie pewnego

---

[1]) Wraz z dziećmi.

[2]) Wyznaczywszy jeszcze np. dwie cyfry dziesiętne, otrzymamy dokładniéj 52,31% i 40,01%; t. j. (por. przypisek do us. 3-go, § 16-go), iż na 10 000 osób płci męskiéj umie czytać i pisać 5231 a na 10 000 osób płci żeńskiéj umié czytać i pisać 4001.

Inne byłoby zadanie: jaki jest w Warszawie stosunek ilości mężczyzn, umiejących czytać i pisać, do ilości kobiet, umiejących czytać i pisać (94868 : 80664).

polecenia; kurtaż oznacza wynagrodzenie płacone meklerowi giełdowemu lub agentowi handlowemu za pośrednictwo w interesie, przy jego udziale załatwionym; dywidenda oznacza zysk w przedsiębiorstwie, prowadzonym przez pewne «towarzystwo», przypadający do podziału po zatwierdzeniu rachunków rocznych; ażjo przedstawia przy zamianie monety złotéj na srebrną, lub każdéj z nich na papierową, różnicę między ilością jednostek pieniężnych, otrzymywanych przy takiéj zamianie, a ilością takichże jednostek oddanym za nie; tara oznacza wagę opakowania towaru [waga netto jestto waga towaru bez opakowania; netto plus tara stanowi wagę brutto]; nawaga oznacza ustępstwo na wadze przy sprzedaży towaru hurtowéj na sprzedaż detaliczną i t. d.

Zajmiemy się bliżéj rozważaniem zadań na obroty pieniężne.

OBROTY PIENIĘŻNE BEZ UWZGLĘDNIENIA CZASU.

2. Najczęściéj z zadaniami na regułę procentu spotykamy się przy różnych obrotach pieniężnych, dokonywanych przez przemysłowców, kapitalistów i handlujących.

Weźmiemy naprzód na uwagę zadania, w których nie ma się względu na przeciąg czasu, w jakim ów obrót się dokonywa. Wtedy do zadania wchodzą:

kapitał pewien,

100 jednostek kapitału,

procent (t. j. zarobek, strata, wynagrodzenie i t. p. od 100 jednostek kapitału) i

kwota pieniężna, któréj stosunek do procentu jest równy stosunkowi owego kapitału do 100 jego jednostek. Nazywają ją niekiedy również «procentem» (rozumiejąc przez to: procent od całego kapitału), rzadziéj zaś «procentami», a niekiedy także «prowizyją», albo też wprost «dochodem». Od niejakiego jednak czasu dość często mówią także «odsetki» [1]); tego wyrazu będziemy tu używali. Odsetki więc dane lub szukane są jedną wartością téjże wielkości, któréj drugą wartością jest procent. Innymi słowy, procent jest szczególną wartością odsetek, odpowiadającą 100 jednostkom kapitału.

Ponieważ odsetki od jakiegokolwiek kapitału przedstawiają kwotę,

---

[1]) Używać więc tu będziemy: procent jako odpowiadający 100 jednostkom kapitału, a odsetki jako odpowiadające jakiéjkolwiek ilości jednostek kapitału.

[Nie używamy tego wyrazu w liczbie pojedyńczéj: «odsetka», mającego wtedy zastępować: procent. Mimo bowiém czynionych usiłowań, nie przyjęło się to, jako niezręczne w użyciu. Trudno wyraz procent zastąpić wyrazem odsetka, choćby w tak prostych wyrażeniach: oddał swój kapitał na 5 procent, zarobił na sprzedaży towaru 15 procent.]

tyle razy większą od procentu, ile razy kapitał jest większy od 100 jednostek kapitału, przeto (§ 31, us. 3): *kapitał i odsetki są wielkościami wprost proporcyjonalnymi względem siebie.*

Z powyższych czterech liczb jedna (t. j. 100 jednostek kapitału) jest stała; w odpowiednich więc zadaniach z trzech liczb pozostałych jedna może być niewiadoma t j. mogą być niewiadome albo odsetki, albo procent, albotéż kapitał.

Jeżeli powiemy wogóle, że w kapitale jest k jednostek (takich samych jak w stałéj liczbie 100 jednostek), że liczby wyrażające procent i odsetki, są odpowiednio p i o jednakowych jednostek, to te trzy zadania możemy ogólnie tak przedstawić:

A). $100 \text{ —— } p$ B). $k \text{ —— } o$ C). $p \text{ —— } 100$
$k \text{ —— } x$ $100 \text{ —— } x$ $o \text{ —— } x$

Odsetki i kapitał są wielkościami wprost proporcjonalnymi. Z tych więc zadań wypada (§ 32, us. 2), że odpowiednio

A). x, t. j. $o = \frac{k.p}{100}$; B). x, t. j. $p = \frac{100.o}{k}$; C). x, t. j. $k = \frac{100.o}{p}$.

Z jednej którejkolwiek z tych odpowiedzi można wyprowadzić pozostałe dwie. Tak np. z pierwszéj, według któréj: *odsetki równają się setnéj części iloczynu kapitału i procentu*, wypada, iż 100 razy powiększone odsetki przedstawiają iloczyn dwu czynników, z których jednym jest kapitał, innym zaś procent, a więc (§ 7, us. 5): *procent równa się 100 razy powiększonym odsetkom, podzielonym przez kapitał; kapitał równa się 100 razy powiększonym odsetkom, podzielonym przez procent* [1]). Np.

1). a. Kupiec kupił towaru za 280 rub., a sprzedając, miał zarobku 15%; ile na tym towarze zarobił?

$$\begin{array}{l} 100 \text{ rub.} \text{ —— } 15 \text{ rub.} \\ 280 \text{ „ —— } x \text{ „} \end{array}$$

$$x = \frac{15.280}{100} = 42.$$

Odp. Zarobił na tym towarze 42 ruble.

Można to zadanie inaczej rozwiązywać. Kiedy na 100-u rublach kupiec zarabia 15 rubli, to na 1 rublu i t. d. (§ 32, us. 3).

$$\begin{array}{l} 100 \text{ rub.} \text{ —— } 15 \text{ rub.} \\ 1 \text{ „ —— } 0{,}15 \text{ „} \\ 280 \text{ „ —— } 0{,}15 \text{ rub.} \times 280 = 42 \text{ rub.} \end{array}$$

[1]) Niéma co tych wysłowień zapamiętywać; i bez tego bardzo łatwo każde takie zadanie rozwiązać.

Albo: Kiedy na 100-u rublach zarabia 15 rub., to na 2.8 setkach rubli zarabia 2,8 raza więcej

100 rub. —— 15 rub.
280 rub. —— 15 rub. × 2,8 = 42 rub.

Albotеż można zastosować praktykę włoską (§ 32, us. 4),

100 rub. —— 15 rub.
100 „ —— 15 „
20 „ —— 3 „
60 „ —— 9 „
42 rub.

Albo: Od 280 rub. po 1% —— 2,8 rub.
„ „ „ 2% —— 5,6 „
„ „ „ 2% —— 5.6 „
„ „ „ 10% —— 28 „
42 rub.

Moglibyśmy także ułożyć proporcyją zadania (§ 32, us. 2)

$$x : 15 = 280 : 100$$
$$x = \frac{15 \times 280}{100} = 42$$

Taksamo rozwiązywać możemy zadania:

b. Kupiec na towarze, za który zapłacił 280 rub., zarobił 42 rub.; jaki ten zarobek przedstawia procent od kapitału, wyłożonego na kupno owego towaru?

c. Kupiec na sprzedaży pewnego towaru zarobił 42 rub., które przedstawiają zarobku 15%; ile on za ten towar zapłacił?

2) Podobnie rozwiązalibyśmy np. zadania:

aa. Kupiec kupił towaru za 280 rub., a sprzedając, poniósł straty 15%; ile na tym towarze stracił?

bb. Kupiec na towarze, za który zapłacił 280 rub., stracił 42 rub.; jaki ta strata przedstawia procent od kapitału, wyłożonego na kupno owego towaru.

cc. Kupiec na sprzedaży pewnego towaru stracił 42 rub., które przedstawiają straty 15%; ile ou za ten towar zapłacił?

3. Niekiedy w takich zadaniach, zamiast kapitału, od którego się liczą odsetki, występuje suma pieniężna, przedstawiająca albo kapitał wraz z odsetkami, albotеż kapitał po potrąceniu z niego odsetek.

1) Weźmy naprzód na uwagę piérwszy z tych przypadków, t. j. kiedy w zadaniu jest dana suma pieniężna, przedstawiająca kapitał wraz z odsetkami. Np.

a. Kupiec, sprzedając towar za 322 rub., miał zarobku 15%; ile on na tym towarze zarobił? — Tu suma 322 rub. przedstawia kapitał, wyłożony na kupno towaru, wraz z zarobkiem, osiągniętym przy sprzedaży; a więc téj sumy drugą wartością nie będzie 100 rub.. lecz 115 rub. Mamy więc tu zadanie:

115 rub. —— 15 rub.
322 „ —— x „

$$x = \frac{15 . 322}{115} = 42.$$

Tu 115 rub. i 322 rub. są wartościami sumy pieniężnéj, złożonéj z kapitału, proporcyjonalnego względem odsetek, i odsetek od tegoż kapitału. Ponieważ, ile razy ta suma jest większa, tyle razy są większe odsetki od kapitału, zatym (§ 31, us. 3), ta *suma pieniężna, przedstawiająca kapitał wraz z odsetkami, i odsetki są wielkościami wprost proporcyjonalnymi względem siebie.* — Odp. Zarobek wynosi 42 rub.

Stosując tu metodę sprowadzania do jedności, rozumowalibyśmy tak: w 115 rub. jest zysku 15 rub., a więc w 1 rub. i t. d.

115 rub. —— 15 rub.

1 „ —— $\frac{15}{115}$ rub.

322 rub. —— $\frac{15}{115}$ rub. $\times$ 322 = 42 rub.

Moglibyśmy także z zadania ułożyć proporcyją i rozwiązać ją:

$$x : 15 = 322 : 115$$

$$x = \frac{15 \times 322}{115} = 42.$$

Z liczb tego zadania możemy utworzyć jeszcze zadania następujące:

b. Kupiec na towarze, który sprzedał za 322 rub., zarobił 42 rub.; jaki ten zarobek przedstawia procent od kapitału, wyłożonego na kupno owego towaru?

c. Kupiec na sprzedaży pewnego towaru zarobił 42 rub., które przedstawiają zarobek 15%; za ile on ten towar sprzedał?

Może tu być nadto [1]) zadanie:

d. Kupiec na towarze, który sprzedał za 322 rub., zarobił 15%; za ile on ten towar kupił? — Rozumując taksamo, jak przy zadaniu a.,

[1]) Zadanie: Kupiec za towar zapłacił 280 rub., a sprzedał go za 322 rub.; jaki procent od wyłożonego kapitału przedstawia zarobek, na sprzedaży towaru osiągnięty? należy sprowadzić do zadania b., odejmując 280 rub. od 322 rub.

doszlibyśmy do wniosku, że *suma pieniężna, przedstawiająca kapitał wraz z odsetkami, i kapitał są wielkościami wprost proporcyjonalnymi względem siebie.* Zamiast więc rozwiązywać zadanie a. i następnie znaleziony zarobek (42 rub.) odejmować od sumy danéj w zadaniu, możemy wprost, ułożywszy zadanie obok wypisane [1]), rozwiązać je.

115 rub. —— 100 rub.
322 „ —— x „

$$x = \frac{100 \cdot 322}{115} = 280.$$

Widzimy więc, że rozwiązywanie powyższych zadań [2]) nie przedstawia trudności.

2) Weźmy teraz na uwagę drugi ze wzmiankowanych przypadków, kiedy w zadaniu jest dana suma pieniężna, przedstawiająca kapitał po potrąceniu z niego odsetek.

aa. Kupiec, sprzedając towar za 238 rub., poniósł straty 15%; ile on na tym towarze stracił? — Ta suma 238 rub. przedstawia kapitał, wyłożony na kupno towaru po potrąceniu z niego straty, poniesionéj przy sprzedaży; a więc téj sumy drugą wartością nie będzie 100 rub., ale 85 rub. Mamy więc tu zadanie:

85 rub. —— 15 rub.
238 „ —— x „

$$x = \frac{15 \cdot 238}{85} = 42.$$

Tu 85 rub. i 238 rub. są wartościami sumy pieniężnéj powstałéj z kapitału (proporcyjonalnego względem odsetek) po potrąceniu z niego tych odsetek. Ile razy ta suma pieniężna jest większa, tyle razy są większe odsetki, a zatym (§ 31, us. 3) ta *suma pieniężna, przedstawiająca kapitał po potrąceniu odsetek, i odsetki są wielkościami wprost proporcyjonalnymi względem siebie.* — Odp. Strata wynosi 42 rub.

Stosując tu metodę sprowadzania do jedności, powiemy: na każdych 85-u rub. osiągniętych ze sprzedaży jest 15 rub. straty, a więc na 1-ym rublu i t. d.

85 rub. —— 15 rub.

1 „ —— $\frac{15}{85}$ „

238 „ —— $\frac{15}{85}$ rub. $\times$ 238 = 42 rub.

---

[1]) Taksamo moglibyśmy rozwiązać także zadanie odwrotne: Kupiec na towarze, który kupił za 280 rub., zarobił 15%; za ile on ten towar sprzedał.

[2]) Procent w tego rodzaju zadaniach niektórzy od dość już dawna nazywają procentem «na sto» (z niemiecka: auf hundert), co rodzi w uczących się myśl, jakgdyby to było coś innego, niż procent od sta. Tymczasem różnica tych zadań od zadań w us. 2 polega nie na różnicy w pojmowaniu procentu, lecz na tym, czy do zadania wchodzi kapitał, czy też kapitał wraz z odsetkami. Dlatego, jeżeli idzie o rozróżnianie tych zadań, to lepiej je scharakteryzujemy, gdy je rozróżnimy według tego, czy w nich mamy rozumieć sam *kapitał*, czytéż *kapitał wraz z odsetkami* (odsetki zaś tak w jednym jak w drugim zadaniu przedstawiają zawsze kwotę, powstałą z obliczenia procentu *od sta* każdego).

Moglibyśmy również z zadania ułożyć proporcyją:

$$x : 15 = 238 : 85 \qquad \text{stąd}$$

$$x = \frac{15 \times 238}{85} = 42.$$

Z liczb tego zadania możemy utworzyć jeszcze zadania następujące:

bb. Kupiec na towarze, który sprzedał za 238 rub., stracił 42 rub.; jaki ta strata przedstawia procent od kapitału, wyłożonego na kupno owego towaru?

cc. Kupiec na sprzedaży pewnego towaru stracił 42 rub., które przedstawiają straty 15%; za ile on ten towar sprzedał?

Może tu być nadto [1]) zadanie:

dd. Kupiec na towarze, który sprzedał za 238 rub., stracił 15% za ile on ten towar kupił? — Rozumując tak samo, jak przy zadaniu aa., doszlibyśmy do wniosku, że *suma pieniężna, przedstawiająca kapitał po potrąceniu z niego odsetek, i kapitał są wielkościami wprost proporcyjonalnymi względem siebie* [2]). Zamiast więc rozwiązywać zadanie aa. i następnie znalezioną stratę (42 rub.) dodawać do sumy danéj w zadaniu, możemy wprost, ułożywszy zadanie obok wypisane [3]), rozwiązać je.

85 rub. —— 100 rub.
238 „ —— x „

$$x = \frac{100 \cdot 238}{85} = 280.$$

Widzimy więc, że także rozwiązywanie powyższych zadań [4]) nie przedstawia trudności.

---

[1]) Zadanie: Kupiec za towar zapłacił 280 rub., a sprzedał go za 238 rub.; jak procent od wyłożonego kapitału przedstawia strata, przy sprzedaży tego towaru poniesiona? należy sprowadzić do zadania bb., odejmując 238 rub. od 280 rub.

[2]) Ponieważ kapitał jest proporcyjonalny względem odsetek, a wartościom k i 100 kapitału odpowiadają wartości o i p odsetek (us. 2) przeto mamy (§ 31, us. 3)

$$k : 100 = o : p$$

skąd wprost wynikają (§ 30, us. 11) własności pewyżej zaznaczone:

$$(k + o) : (100 + p) = o : p, \qquad (k + o) : (100 + p) = k : 100,$$
$$(k - o) : (100 - p) = o : p, \qquad (k - o) : (100 - p) = k : 100.$$

[3]) Taksamo moglibyśmy rozwiązać także zadanie odwrotnie: Kupiec na towarze, który kupił za 280 rub., stracił 15%; za ile on ten towar sprzedał?

[4]) Procent w tego rodzaju zadaniach niektórzy odniedawna nazywają procentem «w stu», lub «w sto» (również z niemiecka: in hundert), o czem można zrobić podobną uwagę, jak powyżej o tak zw. procencie «na sto». Chcąc wyróżnić te zadania, lepiej je scharakteryzujemy, mówiąc, że w nich mamy *kapitał po potrąceniu odsetek* (odsetki zaś przedstawiają zawsze kwotę, która powstaje z procentu *od sta*, t. j. od wszystkich setek całego kapitału).

[Sądzę, że nic nie stracimy, obywając się, podobnie, jak up. Francuzi, bez dziwacznych wyrażeń: procent na sto, procent w sto, obliczam procent w stu i t. d. (dziwacznych dlatego, że sam wyraz procent znaczy: od sta), tymwięcéj, że rzecz daleko jaśniéj się przedstawi, gdy zamiast tego zaznaczać będziemy wyraźnie, iż ową sumę uważamy nie jako kapitał, lecz odpowiednio jako kapitał z odsetkami, lub kapitał po potrąceniu odsetek. Będzie

Rozwiążmy jeszcze następujące zadanie złożone:

Jaką cenę powinien naznaczyć kupiec hurtowy za funt towaru, który go kosztuje 2 rub., aby zarobił na nim 20% od ceny kosztu i mógł kupcom detalicznym dać rabatu 20% od ceny osiąganéj przy sprzedaży. Rozwiązując tu kolejno zadania [1]):

100 kop. —— 120 kop.	80 kop. —— 100 kop.
200 „ —— x „	240 „ —— x „
$x = 240$,	$x = 300$,

znajdujemy naprzód, że cena funta, w któréjby się mieściło zarobku 20% rachowanego od ceny kosztu, a więc cena, po któréj kupiec hurtowy oddaje detalicznemu funt tego towaru, wynosi 2 rub. i 40 kop., a następnie, że cena, osiągana przy sprzedaży przez kupca detalicznego, z któréj po ustępstwie 20% pozostałoby 2 rub. i 40 kop., wynosi 3 rub. Należy więc funt tego towaru sprzedawać w handlu detalicznym po 3 ruble.

4. Z tego, cośmy tu (us. 1—3) mówili, wypada, że, mając zadanie na obliczanie odsetek, należy się przedewszystkim nad tym zastanowić, czy suma dana w zadaniu przedstawia kapitał, czy kapitał z odsetkami, czytéż kapitał po potrąceniu odsetek.

Aby wykazać, jaka pod tym względem zachodzi różnica, przypuśćmy, że od 100 jednostek kapitału otrzymujemy jako odsetki 4 jednostki wtedy mówimy, że mamy 4% od kapitału.

Jeżelibyśmy te 100 jednostek uważali jako kapitał wraz z odsetkami, któreto odsetki wynoszą 4 takież jednostki, to ta suma 100 jednostek składałaby się z 96 jednostek kapitału i 4 jednostek odsetek. Chcąc się tu dowiedzieć: jaki procent przedstawiają 4 jednostki odsetek od 96 jednostek kapitału, mielibyśmy zadanie B. us. 2-go, które rozwiązując, znaleźlibyśmy, że: 4 jednostki odsetek od 96 kapitału przedstawiają $4\frac{1}{6}$% od kapitału.

96 —— 4
100 —— x
$x = \frac{4 \cdot 100}{96} = 4\frac{1}{6}$.

---

to nadto zgodne z tym, że w rzeczywistości procent jest tylko od sta; używanie zaś wyrażeń bałamutnych: procent na sto, procent w stu może wyjść niekiedy na szkodę interesanta, nie rozumiejącego, że tu idzie nie o inne pojmowanie procentu, lecz właściwie o inne uważanie owéj sumy pieniężnéj, do czego przyczynia się jeszcze i to, że używających owych nazw dziwnych, kapitałem także niekiedy nazywają to, co jest właściwie kapitałem z odsetkami, lub kapitałem po potrąceniu odsetek].

[1]) Możnaby także, rozwiązawszy zadanie (A.):

100 kop. —— 20 kop.
200 „ —— x „
$x = 40$,

znalezione 40 kop. dodać do 200 kop., a następnie, rozwiązawszy zadanie (takie jak wyżéj aa.):

80 kop. —— 20 kop.
240 „ —— x „
$x = 60$,

znalezione 60 kop. dodać do 240 kop. Otrzymamy więc 3 ruble

Jeżelibyśmy zaś owe 100 jednostek uważali jako kapitał, pozostały po odtrąceniu odsetek, któreto odsetki wynoszą 4 takież jednostki, to ta suma 100 jednostek byłaby różnicą między kapitałem 104 jednostki i 4-ma jednostkami odsetek. Chcąc się tu dowiedzieć: jaki procent przedstawiają 4 jedaostki odsetek od 104 jednostek kapitału, mielibyśmy również zadanie B. us. 2-go i znaleźlibyśmy, że: 4 jednostki odsetek od 104 jednostek kapitału przedstawiają $3\frac{11}{13}$ % od kapitału. —

104 —— 4
100 —— x

$x = \frac{4 \cdot 100}{104} = 3\frac{11}{13}$.

W ostatnim np. zadaniu ustępu poprzedzającego 20% od ceny, osiąganéj przy sprzedaży przez kupca detalicznego, przedstawia jednocześnie dla niego 25% zarobku od ceny kosztu, przezeń poniesionego t. j. od kapitału, wyłożonego przezeń na kupno funta owego towaru). Podobnie 20% zarobku, otrzymane przez kupca hurtowego przy sprzedaży tego towaru, stanowi $16\frac{2}{3}$% téj sumy, którą on za ten towar otrzymał. —

Jeżeli ktoś wypożyczył na rok 200 zł. i procent 4% rocznie potrącił sobie z góry, to po roku otrzymał włożoną w ten obrót sumę 192 zł. i od nich 8 zł. odsetek; pobierał więc właściwie $4\frac{1}{6}$%.

5. Jeżeli w zadaniu, w którym odsetki zależą już wprawdzie od przeciągu czasu, za jaki są liczone, przeciąg czasu pozostaje ten sam, nie zmienia się, to zadanie takie sprowadza się oczywiście do zadań poprzednio rozważanych.

Np. Jaki procent rocznie będzie miał ten, kto kupi pięcio-procentowe papiéry publiczne według kursu 84 za 100? [Tu wyraz «pięcioprocentowe» oznacza, że owe papiéry zawsze przynoszą rocznie 5 jednostek «gotówką» od 100 jednostek nominalnéj (t. j. wypisanéj na nich) wartości; «kurs za 100» oznacza, po jakiéj cenie (gotówką) można nabyć każde 100 jednostek nominalnéj wartości.] — Wyłożone tu na ich kupno każde 84 jednostki przyniosą rocznie jako odsetki 5 jednostek. Mamy więc tu zadanie B. us. 2-go. Rozwiązawszy je, znajdziemy, że nabywca tych papierów będzie miał $5\frac{20}{21}$ % od kapitału, wyłożonego na ich kupno.

84 —— 5
100 —— x

$x = \frac{5 \cdot 100}{84} = 5\frac{20}{21}$.

OBROTY PIENIĘŻNE Z UWZGLĘDNIENIEM CZASU.

6. Zadania na regułę procentu, wymagające uwzględnienia przeciągu czasu, w ciągu którego dokonywa się pewnego obrotu sumą pieniężną, odnoszą się albo do kapitałów, umieszczonych na czas dłuższy w pewnym przedsiębiorstwie, albotéż do wynagrodzenia, które pobiéra

osoba, udzielająca swego kapitału (wierzyciel) od osoby, biorącéj ów kapitał (dłużnika) na pewien czas, za korzystanie przez ten czas z owego kapitału.

Przy obrachunkach tego rodzaju przyjmuje się za podstawę wysokość dochodu od 100 jednostek kapitału zwykle za przeciąg 1 roku [1]), co się nazywa «stopą procentu». Zatym stopa procentu jest to samo, co procent (us. 2) za przeciąg jednego roku. — Na oznaczenie stopy procentu używa się również znaku %, tak iż np. 5% oznaczać będzie w takich zadaniach toż samo, co «5 jednostek dochodu od 100 jednostek kapitału za 1 rok».

Całkowity dochód od pewnego kapitału za pewien przeciąg czasu nazywają «procentem», «procentami» albo «odsetkami». Używać tu będziemy tego ostatniego wyrazu. (Stopa procentu jest wartością szczególną odsetek, odpowiadającą 100 jednostkom kapitału umieszczonym na 1 rok.)

Jeżeli mamy np. zadanie: Jakie odsetki przyniesie w ciągu 3 lat kapitał 3000 zł. umieszczony po 5%?, to moglibyśmy naprzód obliczyć (us. 5, 2) odsetki za jeden rok (150 zł.), a następnie, mnożąc znalezioną liczbę przez 3, otrzymalibyśmy, jako odsetki od owego kapitału za 3 lata, 450 zł.

Widzimy więc, że do tego rodzaju zadań wchodzą trzy wielkości: kapitał, ilość lat i odsetki. Tak w powyższym zadaniu dwiema wartościami kapitału były: 3000 zł. i 100 zł.; dwiema wartościami ilości lat: 3 lata i 1 rok; dwiema wartościami odsetek: 450 zł. i 5 zł. Jedne odpowiadające sobie wartości tych trzech wielkości były tu: 100 zł, 1 rok i 5 zł., a drugie: 3000 zł., 3 lata i 450 zł.

Zważmy, że wogóle (por. § 33, us. 1) wciągu tego samego czasu od większego kapitału otrzymamy tyle razy więcéj odsetek, ile razy kapitał jest większy, tak, iż możemy powiedzieć, że *kapitał i odsetki są wielkościami wprost proporcyjonalnymi względem siebie.* — Podobnie, od tego samego kapitału za większą ilość lat otrzymamy tyle razy więcéj odsetek, ile razy ilość lat jest większa. Możemy więc powiedzieć, że *ilość lat i odsetki są wielkościami wprost proporcyjonalnymi względem siebie.* — Nakoniec, też same odsetki od większego kapitału otrzymujemy za tyle razy mniejszą ilość lat, ile razy kapitał jest większy. Możemy przeto powiedzieć, że *kapitał i ilość lat są wielkościami odwrotnie proporcyjonalnymi względem siebie.*

---

[1]) Niekiedy, przy rachunkach szczególnych (np. kary administracyjne za opóźnienie opłaty podatków, rachunki lichwiarskie i t. d.), za przeciąg 1 miesiąca.

Z sześciu liczb, które, jak widzieliśmy, wchodzą do takiego zadania, dwie (t. j. 100 jednostek kapitału i 1 rok) są stałe; w odpowiednich więc zadaniach może być niewiadoma jedna z czterech liczb pozostałych, t. j. mogą być niewiadome albo odsetki, albo stopa procentu, albo kapitał, albotéż ilość lat.

Jeżeli powiemy wogóle, że w kapitale jest k jednostek (takich samych jak w stałéj liczbie 100 jednostek), że liczby, wyrażające stopę procentu i odsetki, są odpowiednio s i o jednostek jednakowych, i że jest l lat, to te cztéry zadania możemy ogólnie tak przedstawić:

	wpr.	wpr.	
A).	100	l	s
	k	l	x

	wpr.	wpr.	
B).	k	l	o
	100	1	x

	odw.	wpr.	
C).	1	s	100
	l	o	x

	odw.	wpr.	
D).	100	s	1
	k	o	x

Wyznaczywszy na mocy tego, cośmy tu wyżéj powiedzieli, które wielkości są wprost, a które odwrotnie proporcyjonalne względem téj wielkości, któréj jednéj wartości szukamy, otrzymujemy [1]) odpowiednio (§ 33, us. 2):

A). x, t. j. $o = \frac{k.l.s}{100}$; B). x, t. j. $s = \frac{100.o}{k.l}$;

C). x, t. j. $k = \frac{100.o}{s.l}$; D). x, t. j. $l = \frac{100.o}{k.s.}$.

Z jednéj któréjkolwiek z tych odpowiedzi [2]) można wyprowadzić pozostałe trzy. Tak np. z piérwszéj, według któréj: *odsetki równają się setnéj części iloczynu kapitału, ilości lat i stopy procentu*, wypada, iż 100

---

[1]) Możnaby te rozwiązania wyprowadzić wprost zapomocą sprowadzenia do jedności (§ 33, us. 4):

A). 100 — 1 r. — s
1 — 1 — $\frac{s}{100}$
k — l — $\frac{s.l.k.}{100} = o$;

B). k — l — o
1 — 1 — $\frac{o}{k.l.}$
100 — 1 — $\frac{o.100}{k.l.} = s$;

C). s — 1 r. — 100
1 — 1 — $\frac{100}{s}$
o — l — $\frac{100.o}{s.l.} = k$;

D). 100 — s — 1 r.
1 — 1 — $\frac{100}{s}$
k — o — $\frac{100.o}{s.k} = l$.

[2]) Gdy w piérwszych trzech opuścimy czynnik l, to one staną się takimi samymi, jak otrzymane w us. 2-im, gdyż wtedy s oznacza to samo, co tam p.

razy powiększone odsetki przedstawiają iloczyn trzech czynników, z których jednym jest kapitał, innym ilość lat, pozostałym zaś stopa procentu. Uważając w tym iloczynie trzech czynników iloczyn dwu z nich jako wyrażenie jednéj liczby, otrzymamy stąd (§ 7, us. 5): *stopa procentu równa się 100 razy powiększonym odsetkom, podzielonym przez iloczyn kapitału i ilości lat; kapitał równa się 100 razy powiększonym odsetkom, podzielonym przez iloczyn stopy procentu i ilości lat; ilość lat równa się sto razy powiększonym odsetkom, podzielonym przez iloczyn kapitału i stopy procentu* [1]). Np.

a. Ile przyniosą w ciągu 3 lat 3000 zł., umieszczone po 5%?

wpr. wpr.
100 zł. —— 1 r. —— 5 zł.
3000 „ —— 3 l. —— x „

$$x = \frac{5 \times 3000 \times 3}{100} = 450.$$

W ciągu tego samego czasu od większego kapitału i t. d. (jak wyżéj) a więc kapitał i odsetki są wielkościami wprost proporcyjonalnymi; od tego samego kapitału i t. d., a więc ilość lat i odsetki są wielkościami wprost proporcyjonalnymi. A zatym (§ 33, us. 2-
$x = 450$, t. j. odsetki wyniosą 450 zł.

Widzieliśmy już na początku tego ustępu, iż, obliczywszy naprzód odsetki od 100 zł. za 3 lata,

1 r. —— 5 zł.
3 l. —— x „

$$x = 5 \times 3 = 15,$$

sprowadzamy zadanie do zadania A us. 2-go,

100 zł. —— 15 zl.
3000 „ —— x „

$$x = 15 \times 30 = 450.$$

wpr. wpr.
3000 zł. —— 3 l. —— 450 zł.
100 „ —— 1 r. —— x „

$$x = \frac{450 \times 100}{3000 \times 3} = 5.$$

b. Według jakiéj stopy umieszczono 3000 zł., które w ciągu 3 lat przyniosły 450 zł.?

Odp. Umieszczono po 5%.

odw. wpr.
1 r. —— 5 zł. —— 100 zł.
3 l. —— 450 „ —— x „

$$x = \frac{100 \times 450}{3 \times 5} = 3000.$$

c. Jaki kapitał, umieszczony po 5%, przynosi w ciągu 3-ch lat 450 zł.?

Odp. 3000 zł.

---

[1]) Dobrze jest umieć przeczytać powyższe ogólnie wypisane rozwiązania, ale niepotrzeba tych wysłowień zapamiętywać: lepiéj, aby uczniowie na każdym tego rodzaju zadaniu przeprowadzali odpowiednie rozumowanie.

odw. wpr.
100 zł. —— 5 zł. —— 1 r.
3000 „ —— 450 „ —— x l.

$$x = \frac{100 \times 450}{3000 \times 5} = 3.$$

d. W ciągu ilu lat 3000 zł., umieszczone po 5%, przynoszą 450 zł.?

Odp. w ciągu 3 lat.

ZADANIA, DO KTÓRYCH WCHODZĄ KAPITAŁY POWIĘKSZONE LUB ZMNIEJSZONE O ODSETKI ZA RÓŻNY PRZECIĄG CZASU.

7. Jak widzieliśmy (us. 3), sumy pieniężne przedstawiające czy to kapitały wraz z dołączonymi do nich odsetkami, czy też kapitały po odtrąceniu z nich odsetek, wrazie kiedy odsetki są liczone za ten sam przeciąg czasu, są proporcyjonalne tak względem samych kapitałów, jak i względem samych odsetek. Rozważmy, czy istnieje podobna zależność wrazie, kiedy odsetki nie są liczoue za ten sam przeciąg czasu.

Jeżeli odsetki, np. przy 5%, dodajemy do kapitału, to po upływie roku w sumie pieniężnéj 105 zł. przedstawiającéj kapitał wraz z odsetkami jest 5 zł. odsetek; po upływie zaś 2 lat, w sumie pieniężnéj 220 zł. jest odsetek 20 zł.

105 zł. —— 1 r. —— 5 zł.
220 „ —— 2 l. —— 20 „

Przypatrując się tym liczbom widzimy, że kiedy ilość lat, za które są liczone odsetki, jest większa 2 razy, to tu odsetki są większe 4 razy, gdy tymczasem suma pieniężna, przedstawiająca kapitał wraz z odsetkami, w całkiem innym zmieniła się stosunku. To samo wypadłoby powiedzieć, jeżelibyśmy wzięli na uwagę sumy pieniężne, przedstawiające kapitał po potrąceniu z niego odsetek, przy niejednakowéj ilości lat:

95 zł. —— 1 r. —— 5 zł.
180 „ —— 2 l. —— 20 „

jak również, kiedyśmy brali na uwagę podobne jak powyżéj sumy pieniężne i same kapitały:

105 zł. —— 1 r. —— 100 zł.
220 „ —— 2 l. —— 200 „

95 zł. —— 1 r. —— 100 zł.
180 „ —— 2 l. —— 200 „

Widzimy zatym, że *suma pieniężna, przedstawiająca czy to kapitał wraz z odsetkami, czy też kapitał po odtrąceniu z niego odsetek, wrazie, kiedy odsetki nie są liczone za jednakowy przeciąg czasu, nie jest ani wprost, ani też odwrotnie proporcyjonalna tak względem samego kapitału, jak i względem samych odsetek;* jakoteż: *suma pieniężna, przedstawiająca czy*

to kapitał wraz z odsetkami, czy też kapitał po odtrąceniu odsetek, nie jest ani wprost, ani też odwrotnie proporcyjonalna względem ilości lat.

Dlatego, jeżeli mamy np. zadanie [1]):

Jaki kapitał, umieszczony po 5%, przedstawi po 3 latach wraz z odsetkami 3450 zł.?

105 zł. —— 1 r. —— 100 zł.
3450 „ —— 3 l. —— x „

W tym zadaniu są rozważane odsetki za różną ilość lat, dołączane do kapitału, i również *ilość lat nie jest w takim zadaniu ani wprost, ani odwrotnie proporcyjonalna względem kapitału.* Niemożemy więc naszego zadania wprost rozłożyć na dwa zadania na regułę trzech (§ 33, us. 1; początek rozdziału XI), czyli *to zadanie nie jest bezpośrednio zadaniem na regułę trzech.*

Aby to zadanie rozwiązać, przekształcimy je na takie, w którym odsetki byłyby liczone za ten sam przeciąg czasu, mianowicie uprzednio wyliczymy, jaką sumę przedstawi 100 zł, umieszczone po 5%, po 3 latach,

wpr.
1 r. —— 5 zł.
3 l. —— x „
$x = 15.$

Odsetek od 100 zł. po 5% w ciągu 3 lat zbierze się 15 zł.; a więc 100 zł. wraz z odsetkami po 5% za 3 lata przedstawi sumę 115 zł.

Teraz możemy już rozwiązać zadanie przekształcone:

wpr.
115 zł. —— 100 zł.
3450 „ —— x „

$$x = \frac{100 \times 3450}{115} = 3000.$$

Odp. Ów kapitał jest 3000 zł.

W taki sam sposób postępować należy z innymi zadaniami podobnymi.

Moglibyśmy, rozwiązując to zadanie, tak inaczéj rozumować. Kiedy po dołączeniu odsetek za jeden rok tworzy się suma 105 zł., to, po dołączeniu odsetek za 3 lata, ze 100 zł. powstanie suma 115 zł.; kiedy w sumie 115 zł. jest samego kapitału 100 zł., to w 1 zł. takiéj sumy jest kapitału $\frac{100}{115}$ zł., zaś w 3450 zł. jest samego kapitału $\frac{100}{115}$ zł. $\times$ 3450 = = 3000 zł.

[1]) Z możliwych takich zadań podane tu jest to, w którym rozumowanie zdaje się przedstawiać najwięcéj trudności dla uczącego się.

OBLICZANIE ODSETEK ZA MIESIĄCE LUB DNIE.

8. Mówiliśmy dotąd (us. 6, 7) o przeciągu czasu, wyrażonym jako pewna ilość lat, t. j. tymsamym przyjmowaliśmy, że, jeżeli w wyrażenie owego czasu, w przeciągu którego kapitał przynosi odsetki, wchodzą albo miesiące, albo tygodnie, albotéż dnie, to przedstawiamy je w ułamku roku. Zauważyć przytem należy, że, przy obliczaniu odsetek od kapitałów umieszczanych w przedsiębiorstwach lub pożyczanych, prawie wszędzie na kontynencie Europy przyjmuje się miesiące wszystkie jako mające tę samę ilość dni, a więc przedstawiające tę samę część roku tak, iż każdy miesiąc jest 12-tą częścią roku; podobnie przyjmuje się każdy tydzień jako 52-gą część roku, każdy dzień jako 30-tą część miesiąca, czyli 360-tą część roku [1]).

Jeżeli więc mamy np. zadanie: Jakie odsetki przyniesie kapitał 3000 zł., umieszczony po 5%, w ciągu 3-ch lat i 2-ch miesięcy?, to wyrazimy 2 miesiące jako $\frac{1}{6}$ roku, wskutek czego 3 lata + 2 m. $= 3\frac{1}{6}$ r., albo $\frac{19}{6}$ roku, i znajdziemy, iż szukane odsetki wyniosą 475 zł. — Moglibyśmy jednak nieco inaczéj tu postąpić. Zamiast mówić, że 5 zł. jest odsetkami od 100 złotych za 1 rok, możemy powiedzieć: 5 zł. jest odsetkami za 12 miesięcy. Wtedy wypadnie wyrazić (§ 29, us. 1) również 3 l. + 2 m. jako 38 m.

wpr. wpr.
100 zł. —— 1 r. —— 5 zł.
3000 „ —— $3\frac{1}{6}$ r. —— x „

$$x = \frac{5 \times 3000 \times 19}{6 \times 100} = 475.$$

wpr. wpr.
100 zł. —— 12 m. —— 5 zł.
3000 „ —— 38 „ —— x „

$$x = \frac{5 \times 3000 \times 38}{100 \times 12} = 475.$$

Możemy to zadanie inaczéj zrobić. Albo:

100 zł. —— 12 m. —— 5 zł.
„ —— 1 „ —— $\frac{5}{12}$ „
„ —— 38 „ —— $\frac{5 \times 38}{12}$ zł.
3000 zł. —— 38 „ —— $\frac{5 \times 38 \times 30}{12}$ zł.

Albo: 100 zł. —— 1 r. —— 5 zł.
a więc (§ 32, us, 4).
3000 zł. —— 1 r. —— 5 zł. × 30 = 150 zł.
„ —— 2 l. —— 150 zł. × 2 = 300 „
„ —— 2 m. —— 150 zł. : 6 = 25 „
475 zł.

[1]) Zatym 1 miesiąc + 6 dni = 0,1 roku; 2 m. + 12 dni = 0,2 roku i t. d.

Podobnie, gdybyśmy mieli np. zadanie: Ile należy się odsetek od 3000 zł. po 5% za 4 miesiące i 5 dni?, to moglibyśmy rozwiązać to zadanie, wykonywając obliczenie:

wpr. wpr.
100 zł. —— 1 r. —— 5 zł.
3000 „ —— $\frac{25}{72}$ r. —— x „

$$x = \frac{5 \times 3000 \times 25}{72 \times 100} = 52\frac{1}{12}.$$

Odp. Należy się $52\frac{1}{12}$ złotego.

Albo wyrażając przeciąg czasu w miesiącach, lub w dniach, wykonamy jedno z dwu obliczeń:

wpr. wpr.
100 zł. —— 12 m. —— 5 zł.
3000 „ —— $4\frac{1}{6}$ „ —— x „

$$x = \frac{5 \times 3000 \times 25}{6 \times 100 \times 12} = 52\frac{1}{12}.$$

wpr. wpr.
100 zł. —— 360 d. —— 5 zł.
3000 „ —— 125 „ —— x „

$$x = \frac{5 \times 3000 \times 125}{100 \times 360} = 52\frac{1}{12}.$$

albo:

100 zł. —— 1 m. —— $\frac{5}{12}$ zł.

a więc:

3000 zł. —— 1 m. —— $\frac{5}{12}$ zł. $\times$ 30 $= 12\frac{1}{2}$ zł.
„ „ —— 3 m. —— $12\frac{1}{2}$ zł. $\times$ 3 $= 37\frac{1}{2}$ zł.
„ „ —— 5 d. —— $\frac{25}{2}$ zł. : 6 $= 2\frac{1}{12}$ zł.

$52\frac{1}{12}$ zł.

Taksamo postępowalibyśmy przy innych (us. 6 B., C., D.; us. 7) w zadaniach podobnych.

9. Gdy idzie o obliczenie odsetek za pewną ilość dni, to często używają dogodniejszego sposobu, który tu wyłożymy.

Jeżeli ilość dni, za które mamy obliczyć odsetki o po s % od kapitału k, oznaczymy literą d, to we wzorze A us. 6-go, zamiast ilości lat l możemy napisać $\frac{d}{360}$ i miéć będziemy

$$o = \frac{k.d.s.}{360.100}, \text{ czyli } o = \frac{k.d}{\left(\frac{36000}{s}\right)}.$$

Aby więc wyznaczyć owe odsetki, należy ilość jednostek kapitału pomnożyć przez ilość dni, a ten iloczyn podzielić przez iloraz z podzielenia liczby 36 000 przez stopę procentu. Iloczyn ilości jednostek kapitału przez ilość dni, za które mamy obliczyć odsetki, jest niezależny od stopy procentu; nazwiemy go

liczbą procentującą [1]). Liczba zaś, przez którą należy podzielić liczbę procentującą, aby otrzymać szukane odsetki, t. j. liczba $36\,000 : s$, zależna tylko od stopy procentu, a tymsamym stała dla oznaczonéj stopy procentu, nazywa się dzielnikiem odpowiadającym stopie procentu.

Z tego wypada, że dzielnik, odpowiadający stopie s, winien przedstawiać kapitał, który po $s\%$ w ciągu 1 dnia przynosi 1 odsetek [2]). Rzeczywiście, jeżeli w wypisanym tu wzorze przyjmiemy $o = 1$ i $d = 1$, to otrzymamy

$$1 = \frac{k.s}{36\,000}, \text{ skąd } k = \frac{36\,000}{s}.$$

Ponieważ liczba 36 000 jest podzielna przez czynniki piérwsze 2, 3 i 5, więc dla wielu wartości s dzielnik jest liczbą całkowitą; dla niektórych on oczywiście pozostanie ułamkowym. Tak np.

$s =$	1,	1,5,	2,	2,5,	3,	3,5,	4,	4,5,
dziel.	36000,	24000,	18000,	14400,	12000,	(72000 : 7),	9000,	8000,

$s =$	5,	5,5,	6,	6,5,	7,	7,5,	8,
dziel.	7200,	(72000 : 11),	6000,	(72000 : 13),	(36000 : 7),	4800,	4500.

Weźmy np. zadanie: obliczyć odsetki od kapitału 4200 rub. za przeciąg czasu od 18-go paździer. do 6-go marca roku następnego po 5% i po $5{,}5\%$. —Miesiące: listopad do lutego włącznie wyrazimy jako 30 dni $\times$ 4 = 120 d.; dni zaś w październiku i marcu (jednéj z dwu dat, według słusznego zwyczaju, nie włączamy) jest 18; razem 138 dni. Iloczyn $4200 \times 138 = 579600$ jest «liczbą procentującą», którą należy podzielić przez 7200, jeżeli chcemy obliczyć odsetki po 5%, podzielić zaś przez $\frac{72000}{11}$, czyli pomnożyć przez $\frac{11}{72000}$, jeżeli chcemy obliczyć odsetki po $5{,}5\%$. Wykonawszy więc

$$579600 : 7200 \quad \text{i} \quad (579600 \times 11) : 72000,$$

znajdziemy, że w piérwszym razie odsetki wyniosą 80 rub. i 50 kop., w drugim zaś razie 88 rub. i 55 kop. (ostatnią liczbę można było otrzymać w ten sposób: obliczyć odsetki po 5% i do nich dodać dziesiątą ich część).

ODSETKI SKŁADANE.

10. Jeżeli pewien kapitał jest tak umieszczony, że odsetki, przypadające we właściwych terminach, są do kapitału dołączane, a po każdym dołączeniu odsetki obliczają się od kapitału powiększonego o wszystkie poprzednio dołączone odsetki, to mówimy, że kapitał jest umiesz-

[1]) Francuzi nazywają go wprost: liczbą (nombre).

[2]) Odwrotność dzielnika, odpowiadającego stopie s, przedstawia odsetki od jednostki kapitału za jeden dzień.

czony na «odsetki składane», albo na «procent składany» [1]), albo też, że odsetki są «kapitalizowane» [2]).

W takich warunkach umieszczone kapitały wzrastają o odsetki zwykle albo corocznie, albo copółrocznie. Różne zadania, odnoszące się do kapitałów, umieszczanych na procent składany, rozwiązują się bardzo dogodnie przy pomocy pewnych sposobów postępowania, których dostarcza algiebra; przy nauce więc algiebry szczegółowiéj zajmiemy się tymi zadaniami. Tu zaś przedstawimy tylko obliczenie sumy piénięznéj, jaka się utworzy wskutek umieszczenia kapitału na procent składany w ciągu niedługiego przeciągu czasu. Np.

Jaka się utworzy suma z kapitału 2000 rub., umieszczonego na procent składany po 6% w ciągu 4 lat, 4 miesięcy i 24 dni, jeżeli odsetki są dokładane corocznie?

Zważmy, że od 100 rub. w ciągu 1-go roku narośnie odsetek 6 rub., tak że w ciągu roku 1-go ze 100 r. utworzy się 106 rubli. Ponieważ zaś kapitał wraz z odsetkami za ten sam przeciąg czasu jest wprost proporcyjonalny względem kapitału (us. 7), przeto łatwo wyliczymy kolejno, jaki się utworzy kapitał w ciągu 1-szego, 2-go, 3-go i 4-go roku (§ 21, us. 13):

1) 100 rub. —— 106 rub.
2000 „ —— x „

$$x = \frac{106 \times 2000}{100} = 2120;$$

2) 100 rub. —— 106 rub.
2120 „ —— x „

$$x = 2247{,}2;$$

3) 100 rub. —— 106 rub.
2247,2 „ —— x „

$$x = 2382{,}03;$$

4) 100 rub. —— 106 rub.
2382,03 „ —— x „

$$x = 2524{,}95.$$

Następnie wypadnie obliczyć odsetki (zwykłe) od 2524,95 rub. za 4-ry miesiące i 24 dnie i dodać je do powyższéj sumy; można także (us. 7), obliczywszy, ile się utworzy ze 100 rub. oddanych na 6% w ciągu 4 miesięcy i 24 dni, następnie ozuaczyć odrazu szukaną sumę:

360 dni —— 6
144 „ —— x

$$x = 2{,}4;$$

100 —— 102,4 rub.
2524,95 —— x „

$$x = 2585{,}55.$$

Odp. Utworzy się 2585 rub. i 55 kop. — [Jeżeli mamy pod ręką tablicę [3]), obejmującą wartości jednostki kapitału, umieszczonéj na procent

[1]) Jeżeli idzie o to, żeby wyraźnie zaznaczyć, że kapitał jest umieszczony nie na procent składany, to mówimy, że jest umieszczony na «procent zwykły».

[2]) Mówią także, że wtedy liczy się «procent od procentu».

[3]) Tablice takie są podawane w wielu zbiorach zadań arytmetycznych.

składany przy różnych stopach procentu a corocznym dokładaniu odsetek, to moglibyśmy tu łatwo znaleść sumę, jaka się utworzy po upływie 4 lat, mnożąc 2000 rub. przez liczbę, która w tych tablicach odpowiada stopie 6% i 4½latom].

Gdyby w powyższym zadaniu odsetki były dokładane nie corocznie, lecz co pół roku, to naprzód wypadłoby wykonać rachunek, podobny do powyższego, kolejno za 8 półroczy, przyjmując, że w każdym półroczu ze 100 rubli tworzy się 103 rub., a następnie uwzględnić owe 4 miesiące i 24 dnie.

---

§ 35. REGUŁA DYSKONTA.

OKREŚLENIE ZADANIA NA REGUŁĘ DYSKONTA.

1. Jeżeli chcemy zrealizować sumę pieniężną płatną nie w chwili obecnéj, lecz po pewnym dopiéro przeciągu czasu, to, przekazując ją nabywcy, na rzecz jego ustępujemy z téj sumy pewną kwotę, która przedstawia odsetki według umówionéj stopy procentu za cały przeciąg czasu, mający upłynąć do wypłaty owéj sumy, czyli do «terminu» jéj płatności. Owo «odtrącanie odsetek» z sumy pieniężnéj realizowanéj nazywa się «dyskontowaniem» owéj sumy, sama zaś odtrącona kwota nazywa się «eskontem» albo «dyskontem» [1]) téj sumy pieniężnéj. Dyskontem więc jest należność za wypłatę przekazywanéj sumy pieniężnéj przed terminem jéj płatności. Zadanie, w którym idzie o obliczenie dyskonta nazywa się zadaniem na regułę dyskonta.

Zadanie, w którym idzie o obliczenie, ile należy, według umówionéj stopy procentu, potrącić z sumy przekazywanéj przed terminem jéj płatności, jest zadaniem na regułę dyskonta. Zbiór objaśnień i wskazówek rozwiązywania takich zadań stanowi regułę dyskonta.

W różnych przypadkach może zachodzić potrzeba [2]) takiego obliczania; najczęściéj jednak występuje ona przy przekazywaniu szczególnego zobowiązania piśmiennego, za którego ukazaniem we właściwym «terminie» suma, w tym zobowiązaniu oznaczona, ma być płatna, wystawianego z zachowaniem pewnych przepisów prawnych, nazywającego się

---

[1]) Dawniéj mówiono u nas «eskont» (escompte); od pewnego jednak czasu stanowczo przemaga wyraz «dyskont» (disconto), skąd: dyskontować, dyskontowy i t. d.

[2]) Np. Jan i Piotr zajmowali się na spółkę pewnym przedsiębiorstwem, lecz Jan występuje ze spółki, dalsze prowadzenie interesu pozostawiając Piotrowi. Z obrachunku okazało się, iż na rzecz Jana przypadnie kwota 5000 rub., która będzie do podniesienia po 4-ch miesiącach. Jan ją teraz przekazuje Piotrowi, ustąpując z niéj 8%, ile Piotr ma za tę kwotę teraz Janowi zapłacić?

wekslem. Przy przekazywaniu weksli przed oznaczonym w nich terminem oblicza się odpowiedni dyskont, czyli dyskontuje się weksle.

Realizowanie sumy pieniężnéj przed datą, w któréj ta suma jest płatna, dokonywa się zwykle za przeciąg czasu niedłuższy od 9-ciu miesięcy, a niekrótszy od 10-ciu dni [1]).

Dlatego zazwyczaj oblicza się ilość dni, mających upłynąć od *daty* realizowania takiéj sumy do *daty*, w któréj ma być uiszczona całkowicie, t. j. do terminu. Jedna z tych dwu dat (dni bieżących), według słusznego zwyczaju powszechnego, nie przyjmuje się w rachubę, a drugą datę uważa się jako dzień całkowity, wliczany do ogólnéj ilości dni. Co się zaś tyczy wyliczenia ilości dni, pośrednich między tymi dwiema datami, to w rozmaitych krajach różne panują zwyczaje, które przepisy prawne uświęciły. U nas przyjmuje się, że przy tych wyliczeniach rok ma 360 dni, a każdy miesiąc [2]) roku ma dni 30. W Austryi, Francyi i Hollandyi przyjmuje się, że rok ma dni 360, a dnie oddzielnych miesięcy wylicza się według rzeczywistéj ilości dni w każdym z owych miesięcy; w Anglii zaś przyjmuje się, że rok ma 365 dni, a miesiące tyle dni, ile one rzeczywiście ich mają. — Jeżeli jednak u nas na wekslu termin jego płatności jest oznaczony w ten sposób: «za tyleto dni» (od daty wystawienia owego wekslu), to, chcąc oznaczyć ów termin jako datę, w któréj ma nastąpić wypłata, należy przyjmować w każdym miesiącu rzeczywistą ilość jego dni. Taksamo postępować należy wrazie, gdy zobowiązanie zaciągnięte było na pewną ilość tygodni.

DWOJAKI SPOSÓB OBLICZANIA DYSKONTA.

2. Weźmy np. zadanie:

Ile należy zapłacić za weksel, wystawiony w dniu 7-ym kwietnia roku 1896 na 5 miesięcy na sumę 816 rubli, dyskontując go po 6% w dniu 22-im maja roku 1896-go?

Od 22-go maja do 7-go września tegoż roku jest 105 dni (to jest: $8 + 30 + 30 + 30 + 7$, albo $9 + 30 + 30 + 30 + 6$). Z sumy więc, napisanéj na wekslu, mamy potrącić odsetki za 105 dni. Zatym w dniu dyskonta téj sumy odsetki są w nią włączone. Zadanie samo moglibyśmy tak napisać:

106 rub. —— 360 dni —— 100 rub.
860 „ —— 105 „ —— x „

---

[1]) W wielu interesach handlowych, przy których są wystawiane weksle, jest ściśle przestrzegany zwyczaj, aby termin płatności nie był dalszy nad pewną ilość miesięcy, np. 3 mies., 6 mies., a najwięcéj 9 mies. Banki zaś wcale nie dyskontują weksli, jeżeli do terminu ich płatności brak mniéj niż 10-u dni.

[2]) Połowa więc każdego miesiąca ma 15 dni. (Por. § 34, us. 8, 9).

Wprost z tego, cośmy mówili w us. 7 § 34-go, wynika, że to zadanie nie jest zadaniem na regułę trzech. Aby je sprowadzić do zadania na regułę trzech, najprościéj będzie, gdy uprzednio obliczymy odsetki od 100 rub. za owe 105 dni:

$$\begin{array}{l} 360 \text{ dni} \text{ —— } 6 \text{ rub.} \\ 105 \text{ „} \text{ —— } x \text{ „} \end{array}$$

$$x = \frac{6 \times 105}{360} = 1{,}75.$$

Kupujący przeto weksel od każdych 100 rub., które płaci za weksel, powinien za przeciąg czasu do dnia wypłaty wekslu otrzymać odsetek 1,75 rub., tak, iż za każde 100 rub., które płaci za weksel, powinien w dniu wypłaty otrzymać wyłożone 100 rub. i odsetek od nich 1,75 rub., t. j. razem 101,75 rub. Jeżeli więc za 101,75 rubla, płatne w terminie wekslu, czyli za 101,75 rubla, napisane na wekslu, płaci (w dniu dyskonta) 100 rub., to ile ma zapłacić za 860 rubli napisane na wekslu?

$$\begin{array}{l} 101{,}75 \text{ rub.} \text{ —— } 100 \text{ rub.} \\ 860 \text{ „} \text{ —— } x \text{ „} \end{array}$$

$$x = \frac{100 \times 860}{101{,}75} = 845{,}21.$$

Odp. Za weksel należy zapłacić 845 rub. i 21 kop, czyli z napisanéj na nim sumy należy potrącić 14 rub. i 79 kop.

3. W rzeczywistości nie wykonywa się dyskonta takim sposobem, jakiegośmy powyżéj użyli.

Owe 1,75 rubla, przedstawiające odsetki od 100 rubli za 105 dni do terminu [1]), potrąca się z każdych 100 rubli, napisanych na wekslu. Kupujący przeto weksel za każde 100 rub., napisane na wekslu, zapłaci 98,25 rub. Jeżeli więc za 100 rub., napisane na wekslu, zapłaci 98,25 rub., to ile ma zapłacić za 860 rub.? (§ 34, us. 3).

$$\begin{array}{l} 100 \text{ rub.} \text{ —— } 98{,}25 \text{ rub.} \\ 860 \text{ „} \text{ —— } x \text{ „} \end{array}$$

$$x = \frac{98{,}25 \times 860}{100} = 844{,}95.$$

Odp. Za weksel należy zapłacić 844 rub. i 95 kop., czyli należy z sumy, napisanéj na wekslu, potrącić 15 rub. i 5 kop. [Możnaby jeszcze rozwa-

[1]) Dyskontując ten weksel tegoż dnia w Austryi, należałoby tu obliczyć:

$$\begin{array}{l} 360 \text{ dni} \text{ —— } 6 \text{ rub.} \\ 108 \text{ „} \text{ —— } x \text{ „} \end{array}$$

Dyskontując zaś go w Anglii, należałoby tu obliczyć:

$$\begin{array}{l} 365 \text{ dni} \text{ —— } 6 \text{ rub.} \\ 108 \text{ „} \text{ —— } x \text{ „} \end{array}$$

żać zadania, w których byłaby niewiadoma albo suma wystawiona na wekslu, albo stopa procentu, według któréj dyskont został obliczony, albo też ilość dni, za które dyskont został potrącony, a rozwiązanie tych zadań nie przedstawiałoby trudności. Takie jednak zadania w praktyce nie występują.]

O RÓŻNICY MIĘDZY DWOMA SPOSOBAMI OBLICZANIA DYSKONTA.

4. Sposób dyskontowania, wyłożony w us. 3-im, jest «sposobem handlowym», w przeciwstawieniu sposobowi, wyłożonemu w us. 2-im, który można naznać «sposobem teoretycznym» [1]).

W sposobie teoretycznym potrąca się odsetki, obliczane od sumy wypłacanéj w dniu dyskonta. W sposobie zaś handlowym potrąca się odsetki które, *nie zważając na wypłacaną sumę*, oblicza się od sumy wypisanéj na wekslu.

Aby zdać sobie sprawę z różnicy, jaka zachodzi między tymi dwoma sposobami dyskonta, zważmy, że, dyskontując powyższy weksel (us. 2, 3) sposobami:

teoretycznym, płacimy 100 za 101,76 napisane na wekslu,
handlowym, „ 98,25 za 100 „ „

a wobu razach różnica 1,75 przedstawiać ma według umówionéj stopy odsetki od 100. A więc sposobem teoretycznym potrącamy odsetki obliczone od téj sumy piéniędzy, którą nabywca odstępowanéj sumy piénieżnéj za nią płaci. Sposobem zaś handlowym potrącamy odsetki obliczone od większéj sumy piénięndzy, mianowicie od téj, która jest napisana na wekslu, t. j. którą nabywca późniéj otrzyma w terminie, oznaczonym na tym wekslu.

Dyskontując zatym ów weksel sposobem handlowym, nabywca za przeciąg czasu, jaki ma upłynąć do termiuu, otrzymuje 1,75 rub. odsetek od 98,25 rub., co jest więcéj (§ 34, us. 4) niż 6%.

Różnica dyskonta owego wekslu dwoma sposobami wyniosta 0,26 rub Co ta kwota przedstawia? — Wartość wekslu, powyżéj wyznaczona sposobem

---

[1]) Nazywają go także «matematycznym».

Francuzi kwotę potrąconą przy dyskontowaniu sposobem handlowym nazywają «dyskontem zewnątrz» (escompte en dehor), w przeciwstawieniu temu kwotę potrącaną przy dyskontowaniu sposobem teoretycznym nazywają «dyskontem wewnątrz» (escompte en dedans). Taktéż dawniéj u nas to nazywano. Obecnie zaś, pod wpływem stosunków handlowych z Niemcami i niemieckich podręczników arytmetyki handlowéj, tak w kantorach bankierskich, jak i w niektórych naszych książkach używają często wyrażeń: «dyskont od sta» i «dyskont na sto». Do tego cośmy w przypisku do us. 3-go § 34-go powiedzieli przeciwko wyrażeniu «na sto» przybywa jeszcze tu ta okoliczność, iż owe wyrażenia» od sta» i «na sto», przy dyskoncie przedstawiają to, co wyrażenia odpowiednio «w stu» i «od sta» przy zwykłym (§ 34) obliczaniu odsetek (albowiem przy dyskoncie w tych wyrażeniach 100 jest odniesione do sumy wypisanéj na wekslu, gdy tymczasem należałoby ten wyraz odnieść do sumy płaconéj za weksel).

teoretycznym, jest przybliżoną na 0,01 rub. (§ 21, us. 13). Aby należycie wyraźnie przedstawiło się nam znaczenie powyższéj różnicy, wyznaczmy dokładniejsze przybliżenie owéj wartości, mianowicie weźmy wartość 845,208845 rub. Wtedy różnica dyskonta przedstawi się jako 0,258845 rub. Oczywiście ta różnica przedstawia odsetki od pewnéj sumy za owe 105 dni; znajdziemy tę sumę:

$$\begin{array}{rl} 1{,}75 & \text{rub.} \text{ —— } 100 \text{ rub.} \\ 0{,}258845 & \text{„ —— } x \text{ „} \end{array}$$

$$x = \frac{2588{,}45}{175} = 14{,}79.$$

Otrzymane 14,79 rub. przedstawia to, co potrącono z sumy, napisanéj na wekslu, dyskontując go sposobem teoretycznym (us. 2). A więc owa różnica przedstawia odsetki po 6% od dyskonta obliczanego sposobem teoretycznym za przeciąg czasu, jaki ma upłynąć do terminu. O te więc odsetki od odsetek nabywca wekslu płaci mniéj, dyskontując go sposobem handlowym, niżby zapłacił, dyskontując sposobem teoretycznym.

Zwykle, jako przyczynę tego, że dyskontowanie weksli uskutecznia się zawsze sposobem handlowym, a nie teoretycznym, podają to, że piérwszym z tych sposobów rachunek łatwiéj się wykonywa, niż drugim, gdyż w piérwszym w dzielniku zachodzi liczba 100, w drugim zaś nie wypada liczba niedogodna, jak np. powyżéj 101,75. Przy wekslach jednak na większe sumy różnica opłaciłaby wykonywanie nieco drobiazgowszego dzielenia, tymwięcej, iż wszyscy, wykonywający w praktyce podobne obliczenia, dobrze rachować umieją. Możnaby to słuszniéj już usprawiedliwić tym, że instytucyja kredytowa, dyskontując weksle np. po 6%, nie osiągałaby w rzeczywistości 6%, gdyż musi mieć przeznaczony na skup weksli zapas gotówki, która nie przynosi dochodu, i powtóre, z zatrzymanego dyskonta należy potrącić pewną część na utrzymanie téj instytucyi (co się téż uwzględnia przy wekslach na mniejsze sumy przez ściąganie przy ich dyskontowaniu opłaty dodatkowéj, prowizyją.) Prawdziwą jednak przyczyną jest to, że kupujący weksle znajdują się w położeniu wygodniejszym, niż ci, którzy je sprzedają. i dlatego ci ostatni musieli początkowo przystawać na warunki, jakie piérwsi im stawiali. Następnie zaś powszechny zwyczaj takie postępowanie uprawnił.

---

§ 36. REGUŁA PODZIAŁU PROPORCYJONALNEGO. REGUŁA SPÓŁKI.

OKREŚLENIE ZADANIA NA REGUŁĘ PODZIAŁU PROPORCYJONALNEGO.

1. Mówiliśmy w us. 14-ym § 30-go o dwu grupach liczb proporcyjonalnych, t. j. o dwu grupach takich liczb, iż stosunek dwu jakichkol-

wiek liczb jednéj grupy jest równy stosunkowi dwu odpowiadających liczb drugiéj grupy.

W niektórych zadaniach iść nam może o to, aby pewną liczbę rozdzielić na części tak, iżby te części przedstawiały właśnie grupę liczb proporcyjonalnych względem pewnych liczb danych. Tak np. za sztukę płótna trzech nabywców ma zapłacić 33 rub.; jeden wziął 20 łokci, drugi 15 łokci, trzeci zaś pozostałe 25 łokci; ile każdy ma zapłacić? Idzie więc tu o znalezienie trzech części liczby 33 rub. takich, iżby one tworzyły grupę liczb proporcyjonalnych względem liczb 20, 15 i 25. Mówimy wtedy, że mamy znaléźć 3 części liczby 33 rub. proporcyjonalne względem liczb (pisząc jak w us. 14, § 30)

20 : 15 : 25, czyli (§ 29, us. 6 c.) względem liczb: 4 : 3 : 5.

W tym zadaniu warunek podziału mógłby być inaczéj wypowiedziany np.: pierwszy nabywca bierze płótna $\frac{4}{3}$ tego, co drugi, a $\frac{4}{5}$ tego, co trzeci, w takim razie przy pomocy odpowiedniego postępowania zastąpilibyśmy go przez równoznaczny poprzedniemu, który dla dalszego rachowania jest dogodniejszy.

Takiego rodzaju zadanie nazywa się zadaniem na regułę podziału proporcyjonalnego.

Zadanie, w którym nam idzie o to, aby liczbę daną rozłożyć na części proporcyjonalne albo względem liczb wprost danych w zadaniu, albo też względem liczb, które wyznaczone być mogą z warunków w zadaniu danych, nazywa się zadaniem na regułę podziału proporcyjonalnego. Zbiór wskazówek i objaśnień rozwiązywania takich zadań stanowi regułę podziału proporcyjonalnego.

Jeżeli w takim zadaniu idzie o podział zysków osiągniętych lub strat poniesionych przez osoby, prowadzące razem pewien interes, czyli przez «spółkę» handlową lub przemysłową, to w takim razie często bywa ono nazywane zadaniem na regułę spółki.

ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ NA REGUŁĘ PODZIAŁU PROPORCYJONALNEGO.

2. W powyższym zadaniu o kupionéj przez 3 osoby sztuce płótna idzie nam o to, aby się dowiedzieć, ile ma zapłacić każda z tych trzech osób. Ilość rubli, które każda z tych 3 osób ma zapłacić, jest wprawdzie proporcyjonalna względem ilości łokci wziętego przez nią płótna, ale w tym zadaniu mamy więcéj niż jednę niewiadomą, a zadanie jest tego rodzaju, iż wprost z liczb w nim danych nie można według prawideł w §§ 32 i 33, żadnych z tych niewiadomych wyznaczyć. Nie jest więc ono zadaniem na regułę trzech. Aby to zadanie sprowadzić do zadania na

regułę trzech, zważmy, że mamy tu 33 ruble podzielić na 3 części, proporcyjonalne względem liczb 4, 3 i 5, t. j. tak, aby piérwsza część odpowiadała liczbie 4, druga liczbie 3, a trzecia liczbie 5. Cała więc liczba 33 ruble odpowiadać wtedy będzie liczbie $4+3+5=12$. Jeżeli więc całą liczbę 33 rub. podzielimy na 12 równych sobie cząstek, to 4 takie cząstki przedstawiają kwotę, którą ma zapłacić osoba piérwsza, tak, iż ona zapłacić ma $\frac{4}{12}$ liczby 33 rub.; podobnie druga osoba ma zapłacić $\frac{3}{12}$ liczby 33 rub., a trzecia $\frac{5}{12}$ liczby 33 rub. czyli (§ 19, us. 8) mają te osoby zapłacić odpowiednio:

$$33 \text{ rub.} \times \frac{4}{4+3+5}; \quad 33 \text{ rub.} \times \frac{3}{4+3+5}; \quad 33 \text{ rub.} \times \frac{5}{4+3+5}$$

Odp. Te osoby zapłacą odpowiednio: 11 rub., 8,25 rub., 13,75 r. I rzeczywiście $11 : 8{,}25 : 13{,}75 = 4 : 3 : 5$.

Zadanie zatym nasze sprowadziliśmy do takich zadań na regułę trzech:

liczbie 12 odpowiada 33 rub.	12 —— 33 rub.	12 —— 33 rub.
„ 4 „ x „	3 —— y „	5 —— z „
$x=\frac{33\times 4}{12}=11,$	$y=\frac{33\times 3}{12}=8{,}25,$	$z=\frac{33\times 5}{12}=13{,}75.$

Znalazszy odpowiedzi na dwa piérwsze z wypisanych tu teraz zadań, mogliśmy znaleźć odpowiedź na pozostałe, odjąwszy od liczby 33 sumę liczb 11 i 8,25,

$$33 - (11 + 8{,}25) = 13{,}75.$$

Oczywiście, że możnaby tu zastosować metodę sprowadzania do jedności, ale uprzednio należy dodać do siebie liczby, względem których szukane części mają być proporcyjonalne, t. j. znaleźć liczbę, która odpowiada liczbie danéj do podziału.

$$\begin{aligned}
12 &\text{ —— } 33 \text{ rub.} \\
1 &\text{ —— } \tfrac{33}{12} \text{ rub.} = 2{,}75 \text{ rub.} \\
4 &\text{ —— } 2{,}75 \text{ rub.} \times 4 = 11 \text{ „} \\
3 &\text{ —— } 2{,}75 \text{ rub.} \times 3 = 8{,}25 \text{ „} \\
5 &\text{ —— } 2{,}75 \text{ rub.} \times 5 = 13{,}75 \text{ „}
\end{aligned}$$

Przy tym samym zastrzeżeniu można zastosować proporcyje:

$x : 33 = 4 : 12$, $y : 33 = 3 : 12$, $z : 33 = 5 : 12$, skąd $x =$ i t. d.

Możemy więc powiedzieć ogólnie: *aby pewną liczbę rozłożyć na dwie lub więcéj części, proporcyjonalnych względem tyluż liczb danych, należy ją oddzielnie pomnożyć przez każdy z ułamków, w którego liczniku jest jedna z owych liczb danych, a w mianowniku suma tych liczb.*

PRZYPADEK, KIEDY MAMY DANE ODDZIELNE STOSUNKI MIĘDZY LICZBAMI.

3. Niekiedy nie mamy tak wprost, jak powyżéj, danych liczb, względem których mają być proporcyjonalne szukane części danéj do podziału liczby, lecz mamy dane tylko oddzielne stosunki między nimi. Tak np. jeżeli mają być wyznaczone cztery części pewnéj liczby takie, iżby stosunek piérwszéj do drugiéj był równy stosunkowi 5 : 8, stosunek drugiéj do trzeciéj był równy stosunkowi 6 : 7, a stosunek drugiéj do czwartéj równy stosunkowi 36 : 35, to wtedy zastępujemy te stosunki takimi, iżby je można było w powyżéj wskazany sposób (us. 1) krócéj oznaczyć. W tym celu weźmy naprzód dwa piérwsze stosunki, t. j. 5 : 8 i 6 : 7. Wyraz 8 w piérwszym stosunku i wyraz 6 w drugim odpowiadają téj saméj, a mianowicie drugiéj z mających się wyznaczyć części; aby więc te dwa stosunki móc krócéj oznaczyć, trzeba je zastąpić takimi, w którychby zamiast owych liczb 8 i 6 zjawiła się pewna taż sama liczba Najmniejsza spólna wielokrotność liczb 8 i 6 jest 24; pomnożymy więc oba wyrazy piérwszego stosunku przez 3, a drugiego przez 4; otrzymamy:

$$15 : 24 \quad \text{i} \quad 24 : 21, \quad \text{czyli} \quad 15 : 24 : 21.$$

Następnie zaś zauważymy, że w tych stosunkach wyraz 24 i w trzecim z danych stosunków, t. j. w stosunku 36 : 35, wyraz 36 odpowiadają téj saméj, a mianowicie drugiéj z mających się wyznaczyć części. Podobnie więc, aby zamiast owych liczb 24 i 36 zjawiła się taż sama liczba, pomnożymy wszystkie wyrazy powyższych dwu stosunków przez 3, a oba wyrazy stosunku 36 : 35 przez 2, i mieć będziemy:

$$45 : 72 : 63 \quad \text{i} \quad 72 : 70, \quad \text{czyli} \quad 45 : 72 : 63 : 70.$$

Weźmy np. zadanie: 15 960 złotych rozdzielić między trzech braci, mających 36, 24 i 16 lat, odwrotnie proporcyjonalnie względem ilości ich lat. Mamy więc tu liczbę 15 960 zł. rozłożyć na trzy części tak, iżby stosunek piérwszéj do drugiéj był równy odwrotnemu stosunkowi liczb 36 i 24 t. j., aby był równy 24 : 36 czyli 2 : 3, zaś stosunek drugiéj części do trzeciéj był równy stosunkowi 16 : 24 czyli 2 : 3. W tych dwu stosunkach:

$$2 : 3 \quad \text{i} \quad 2 : 3$$

następnik pierwszego i poprzednik drugiego stosunku odpowiadają téj saméj części (drugiéj); zastępując te wyrazy przez tę samę liczbę 6, sprowadzimy te stosunki do:

$$4 : 6, \quad 6 : 9 \quad \text{czyli} \quad 4 : 6 : 9.$$

A więc każdy z trzech braci dostanie odpowiednio:

$$15\,960 \text{ zł.} \times \frac{4}{4+6+9} = 3360 \text{ zł.}; \quad 15\,960 \text{ zł.} \times \frac{6}{19} = 5040 \text{ zł.};$$

$$15\,960 \text{ zł.} \times \frac{9}{19} = 7560 \text{ zł.}$$

PRZYPADEK, KIEDY MAMY DANYCH DWA LUB WIĘCÉJ WARUNKÓW.

4. Zadanie, w którym mamy pewną liczbę rozłożyć na części proporcyjonalne względem liczb, które mamy dopiero wyznaczyć z dwu lub więcéj warunków, a te warunki są wyrażone jako proporcyjonalne względem liczb danych [1]), łatwo sprowadza się do zadania takiego rodzaju, jak poprzednie. Np.

Za przewiezienie koleją żelazną zboża, a mianowicie 240 korcy pszenicy, 160 korcy żyta, 320 korcy jęczmienia i 400 korcy owsa zapłacono razem (t. j. za ciężar wszystkiego zboża) 218 rub. 13 kop.; ile zapłacono oddzielnie za przewiezienie pszenicy, żyta, jęczmienia i owsa, jeżeli wiadomo, że korzec pszenicy waży 250 funtów, żyta 225 fun., jęczmienia 195 fun., a owsa 140 fun.? Należy więc tu liczbę 218,13 rub. rozłożyć na cztéry części, proporcyjonalne względem liczb, które wyznaczymy z danych ilości korcy tych czterech gatunków zboża i z danych ciężarów jednego korca każdego z tych gatunków zboża. Ilości korcy (wogóle: tych samych jednostek objętości) tych gatunków zboża są proporcyjonalne względem liczb

$$240 : 160 : 320 : 400, \text{ czyli } 3 : 2 : 4 : 5,$$

a odpowiednie ciężary jednego korca (wogóle: téj saméj jednostki objętości) tychże gatunków zboża są proporcyjonalne względem liczb

$$250 : 225 : 195 : 140, \text{ czyli } 50 : 45 : 39 : 28.$$

Ciężar zaś pewnéj ilości, np. korcy, jakiegoś zboża jest iloczynem ciężaru jednego korca przez liczbę oderwaną, odpowiadającą owéj ilości korcy; a więc ciężary wszystkiéj przewiezionéj pszenicy, żyta, jęczmienia i owsa, a tymsamym i opłaty za ich przewiezienie, są proporcyjonalne względem liczb:

$$(3 \times 50) : (2 \times 45) : (4 \times 39) : (5 \times 28), \text{ czyli } 75 : 45 : 78 : 70.$$

Sprowadziliśmy więc zadanie do takiego, jak poprzednie; rozwiązując je, znajdziemy, że za przewiezienie pszenicy zapłacono (§ 21, us. 13) 61,04 rub., żyta 36,63 rub., jęczmienia 63,48 rub., owsa 56,97 rub.

Gdyby w tym zadaniu był jeszcze warunek, że pszenica ma być przewieziona do stacyi 6 razy, a żyto do stacyi 4 razy daléj położonéj, niż stacyja, do któréj ma być przewieziony owies, a stosunek dróg, które

---

1) Niektórzy takie zadanie nazywają zadaniem na regułę proporcyjonalnego podziału (lub spółki) złożoną.

mają odbyć żyto i jęczmień, jest 6 : 7, to przybyłby nam warunek do wyznaczenia opłat za te gatunki zboża, mianowicie proporcyjonalność dróg przewozu względem liczb (us. 3)

$$18 : 12 : 14 : 3.$$

Wtedy liczby, względem których są proporcyjonalne opłaty za przewóz oddzielnych gatunków zboża, należałoby wyznaczyć z warunków, iż ich ciężary i odległości, na jakie mają być przewiezione, są proporcyjonalne względem liczb

$$75 : 45 : 78 : 70 \quad \text{i} \quad 18 : 12 : 14 : 3.$$

Moglibyśmy tu albo rozumować podobnie jak poprzednio [1]), albotéż w taki sposób. Opłata od każdych 75 jednostek ciężaru zboża za każde 18 jednostek odległości jest taż sama, co za przewiezienie na jednostkę odległości 75×18 jednostek ciężaru, i t. d., tak iż wypadłoby liczbę 218,13 rub. rozłożyć na części proporcyjonalne względem liczb [2])

$$(75 \times 18) : (45 \times 12) : (78 \times 14) : (70 \times 3).$$

A daléj, jak poprzednio.

REGUŁA SPÓŁKI.

5. Jak wzmiankowaliśmy (us. 1), *zadanie na regułę podziału proporcyjonalnego w tym przypadku, kiedy mamy daną ilość pieniędzy, przypadającą na rzecz dwu lub więcéj spólników, rozłożyć na części proporcyjonalne względem liczb, które należy wyznaczyć z danych warunków, określających udziały owych spólników, nazywa się zadaniem na regułę spółki.*

Np. Na rzecz cztérech spólników przypada do podzielenia suma 10 800 zł. Suma ta jest zyskiem osiągniętym na przedsiębiorstwie, do którego piérwszy spólnik włożył 2360 zł. na czas 2 lat i 3 miesięcy, drugi 4200 zł. na 1 rok i 8 miesięcy, trzeci 4500 zł. na 2 lata, 3 miesiące i 20 dni, a czwarty 3200 zł. na 2 lata i 10 miesięcy. Ostatni z tych spólników, jako inicyjator i kierownik tego przedsiębiorstwa, ma zapewnione, iż zysk od jego wkładu względem zysku od wkładów innych spólników ma być liczony w stosunku 9 : 5. Po ile przypada z owéj sumy na rzecz każdego ze spólników? Mamy tu liczbę 10 800 rozłożyć na cztéry części proporcyjonalne względem liczb, które mamy wyznaczyć z warunków, iż ich wkłady piéniężne są proporcyjonalne względem liczb

$$2360 : 4200 : 4500 : 3200, \quad \text{czyli} \quad 118 : 210 : 225 : 160,$$

---

[1]) Opłata za przewóz pewnéj ilości jednostek ciężaru na pewną ilość jednostek odległości jest iloczynem opłaty za ową ilość jednostek ciężaru na jednostkę odległości przez liczbę oderwaną, odpowiadającą ilości owych jednostek odległości.

[2]) Odpowiadających ciężarom, rachowanym na jednostkę odległości, czyli wogóle, rachowanym na tę samę odległość.

czasy obrotu tych wkładów proporcyjonalne względem liczb (przyjmując rok = 360 dniom; § 34, us. 8)

$$810 : 600 : 830 : 1020, \text{ czyli } 81 : 60 : 83 : 102,$$

a stosunkowa wielkość udziałów przy obliczaniu zysków proporcyjonalna względem liczb

$$5 : 5 : 5 : 9.$$

Weźmy naprzód na uwagę tylko dwa piérwsze warunki. Ten sam udział w ogólnym zysku, który przypada piérwszemu spólnikowi za 118 jednostek kapitału, będących w obrocie w ciągu 81 jednostek czasu, przypadłby od kapitału, będącego w obrocie w ciągu jednostki czasu, w takim razie, kiedyby jednostek kapitału było 81 razy więcéj. I t. d. A więc udziały tych spólników będą takie, jakie wyznaczymy z warunku, iż kapitały, będące w obrocie w ciągu tego samego przeciągu czasu, są proporcyjonalne względem liczb

$$(118 \times 81) : (210 \times 60) : (225 \times 83) : (160 \times 102).$$

Wskutek zaś trzeciego z danych warunków, każda jednostka kapitału czwartego spólnika jest przy obliczeniu udziałów zysku 1,8 raza więcéj warta od każdéj jednostki każdego z pozostałych spólników. A więc ostatecznie udziały tych spólników w osiągniętym zysku są proporcyjonalne względem liczb

$$(118 \times 81) : (210 \times 60) : (225 \times 83) : (160 \times 102 \times 1{,}8).$$

A daléj jak poprzednio.

---

§ 37. REGUŁA MIESZANINY.

OKREŚLENIE ZADAŃ NA REGUŁĘ MIESZANINY. PRÓBA ZŁOTA LUB SREBRA, i t. d.

1. Pewne zadania, w których jest mowa o mieszaninie czy to różnorodnych ciał, czy téż różnych gatunków pewnego ciała, rozważamy oddzielnie jako zadania na regułę mieszaniny. A mianowicie:

Jeżeli zadanie, w którym jest mowa o mieszaninie dwu lub więcéj czyto różnorodnych ciał [1], *czytéż różnych tylko gatunków pewnego ciała* [2], *sprowadza się albo do wyliczenia własności* [3] *mieszaniny, albotéż do wyznaczenia stosunków, w jakich do téj mieszaniny mają być wzięte*

---

[1] Np. o stopie cynku i miedzi, zwanym mosiądzem, o mieszaninie alkoholu i wody, zwanéj wódką, i t. d.

[2] Np. o mieszaninie różnych gatunków nasion trawiastych, różnych gatunków tytoniu, i t. d.

[3] Niekiedy, w szczególności ceny.

ilości owych składających ją części, to nazywa się ono zadaniem na regułę mieszaniny. Zbiór wskazówek i objaśnień rozwiązywania takich zadań stanowi r e g u ł ę m i e s z a n i n y.

Tu należą zadania, do których wchodzi t. z. p r ó b a złota lub srebra. Próbą złota lub srebra nazywamy stosunek wagi czystego metalu szlachetnego w pewnym przedmiocie metalowym do wagi całkowitéj tego przedmiotu. Stosunek ten wyraża się w cząstkach wagi menniczéj; wyrażenie więc tego stosunku zależy od owéj wagi, prawnie w pewnym kraju używanéj, a któréj się dorozumiéwa przy wypowiadaniu próby.

U nas, dawniéj (a od r. 1815 prawnie) wagą menniczą dla wyrobów srebrnych była »grzywna kolońska», dzieląca się na 16 łutów (po 18 granów menniczych); dlatego próba np. 12-stą srebra oznacza, że w przedmiocie, tą próbą ocechowanym, stosunek wagi czystego srebra do wagi całkowitéj przedmiotu jest 12 : 16. Dla wyrobów złotych przyjmowano 24 karaty (po 12 granów karatowych), jako oznaczające czyste złoto, tak iż w wyrobie złotym np. 18-sto karatowym stosunek wagi czystego złota do całkowitéj wagi przedmiotu jest 18 : 24.

Od r. 1842 wprowadzono jako wagę menniczą dla wyrobów złotych i srebrnych funt w Rosyi używany z podziałem na 96 zołotników. Zatym np. 72-ga próba wyrobu z metalu szlachetnego oznacza, iż stosunek wagi tego metalu do całkowitéj wagi przedmiotu jest 72 : 96.

W krajach, w których systemat metryczny jest w powszechnym użyciu, wyraża się próba srebra i złota w tysiączuych częściach jednostki wagi całkowitéj przedmiotu; gdy więc np. mówią: srebro próby 950, to oznacza, że stosunek wagi czystego srebra do całkowitéj wagi przedmiotu jest 950 : 100.

Dla niektórych mieszanin cieczy istnieją również umówione sposoby oznaczania stosunku, w jakim ciecze z sobą zmieszane zostały. Zwykle jednak odnoszą się one do stosunku objętości. Tak np. wyrażenie: «wódka 65 stopni» oznacza wódkę takiéj saméj «mocy», jaką posiada mieszanina 65-u jednostek objętości alkoholu z 35-u (t. j. 100—65) jednostkami objętości wody.

ZADANIA, W KTÓRYCH SZUKAMY WŁASNOSCI MIESZANINY.

2. Weźmiemy naprzód na uwagę zadania, w których, mając dane własność i ilość każdego z przedmiotów mieszanych, szukamy własności mieszaniny.

Np. Stopiono razem 5 funtów srebra 72-éj, 5 fun. 84-éj, 3 funty 90-éj próby oraz 1 funt miedzi; jakiéj próby jest stop? — Ten stop zawiéra srebra

$$72 \times 5 + 84 \times 5 + 90 \times 3$$

złotników, a waży $5+5+3+1=14$ funtów. W jednym więc funcie stopu jest

$$\frac{72\times5+84\times5+90\times3}{5+5+3+1}=\frac{1050}{14}=75$$

złotnlków srebra. Zatym stosunek wagi czystego srebra do wagi całkowitéj stopu jest 75 : 96, czyli ten stop jest 75-éj próby.— Gdyby w zadaniu zamiast funtów były np. dane łuty, t. j. piérwszego gatunku srebra było 5 łutów, drugiego 5 ł., trzeciego 3 ł., a miedzi 1 ł., to rachunek byłby ten sam; niecoby się tylko zmienił sposób jego objaśnienia. Mianowicie, moglibyśmy powiedzieć tak: w każdéj jednostce wagi (łucie) piérwszego gatunku srebra na 96 cząstek jest 72-ie czystego srebra, w każdéj drugiego gatunku 84 cząstki, a w każdéj trzeciego 90 cząstek; we wszystkich więc $5+5+3+1$ jednostkach wagi stopu na 96×14 cząstek jest czystego srebra $72\times5+84\times5+90\times3$ takichże cząstek, a przeto w jednostce wagi stopu na 96 cząstek jest czystego srebra $\frac{72\times5+\cdots}{5+\cdots}=75$ cząstek. Zatym stosunek wagi i t. d. (jak poprzednio).

Łatwo spostrzéc, że takie zadanie jest właściwie *zadaniem* [1]) *na wyznaczenie średniéj arytmetycznéj* (§ 7, us. 25).

Jeżelibyśmy mieli np. zadanie: Kupiec zmieszał 10 funtów herbaty po 2 rub., 12 f. po 2 rub. 50 kop. i 15 f. po 1 rub. 75 kop.; po czemu ma sprzedawać funt téj mieszaniny, jeżeli chce jeszcze na niéj zarobić 8 rub.?, to, rozumując podobnie i zważając, że do sumy piénięžnéj, którą on ma otrzymać ze sprzedaży $10+12+15$ funtów téj mieszaniny, wejdą owe 8 rub., znajdziemy, że ma sprzedawać funt po kopiejek

$$\frac{200\times10+250\times12+175\times15+800}{10+12+15}.$$

ZADANIA, W KTÓRYCH SZUKAMY STOSUNKU, W JAKIM DWA GATUNKI MAJĄ BYĆ MIESZANE.

3. Zadanie odwrotne powyższemu, t. j. zadanie, w którym, mając dane: własność każdego z przedmiotów mieszanych i własność mieszaniny, chcemy wyznaczyć stosunki, w jakich mają być wzięte ilości mieszanych przedmiotów, rozważymy naprzód w przypadku, gdy mieszamy dwa tylko przedmioty.

Np. W jakim stosunku należy brać srebro 90-éj i srebro 72-éj próby, aby otrzymać stop 84-éj próby? — Dane w zadaniu próby gatunków mieszanych nie są wartościami wielkości ani wprost, anitéż odwrotnie

[1]) Por. § 33 us. 6.

proporcyjonalnéj względem ilości jednostek, które z każdego gatunku mają być wzięte, a tym samym z tego już względu nie może tu być mowy o uważaniu wprost tego zadania za zadanie na regułę trzech. Dlatego należy zadanie nasze przekształcić w taki sposób, iżby dojść do rozważania wartości takich wielkości, któreby były wprost lub odwrotnie proporcyjonalne względem siebie.

Każda jednostka wagi srebra piérwszego gatunku ma zawiele 6 cząstek, a każda jednostka drugiego gatunku ma zamało 12 cząstek czystego srebra [1]). Jeżeli na każde 12 jednostek wagi piérwszego gatunku weźmiemy 6 jednostek wagi drugiego, to w tych 12 jednostkach piérwszego gatunku miéć będziemy zawiele 6×12 cząstek, gdy w 6 jednostkach drugiego miéć będziemy zamało 12×6 cząstek, a więc stop 12 jednostek wagi piérwszego gatunku i 6 jednostek wagi gatunku drugiego będzie żądanéj próby. Widzimy więc, że stosunek, w jakim mają być wzięte ilości (na wagę) tych dwu gatunków srebra, jest 12 : 6, czyli 2 : 1, a zatym jest odwrotny względem stosunku różnic między liczbą, wyrażającą własność mieszaniny, a liczbami, wyrażającymi własności dwu mieszanych przedmiotów [2]), tak, iż *ilość jednostek wagi, które mają być wzięte z każdego gatunku, jest wielkością odwrotnie proporcyjonalną względem różnicy między większą z liczb, wyrażających własność tego gatunku i własność mieszaniny, a mniejszą z nich.* Ślad tego rozumowania zwykle tak zaznaczamy:

90		6 cz.	12 jed.	2 jed.
	84			
72		12 cz.	6 jed.	1 jed.

Gdybyśmy, zamiast powyższego, mieli zadanie: Ile trzeba wziąć srebra 90-éj i srebra 72-éj próby, aby utworzyć stop 18 funtów srebra 84-éj próby?, to, znalazszy, jak powyżéj, że stosunek, w jakim mają być wzięte ilości tych dwu gatunków jest 2 : 1, należałoby następnie rozwiązać dodatkowo zadanie na regułę podziału proporcyjonalnego (§ 36, us. 2): rozłożyć 18 funtów na dwie części w stosunku 2 : 1, i znaleźlibyśmy, że należy wziąć gatunku

$$\text{1-go } 18 \text{ f.} \times \frac{2}{2+1}, \text{ a 2-go } 18 \text{ f.} \times \frac{1}{2+1},$$

t. j. 12 f. i 6 f.

Gdybyśmy mieli zadanie: ile potrzeba wziąć srebra 90-éj próby na 8 funtów srebra 72-éj próby, aby utworzyć stop 84-éj próby?, to, znalaz-

[1]) Gdybyśmy podobnie mieszali np. srebro 90-éj próby z miedzią (moglibyśmy o niéj powiedzieć, że jest próby 0), pragnąc otrzymać stop 84-éj próby, to odpowiednio byłoby zawiele 6 cząstek i zamało 84 cząstki.

[2]) T. j. względem stosunku (90—84) : (84—72).

szy, że stosunek, w jakim mają być wzięte ilości tych dwu gatunków jest 2 : 1, należałoby następnie rozwiązać zadanie na regułę trzech: kiedy na 1 funt gatunku 2-go należy brać 2 f. gatunku piérwszego, to na 8 f. drugiego ile trzeba wziąć funtów gatunku piérwszego? Znajdziemy, że należy srebra 90-éj próby wziąć 16 f.

ZADANIE NIEOZNĄCZONE.

4. Weźmy teraz przypadek, kiedy w zadaniu tego rodzaju, co poprzednie, mieszamy więcéj niż dwa przedmioty.

Np. Mając trzy gatunki tytoniu: na 420, 400 i 300 kopiejek funt, w jakim stosunku powinniśmy je mieszać, aby wartość funta mieszaniny wynosiła 380 kop.? — Wartość funta piérwszego gatunku i funta drugiego jest za wielka odpowiednio o 40 kop. i o 20 kop., wartość zaś funta trzeciego gatunku jest za mała o 80 kop. Na każdy więc funt trzeciego gatunku powinniśmy tyle wziąć piérwszego i drugiego, aby razem wziąć zawiele o 80 kop. Tyle zatym mamy wziąć jednostek piérwszego gatunku i tyle drugiego, aby mnożąc 40 kop. przez liczbę oderwaną, odpowiadającą ilości jednostek piérwszego gatunku, i mnożąc 20 kop. przez liczbę oderwaną, odpowiadającą ilości jednostek gatunku drugiego, otrzymać, jako sumę tych dwu iloczynów, 80 kop. Czyli mamy tu zadanie: wyznaczyć dwie liczby takie, aby suma iloczynu 40 przez jednę z nich i iloczynu 20-u przez drugą była 80 [1]). Jednéj z tych liczb szukanych możemy nadawać różne wartości; gdy bowiém, jako wartości np. piérwszéj z nich, przyjmiemy po kolei: $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}$ i t. d., to, gdy

$$40\times 1+20\times \text{drugą} = 80,\quad 40\times 0{,}5+20\times \text{drugą} = 80,\ \text{i t. d.}$$

miéć będziemy (§ 5, us. 7) odpowiednio: $20\times\text{drugą} = 80-40\times 1$ i t. d., skąd (§ 7, us. 5; § 17, us. 5)

$$\text{druga} = \frac{80-40\times 1}{20} = 2;\ \text{albo} = \frac{80-40\times 0{,}5}{20} = 3;$$

$$\text{albo} = \frac{80-40\times 0{,}25}{20} = 3{,}5,\ \text{i t. d.}$$

Wypada więc, że te trzy gatunki możemy mieszać z sobą proporcyjonalnie względem liczb (§ 36, us. 3, 2)

---

[1]) Wyrażając się, jak w algiebrze, gdy piérwszą z liczb szukanych nazwiemy x, a drugą y, mamy znaleźć pierwiastki dodatne (choćby ułamkowe) równania nieoznaczone

$$40 . x + 20 . y = 80.$$

$$1 : 2 : 1,$$

albo $\frac{1}{2} : 3 : 1$, czyli $1 : 6 : 2$,

„ $\frac{1}{4} : 3\frac{1}{2} : 1$, „ $1 : 14 : 4$,

„ $\frac{1}{5} : 3\frac{3}{5} : 1$, „ $1 : 18 : 5$,

„ $\frac{2}{5} : 3\frac{1}{5} : 1$, „ $2 : 16 : 5$,

i t. d.

Zadanie więc to może mieć nieskończenie wiele odpowiedzi i dlatego nazywamy je zadaniem nieoznaczonym.

Jeżelibyśmy, zamiast powyższego, mieli np. zadanie: Ile trzeba wziąć tytoniu z gatunków na 420, 400 i 300 kop. funt., aby utworzyć 15 funtów mieszaniny, któréjby funt był wart 280 kop.?, to i ono byłoby nieoznaczone, gdyż miałoby nieskończenie wiele rozwiązań, odpowiadających rozłożeniu 15-u funtów na trzy części, proporcyjonalne albo względem liczb 1 : 2 : 1, albo względem liczb 1 : 6 : 2, albo względem liczb 2 : 16 : 5 i t. d.

Zadania takie byłyby również nieoznaczone wrazie, gdyby, zamiast trzech przedmiotów mieszanych, było ich więcéj.

Widzimy więc, że zadanie, w którym, mając dane własności każdego z przedmiotów mieszanych i własność mieszaniny, chcemy wyznaczyć stosunki, w jakich mają być wzięte ilości mieszanych przedmiotów, jest nieoznaczone (t. j. posiada nieskończenie wiele odpowiedzi) w przypadku, gdy mieszamy z sobą więcéj niż 2 przedmioty.

Oczywiście, że to zadanie, tak w przypadku, kiedy mieszamy dwa przedmioty, jak i wogóle, kiedy mieszamy ich więcéj, jest możliwe tylko wtedy, kiedy własność mieszaniny wyraża się liczbą pośrednią między najmniejszą i największą z liczb, wyrażających własność przedmiotów mieszanych.

ŚREDNI TERMIN WYPŁATY ZOBOWIĄZAŃ.

5. Sposób, zapomocą którego rozwiązywaliśmy zadanie us. 2, może być zastosowany, kiedy idzie o oznaczenie tak zwanego «średniego terminu» zobowiązań, t. j. kiedy pytamy się, w jakim terminie należałoby wypłacić jednorazowo sumę kwot płatnych w różnych terminach, iżby przytym ani wierzyciel, ani dłużnik straty nie ponieśli.

Np. Jan ma zapłacić Piotrowi 200 zł. po 3-ch miesiącach, 300 zł. po 4 m., oraz 100 zł. po 6 m.; kiedy Jan mógłby jednorazowo wypłacić Piotrowi sumę 200 zł. + 300 zł. + 100 zł. = 600 zł. bez straty i bez zysku?

W tak wysłowionym zadaniu oczywiście przyjmuje się, że stopa procentu jest przy każdéj kwocie taż sama. Odsetki od 200 zł. za 3 m. wynoszą tyleż, co odsetki od $200 \times 3 = 600$ zł. za jeden miesiąc; i podobnie co do pozostałych dwu kwot, tak, iż odsetki od tych 3 kwot wynoszą tyleż, co odsetki od $200 \times 3 + 300 \times 4 + 100 \times 6 = 2400$ zł. za jeden miesiąc. Aby odsetki od całkowitéj sumy $200 + 300 + 100 = 600$ zł. również tyle wyniosły, suma 600 zł. powinna być widocznie zapłacona po upływie $\frac{2400}{600} = 4$ miesięcy, t. j. po upływie miesięcy:

$$\frac{200 \times 3 + 300 \times 4 + 100 \times 6}{200 + 300 + 100} = 4.$$

Odp. Za 4 miesiące przypadnie średni termin wypłaty zobowiązań Jana względem Piotra.

Podobnie: gdy ktoś zamiast 4-ch weksli, jednego na 350 rub. płatnego dziś, drugiego na 250 rub. płatnego za 40 dni, trzeciego na 300 rub. płatnego za 50 dni, i czwartego na 500 rub. płatnego za 70 dni, chce wystawić jeden weksel na sumę $350 + 250 + 300 + 500 = 1400$ rub., to za ile dni ma być oznaczony termin owego wekslu? — Zauważywszy, że od kwoty 350 rub. na piérwszym wekslu, płatnym dziś, nie ma do potrącenia odsetek, zaś należéć się od niéj będą odsetki przy wypłacaniu téj kwoty późniéj, znajdziemy, że termin wystawić się mającego wekslu ma być oznaczonym po upływie dni

$$\frac{250 \times 40 + 300 \times 50 + 500 \times 70}{350 + 250 + 300 + 500} = 42\frac{6}{7}$$

t. j. po upływie 43-ch dni (wszelki ułamek dnia, choćby mały, przyjmuje się za 1 dzień).

6. Zadania powyższego rodzaju, zwykle jedynie w arytmetyce rozważane, są szczególnym przypadkiem zadania ogólniejszego, kiedy idzie o średni termin wypłaty zobowiązań, zaciągniętych przy niejednakowéj stopie procentu. Najprościéj tę rzecz przedstawimy, rozważając ją ogólnie.

Jeżeli np. trzy kapitały k_1, k_2, k_3, umieszczone odpowiednie po $s_1\%$, $s_2\%$, $s_3\%$ mają być płatne odpowiednio po l_1, l_2, l_3 latach, to odsetki od wszystkich tych kapitałów wynoszą (§ 34, us. 6)

$$\frac{s_1 k_1 l_1 + s_2 k_2 l_2 + s_3 k_3 l_3}{100}$$

Jeżeli chcemy bez zysku sumę $k_1 + k_2 + k_3$ wypłacić po l latach, to za owe l lat odsétki przy odpowiednich stopach procentu rachowane,

$$\frac{(s_1 k_1 + s_2 k_2 + s_3 k_3)\, l}{100}$$

wynieść powinny tę samę kwotę co poprzednio, tak iż będzie:

$$l = \frac{s_1 k_1 l_1 + s_2 k_2 l_2 + s_3 k_3 l_3}{s_1 k_1 + s_2 k_2 + s_3 k_3}.$$

Z téj ogólnéj formuły, w razie, gdy przyjmiemy, że każde zobowiązanie jest zaciągnięte przy téj saméj stopie procentu, t. j. jeżeli przyjmiemy $s_1 = s_2 = s_3$, wypada po uproszczeniu formuła:

$$l = \frac{k_1 l_1 + k_2 l_2 + k_3 l_3}{k_1 + k_2 + k_3},$$

według któréj rozwiązaliśmy zadania ustępu poprzedzającego. Gdyby nadto oddzielne kapitały były równe sobie, $k_1 = k_2 = k_3$, to szukana liczba l byłaby średnią arytmetyczną liczb l_1, l_2, l_3.

Tak samo moglibyśmy obliczyć t. zw. «średnią stopę procentu». Tak np. ktoś dokonał trzech interesów, jednego kapitałem k_1, który mu w ciągu lat l_1 przyniósł $s_1\%$, drugiego kapitałem k_2, który mu w ciągu lat l_2 przyniósł $s_2\%$, i trzeciego kapitałem k_3, który w ciągu lat l_3 przyniósł $s_3\%$. Jeżeli się pytamy, jaka byłaby stopa procentu s, przy któréj też same kapitały k_1, k_2, k_3, w ciągu lat odpowiednio l_1, l_2, l_3, przyniosły też same, co poprzednio, odsetki, to, tak samo rozumując jak powyżéj, znajdziemy, że:

$$s = \frac{s_1 k_1 l_1 + s_2 k_2 l_2 + s_3 k_3 l_3}{k_1 l_1 + k_2 l_2 + k_3 l_3}.$$

Gdyby czasy obrotu każdego z tych kapitałów były jednakowe, t. j. gdyby było $l_1 = l_2 = l_3$, to wówczas:

$$s = \frac{s_1 k_1 + s_2 k_2 + s_3 k_3}{k_1 + k_2 + k_3}.$$

Nakoniec, gdyby nadto jeszcze te kapitały były sobie równe, $k_1 = k_2 = k_3$, to liczba s byłaby średnią arytmetyczną liczb s_1, s_2, s_3.

---

§ 38. REGUŁA ŁAŃCUCHOWA.

OKREŚLENIE ZADANIA NA REGUŁĘ ŁAŃCUCHOWĄ.

1. Jak widzieliśmy (§ 32, us. 1), w zadaniu na regułę trzech, mając daną jednę parę odpowiadających sobie wartości dwu wielkości proporcyjonalnych względem siebie, szukamy innéj wartości jednéj z tych wielkości, odpowiadającéj danéj (drugiéj) wartości drugiéj z tych wielkości. Mając np. takiego właśnie rodzaju zadanie: za $8^1/_8$ włóki zapłaco-

no 13020 rub., ile zapłacono za 3 włóki?, wypiszmy je w ten sposób w dwu wierszach, iżby szukana ilość rubli znalazła się na początku:

$$\begin{array}{rrr} x \text{ rub.} & \text{——} & 3 \text{ wł.} \\ 13020 \text{ „} & \text{——} & 8\tfrac{1}{8} \text{ „} \end{array}$$

Tu ilość włók jest proporcyjonalna wprost względem ilości rubli, i szukamy téj wartości ilości rubli, któraby odpowiadała trzem włókom, wiedząc, że 13020 rub. i $8\frac{1}{8}$ wł. przedstawiają parę odpowiadających sobie wartości tychże wielkości: ilości rubli i ilości włók.

Weźmy teraz zadanie: ile zapłacono za trzy włóki, jeżeli włóka ma $15\frac{5}{13}$ diesiatyny, a za 125 diesiatyn zapłacono 13020 rub.? W tym zadaniu szukamy ilości rubli odpowiadającéj 3 wł., ale nie mamy danéj pary bezpośrednio sobie odpowiadających wartości ilości włók i zapłaconych za nie rubli. Mamy tylko dwie oddzielne wartości tych wielkości: 1 wł. i 13020 rub., które sobie nie odpowiadają (i dlatego to zadanie nie jest wprost zadaniem na regułę trzech), lecz piérwsza z nich odpowiada $15\frac{5}{13}$ diesiatyny, druga zaś 125-u diesiatynom, t. j. owe dwie wartości odpowiadają dwu wartościom téj saméj wielkości: ilości diesiatyn. Zadanie to tak wypiszemy, aby każde dwie wartości téj saméj wielkości znalazły się pod sobą:

$$\begin{array}{rrr} x \text{ rub.} & \text{——} & 3 \text{ wł.} \\ 1 \text{ „} & \text{——} & 15\tfrac{5}{13} \text{ dies.} \\ 13020 \text{ „} & \text{——} & 125 \text{ „} \end{array}$$

Weźmy zadanie jeszcze więcéj złożone:

Ile rubli zapłacono za 3 włóki ziemi, jeżeli za 125 diesiatyn zapłacono 13020 rubli i jeżeli przy tym wyliczeniu przyjmujemy, że 1000 diesiatyn = 1092 hektarom, a mórg = 56 arom?

Mamy w tym zadaniu znaleść pewną ilość rubli, odpowiadającą 3 włókom, ale nie mamy danéj bezpośrednio pary odpowiadających sobie innych wartości tych dwu wielkości: ilości rubli i ilości włók. Jeżeli tu dodamy jeszcze to, co w tym zadaniu jest uważane za wiadome, a mianowicie, że włóka ma 30 morgów, a hektar 100 arów, to owych dwu wielkości: ilości rubli i ilości włók mamy w tym zadaniu dane dwie oddzielne wartości, 13020 rubli i 1 włókę, z których piérwsza odpowiada 125 diesiatynom, a druga 30 morgom. Tych zaś dwu wielkości: ilości diesiatyn i ilości morgów nie mamy tu pary odpowiadających sobie innych ich wartości, lecz tylko mamy dane dwie ich oddzielne wartości: 1000 diesiatyn

i 1 mórg, z których piérwsza odpowiada 1092 hektarom, a druga 56 arom; te zaś dane dwie wartości dwu wielkości: ilości hektarów i ilości arów sobie nie odpowiadają, lecz są dwiema oddzielnymi wartościami dwu wielkości: ilości hektarów i ilości arów, którychto wielkości dwie inne wartości: 1 hektar i 100 arów przedstawiają parę odpowiadających sobie wartości. Do danego więc zadania wchodzą wielkości: ilość rubli, ilość włók, ilość diesiatyn, ilość morgów, ilość hektarów i ilość arów. Dwie wartości każdéj z tych wielkości odpowiadają wartościom dwu różnych wielkości, tak iż w tym zadaniu mamy jakby szereg «ogniw» łańcucha, łączących z sobą różne wielkości, wchodzące do zadania, co się uwidoczni, gdy to zadanie tak wypiszemy:

x rub. —— 3 wł.
1 „ —— 30 m.
1 „ —— 56 *a*
100 —— 1 *ha*
1092 „ —— 1000 dies.
13020 rub. —— 125 „

W zadaniach takich mamy znaléść wartość pewnéj wielkości, odpowiadającą danéj wartości drugiéj wielkości, gdy drugie dane wartości tychże wielkości nie przedstawiają pary odpowiadających sobie wartości, lecz są dwiema oddzielnymi ich wartościami, odpowiadającymi dwu danym wartościom innéj wielkości, lub téż dwu danym wartościom oddzielnym dwu różnych wielkości; w tym ostatnim razie mamy jeszcze dane albo parę odpowiadających sobie wartości tych dwu ostatnich wielkości, albotéż dwie ich oddzielne wartości, odpowiadające dwu danym wartościom pewnéj innéj jeszcze wielkości, lubtéż dwu danym wartościom oddzielnym dwu jeszcze innych wielkości; w tym ostatnim razie i t. d.; ostatecznie zaś, albo dane dwie wartości pewnych dwu wielkości sobie odpowiadają (jak w ostatnim zadaniu), albotéż odpowiadają dwu danym wartościom pewnéj téj saméj wielkości (jak w zad. przedostatnim).

Takie zadanie nazywamy zadaniem na regułę łańcuchową. Zauważyć należy, że w zadaniu na regułę łańcuchową mamy do czynienia z wielkościami takimi, iż *każde dwie wielkości, których oddzielne wartości sobie odpowiadają, są wielkościami wprost proporcyjonalnymi względem siebie.*

W zadaniu na regułę łańcuchową należy znaléść wartość pewnéj wielkości, odpowiadającą danéj wartości drugiéj wielkości, gdy inne dane wartości tych dwu wielkości sobie nie odpowiadają; wszystkie zaś liczby w tym zadaniu są takie, że dwie wartości każdéj wielkości odpowiadają

wartościom dwu różnych wielkości [1]). Zbiór objaśnień i wskazówek rozwiązywania takich zadań stanowi r e g u ł ę ł a ń c u c h o w ą.

ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ NA REGUŁĘ ŁAŃCUCHOWĄ.

2. Rozwiążemy ostatnie z zadań ustępu poprzedzającego. Wypisaliśmy je tak, iż każde dwie wartości téj saméj wielkości były pod sobą; zwykle jednak dla oszczędzenia miejsca wypisuje się je tak:

x rub.	——	3 wł.		x rub.	3 wł.
1 wł.	——	30 morgów	albo też:	1 wł.	30 morgów
1 mórg	——	56 *a*		1 mórg	56 *a*
1000 *a*	——	1 *ha*		100 *a*	1 *ha*
1092 *ha*	——	1000 dies.		1092 *a*	1000 dies.
125 dies.	——	13020 rub.		125 dies.	13020 rub.

I tu, jak poprzednio, dwie wartości téj saméj wielkości wchodzą do dwu następujących po sobie wierszy, ale tak, iż wiérsz jeden kończy się, a następujący zaczyna od wartości téj saméj wielkości, a ostatni wiérsz kończy się wartością téj wielkości, od któréj wartości zaczyna się wiérsz piérwszy (te więc dwie wartości «zamykają łańcuch»). Gdy zadanie mamy tak wypisane, mówimy, żeśmy je ułożyli w ł a ń c u c h.

Ponieważ mamy znaléść wartość ilości rubli, odpowiadającą 3 włókom, więc, wychodząc z tego, że 125 diesiatynom odpowiada 13020 rub., będziemy kolejno, przechodząc przez hektary i morgi, dążyć do znalezienia szukanéj liczby. Wypadnie więc [2]) w ten sposób rozumować (§ 32, us. 3):

jeżeli za 125 dies. zapłacono 13020 rub., to za 1 dies. zapł. $\frac{13020}{125}$ r.

„ 1 dies. „ $\frac{13020}{125}$ rub., „ 1000 dies. [3]) zapłacono $\frac{13020 \times 1000}{125}$ r.

„ 1092 *ha* „ $\frac{13020 \times 1000}{125}$ rub., „ 1 *ha* zapłacono $\frac{13020 \times 1000}{125 \times 1092}$ r.

---

[1]) *Dokładne* określenie zadania na regułę łańcuchową nie daje się prościéj wysłowić (por. zresztą przypisek do us. 1-go, § 31-go).

[2]) Nie wykonywamy tu żadnych skróceń w otrzymywanych ułamkach, aby móc wnieść z odpowiedzi, jak ona powstaje z liczb, danych w zadaniu.

[3]) Czyli, według zadania, 1092 *ha*.

jeżeli za 100 a zapłacono $\frac{13020\times1000}{125\times1092}$ rub., to za 1 a zapłacono $\frac{13020\times1000}{125\times1092\times100}$ r.

„ 1 a „ $\frac{13020\times1000}{125\times1092\times100}$ rub., to za 56 a [1]) zapłacono $\frac{13020\times1000\times56}{125\times1092\times100}$ r.

„ 1 mórg „ $\frac{13020\times1000\times56}{125\times1092\times100}$ rub., to za 30 morgów zapłac. $\frac{13020\times1000\times56\times30}{125\times1092\times100}$ r.

„ 1 włókę „ $\frac{13020\times1000\times56\times30}{125\times1092\times100}$ rub., to za 3 włóki zapłacono $\frac{13020\times1000\times56\times30\times3}{125\times1092\times100}$ r.

Znaleźliśmy, ile zapłacono rubli za 3 włóki; że zaś tę ilość rubli nazwaliśmy x, zatym: za 3 włóki zapłacono rubli

$$x = \frac{13020\times1000\times56\times30\times3}{125\times1092\times100} = 4807{,}38.$$

Przypatrując się temu wypadkowi i powyżéj wypisanemu zadaniu w dwu kolumnach, możemy powiedzieć: *jeżeli zadanie na regułę łańcuchową wypiszemy w dwu kolumnach, tak, żeby drugi i następne wiérsze zaczynały się od wartości téj saméj wielkości, której wartością* [2]) *poprzedni wiersz się kończy i gdy ostatni wiérsz kończy się wartością téj wielkości, od któréj wiérsz piérwszy się zaczyna* [3]), *to liczba szukana równa się iloczynowi wszystkich liczb, znajdujących się w innéj, niż liczba szukana kolumnie, podzielonemu przez iloczyn wszystkich liczb, znajdujących się w téj samej co liczba szukana, kolumnie.*

W tak ułożonym zadaniu którekolwiek dwie liczby, wchodzące do różnych kolumn, są czynnikami jedna dzielnéj, a druga dzielnika (albo: jedna licznika, a druga mianownika). Dlatego, po takim ułożeniu zadania, albo wypiszemy wprost według powyższéj wskazówki wyrażenie szukanéj liczby i dzielić będziemy, jeżeli można, czynnik licznika i czynnik mianownika przez ich spólny dzielnik (§ 19 us. 4), albotéż wykonamy toż samo uprzednio, t. j. w wypisanym zadaniu zniesiemy ułamki, mnożąc

[1]) Czyli 1 mórg.
[2]) Wyrażoną przy pomocy téj saméj jednostki.
[3]) Można, układajac tak zadanie, zacząć je od którejkolwiek z liczb, do niego wchodzących; niéma to żadnego wpływu na wypadek. Rozumowanie tylko jest najzręczniejsze, gdy zadanie jest tak ułożone, jak powyżéj.

dwie liczby różnych kolumn przez odpowiednią tę samę liczbę, i następnie dzieląc dwie liczby różnych kolumn przez ich spólny dzielnik.

3. Chociaż zadanie na regułę łańcuchową nie jest wprost zadaniem na regułę trzech (us. 1), a więc w szczególności nie może być ani tak rozwiązywane jak zadanie na regułę trzech złożoną (§ 33 us. 2, 3, 4), ani też odpowiednio na oddzielne zadania rozłożone (§ 33 us. 1), to jednak można zadanie na regułę łańcuchową rozwiązać przy pomocy kolejnych zadań na regułę trzech. Tak np. rozwiązać możemy poprzednie zadanie, rozwiązując kolejno szereg następujących zadań na regułę trzech:

125 dies. —— 13020 rub.
1000 „ —— y „

1092 ha —— y rub.
1 „ —— z „

100 a —— z
56 „ —— u

1 mórg —— u
30 „ —— w

1 wł. —— w rub.
3 „ —— x „

gdzie y, z, u, w są liczbami wyrażającymi odpowiednie wartości ilości rubli, które kolejno z tych zadań wyznaczone być mogą.

Jeżelibyśmy z każdego zadania utworzyli proporcyją (§ 32 us. 2), to mielibyśmy:

$$\begin{aligned} y : 13020 &= 1000 : 125, \\ z : y &= 1 : 1092, \\ u : z &= 56 : 100, \\ w : u &= 30 : 1, \\ x : w &= 3 : 1, \end{aligned}$$

Mnożąc zaś te proporcyje przez siebie i oba wyrazy piérwszego stosunku dzieląc przez liczby y, z, u i w, otrzymamy proporcyją

$$x : 13020 = (1000 \times 56 \times 30 \times 3) : (125 \times 1092 \times 100),$$

z któréj wypada wyrażenie liczby szukanéj, utworzone według wskazówki, podanéj w ustępie poprzedzającym.

4. Weźmy jeszcze zadanie:

Dla kupca hurtowego w Warszawie komisant w Wiedniu nabył 9 pak towaru, ważących każda 612 kg brutto [1]) za sumę 10 044 guldenów i opłacił koszta transportu po 0,12 guldena od kg, a policzył sobie 2,4% komisowego od wszystkich wydanych w Wiedniu pieniędzy. W Warszawie kupiec nabył guldeny po 0,85 rub., opłacił cło od każdych 100 funtów netto, po 6 rub. w złocie, a rubel w złocie nabywał po 130 k. Tara stanowiła 4%. Jaką ów kupiec ma wyznaczyć cenę funta tego

[1]) Zob. koniec us. 1-go § 34-go.

towaru w sprzedaży detalicznéj, jeżeli po ustąpieniu od niej rabatu 25% ma sam osiągnąć zysku 20% od poniesionych przezeń kosztów? (funt rus. = 409,5 *g*).

Cena funta w sprzedaży detalicznuj zależy od tego, ile funt towaru kosztuje kupca. To zaś jest sumą tego, ile kosztuje funt, sprowadzony do Warszawy, i cła opłaconego za funt. Gdy piérwszy składnik nazwiemy x, a drugi y, to znajdzimy:

x rub.	1 f. netto
1 f.	409,5 *g*
1000 *g*	1 *kg*
96 *kg* netto	100 *kg* brutto
612 *kg* × 9	10044 gul. + 0,12 gul. × 612 × 9
100 gul.	102,4 gul.
1 gul.	0,85 rub.

$x = 0{,}722$:

y rub.	1 f,
100 f.	6 rub, w złocie
1 rub. w złocie	1,3 rub,

$y = 0{,}078$

$x + y = 0{,}8$.

Oznaczywszy cenę funta w sprzedaży detalicznéj przez z rub., mieć będziemy [1]):

z rub. (detal.)	0,8 rub. (kosztu)
100 „ (kosztu)	120 „ (hurt,)
75 „ (hurt.)	100 „ (detal.)

Odp. Cena funta sprzedaży detalicznéj ma wynosić 1 rub. 28 kop.

UŻYWANIE «ŁAŃCUCHA» PRZY ZADANIACH NA REGUŁĘ TRZECH.

5. Chociaż zadanie na regułę łańcuchową nie jest zadaniem na regułę trzech, to jednak można zadanie na regułę trzech ułożyć w łańcuch (us. 2), w tym przypadku, kiedy mamy w nim do czynienia tylko z *dwiema wielkościami względem siebie wprost proporcyjonalnymi* [2]).

Wypiszmy np. piérwsze zadanie us. 1-go § 32-go w ten sposób, aby drugi wiérsz zaczynał się od wartości tej wielkości, której wartością kończy się wiérsz piérwszy:

---

[1]) Wprowadzamy oznaczenia szczegółowe dla jasności, w praktyce pisze się same liczby.

[2]) Por. w us. 1-ym uwagę przed określeniem zadania na regułę łańcuchową.

x rub.	35 łok.
16 łok.	27 rub.

$$x = \frac{35 \times 27}{16} = 59{,}06$$

Tak samo mieć będziemy rozwiązując:

pierwsze zadanie us. 2-go § 34-go,

x rub. (zarobku)	280 rub.
100 „	15 „ (zarobku)

$$x = \frac{280 \times 15}{100} = 42;$$

piérwsze zadanie us. 6-go § 34-go,

x zł.	3 l.
1 rok	5 zł.

$$x = 3 \times 5 = 15;$$

x zł.	3000 zł.
100 „	15 „

$$x = \frac{3000 \times 15}{100} = 450;$$

piérwsze zadanie us. 7-go § 34-go,

x zł.	3 l.
1 rok	5 zł.

$$x = 15;$$

100 zł. + 15 zł. = 115 zł.,

x zł.	3450 zł.
115 „	100 „

$$x = \frac{3450 \times 100}{115} = 3000;$$

zadanie us. 10-go § 34-go,

x rub.	144 dnie
360 dni	6 rub.

$$x = \frac{144 \times 6}{360} = 2{,}4;$$

x rub.	2000 rub.
100 „	106 „
100 „	106 „
100 „	106 „
100 „	106 „
100 „	102,4 r.

$$x = 2000 \times 1{,}06 \times 1{,}06 \times 1{,}06 \times 1{,}06 \times 1{,}024 = 2585{,}55;$$

zadanie us. 2-go § 35-go,

x rub.	105 dni		x rub.	860 rub.	
360 dni	6 rub.		101,75 „	100 „	

$$x = \frac{105 \times 6}{360} = 1{,}75; \qquad x = \frac{860 \times 100}{101{,}75} = 845{,}21;$$

zadanie us. 3-go § 35-go,

x rub.	105 dni		x rub.	860 rub.	
360 dni	6 rub.		100 „	98,25 „	

$$x = 1{,}75; \qquad x = \frac{860 \times 98{,}25}{100} = 844{,}95;$$

zadanie us. 1-go § 36-go,

x rub.	20 łok.		x rub.	15 łok.	
60 łok.	33 rub.		60 łok.	33 rub.	

$$x = \frac{20 \times 33}{60} = 11; \qquad x = \frac{15 \times 33}{60} = 8{,}25;$$

$60 - (11 + 8{,}25) = 40{,}75.$

6. Handlujący używają z upodobaniem łańcucha, tak, iż nawet w nienadających się wprost do ułożenia w łańcuch zadaniach na regułę trzech złożoną w taki sposób grupują liczby, iżby zadanie mogło być uważane za zadanie na regułę trzech, w którem zachodzą tylko *dwie wielkości wprost względem siebie proporcyjonalne.*

Weźmy np. zadanie us. 1-go § 33-go i wypiszmy je tak:

x dni,	8 godz.,	24 tk. ——	3 600 m, 18 dm
32 dni,	9 godz.,	15 tk, ——	2 400 m, 15 dm

Ile razy powiększy się czyto ilość dni pracy, czy też ilość godzin codziennej pracy, czy nakoniec ilość tkaczy, to tyleż razy powiększy się wykonana przez nich robota, a mianowicie: albo np. długość utkanego płótna, albo też jego szerokość. Możemy więc powiedzieć, że trzy czynnikowe iloczyny liczb w piérwszéj kolumnie są tu wprost proporcyonalne względem iloczynów liczb kolumny drugiéj, tak, iż moglibyśmy to zadanie tak wypisać (us. 5):

$x \times 8 \times 24$	$3\,600 \times 18$
$2\,400 \times 15$	$32 \times 9 \times 15$

zwykle jednak w takim razie tak zadanie wypisują:

x	3600
8	18
24	
2400	32
15	9
	15

$$x = \frac{3600 \times 18 \times 32 \times 9 \times 15}{8 \times 24 \times 2400 \times 15} = 4{,}05;$$

Tak samo mieć będziemy, rozwiązując:

piérwsze zadanie us. 6-go § 34-go,

x rub.	3000 rub.
	3 l.
100 rub.	5 rub.
1 r.	

$$x = \frac{3000 \times 3 \times 5}{100} = 450;$$

ostatnie zadanie us. 6-go § 34-go,

x lat	450 rub.
3000 rub.	
5 rub.	1 r.
	100 rub.

$$x = \frac{450 \times 100}{3000 \times 5} = 3;$$

zadanie us. 3-go § 35-go,

x rub.	860 rub.
	105 dni
100 rub.	6 rub.
360 dni	

$$x = \frac{860 \times 105 \times 6}{100 \times 360} = 15{,}05$$

860 rub. — 15,05 rub. = 844,95 rub.

§ 39. REGUŁA FAŁSZYWEGO ZAŁOŻENIA.

Zadanie, w którem należy wyznaczyć liczbę z warunku, że pewne dwie liczby, od tamtej zależne, mają być równe sobie, może być rozwiązane zapomocą dwu dowolnie zrobionych przypuszczeń co do liczby szukanéj, odpowiednie postępowanie przy rozwiązywaniu tego rodzaju zadań (dawniéj [1]) wielce rozpowszechnione) nazywa się reguła fałszywego założenia (właściwiéjby: fałszywego przypuszczenia).

Np. Za 36 łokci sukna dwu gatunków, jednego po 12 zł. łokieć, a drugiego po 10 zł. łokieć, zapłacono 390 zł.; ile kupiono łokci każdego gatunku? — Jeżeli wyznaczymy np. ilość łokci piérwszego gatunku, to odejmując tę liczbę od 36 łokci, mieć będziemy ilość łokci gatunku drugiego. Ta zaś mająca się wyznaczyć ilość łokci piérwszego gatunku ma być taka, aby wartość wszystkich 36-u łokci była równa liczbie 390 zł.

Przypuśćmy, popiérwsze, że ilość łokci sukna gatunku pierwszego jest np. 10; w takim razie drugiego gatunku byłoby 26 łokci, i

$$(12 \text{ zł.} \times 10) + (10 \text{ zł.} \times 26) = 380 \text{ zł}; \quad 390 \text{ zł.} - 380 \text{ zł.} = 10 \text{ zł.}$$

Przypuśćmy, powtóre, że ilość łokci sukna piérwszego gatunku jest np. 12; w takim razie drugiego gatunku byłoby 24 łokcie, i

$$(12 \text{ zł.} \times 12) + (10 \text{ zł.} \times 24) = 384 \text{ zł.}; \quad 390 \text{ zł.} - 384 \text{ zł.} = 6 \text{ zł.}$$

Zauważmy, że różnica w ilości kupionych łokci sukna gatunku piérwszego jest proporcyjonalną względem różnicy między odpowiednimi ilościami złotych, należnymi za wszystkie 37 łokci (jak to łatwo sprawdzić, robiąc jakiekolwiek inne: trzecie, czwarte i t. d. przypuszczenia). Wychodząc więc z któregokolwiek z tych przypuszczeń, np. z drugiego (12 łokci), przy którym osiągamy o 6 zł. mniéj niżby należało, możemy skorzystać z tego, że stosunek różnicy między szukaną ilością łokci sukna gatunku piérwszego i 12 jego łokciami, któráto różnicę nazwijmy: r łokci, do różnicy między dwoma zrobionymi przypuszczeniami, t. j. do 2-ch łokci, jest równy stosunkowi dwu różnic między wartościami odpowiednimi wszystkich 36 łokci, t. j. stosunkowi

$$(390 \text{ zł.} - 384 \text{ zł.}) : (384 \text{ zł.} - 380 \text{ zł.}),$$

czyli stosunkowi 6 : 4. Mamy więc

$$r : 2 = 6 : 4, \quad \text{skąd } r = 3.$$

---

[1]) Obecnie takie zadanie rozwiązujemy algiebraicznie.

Szukana więc liczba jest o 3 łokcie większą od ilości łokci w drugim przypuszczeniu (12 łokci); a więc jest nią 15 łokci. Znaleźliśmy więc, że piérwszego gatunku sukna kupiono 15 łokci, a drugiego 21 łokci. —

Z powyższego widzimy, że tę metodę rozwiązywania można stosować tylko do takich zadań, w których *zmiana wartości liczby szukanéj jest proporcyjonalna względem różnicy owych dwu liczb, które powinnyby, według zadania, być sobie równe.* W każdym przeto danym przypadku należy uprzednio sprawdzić, czy to istotnie ma miejsce.

KONIEC.

Wyższa Szkoła Pedagogiczna BIBLIOTEKA GŁÓWNA w Kielcach

DO NABYCIA

WE WSZYSTKICH KSIĘGARNIACH NASTĘPUJĄCE DZIEŁA

WYDANE Z ZAPOMOGI KASY POMOCY

DLA OSÓB PRACUJĄCYCH NA POLU NAUKOWEM,

lub ofiarowane na rzecz Kasy.

DZIEŁA MATEMATYCZNE.

Biblioteki matematyczno-fizycznej, wydawanej pod redakcyją *M. A. Baranieckiego* i *A. Czajewicza*, następujące tomy:

Seryi I t. II i III: **Wiadomości początkowe z fizyki**, *S. Kramsztyka*. Książeczka I. Wydanie drugie, str. XII, 105, drzeworytów 61. Cena w oprawie kop. 40. Książeczka II. Wydanie drugie str. XI, 171, drzeworytów 77. Cena w oprawie kop. 65.

Seryi I tom IV: **Wiadomości początkowe z gieografii fizycznej i meteorologii**. *A. W. Witkowskiego*. Warszawa. 1884. W 12-ce, str. X, 108, drzeworytów 22, litografij 4. Cena w oprawie kop. 25.

Seryi III tom V: **Początkowy wykład syntetyczny własności przecięć stożkowych.** na podstawie ich pokrewieństwa harmonicznego z kołem, *A. M. Baranieckiego*, Warszawa, 1885, w 8-ce, str. XVI, 131, drzeworytów 63. Cena zniżona kop. 40.

Seryi III tom VI. **Trygonometryja płaska i kulista**, *A. Czajewicza*. Warszawa, 1891, w 8-ce, str. XXX, 389, drzeworyt. 86. Cena rs. 2.

Seryi III tom VIII. **Zasady fizyki** napisał *August Witkowski* Tom I. Warszawa, 1892, w 8-ce str. XIV, 469, drzeworytów 205. Cena rs. 2.

Seryi III tom IX: **Kosmografija**, *J. Jędrzejewicza*, ze wstępem historycznym *H. Merczynga*. Warszawa, 1886, w 8-ce, str. XLVIII, 400, drzeworytów 215 tab. X. Cena zniżona rs. 2.

Seryi IV tom II: **Rozwiązywanie równań liczebnych**, *J. Sochockiego*. Warszawa, 1884, w 8-ce Lex, str. XII, 212. Cena zniżona kop. 60.

Seryi IV tom IV: **Geometryja analityczna**, *W. Zajączkowskiego*. Warszawa, 1884, w 8-ce Lex, str. XL, 511, dzeworytów 85. Cena zniżona rs. 1.

Seryi IV tom X: **Mechanika teoretyczna**, *J. N. Frankego*, Warszawa, 1889, w 8-ce, str. XXXI, 645, drzeworytów 72. Cena rs. 3.

Dzieła i rozprawy matematyczno-fizyczne wydawane przez *A. Czajewicza*.

Tom 1 Arytmetyka, wykład szczegółowy *M. A. Baranieckiego* Warszawa 1894, str. 408, drzeworyty w tekście. Cena rs. 1 kop. 35.

Danielewicz Bolesław. **Z dziedziny statystyki matematycznej.** Warszawa, 1884, w 8-ce, str. 20. Cena zniżona kop. 10.

Rozmarynowicz Teofil. **Matematyczne podstawy ubezpieczenia na wypadek niezdolności do pracy**, w zastosowaniu do urządzenia kas emerytalnych. Wydał Bolesław Danielewicz, Warszawa, 1886, w 8-ce więk. str. IV, 53. Cena zniżona kop. 10.

Gino Loria. **Przeszłość i stan obecny najważniejszych teoryj gieometrycznych.** Przekład uzupełniony licznemi dodatkami, wydany za upoważnieniem autora przez *S. Dicksteina*. Warszawa, 1889, w 8-ce, str. VIII, 113, V. Cena kop. 60.

DZIEŁA PRZYRODNICZE I ETNOGRAFICZNE.

Sprawozdania z piśmiennictwa naukowego polskiego, w dziedzinie nauk matematycznych i przyrodniczych.
Rok 1. 1882. Warszawa, 1883, str. VIII, 188. Cena rs. 1.
Rok 2. 1883. Warszawa, 1885, str. IV, 220. Cena rs. 1.
Rok 3. 1884. Warszawa, 1886, str. IV, 294. Cena rs. 1.
Rok 4. 1885. Warszawa, 1887, str. VII, 300. Cena rs. 1.

I. D. Everett. **Jednostki i stałe fizyczne.** Przekład z 2-go wyd. angielskiego, dokonany przez *J. J. Boguskiego*, staraniem Redakcyi „Wszechświata", Warszawa, 1885, w 8-ce, str. XX, 168, IV. Cena kop. 30.

T. X. Hurley. **Wykład biologii praktycznej.** Za upoważnieniem autora przełożył z angielskiego *August Wrześniowski*, prof. uniwersytetu. Warszawa, 1883, w 8-ce, str. X, 271. Cena kop. 30.

W. F. Szokalski. **Początek i rozwój umysłowości w przyrodzie.** Warszawa, 1885, w 8-ce, str. VIII, 468. Cena kop. 60.

Dr. Kazimierz Filipowicz. **Wiadomości początkowe z botaniki** (podług dzieła D-ra Le Maout: „Leçons élementaires de botanique") z 194 drzeworytami w tekście. Warszawa, 1884, 16-ka, str. III, 234, II. Kartonowane. Cena kop. 25.

W. K. **Mapa hydrograficzna dawnej Słowiańszczyzny.** Część zachodnio-północna. Cena kop. 10.

W. K. **Rzeki i jeziora**, tekst objaśniający do mapy hydrograficznej dawnej Słowiańszczyzny, części północno-zachodniej. Warszawa, 1883, w 8-ce, str. II, 125. Cena kop. 10.

Dr. Berdau Feliks. **Flora Tatr, Pienin i Beskidu Zachodniego.** Warszawa, 1890, w 8-ce, str. IV, 827, 55. Cena rs. 3.

BIBLIOTEKA PRZYRODNICZA „WSZECHŚWIATA".

Dr. Edward Strasburger prof. **Krótki przewodnik do zajęć praktycznych z botaniki mikroskopowej.** W 8-ce, str. X, 368, VI ze 115 drzeworytami w tekście. Cena 2. (Wyczerpane).

H. Mohn. **Zasady meteorologii**, przełożył *St. Kramsztyk*, 8-o, str. XVI, 318, VI, z 46 drzeworytami i 24 tablicami litografowanemi. Cena rs. 2.

J. D. Dan. **Podręcznik gieologii.** Spolszczył *Dr. I. Siemiradzki.* Z 261 drzeworytami w tekście. Warszawa, 1891. W 8-ce str. 219. Cena rs. 1 kop. 20.

DZIEŁA LEKARSKIE.

D-r. Juljusz Cohnheim. **Odczyty z patologii ogólnej.** Podręcznik dla lekarzy i studentów. Przekład z 2-go przerobionego wydania, z 1882 r. Warszawa, 1884, w 8-ce. Tom I, str. VIII, 607. Tom II, str. V, 262. Tom III, str. VI, 340, 20. Cena rs. 5.

S. Jaccoud. **Wykład patologii szczegółowej.** Przekład z siódmego wydania francuskiego z r. 1883. Dzieło ozdobione drzeworytami i tablicami chromolitograficznemi. Warszawa, 1884, w 8-ce. Tom I, str. 931. Tom II, str. 984. Tom III, str. 961. Cena rs. 6.

A. Baginsky. **Wykład chorób dzieci.** Podręcznik dla lekarzy i studentów. Przekład z wydania niemieckiego z r. 1883, dokonany przez D-ra *Wiktoryna Kosmowskiego.* Tom I. Warszawa, 1886, w 8-ce str. VIII, 279. Tom II, 1886, 272. Tom III, 1887, str. 272. Cena każdego tomu rs. 2.

F. V. Birch-Hirschfeld. **Wykład anatomii patologicznej.** Część ogólna, ze 128 drzeworytami w tekście. Z 2-go, zupełnie przerobionego wydania przełożył *Dr. Wacław Mayzel.* Warszawa, 1884, w 8-ce, str. XVI, 338. (Wyczerpane).

H. Haeser. **Historyja medycyny.** Przekład trzeciego wydania dzieła: **Lehrbuch der Geschichte der Medicin** dokonany przez prof. *D-ra H. Łuczkiewicza.* Tom drugi. Dzieje medycyny nowożytnej. Warszawa, 1886, w 8-ce, str. 1092. Cena rs. 5.

Toż samo dla b. prenumeratorów Biblioteki Umiejętności lekarskich, od ark. 68 (str. 737 do 1062), cena z przesyłką rs 2. Arkusze poprzednie zniszczone i zagubione, księgarnia E. Wendego i Sp. uzupełnia bezpłatnie.

(NB. Tom pierwszy powyższego dzieła, obejmujący medycynę wieków starożytnych i średnich, wydany w r. 1876 w Bibl. Umiej. lekarsk., str. 387 i II, znajduje się w handlu księgarskim po rs. 1).

A. Korneliusza Celsa. **O lecznictwie ksiąg ośmiora** (A. Corn. Celsi: De medicina libri octo), z najlepszych wydań na język polski przełożył Dr. Med. i Chir. *Henryk Łuczkiewicz.* Warszawa, 1889, str. XXXVII, 630. Cena rs. 2.

Cybulski Napoleon prof. **Fizyologija człowieka**, wydana staraniem *Stanisława Markiewicza.* Część I Krew. Limfa. Mięśnie. Układ nerwowy. Warszawa, 1891, w 8-ce, str. 239 z 63 cynkotypami. Cena kop. 75. Część II. Krążenie krwi i limfy. Oddychanie. Trawienie. Warszawa 1892 r. str. 240—494 z 58 cynkotypami. Cena kop. 75.

Fryderyk Sander. Zarys nauki o **Publicznej Ochronie Zdrowia**, według drugiego wydania z r. 1885, przełożył *St. Markiewicz.* Str. VI, 632. Warszawa. 1891. Cena rs. 1 kop. 50.

Dawid Wassercug. **Objawy Oczne**, przy zaburzeniach układu nerwowego, oraz wartość ich przy rozpoznawaniu siedliska i natury chorób mózgowych. (Z rysunkami szematycznemi). Warszawa 1891, w 16-ce, str. 256. Cena rs. 1.

Wykłady z dziedziny Patologii ogólnej i szczegółowej. Przekład z dzieła: Traité de Médecine, wydanego pod kierunkiem Profesorów: Charcot, Bouchard, Brissaud. Potologia ogólna zakażeń przez A. Charrin'a. Zaburzenia i choroby odżywiania przez Le Gendre'a przekład *St. Markiewicza.* Choroby zakaźne wspólne ustrojowi człowieka i zwierząt przez G. H. Roger'a przekład *Ad. Ciąglińskiego.* Warszawa 1893, w 8-ce. Str. VIII. 966. Cena rs. 4.

Wł. Ołtuszewski **Szkic fizyologii mowy** ze szczególnem uwzględnieniem głosek alfabetu polskiego. Z 5 drzeworytami. Warszawa, 1893, w 8-ce, str. 38. Cena kop. 20.

DZIEŁA FILOZOFICZNE, HISTORYCZNE, FILOLOGICZNE I PEDAGOGICZNE.

Biblioteka filozoficzna, wydawana pod redakcyją prof. *Henryka Struvego.* Dotąd wyszły następujące pisma:

Platon **Obrona Sokratesa.** Przełożył z greckiego i objaśnienia dodał *Adam Maszewski*, Magister nauk filologiczno-historycznych b. Szkoły Głównej Warszawskiej. Warszawa, 1885, w 8-ce str. XII, 68, nlb. 4. Cena kop. 40.

Platon. **Fileb. Dyjalog o rozkoszy.** Przełożył z greckiego *Br. Kąsinowski.* Warszawa, 1888, w 8-ce, str. XL, 103, nlb. Cena kop. 70.

Kartezyjusz. **Rozmyślania nad zasadami filozofii**, dowodzące istnienia Boga i różnicy pomiędzy duszą ludzką i ciałem. Przełożył z łacińskiego *Ignacy Karol Dworzaczek.* Warszawa, 1885, w 8-ce str. XX, 110, nlb. 4. Cena kop. 70.

Spinoza. **Etyka**, sposobem geometrycznym wyłożona. Przełożył z łacińskiego *Antoni Paskal.* Warszawa, 1888, str. XLVII, 254. Cena rs. 1 kop. 50.

Berkeley. **Rzecz o zasadach poznania.** Przełożył z angielskiego *Feliks Jezierski.* Warszawa 1890, w 8-ce str. XXXII, 152, nlb. 6. Cena kop. 50.

Kondyllak. **Traktat o wrażeniach zmysłowych.** Przełożył z francuskiego *Antoni Lange.* Warszawa, 1887, w 8-ce, str. XXXVII. 220. Cena rs. 1 kop. 20.

W. Lutosławski **O logice Platona.** Część II-ga. dotychczasowe poglądy na logikę Platona i zadania dalszych badań nad tym przedmiotem. Warszawa 1892, w 8-ce wielkiej, str. 64. Cena kop. 30.

Wierzbowski Teodor. **Krzysztofa Warszewickiego** niewydane pisma, listy do znakomitych ludzi, tudzież inne dokumenty, odnoszące się do jego życia i działalności, wraz ze spisem dzieł tegoż autora, dotąd drukiem ogłoszonych. Warszawa, 1883 w 8-ce, str. VII, 276. Cena rs. 2.

Wierzbowski Teodor. **Krzysztof Warszewicki** 1544 — 1600 i jego dzieła. Monografia historyczno-literacka. Warszawa, 1877, w 8-ce, str. XII, 406. Cena rs. 3.

Biblioteka zapomnianych poetów i prozaików polskich:

Zeszyt I. **Wenecyja**, poemat historyczno-polityczny z końca XVI wieku. Warszawa, 1886, str. XXXVIII, 90, V. Cena rs. 3.

Zeszyt II. **Mowy Krzysztofa Warszewickiego**, wypowiedziane i wydane w r. 1602. Warszawa, 1885, str. VII, II. Cena rs. 1.

Wierzbowski Teodor. **Uchańsciana**, czyli zbiór dokumentów, wyjaśniających życie i działalność Jakóba Uchańskiego, arcybiskupa gnieźnieńskiego, † 1581. Warszawa, 1884—1891 w 8-ce.

Tom I. Korespondencyja Uchańskiego z lat 1549 — 1581 i wyjątki z Acta decretorum kapituły gnieźnieńskiej z lat 1562—1581, str. VIII, XV, XLIV, 441.

Tom II. Różne dokumenty z lat 1537 — 1581 i Uchańsciana Vladislaviensia, z lat 1557 — 1562, zebrane przez *Zenona Chodyńskiego*, prałata kustosza katedry kujawskiej. str. IV, XVII, 480.

Tom III, zawierający: 1) korespondencyję Uchańskiego z Hozyuszem 1561 — 1573; listy rozmaitych osób do Uchańskiego, 1554 — 1565; 3) poselstwa polskie do Rzymu, 1548 — 1578; 4) biografię Uchańskiego przez I. A. Załuskiego; 5) Achacego Cureusa Elegia gratulatoria, 1559. Str. II, IV, XIII, 351.

Tom IV zawierający: 1) poselstwa papieskie w Polsce, 1560—1581; 2) różne dokumenty z lat 1534—1592, str. IV, VII, III, II, 401. Cena każdego tomu rs. 3.

Wierzbowski Teodor. **Jana Ostroroga Pamiętnik** ku pożytkowi Rzeczypospolitej zebrany, poprzedzony przedmową. Warszawa, 1891. Cena rs. 1 kop. 25.

Korneliusa Neposa. **Żywoty znakomitych mężów**, przełożył i objaśnienia historyczne dodał *A. Mierzyński*. Warszawa 1883, w 8-ce str. 361. Cena kop. 15.

J. Szastecki. **Gramatyka czeska**, wydana nakładem *Kazimierza Kaszewskiego*. Warszawa, 1884, w 8-ce str. VIII, 204. Cena rs. 1 kop. 20.

Prace filologiczne, wydawane przez *J. Baudouina de Courtenay*, *J. Karłowicza*, *Ad. Ant. Kryńskiego* i *L. Malinowskiego*.

Tom I. Warszawa, 1885 i 86, w 8-ce, str. 818. Cena rs. 4 kop. 30.

Tom II. Warszawa, 1887—88, w 8-ce str. 881. Cena rs. 4 kop. 50.

Tom III. Warszawa, 1889—1891, str. 846. Cena rs. 3.

Tom IV. Zesz. 1 i 2 Warszawa. 1892—1893 Str. 1—688. Cena zesz. rs. 1.

Iliada Homera, przetłomaczył hexametrem *Augustyn Szmurło*, b. prof. literatury greckiej i rzymskiej i t. d. Warszawa, 1887. W 8-ce więk. str. XXX, 531. Cena rs. 1.

Rocznik pedagogiczny, przegląd postępów w dziedzinie wychowania i nauczania, wydawany staraniem i pod redakcyją *S. Dicksteina*. Tom II. 1882—1883. Warszawa, 1884, w 8-ce str. IX, 470.

Gajsler J. F. **Rys dziejów czeskich**, skreślił według źródeł... Tom I. Warszawa, 1888. W 8-ce str. IV, 228, z mapą chromolitograf. Cena rs. 1 kop. 20. Tom II. 1892 Str. 361. Cena rs. 1.

Źródła do mytologii litewskiej od Tacyta do końca XIII. wieku Zebrał i objaśnił *Antoni Mierzyński*. Zeszyt I. Warszawa 1892. W 8-ce str. 155.

Czapiński Leopold **Księga przysłów, sentencji i wyrazów łacińskich**, używanych przez pisarzów polskich. Warszawa, 1892, w 8-ce str. 524 Cena rs. 2 kop. 50.

DZIEŁA TREŚCI ROZMAITEJ.

Zieliński Dominik, b. obrońca przy senacie. **O wekslach** (fragment). Wydanie pośmiertne. Warszawa, 1883, w 8-ce, str. IV, 410. Cena rs. 2 kop. 50.

Jeziorański Feliks. **Ustawy hypoteczne i przepisy o zatwierdzeniu aktów notaryjalnych**, obowiązujące w Królestwie Polskiem, z objaśnieniami. Część II. Ustawa sejmowa z r. 1818. Tom I. Warszawa, 1892. W 8-ce str. 575, VI.

Kleczkowski Kazimierz arch. **Analiza kształtów architektury.** Warszawa, 1885, w 8-ce, str. 101, z 22 tablicami rysunków, sposobem foto-litograficznym wykonanych. Cena rs. 2.

Toż. Część II. Warszawa, 1890, w 8-ce, str. X, 114, z 65 rysunkami w tekście. Cena rs. 2.

Natanson Ludwik Dr. Med. **Teorya jestestw idiodynamicznych.** Warszawa, 1883, str. 112 i IV. Cena kop. 25.

F. 28/67 - 36/25

30

165882

11.03/AB

WYŻSZA SZKOŁA
PEDAGOGICZNA W KIELCACH
BIBLIOTEKA
103630

Biblioteka WSP Kielce
0159605